ELECTRON MICROSCOPIC STUDIES ON THE ORIGIN OF CHOLESTERINE CRYSTAL IN THE CHOLESTERINE GRANULOMA (IN HUMAN EARS)

TAKESHI SAKAMOTO

*Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine,
Hokkaido University, Sapporo (Director: S. Hirano, M.D.)*

Cholesteroline granuloma obtained from the mastoid cavities of ten operated patients aged from 12 to 56 years was fixed by Millonig's 1% osmic solution, immediately after removal, embedded in Epon 812, stained by uranyl acetate solution and electron-microscopically observed in order to study the origin of cholesteroline crystal which is recognized as cholesteroline cleft within the granuloma.

Results obtained were as follows:

1. Small cholesteroline clefts (possibly in early stage of development) were seen to be surrounded by numerous degenerated erythrocytes, D-Cell (see below) and phagocytes being in a close contact with each other (Fig. 6, 7).

Several phagocytes in which phagosome, residual bodies and myelin figures indicated their active function, including the small cleft also (Fig. 6, 7).

2. Foam cells contain various sized and forms of vacuoles and granules were often seen around the clefts. Some of the cells contained small cholesteroline clefts or phagosomes in the cytoplasm. These

cells were therefore, supposed to belong to phagocytes (Fig. 1, 2).

3. Erythrocytes and degenerated cells were always found to be in a close contact with cholesteroline cleft at its surface. The former degenerated frequently. The size of the latter was equal to that of the former. It had a cell membrane, but lacked nucleus. The cytoplasm consisted of diffusely scattered fine granules of low electron density. The feature of the cell suggested that the degenerated blood cell was its origin. Thus the cell was called D-cell by the author.
4. Vascular lesions, such as stasis and thrombosis were frequently observed in the vicinity of the clefts (Fig. 4).
5. These findings strongly suggested that the cholesteroline crystal derived from blood-element which had emigrated from disturbed blood vessels and could develop within extracellular spaces and that it could grow within phagocytes.

ヒトの耳に生じるコレステリン肉芽腫のコレステリン結晶発生機序に関する電子顕微鏡的研究

北海道大学医学部耳鼻咽喉科教室（主任：平野新治教授）

坂 本
さ か も と毅
た け し

緒 言

最近、多数の報告がみられるようになったヒトの耳に生じるコレステリン肉芽腫は、青色鼓膜を有する患者の他は、慢性中耳炎の手術時に偶然発見することが多い。しかし、その成因は不明であり、成因を耳管閉塞¹⁾²⁾、血管血流の異常³⁾⁴⁾、炎症性産物の機化に求めるものも

あり⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾ 確定的なものはない。又、実験的に動物にコレステリン肉芽腫をつくるのが難しいため、その成因の追求を困難にしている。

コレステリン肉芽腫内のコレステリン結晶の由来についても、側頭骨含気腔粘膜上皮の脂肪変性の結果生じるというもの⁹⁾、中耳腔内の出血に由来するというもの¹⁰⁾

3)(4)(10)(11)があるが確定的なものはない。

今回、著者はヒトの耳に生じたコレステリン肉芽腫内のコレステリン結晶の発生機序を、電子顕微鏡的に解明しようと試みた。

研究材料ならびに方法

材料は当院に入院した満12才より56才に至る男女10人、11耳の乳突腔にみられた手術材料を用いた。

手術は、すべて0.2% T-caine による局所麻酔を施行し、麻酔部位は乳突部、外耳道にとどめ、乳突腔への麻酔剤の影響をさけた。乳突部削開と同時に肉芽腫を速やかに耳内鉗子にて採取、直ちに5°C以下に冷保存したMillonig法による1%オスミック酸に固定、厚さ2mm以下に細切し同固定液で2時間半固定、その後水洗することなく50%アセトンより始まるアセトン上昇列と100%アセトンで合計2時間半脱水し、Luft法¹²⁾に準じてEpon 812に包埋した。包埋剤の硬さの調節には、A、B液を5:5の割合に混合したものを使用した。超薄切片の作製はLKB 4800型ミクロトームを使用しガラスナイフにて行なった。ついで醋酸ウラニールによる単染色を行なって、明石 TRS-50 EI型、および日立 HS-7D型電子顕微鏡（以下、電顕という）によって観察し、直接倍率2000倍より10000倍にわたり撮影した。なお、超薄切片を切る前後に同一電顕用包埋試料から約0.5μ～0.1μの切片を作り、アルカリトルイジンブルー¹³⁾で染色し光顕顕微鏡（以下、光顕という）的検索を行なった。

所 見

コレステリン肉芽腫（以下、肉芽腫という）内のコレステリン結晶（以下、コ結晶という）はオスミック酸では固定されず、アセトン上昇列による脱水操作で容易に溶解し、アルコール上昇列の脱水操作を行なった光顕所見と同じく抜け殻となり、附図にみるごとく、いわゆるコレステリンクレフト（コレステリン裂隙、以下、コ・クレフトという）となり、ネガティブ像が観察される。

コ・クレフトは、大体長方形の四隅の角が丸みをもった形としてあらわれることが多い。大小は一定せず、小さいものは2μ×0.25μ、大きいものは500μ×2.5μ以上に達するものもある。コ・クレフトの周囲は完全に膜様構造によってとり囲まれている場合と、一部が断裂消失する場合とがある（写真1）。この膜様構造をみる場合、これがクレフトに接する細胞の細胞膜の延長か、細胞内の膜性小器官の膜であるか決定できないことが多かった。

以下、クレフトに接する頻度の多い細胞、および周囲にみられた血管について記述する。

巨細胞：クレフトの周囲には細胞膜の境界なしに核が数個並列する像をしばしば認める。細胞質には食食顆粒を認め、mitochondriaは比較的少なく、endoplasmic reticulumが偏在して発達する傾向がある。endoplasmic reticulumが拡張し泡沫細胞への移行像を示す場合も多く認められる（写真2）。

泡沫細胞：種々の大きさであらわれてくる。核の偏在をみることが多い（写真1）。空胞は胞体をほとんど充滿している。空胞の形は丸いものが多いが、不規則な形であられるものもある（写真8、9）。空胞の大きさは不同である。空胞は限界膜を有し、その内容は電子密度の低い糸状物が散在したようになってみえることが多い。空胞間に電子密度の高い大小種々の円形の顆粒が多数散在する。空胞の大きさが極端に異なり、かつ偏在することもある。胞体内にphagosome、小さいコ・クレフトを有するものもある（写真2）。

D細胞：赤血球と共にコ・クレフトの周辺、またはこれと密接してほとんど常在する細胞である。大きさは赤血球と略々同大で、核を認めず、細胞質は砂粒をまき散らしたような電子密度の低い粒子群よりなる。この粒子群の他に、小空胞、電子密度の高い微細な顆粒をわずかに有するものもある（写真6）。コ・クレフトがこの細胞に挟まれた形となってあらわれる場合がしばしばみられる（写真3）。これらの細胞を仮りにD細胞と名づけた。

血管外赤血球：光顕所見でも赤血球がコ肉芽腫の血管外に多くあらわれ、これらはしばしば変性しエオジンに淡く染まって認められる。電顕的に観察すると、コ・クレフトの周辺、またはこれに密接して常在する赤血球は、色々な形であられ、かつ電子密度に差を生じて認められる（写真3、5、6、7、8、9）。

変性細胞：D細胞もこれに属するが、変性細胞はとくにコ・クレフトが大きく、かつ多数存在する視野に多く認められる。濃縮した核を認めることもあるが、核の存在が認められないことが多く、細胞質の内容は砂粒を散在したような電子密度の低い粒子群よりなることが多い。

血管：コ・クレフトの周辺には、しばしば血流停滞、ないしは血栓像を示す血管が認められる。すなわち、管腔内に赤血球、栓球、他の血液細胞、および血漿成分がつまっている像がみられ、血管の内皮細胞は、tight junctionを境として隣接する内皮間に電子密度の差を生じている（写真4、矢印で示す）。また、電子密度の低い

明るい血管内皮細胞と電子密度の高い暗い内皮細胞とが血管腔を形式し、かつ血流停滞を示す像も認められた。また pericyte に脂質とみられる顆粒を多く有する血管の所見もしばしば認められた。

さらに、光顕的には明確にコ・クレフトとして識別できないような、小さいコ・クレフトを検索して得た所見は次のごとくである。

- 1) 細胞外にコ・クレフトを認め、このコ・クレフトは数多くの赤血球とD細胞とに囲まれ、その間隙は電子密度の低い微粒子群によって埋められている。そのすぐ周辺には数多くの myelin figure および residual body を有する大きな食細胞を認める(写真5)。
- 2) 細胞外に多角形となったコ・クレフトを認め、このクレフトは多数の赤血球、D細胞、泡沫細胞、および単球様細胞によって囲まれており、これらの間隙は微細な低い電子密度の粒子群によって埋められている。これらの赤血球の電子密度には明らかに差が認められる(写真8, 9)。
- 3) 上述の2)の所見を示す視野に隣接して、種々なる電子密度を有する赤血球、D細胞、および食細胞に囲まれ、細胞外にコ・クレフトが認められる。食細胞は赤血球の4~10倍の大きさで、多くの myelin figure, residual body, および phagosome を有する。この食細胞の一つに小さなコ・クレフトを認める(写真6, 7)。

総括ならびに考按

ヒトの耳に生じるコ肉芽腫は Manasse¹⁴⁾ が1917年に最初に報告したといわれるが、その後次第に報告が増加してきている^{11)~13)}。しかし、その成因は不明な点が多い。

コ肉芽腫をつくる動物実験は Friedmann⁶⁾、および教室の土田等¹⁵⁾によって報告されているのみである。すなわち Friedmann⁶⁾ はモルモットの耳に、純アルコール・エーテル等分液にコレステリン結晶を浮遊させた液を注入してコ肉芽腫をつくったが、果して注入したコレステリンによって生じたものか、エーテル・アルコールによる刺激で生じたものか不明である。土田等は1%酢酸を週1回、5~20回家兎の耳に注入してコ肉芽腫をつくり、炎症によってコ肉芽腫が生じることを立証し、さらにヒトの耳に生じたコ肉芽腫についての臨牀病理組織学的検索成績とあわせ考察し、コ肉芽腫は慢性中耳炎によって中耳腔に生じた肉芽腫が、その吸収途上に血行障碍をきたして生じるものであると推論している¹⁵⁾¹⁶⁾。

しかし、コ肉芽腫内のコ結晶の由来については、中耳

腔内に生じた血液に由来するという意見³⁾⁴⁾¹⁰⁾¹⁷⁾が多いが、確定的なものではなく、かつこれに反対する意見⁹⁾もある。

これら上述のコ肉芽腫に関する報告をみると、コ結晶とその周辺との関連性を組織学的に追求した報告は見当たらない。著者は、コ結晶とその周辺との関連性を明確に観察すれば、コ結晶の発生機序を知りうると考えた。

コ肉芽腫を凍結切片にして組織化学的検索法、または重屈折法を用いて観察すると、コ結晶自体の検出は可能であるが、その周辺との関連性を明確につかむことはできない。普通標本ではアルコール等による脱水操作中に、コ結晶は溶解して抜け殻(すなわちコ・クレフトであるが)となる。この場合、コ・クレフトの周辺は観察できるが、光顕の分解能の許容する範囲内の観察にとどまる。

著者は、コ結晶とその周辺との関連性を明確に知り、コ結晶発生機序のいとぐちを形態学的につかむのに、すぐれた分解能をもつ電顕が応用できないかと考えた。

電顕標本を作製する際、固定剤として一般に用いられているオスミック酸は、コ結晶を除くほとんどすべての脂質を固定することが知られているが¹⁸⁾、Millonig法による1%オスミック酸溶液中でコ結晶の形が変わるかを否かを知るため、市販のコ結晶を同液に3時間浸漬してみたが、その結晶形は不変であった。

次いでこの結晶を50%から始まるアセトン上昇列に入れると速やかに溶解した。したがって、肉芽腫を上述した方法で固定・脱水を行なえばコ肉芽腫内のコ結晶はアセトン溶液内に溶出してしまいが、コ結晶の形はコ肉芽腫にネガティブ像となって、略々そのままの形を残しうると考えた。つまり、このネガティブ像を電顕的に追及することによって、コ・クレフトとその周辺の関連性を、光顕の観察よりはるかに明確にとらえうると考えた。

コ肉芽腫内にコ結晶が発生してくる場合を考えると、はじめから大きい結晶となってあらわれてくるとは考え難いので、コ結晶のあらわれてくる初期像をとらえるには、小さいコ・クレフトを追及していく必要があると考え、小さいクレフトの存在する視野を選んで観察をすすめた。

以下、コ・クレフトとその周辺を観察してえられた所見を考察する。

1) 血管の変化

光顕的なコ肉芽腫の組織検索の報告では、コ肉芽腫

内、またはその周辺の血管の変化に関するものは甚だ少ない。コ肉芽腫内の毛細血管に多核白血球のつまっている所見を認めた Birrell¹⁹⁾、同じくコ肉芽腫内に内腔の閉塞した血管を多数認めた Lichtenstein²⁰⁾、コ肉芽腫とその周辺に血管腫、または静脈瘤の存在を考えた Johnston³⁾の論文をみるに過ぎない。土田¹⁶⁾は有茎性となったコ肉芽腫の茎部の血管が、その周囲にのびてきた上皮に絞扼された所見を報告し、コ肉芽腫が血行障碍に陥り入っていることを指摘している。

電顕的にコ肉芽腫内の血管の変化を観察報告したものはないが、著者はコ・クレフトの周辺で細静脈の血栓像、ないしは血流停滞像をしばしば認めた(写真4)。この血管には一個の赤血球、数個の怪球、他の血液細胞および血漿成分がつまってみられ、この血管の tight junction を境とする隣接の2個の内皮間に電子密度の差を生じていることが認められた。この内皮間の電子密度の差については、血管に炎症等の病変を生じている時にあらわれるという見解²¹⁾と、postcapillary venule にみられる正常な所見であるという見解²²⁾があって、その意義は不明である。この他、血管の pericyte の胞体内に脂質とみられる顆粒が多くみられる所見もしばしば認めたが、これが変性を示しているものか、貪食された脂質を示している像であるかは明確にできなかった。

2) 泡沫細胞について

この細胞は動脈硬化、黄色腫などの脂質代謝異常をみる臓器・器官に多くあらわれることが知られている^{18) 23)}。しかしながら、コ肉芽腫内にあらわれる泡沫細胞については、Birrell¹⁹⁾がコ・クレフト間にこの細胞群をみたという簡単な記載をみるのみである。元来、この細胞については定義がはっきりせず、その起源についても血管内皮細胞、線維細胞、網内系内皮細胞、平滑筋細胞等があげられており定説はないという^{25) 26)}。しかし、一般には常在組織成分である細胞が食作用をあらわしたものであるという見方²⁶⁾が有力である。

著者のとらえた泡沫細胞は phagosome を有し、また小さなコ・クレフトを胞体内に有し泡沫細胞への移行を示すものもあったことより、この細胞は食細胞の一種と考えるのが妥当である。したがってこの細胞は、コレステリンを異物として処理しようとしてあらわれた食細胞の一つであると考ええる。

3) 赤血球および細胞について

コ肉芽腫内の血管外に赤血球がしばしば多数みられること、およびこの組織にヘモジデリンの沈着をみるこ

とは光顕的によく知られている。これらの所見が、コ肉芽腫のコ結晶は血液に由来するという見解の根拠の一つになっている。しかしながら、著者のとらえたコ・クレフトならびにD細胞が密接な関係にある所見(写真3, 5, 6, 7, 8, 9)は、電顕を使用してはじめてとられた像である。とくに写真3にみるD細胞と小さいコ・クレフトが、かみ合う形となり、しかもこの接するD細胞の辺縁が膨化してみえる所見は、コ結晶がD細胞由来ではないかという可能性を考えさせる。D細胞は赤血球とほとんど同時にあらわれること、その形状、大きさ、細胞質が略々均一なこと、および核が認められないことより赤血球由来であることを強く示唆しているが、この二つの細胞間の移行像とみられる細胞をとらえてないので決定は現在の段階ではできない。

4) コ結晶発生初期を示すと考えられる所見について

赤血球の直径より小さいコ・クレフトは、赤血球、またはD細胞と密接して常在すること(写真3, 5)からも、コ結晶が血液成分由来であることを強く示唆するが、コ・クレフトが多数の電子密度の異なる赤血球に囲まれて存在し、その間隙が低い電子密度の粒子群によって埋められており、かつその周囲には赤血球、またはD細胞以外に強い変性を示す細胞がみられないことから、この粒子群が血漿成分を示す可能性は強い。これは一層、コ結晶が血液成分由来であるという見解を支持すると考える(写真8)。この所見を示す視野につづいて、小さいコ・クレフトが細胞外に存在し、このクレフトを多数の電子密度の異なる赤血球、D細胞、食細胞がとり囲み、かつ、食細胞の胞体内に小さなコ・クレフトが存在する視野をとらえた(写真7)。この所見は血液成分よりコレステリンが生じ、これが組織間隙でコ結晶となって析出し、他方では食細胞に貪食されその胞体内にコ結晶となって析出したとみられる。このことは、血液成分が血管外に游出して貯溜する程、コレステリンが増加し、組織間隙のコ結晶は成長して大きくなり、また、コレステリンの貪食がすすめば、食細胞内のコ結晶も成長し大きくなっていくと考えられる。血管外に血液成分が游出して吸収されずに貯溜する現象の発現には、postcapillary venule の血行障碍が一つの誘因になりうると考える。

周知のように、コレステリンは燐脂質と共に細胞を構成する脂質成分である。したがって細胞・組織の脂質の変性によってコ結晶が析出してくる可能性は考えられ

る。しかしながら著者が小さいコ結晶を追及してえられた所見からは、コ結晶が細胞・組織の脂肪変性から生じるという考えを支持することはできなかった。

以上、えられた所見を考察すれば、著者は、ヒトの耳に生じるコ肉芽腫内のコ結晶は、血行障害によって生じた血液成分より生じたことを電顕的に初めて明らかにしえたと考ええる。

結 語

コ肉芽腫内のコ結晶由来を知る目的で、12才より56才にわたる男・女10人、11耳の乳突腔よりコ肉芽腫を手術的に採取、Millonig 法によるオスミック酸固定、アセトン上昇列の脱水、エポン包埋を行ない、コ・クレフトおよびその周辺を電顕的に観察し、以下の所見をえた。

1) 発生初期と考えられる小さいコ・クレフトが多数の変性赤血球、変性血液細胞、および食細胞に接して存在した。胞体内に多数の phagosome, residual body, myelin figure を有する食細胞の内部に小さいコ・クレフトを認めた。

2) コ・クレフトの周囲に泡沫細胞がしばしばあらわれる。この細胞は食細胞の一つであると考えた。

3) 赤血球、および血液細胞由来とみられる変性細胞が、光顕ではコ・クレフトとして識別しえない小さなコ・クレフトと密接して常在した。

4) コ・クレフトの周辺の血管は、しばしば血栓像、および血流停滞像を示した。

5) これらの所見は、血行障害をおこした血管の血液成分よりコ・結晶が生じることを強く示唆していると考えた。

引 用 文 献

- 1) *Shambaugh, G. E.*: Blue drum membrane. Arch. Otolaryng., 10, 238, 1929. 4) より引用す。
- 2) *O'Donnell, J. H.*: "Blue drum" or Idiopathic hemotympanum in children. Brit. Med. Jour., 2, 86, 1941.
- 3) *Johnston, W. R.*: The problem of the blue eardrum. Idiopathic hemotympanum. Laryngoscope, 63, 1096, 1953.
- 4) *Sheehy, J. L., McKibben, B. G.*: Idiopathic hemotympanum. Review of the literature and report of three cases. Laryngoscope, 66, 1291, 1956.
- 5) *Singer, L.*: Ueber entzündliche Erkrankungen des Mittelohres und der pneumatischen Hohlräume des Schläfenbeines. Z. Hals-, Nasen- u. Ohrenheilk., 32, 130, 1933.
- 6) *Friedmann, L.*: Epidermoid cholesteatoma and cholesterol granuloma. Experi-

mental and human. Annals of Otolology and Laryngology, 68, 57, 1959.

7) *Tumarkin, A.*: Attic cholesteatosis. Jour. Laryngol. and Otol., 72, 610, 1958.

8) *Rüedi, L.*: Cholesteatosis of the attic. Jour. Laryngol. and Otol., 72, 610, 1958.

9) *Ranger, D.*: Idiopathic haemotympanum. Jour. Laryngol. and Otol., 63, 672, 1949.

10) *Hybášek, J. and Hybášek, I.*: Etiopathogenesis of the so called idiopathic haemotympanum and its relation to morphogenesis of an adhesive process. Acta Oto-Laryng., Stockholm, 53, 429, 1961.

11) *Hybášek, I.*: Über das Cholesterolgranulom bei Mittelohrentzündungen. Mschr. Ohr.

12) 東昇：医学生物学用電子顕微鏡学，文光堂，1964.

13) *Benjamin, F. T.*: A method of staining epoxy section for light microscopy. J. Ultrastructure Research, 5, 343, 1961.

14) *Mannase*: 6) と15) より引用す。

15) *Dota et al.*: Cholesterol granuloma. Annals of Otolology and Laryngology, 72, 346, 1963.

16) 土田武正：所謂コレステリン肉芽腫および耳真珠腫について。日耳鼻，69, 447, 1966.

17) *Adner, C. A.*: Idiopathic haematotympanum and mastoiditis nigra. Acta Oto-Laryng., Stockholm, 52, 157, 1960.

18) *Cook, R. P.*: Cholesterol. Academic press Inc., 1958.

19) *Birrell, J. F.*: Black cellular cholesteatosis in childhood. Jour. Laryngol. and Otol., 70, 260, 1965.

20) *Lichtenstein*: Xantosis 及び cholesterosis を伴った大脳鎌内中皮細胞腫。脳と神経，4, 16, 1962.

21) *M. Shimoda*: Personal communication.

22) *T. Ito and T. Hoshino*: Light and electron microscopic observation on the vascular pattern of the thymus of the mouse. Arch. histol. jap., 27, 351, 1966.

23) 大山泰雄：動脈病変の電子顕微鏡的研究，ことに動脈硬化症および類線維素変性の成り立ちについて。日病会誌，51, 146, 1957.

24) 綿貫勤他：Wolman 病。最新医学，22, 146, 1957.

25) *Still, W. J. S. and O'Neul, R. M.*: Electron microscopic study of experimental atherosclerosis in rat. Amer. J. Path., 40, 21, 1962.

26) 新井恒人：動脈硬化の病理“代謝障害からみた成り立ちとくに初期像について”日病会誌，51, 290, 1962.

稿を終るにあたり、御懇切なる御指導と御校閲を賜わ

坂本毅論文付図(I)

写真1

写真2

坂本毅論文付図(Ⅱ)

写真3

写真4

坂 本 毅 論 文 付 図 (Ⅲ)

写真 5

写真 6

写真7

写真 8

坂本毅論文付図(VI)

写真9

った恩師平野新治教授、第三解剖学教室の伊藤隆教授、第二病理学教室の恩村雄太教授、ならびに終始御指導と御鞭撻をいただいた耳鼻咽喉科教室の土田武正助教授、第三解剖学教室の星野洸助教授、国立札幌病院中央検査科長の下田晶久医学博士に深甚なる謝意を捧げる。

附 図 説 明

〔略字説明〕

CC : Cholesterine cleft

D : D-cell

R : Red blood cell

P : Phagocyte

F : Foam cell

M : Monocyte

T : Thrombocyte

N : Nucleus

TJ : Tight junction

写真 1

コ・クレフト (CC) に接する泡沫細胞 (foam cell) を示す。コ・クレフト内に膜様構造が断裂遊離して存在する。これはコ結晶が溶出する際、結晶と接する細胞の細胞膜が断裂移動したものと考えられる。

泡沫細胞の核 (N) は辺縁に圧排されている。空胞は胞体内を殆んど充満している。空胞は限界膜を有し、円形に近いものが多く、大小は不同で、直径 0.2μ から 4μ にわたって存在する。空胞の内部に電子密度の低い糸状の構造が存在する。空胞間に electron dense な顆粒が散在する。 4600×

写真 2

CC に接する巨細胞を示す。3個の核が細胞膜の境界なしに並列する。胞体内には無数の拡張した endoplasmic reticulum が充満してみられる。これは泡沫細胞に移行する像を示している。写真の左に CC にはさまれた3個の赤血球 (R) がある。ここにはコレステリン結晶溶出の際、CC にはさまれた細胞質が移動した像がみられる。 5000×

写真 3

D細胞にはさまれた小さいCCが存在する。CCの一端がD細胞にくいこんだ形となり、その接する境界に electron dense な zone がみられる。隣接する大型の細胞は単球と考えられる。視野の周囲に多数の赤血球が存在するが、その電子密度には差が生じている。写真右下の

CC に接する赤血球は電子密度が低くなり、赤血球膜の膨化とみられる像を示している。 6400×

写真 4

CC とその周囲の血管の変化を示す。この血管は細静脈と考えられ、管腔内には一個の赤血球、多数の栓球 (T)、他の血液細胞、および血漿成分がつまってみえる。この血管の内皮細胞は、tight junction を境として隣接する2個の内皮に電子密度の差が生じている (矢印で示す)。周囲の組織間隙の collagen 線維には dense な物質の沈着をみる。 5000×

写真 5

細胞外に小さいCCが多数の赤血球とD細胞に囲まれて存在する、その間隙は電子密度の低い粒子群で埋められている。写真右側に大きなCCと小さいCCが存在し、これに赤血球が接している。写真中央の左側に赤血球の十数倍の大きさの細胞が認められるが、その胞体内に多くの myelin figure, phagosome を有し食細胞とみられる。 5000×

写真 6

細胞外に赤血球、D細胞に囲まれたCCが認められ、これに近接して胞体内に myelin figure, phagosome, residual body を有する食細胞が数個認められる。胞体内に小さいCCを有する食細胞も認められる。 5000×

写真 7

写真6をやや拡大したものである。周辺に多数の赤血球が相接してみられるが、その電子密度に差が生じていることがわかる。 7000×

写真 8

泡沫細胞、赤血球、単球に囲まれた多角形のCCが写真の略々中央にみられる。CCに接する数個の赤血球の電子密度は低くなり、かつ赤血球膜の膨化像がみられる。CCの一端が鋭く赤血球にくいこんだ形でみられる (写真3では、この像がD細胞とCCの間で認められる)。この写真にみられる泡沫細胞の空胞の形は不整形となっている。これらの細胞とCCの間隙は、電子密度の低い微細な粒子によって埋められており、これは血漿成分とみられる。 5000×

写真 9

写真8の拡大であり、CCの周囲をとくに拡大して示した像である。 8000×

(原稿受付 昭和42.6.20)