AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE REPAIR OF THE TRAUMATIC
TRACHEAL STENOSIS.

TAKEO YASHIKI, M. D.

*Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine, University of Hiroshima, Hiroshima.**(Director: Y. Harada, M. D.)*

Following four experiments were performed on the reconstruction of injured trachea.

1) The anterior wall of two to three rings of the cervical trachea of dogs was resected to create a defect of 10mm in length and 10mm in width. Four kinds of autografts were used to repair the defect. They were; a) nasal septal cartilage with mucosa, b) tracheal cartilage without mucosa and perichondrium, c) auricular composite graft, d) skin graft. No subcutaneous or mediastinal emphysema was observed in all dogs. The animals were sacrificed 7 days to 3 months after the operation. The results were evaluated from the gross findings, microscopic examination and the scanning electron microscopic observation. The most satisfactory graft was nasal septal autograft, and then followed by tracheal, auricular and skin graft. In skin grafting, stricture and fistula formation were observed in a few dogs, because of the lack of supporting tissue.

2) 5-0 nylon suture was rather appropriate in end to end anastomosis than silk suture, because the formation of granulation tissue was not observed.

3) Circumferential resection of the trachea was performed by resecting a segment of 2.0cm in length from the cervical trachea and immediately reimplanted. The reimplantation was followed by the stricture associated with granulation tissue and necrosis.

4) In the anterior aspect of the cervical trachea, two windows (10mm in length and 10mm in width) were created. The upper tracheal autograft and the lower one were exchanged and transplanted in the reverse direction. Postoperative course was uneventful.

A83—0889—71714

気管損傷の再建に関する実験的研究

広島大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：原田康夫教授）

屋 敷 建 夫

は じ め に

外傷、腫瘍による気道狭窄は、近年増加の傾向にある。これらの気道狭窄例は、複雑多岐にわたり、その治療法はそれぞれの症例にそくした気道再建法が工夫されている。

気管再建については、①気管の端々に吻合に始まり、②欠損部への他組織移植（皮膚、粘膜、筋膜、軟骨等）、③ Mesh 等による気管欠損の補填、修復が行われている。以上の方法は現在、臨床に応用されているものもあれば、実験的段階にあるものも未だ多く、著者は、これ

らの中より一つの気道再建法として下記のごとく基礎的実験を行い若干の知見を得たので報告する。

実験方法

実験動物は平均体重 12kg の雑種成犬60匹を用いた。手術に際して麻酔は Nembutal (Pentobarbital sodium) 25-30 mg/kg を肢静脈より注射した。術後感染予防のためセファロスポリン 50mg/kg を一週間筋注した。

気管損傷の再建に関する基礎的実験として、気管欠損部へ自家組織移植を行い、気管粘膜の修復過程を走査電子顕微鏡を用いて観察した。あわせて病理学組織学的検査も行った。

1. 気管前壁に約 10 mm×10 mm の窓をあけ、その部分に、次のごとき各種の移植片をそれぞれ2匹づつに移植し、術後1週、2週、3週、1カ月、3カ月と経時的変化を観察した。

- a. 粘膜付鼻中隔軟骨
- b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨
- c. 皮膚付耳介軟骨
- d. 皮膚

2. 気管を切断し直ちに端々吻合したもの。

3. 気管輪全周の長さ 2.0 cm を完全に切断し、再びこれを再移植したもの。

4. 気管前壁に上下、二箇所二つの気管輪を含める大きさの長方形の窓をあけ、上と下とで移植片をいれかけ、一方は方向を同じに、他方は逆転させて移植した。

- 1.a. 粘膜付鼻中隔軟骨

移植片を採取するために、経口蓋的に口蓋粘膜を剝離し、口蓋骨を鼻中隔軟骨に相当する部分のみ除去し、鼻底粘膜を前から後に切開を加え、バレンジャー回転刃を用いて約 1.5 cm×2 cm の大きさの粘膜付鼻中隔軟骨を採取した。得られた移植片は約 10 mm×10 mm の広さに作成し、気管内腔面に面する側は粘膜を付着させたまま、反対側は粘膜を除去し、5-0 ナイロン糸にて呼吸のもらないように縫合した。

- i) 移植後1週間

HE (ヘマトキシリン、エオジン染色、以下 HE と略す) 染色において移植した鼻中隔粘膜には、炎症所見が認められ、上皮細胞層は正常の場合に比べて浮腫状を呈した。従って、かなり厚くなり繊毛も脱落しているのが観察された。移植床にも境界部において浮腫状を呈しているのが認められた (図 2)。

走査電子顕微鏡 (以下 SEM) による観察所見では、

正常鼻中隔粘膜は、正常気管粘膜と大差が無く密に繊毛で覆われているが (図 1)、移植後1週間においては、鼻中隔粘膜上皮細胞から繊毛が脱落し microvilli のみ残存している像が多く認められ、繊毛細胞の変性によるものと考えられた。移植床の境界部付近も同様な所見を呈していた (図 3)。

- ii) 移植後2週間

HE 染色所見：鼻中隔粘膜上皮層の各所に空泡状に抜けた部分が認められた。上皮層の浮腫は軽快しつつあるように見られる所見であるが、細胞上の繊毛はまだ脱落していた (図 4)。

SEM 所見：移植片の中央部は術後1週間に比べて上皮の繊毛の脱落は強く、扁平上皮状になっている部が広がっていた、鼻腺の導管が繊毛の消失で見えるようになっていた。移植片の境界部は繊毛の障害が術後1週間に比べて少なく、再生が始まっている像と考えられた (図 5)。

- iii) 移植後3週間

HE 染色所見：移植片の粘膜上皮細胞層に繊毛が認められるようになった。上皮層は両び厚くなっているように見えた (図 6)。

SEM 所見：上皮細胞上に新しい繊毛の再生の像が見られた (図 7)。

- iv) 移植後1カ月

HE 染色所見：上皮細胞層の全般にわたって繊毛が認められ、上皮下には細胞浸潤が認められたが軽度であった。軟骨は生着しており、気管の枠として十分な働きをしているように見えた (図 8)。

SEM 所見：移植床と同じような像が移植片に認められ繊毛が表面に密生しているのが認められた。従って鼻中隔粘膜上皮細胞の繊毛は脱落するが、上皮が残存しているので繊毛の再生が早く起ったもののごとく思われる (図 9)。

- v) 移植後3カ月

HE 染色所見、SEM 所見も術後1カ月のものに比して、さらにきれいになった像を呈し繊毛も豊富で全く正常の像として観察された (図10, 11)。

- 1.b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨

気管前壁より約 10 mm×10 mm の広さの気管輪軟骨を採取し、その採取した気管軟骨面より粘膜、軟骨膜を鋭利なカミソリで切除したものを、もとの場所へ、その面を気管内腔面に向けて 5-0 ナイロン糸にて呼吸のもらないように縫合した。

i) 移植後1週間

HE 染色所見: 移植片内面は肉芽組織で覆れ、fibroblast 様の細胞が増殖しているのがみられた。移植床の境界部には気管粘膜上皮細胞の繊毛が脱落している所見がみられた(図 12)。

SEM 所見: 移植片においては、血球と思われるものが付着し、移植片との境界部が極めて明確となっていた。移植床の境界部の繊毛は脱落し粗となっていた。少し離れた所の移植床では、分泌物の付着が認められた(図 13)。

ii) 移植後2週間

HE 染色所見: 移植片においては、所々、肉芽組織が認められるが、境界部に上皮細胞層が伸びて移植片内に入っているのが認められた。しかし繊毛は欠如していた(図 14)。

SEM 所見: 移植片では繊毛のない肉芽組織様のものが観察された部分もあるが、移植床との境界部近くでは、分泌物と microvilli と繊毛のある気管粘膜上皮細胞の新生が認められた。移植床では、境界部を遠ざかるにつれて繊毛が多く認められ分泌物様物質も少い。移植に際して移植床も多少の影響をうけ、移植片への近位部位では繊毛の脱落などが起ることもわかった(図 15)。

iii) 移植後3週間

HE 染色所見: 移植片ではこの時期には気管粘膜上皮細胞が認められ、その上に繊毛が多く認められるようになっていた(図 16)。

SEM 所見: 一部、肉芽組織は残存していたが、少くなく、大部分移植片に繊毛の新生が認められた(図17)。

iv) 移植後1カ月

HE 染色所見: 移植片上にほぼ正常の気管粘膜上皮細胞の再生が認められ、症例によっては、分泌物様付着物が存在する所もあった(図 18)。

SEM 所見: 繊毛の metachonal wave も認められ全く正常の気管粘膜上皮細胞像に近い所見を呈していた(図 19)。

v) 移植後3カ月

HE 染色所見, SEM 所見共に術後1カ月とほぼ大差なく正常像に近い所見を呈していた。

1.c. 皮膚付耳介軟骨

耳介内側面の皮膚面を剃毛し、その皮膚を含めた耳介軟骨を採取した。採取した移植片は、皮膚面を気管内腔面に向けて、5-0 ナイロン糸にて呼吸のもれないように縫合した。この場合、移植片の全周にわたって皮膚をわ

ずかに切除し、縫合に際して皮膚が移植床の粘膜に overlap する事をふせいだ。

i) 移植後1週間

HE 染色所見: 移植片の皮膚と耳介軟骨の間に血球の浸潤が著明に認められ、毛のある部分に分泌物、重層扁平上皮の変性剥離している像が認められた(図 20)。

SEM 所見: 移植片の表面は全く汚れた状態で、血餅様物質や変性剥離した上皮に分泌物が付着し、所々に毛の残存が認められた。移植床の境界部付近の繊毛は脱落して、かなりの強い変化が認められた(図 21)。

ii) 移植後2週間

HE 染色所見: 皮下組織内への血球の浸潤は暫時消退し、毛根の変性像が認められはじめた。重層扁平上皮の変性剥離している像は術後1週間より更に著明である。

SEM 所見: 移植片は、表面が汚れた物質で覆れた状態で、分泌物様物質が多く付着していた。境界部では microvilli と短い繊毛の新生が認められるようになった(図 22)。

iii) 移植後3週間

HE 染色所見: 移植片の毛根部の変性が強くなり、その上の重層扁平上皮は消失しつつある像を呈した。重層扁平上皮と毛根部との間に気管粘膜上皮細胞が侵入新生し始めてきていた(図 23)。

SEM 所見: 移植片においては、部分的に肉芽組織様物質の表面粗なものが認められた。しかし、それらは術後2週間の標本に比べてほとんど少くなっており、繊毛の新生が各所に認められた(図 24)。

iv) 移植後1カ月

HE 染色所見: 重層扁平上皮の変性剥離した部は、顕微鏡的にしか認められなくなった。一方気管粘膜上皮細胞層がこれに置換し、かなり広範に認められるようになった。従って繊毛も認められた。しかしこれらの粘膜上皮下に毛根の変性像が認められ興味ある所見を呈した。絹糸で縫合した症例においては、かなり肉芽組織の増生が強く、まだ重層扁平上皮が残存している像も認められた(図 25)。

SEM 所見: 全く完全な気管粘膜上皮に置換された部が存在し、繊毛で覆われた所が広がっている所見が認められた。絹糸を用いた症例では、肉芽組織様部分が残存し、分泌物様物質で覆われた所が認められた(図 26)。

v) 移植後3カ月

HE 染色所見, SEM 所見ともに全く正常の気管粘膜上皮像を呈し、耳介軟骨は完全に生着していた。従って、

皮膚は気管粘膜によって置換され剥離されるものと考えられた(図 27, 28)。

1. d. 皮膚の移植

頸部皮膚をカミソリにて剃毛し、毛の生えている部分を気管内腔面にして移植した。この際、気管に 10 mm × 10 mm に開窓した部に皮膚の収縮をみこして少し大きめのものを採取し、これを移植した。

i) 移植後 1 週間

HE 染色所見：扁平上皮細胞の変性剥離が認められ、その剥離細胞が凹凸不平を呈し、上皮面に白血球等の膿性物質が付着していた。なお、皮下の弾性線維はびまん性に腫脹しており、かなり強い炎症性変化が認められた(図 29)。

SEM 所見：皮膚移植面は、正常皮膚面の像ではなく強い変化が認められ、その表面は汚れた像であった。即ち、分泌物、血餅様物質の間に毛が混在しているのが認められた。移植床境界部は纖毛の脱落が著明であった(図 30)。

ii) 移植後 2 週間

HE 染色所見：移植片の皮膚の重層扁平上皮の凹凸不平はかなり消失し、弾性線維も密となっていた。移植床との境界部近くは、扁平上皮の変性剥離している像が少く、遠ざかるにつれて剥離の像が増加していた。移植床の境界部付近は纖毛は脱落しほとんど認められなかった(図 31)。

SEM 所見：移植片には、所々、毛の残存が認められ、分泌物様物質というよりも肉芽組織様の表面無構造の汚れた像が認められた。移植境界部には、microvilli の中に纖毛をともなった気管粘膜上皮細胞がわずかに認められた(図 32)。

iii) 移植後 3 週間

HE 染色所見：移植片の毛根部はかなりの変性が認められた。上皮細胞は凹凸著明な気管粘膜上皮細胞群が認められ、その上に重層扁平上皮の完全に変性したものが付着している所見がみられた(図 33)。

SEM 所見：移植片には、部分的に肉芽組織が認められ、気管粘膜上皮細胞の纖毛が多く認められるようになってきた(図 34)。

iv) 移植後 1 カ月

HE 染色所見：移植片の毛根は、かなり変性してきており、重層扁平上皮はほぼ剥脱し、これにかわって気管粘膜上皮細胞が移植床より侵入新生し、纖毛もみられ正常気管粘膜に近い像にみられた(図 35)。

SEM 所見：移植片は、一部分、肉芽組織の存在が認められたが、極めて少く、大部分、気管粘膜上皮細胞でおおわれて纖毛は美しい配列を示すようになっていた(図 36)。

v) 移植後 3 カ月

HE 染色所見、SEM 所見とともに、術後 1 カ月の所見に比べてかなり良い状態で観察された。纖毛も増加してほぼ正常気管粘膜に近い状態になっていた。症例によって、支持組織の軟骨が無いために瘻孔を形成し、感染をひきおこし死亡した例もあった。12例中 2 例あった。

以上の成績から

- a. 粘膜付鼻中隔軟骨
- b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨
- c. 皮膚付耳介軟骨
- d. 皮膚

と、4 種類の気管欠損部への移植片の内、最も障害が少いものは、a. 粘膜付鼻中隔軟骨であった。次に、b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨、c. 皮膚付耳介軟骨、d. 皮膚の順で、a, b, c においては、支持組織として軟骨が気管の枠組を補強していた。d の皮膚のみの移植では、支持組織がないために気管の狭窄をひきおこしたり、症例によって瘻孔を形成するものもあった。従って、軟骨などの支持組織は重要な役割をはたした。一般には、術後 2 週間目より移植片の境界部より気管粘膜上皮細胞の侵入が認められはじめ、術後 1 カ月、3 カ月後には、ほぼ完全に気管粘膜上皮細胞により被覆されていた。

2. 気管端々吻合

気管端々吻合は頸部正中切開にて、気管全周を剥離し、第 7 気管輪の下を切断した。この際、反回神経には損傷を加えないように注意した。再び気管の切断端の縫合を行ったが、この際、気管の後壁より縫合を始めて、5-0 ナイロン系にて呼吸がもれないように全周を縫合した(図 37)。

術後 1 カ月でも吻合部では纖毛の再生は悪く、その辺縁部においては、纖毛の間に filament 状のものが認められた。一般に、吻合部は軽度の隆起を生じ、隆起の無い吻合部より 2 mm はなれた所では、正常の纖毛の状態を呈していた(図 38 a, b, c, d)。

しかし術後 3 カ月では全体に正常の纖毛がみられ吻合部がわかりにくくなっていた。

3. 気管輪全周の長さ 2.0 cm の再移植

気管全周を剥離し、第 7 気管輪の下部を切断し、下部

気管をそれより 2.0 cm を輪切りに切断し再移植した。3例の実験を行ったが、全例とも狭窄をおこし、28日目、35日目、40日目にそれぞれ死亡した（図 39, 40）。

4. 気管前壁に上下、二箇所二つの気管輪を含める大きさの長方形の窓をあけ、上と下で移植片をいれかえ、一方は方向を同じに、他方は逆転させて移植した（図 41, 42, 43）。同じ方向に移植した場合、術後 1 カ月では、移植片の境界部付近は、繊毛が密生していたが、移植床の境界付近は繊毛が粗となっていた。また、繊毛の方向性は乱れていた（図 44）。逆転して移植した場合、術後 1 カ月では、同じ方向に移植した場合とほぼ同じような所見を呈していた。しかし気管粘膜表面に粘液様物質の付着が多かった。これは、気管粘膜上皮細胞が脱落しないでそのまま生着し、そのために繊毛の運動が逆であることによるものと考えられた（図 45）。

考 按

喉頭、気管は、ある一定の内腔を保ち、甲状軟骨、輪状軟骨、気管軟骨によって構成され、気管は総数 16～20 個の気管輪軟骨からなり、各気管軟骨は弾性膜で連結されている。

これらの器官は弾力性、可動性に富み、下顎、胸骨により保護され、反射的に前屈位を取ることによって、この器官の損傷は稀れなものであった。しかし、古くは自殺の目的での刃物による損傷が報告されているが、最近では交通、産業が発達するにつれて、気道の外傷が増加しているのが現況である。

これらの気道損傷の修復に関して、特に、気管の再建に対しては、(1) 肉芽組織、瘢痕組織の除去、あるいは除去後、皮膚または粘膜の移植、(2) 端々吻合、狭窄部切除端々吻合、(3) 欠損部の自家組織移植による気道形成、(4) prosthesis の使用等があげられ、色々と現在迄、試みられているが、これといった決定的な方法はまだ無い。従って私は、次の如く気管の形成に関する実験を行った。

1. 気管前壁に約 10 mm×10 mm の広さの窓をあけ、その部分に各種の移植片を移植した。

- a. 粘膜付鼻中隔軟骨
 - b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨
 - c. 皮膚付耳介軟骨
 - d. 皮 膚
2. 気管の端々吻合
3. 気管輪全周の長さ 2.0 cm を再移植

4. 気管前壁に上下、二箇所に二つの気管輪を含める大きさの長方形の窓を開け、上と下で移植片をいれかえ、一方は方向を同じに、他方は逆転させて移植した。

1. 自家移植で行った実験では、気管欠損部の移植片の内、最も障害が少かったものは、a. 粘膜付鼻中隔軟骨で、肉芽形成も無く、気管粘膜上皮細胞の再生が最も早く、繊毛の形成も良好であった。次いで、b. 粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨、c. 皮膚付耳介軟骨、d. 皮膚の順であった。a. b. c. ともに気管の枠組として軟骨の役割が充分にはたされる事がわかった。

一般に、術後 2 週間目より移植片境界部より気管粘膜上皮細胞の侵入が移植片上に認められはじめ、術後 1 カ月、2 カ月後と増生が著明となり、3 カ月後では、完全に気管粘膜上皮細胞で修復されていた。

2. 気管端々吻合は、縫合法により縫合部に肉芽形成が認められた症例もあったが、ナイロン糸縫合により肉芽形成も極めて少く、好結果が得られた。

3. 気管輪全周を長さ 2.0 cm 切り取って再移植した場合は、全例とも栄養血管欠如のためか狭窄をおこして死亡した。従って、この方法での移植には、microsurgery による栄養血管の吻合術が必要と思われた。

4. 一部粘膜付気管壁の再移植であるが、繊毛の再生は起るが、縫合法によっては、肉芽形成が起り、繊毛の乱れ、脱落が、移植初期には生じるようである。

さて、気管の再建移植に関する研究は多くみられる。

鼻中隔を用いたものでは、Drettner & Lindholm (1970)¹⁾ が犬を用いて、気管欠損部に nasal septal graft を用いて 5 匹の内 1 匹に気管狭窄をきたしたと報告している。この場合の縫合糸は 3-0 cutgut を用いている。

Furstoss (1973)²⁾ も犬を用いており、Thomas et al (1975)³⁾ は、声門下狭窄の実験に犬の cartilage mucosa autograft nasal septum を用いて成功している。臨床的には、Wilflingseder (1972)⁴⁾、Krizek et al (1972)⁵⁾、Denecke (1973)⁶⁾ 等の報告があり、日本では、奥田等 (1973)⁷⁾ が鼻中隔を利用して一次的頸部気管の形成を行っている。

耳介軟骨を用いたものは、Babcock (1934)⁸⁾ が耳介軟骨を気管軟骨の大きさに切って、頸部皮膚内に移植し、それを頸部気管前部に移植したと報告している。実験的には、Flemming (1968)⁹⁾、Consiglio (1969)¹⁰⁾、Dahlke (1977)¹¹⁾、Zehm (1977)¹²⁾ 等は、auricular composite graft を用いて実験している。特に Zehm¹¹⁾¹²⁾ は、走査電子顕微鏡を用いてその生着の状態について観

察し、さらに人の症例に応用し成功をおさめている。その他に人に応用した症例では、Caputo & Consiglio (1961)¹³⁾, Zarocostas (1972)¹⁴⁾, Morgenstein (1972)¹⁵⁾ 等の報告がみられる。

気管輪の枠組の目的としては、その他に肋軟骨、甲状軟骨の一部が用いられており、König (1896)¹⁶⁾ は、皮膚とともに甲状軟骨の一部を気管欠損部へ移植し、Lapidot (1968)¹⁷⁾ は、子豚で甲状軟骨の trap door を試みている。さらに、Niehues (1903)¹⁸⁾, Serrano (1959)¹⁹⁾, Meyer (1960)²⁰⁾, Mc Comb (1967)²¹⁾ Kapur (1967)²²⁾, 黒住 (1974)²³⁾²⁴⁾ 等の報告がみられ、肋軟骨を利用した trough method は、Bryce (1967)²⁵⁾, 今野 (1976)²⁶⁾ 等によって報告されている。

皮膚移植については、Trnka (1900)²⁷⁾, Gebauer (1950)²⁸⁾, Paulson (1955)²⁹⁾ 等の報告が見られる。Farmer (1971)³⁰⁾, Farkas (1972)³¹⁾ 等は、耳介軟骨に頬部粘膜を移植したものを気管欠損部に移植した実験を行っている。その他の移植実験は、Davis (1911)³²⁾, Taffel (1940)³³⁾ 等が犬を用いて fascia graft を移植片として気管欠損部の補修を行っている。

Ritsilä (1973)³⁴⁾ は、家兎で free periosteum, Sohn et al (1974)³⁵⁾, Ohlsen et al (1976)³⁶⁾ は perichondrial graft を用い それぞれ家兎で実験を行っている。

Ross (1956)³⁷⁾, Penton (1965)³⁸⁾ 等は、有茎筋肉弁による縦隔内気管広汎欠損口の修復例の報告もある。

端々吻合についての研究は、1881年 Gluck & Zeller³⁹⁾ の実験的吻合に始まり、現在まで数多くの端々吻合が行われてきている。吻合の限界については、道林 (1965)⁴⁰⁾ は、生理的に無理のない最大伸展範囲は 25 mm といっており、古泉 (1966)⁴¹⁾ は、20歳代で 27.5 mm, 30歳代 20.6 mm, 40歳代 16.0 mm が限界であると報告している。Cantrel (1961)⁴²⁾ は、動物実験で、端々吻合に用する牽引力の限界は 2000 gr であり、三浦 (1969)⁴³⁾, Grillo (1964, 1965, 1966)⁴⁴⁾⁴⁵⁾⁴⁶⁾, Mulliken (1968)⁴⁷⁾ 等は、第一に右下肺靱帯の切離により平均 30 mm, 第二に左気管部の切断により平均 27 mm, 第三に心膜、肺動静脈の切離により平均 9 mm, 計 66 mm の延長が可能であると報告している。

Kay (1951)⁴⁸⁾, Paulson (1955)²⁹⁾, Shaw (1961)⁴⁹⁾, 隈上 (1967)⁵⁰⁾ と気管端々吻合例が報告されていますが、隈上は、2 stage にて端々吻合を行い、58 mm (30 mm + 28 mm) の切除に成功している。Conley (1953)⁵⁰⁾, Ogura (1962)⁵²⁾ 等は、輪状軟骨部の狭窄に、甲状軟骨

と気管を one stage で端々吻合を行っている。その他に、胸部外科領域における端々吻合例は、最近では多く発表されて来ている⁵³⁾⁵⁴⁾⁵⁵⁾⁵⁶⁾⁵⁷⁾⁵⁸⁾⁵⁹⁾⁶⁰⁾⁶¹⁾⁶²⁾⁶³⁾。石川 (1969)⁶⁴⁾ は、吻合方法、また、その場合の縫合系について述べている。縫合系の選択が極めて大切で、絹糸は肉芽形成が強く、縫合系としては不適当であると述べている。今回の実験においても、絹糸は肉芽形成が強く、ナイロン糸を用いたものが成功している。その他の縫合系として、一般には、Cutgut, Teytec, Dexon 等が用いられて好結果が得られている。

気管輪全周を移植する場合は、Cauldwell et al (1948)⁶⁵⁾, Miura et al (1966)⁶⁶⁾ 等の研究にみられるように、気管の栄養血管が無いために移植片の生着が悪く、壊死を生じ、狭窄を引き起こし全例死亡したが、Ferguson (1950)⁶⁷⁾ も同じ実験を行って失敗している。従って、今後は microvascular surgery で極めて小さい血管でも利用するという方法が必要となろう。

繊毛の運動を見るために、気管の前壁の移植片を上下にいかえた実験を行ったが、縫合法が完全であれば、繊毛の乱れも無く、移植片部の繊毛の運動障害は時間を経過すれば問題は無いと考えられた。

結 論

1. 気管欠損部への自家移植は 4 種類の移植片を用いた。最も障害が少かったのは、粘膜付鼻中隔軟骨で、次に粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨、皮膚付耳介軟骨、皮膚の順で成績が良く、特に支持組織が無い皮膚のみの症例においては、中には狭窄や瘻孔を形式するものがあった。また、皮膚付耳介軟骨移植と皮膚移植の実験では、重層扁平上皮が変性剥離し重層扁平上皮と毛根部の間に気管粘膜上皮細胞が新生し、しだいに毛根部は変性退化していった。

2. 気管端々吻合は、気管手術全般についていわれることであるが、縫合法、縫合系によって手術の成否が左右されやすく、特にナイロン糸縫合例は、極めて良好であった。

3. 長さ 2.0 cm の気管輪全周の再移植は、全例とも栄養血管欠如のためか、全て狭窄を生じ死亡した。従って、この方法での移植には、microsurgery による栄養血管の吻合術が必要と考えられた。

4. 気管に窓を開け、上下に入れかえた気管の修復過程は、粘膜付鼻中隔軟骨移植と同様に良好であった。繊毛の運動性等についてはこの実験ではわからなかった。

参 考 文 献

- 1) *Drettner B and Lindholm C-E*: Experimental tracheal reconstruction with composite graft from nasal septum. *Acta. Otolaryng.* 70: 401-407, 1970.
- 2) *Furstoss J A and Toohill R T*: Composite nasal septal autografts of the trachea. *Ann Otol* 82: 831-837, 1973.
- 3) *Thomas G K and Marsden J*: Subglottic enlargement using cartilage-mucosa autograft. *Arch Otolaryng* 101: 689-692, 1975.
- 4) *Wilflingseder P*: Rekonstruktion der Trachea durch ein Segmenttransplantat vom Nasenseptum. *Wien Klin Wochenschr* 84: 226-229, 1972.
- 5) *Krizek T J and Kirschner J A*: Tracheal reconstruction with an autogenous mucochondrial graft. *Plast Reconstr Surg* 50: 123-130, 1972.
- 6) *Denecke H J*: Tracheaplastik im Bereich der Halsbasis bei besonderen pathologischen Verhältnissen in der oberen Thoraxapertur. *H N O* 23: 126-128, 1975.
- 7) 奥田 稔 他: 鼻中隔を利用した一次的頸部気管形成例. *耳喉*. 45: 437-443, 1973.
- 8) *Badcock W W*: Plastic closure of laryngostomic fistulas and enlargement of the lumen of the trachea or larynx by implantation of a chondrocutaneous flap. *Arch Otolaryng* 19: 585-589, 1934.
- 9) *Flemming I and Hommerich K W*: Tierexperimentelle Untersuchungen zur Rekonstruktion der Vorderen Trachealwand bei begrenzten Luftöhrungsverengerungen. *Zeit f Laryng-Otol* 47: 336-339, 1968.
- 10) *Consiglio V*: Auricular cartilage autoplasty in the experimental repair of the trachea. *Panminerva medica* 11: 13-16, 1969.
- 11) *Dahlke H et al*: Das intratracheale Verhalten des Haut-Knorpel-Transplantates aus der Ohrmuschel. *Laryng Rhinol* 56: 969-974, 1977.
- 12) *Zehm S*: The use of composite grafts for reconstruction of the trachea and subglottic airway. *Tr Am Acad Ophthal & Otol* 84: 934-937, 1977.
- 13) *Caputo V and Consiglio V*: The use of patients own auricular cartilage to repair deficiency of the tracheal wall. *J Thorac Cardiovas Surg* 41: 594-596, 1961.
- 14) *Zarocostas G*: A interesting case of tracheal stenosis. *Laryngoscope* 76: 555-560, 1972.
- 15) *Morgenstein K M*: Composite auricular graft in Laryngeal reconstruction. *Laryngoscope* 82: 844-847, 1972.
- 16) *König F*: Zur Deckung von Defecten in der vorderen Trachealwand. *Berl Klin Wochenschr* 33: 1129-1131, 1896.
- 17) *Lapidot A and Sodagar R et al*: Experimental repair of subglottic stenosis in piglets. — Trap-door Thyrochondroplasty Flap. — *Arch Otolaryng* 88: 529-535, 1968.
- 18) *Niehues*: Über die Behandlung von Larynxstenosen und Trachealdefekten. *Zentralbl f Chir* 30: 846-846, 1903.
- 19) *Serrano A et al*: Reconstruction of the cervical trachea. — a technique to obtain a permanently patent airway. — *Plast Reconstr Surg* 24: 333-340, 1959.
- 20) *Meyer R*: Rekonstruktion des Tracheallumens durch Haut-Knorpeltransplantation. *Pract Oto-Rhino-Laryng* 22: 161-172, 1960.
- 21) *Mc Comb H*: Treatment of tracheal stenosis. *Plast Reconstr Surg* 39: 43-56, 1967.
- 22) *Kapur T R*: Tracheal injury and reconstruction. *Brit J Surg* 54: 689-694, 1967.
- 23) 黒住静之 他: 喉頭気管外傷の13症例. *耳喉* 46: 551-558, 1974.
- 24) 黒住静之 他: 喉頭気管損傷. *耳喉* 48: 835-843: 1976.
- 25) *Bryce D P et al*: The trough method of Laryngo-tracheal reconstruction. *Ann Otol* 76: 793-803, 1967.
- 26) 今野昭義 他: 気管壁に浸潤した甲状腺癌切除後の頸部気管再建術. *耳喉* 48: 171-183, 1976.
- 27) *Trnka*: Eine praktische Methode der Tracheoplastik mit gedoppeltem Hautlappen. *Zentralbl f Chir* 27: 413-415, 1900.
- 28) *Gebauer P W*: Plasti reconstruction of tuber-

- culous bronchostenosis with dermal grafts. J Thorac Surg 19: 604-628, 1950.
- 29) *Paulson D L and Shaw R R*: Bronchial anastomosis and bronchoplastic procedures in the interest of preservation of lung tissue. J Thorac Surg 29: 238-259, 1955.
 - 30) *Farmer A W et al*: Replacement of a tracheal defect in the dog by a performed composite graft. Plast Reconstr Surg 47: 262-268, 1971.
 - 31) *Farkas L G et al*: Replacement of a tracheal defect in the dog by a preformed composite graft. A later report. Plast Reconstr Surg 50: 238-241, 1972.
 - 32) *Davis J S*: The transplantation of free flaps of fascia. Ann Surg 54: 734-748, 1911.
 - 33) *Taffel M*: The repair of tracheal and bronchial defects with free fascia grafts. Surgery 18: 56-71, 1940.
 - 34) *Ritsilä V and Alhopuro S*: Reconstruction of experimental tracheal cartilage defects with free periosteum. Scand J Plast Reconstr Surg 7: 116-119, 1973.
 - 35) *Sohn S A et al*: Growth of cartilage from a free perichondrial graft placed across a defect in a rabbit's trachea. Plast Reconstr Surg 53: 55-60, 1974.
 - 36) *Ohlsen L and Nordin U*: Tracheal reconstruction with perichondrial grafts. Scand J Plast Reconstr Surg 10: 135-145, 1976.
 - 37) *Poss R R*: Repair of tracheal and esophageal defect by use of pedicle graft. Surg 39: 654-662, 1956.
 - 38) *Penton R S et al*: The use of a viable pedicle graft for repairing an extensive tracheobronchial defect. Ann Surg 139: 709-714, 1952.
 - 39) *Gluck T and Zeller A*: Die prophylactische Resektion der Trachea. Arch f klin Chir 26: 427-436, 1881.
 - 40) 道脉祐二郎: 外因性気管障害の外科的治療. 気食会報 16: 61-66, 1965.
 - 41) 古泉桂四郎: 気管の伸長能に関する計測的研究. 気食会報 17: 294-304, 1966.
 - 42) *Cantrell J R et al*: The repair of circumferential defects of the trachea by direct anastomosis. J Thorac Cardiovas Surg 42: 589-598, 1961.
 - 43) 三浦 健 他: 気管損傷の診断と治療. 臨床外科 24: 1193-1201, 1969.
 - 44) *Grillo H C et al*: Extensive resection and reconstruction of mediastinal trachea without prosthesis or graft. — an anatomical study in man — J Thorac Cardiovas Surg 48: 741-749, 1964.
 - 45) *Grillo H C*: Circumferential resection and reconstruction of the mediastinal and cervical trachea. Ann Surg 162: 374-388, 1965.
 - 46) *Grillo H C*: Management of cervical and mediastinal lesions of the trachea. JAMA 197: 1085-1090, 1966.
 - 47) *Mulliken J B et al*: The limits of tracheal resection with primary anastomosis. — Further anatomical studies in man. — J Thorac Cardiovas Surg 55: 418-421, 1968.
 - 48) *Kay E B*: Tracheal resection with primary anastomosis. Ann Otol 60: 864-869, 1951.
 - 49) *Shaw R R et al*: Traumatic tracheal rupture. J Thorac Cardiovas Surg 42: 281-297, 1961.
 - 50) 隈上秀伯: 外傷性喉頭気管障害 — 特に気管端々吻合例について —. 耳鼻 13: 176-184, 1967.
 - 51) *Conley J J*: Reconstruction of the supraglottic air passage. Ann Otol 62: 477-490, 1953.
 - 52) *Ogura J H et al*: Surgical correction of traumatic stenosis of larynx and pharynx. Laryngoscope 72: 468-480, 1962.
 - 53) *Macmanus J E et al*: Resection and anastomosis of the intrathoracic trachea for primary neoplasms. Ann Surg 139: 350-354, 1954.
 - 54) *Bikfalvi A and Kassay D*: Resektion und Anastomose am thorakalen Teil der Trachea wegen narbiger Stenose. Thoraxchirurgie 3: 150-155, 1955.
 - 55) *Beskin C A*: Rupture-separation of the cervical trachea following a closed chest injury. J Thorac Cardiovas Surg 34: 392-394, 1957.
 - 56) *Quattlebaum J*: Stricture of the trachea following traumatic fracture. Arch Surg 76: 417-423, 1958.

- 57) *Miscall L et al*: Stenosis of trachea resection and end-to-end anastomosis. Arch Surg Chicago 87: 726-731, 1963.
- 58) *Middleton P*: Traumatic laryngeal stenosis. Ann Otol 75: 139-148, 1966.
- 59) *Grillo H C*: Tracheal reconstruction. Indication and techniques. Arch Otolaryng 96: 31-39, 1972.
- 60) *Pennigton C L*: External trauma of the Larynx and trachea. Immediate treatment and management. Ann Otol 81: 546-554, 1972.
- 61) *Lavillauroy C J et al*: La place de la résection anastomose dans le traitement des sténoses de la trachée cervicale après réanimation. Ann Otolaryng chir cervicofac 93: 533-542, 1976.
- 62) 富田正雄 他: 肺癌に対する気管, 気管支成形術併用の経験. 胸部外科 24: 497-503, 1971.
- 63) 富田正雄 他: 気管支再建の機能に関する検討. 胸部外科 29: 249-255, 1976.
- 64) 石川創二: 気管, 気管支の再建 — 基礎的な面より — 気食会報20: 96-102, 1968.
- 65) *Cauldwell E W et al*: The bronchial arteries. An anatomic study of 150 human cadavers. Surg Gynec Obstet 86: 390-412, 1948.
- 66) *Miura T and Grillo H C*: The contribution of the inferior thyroid artery to the blood supply of the human trachea. Surg Gynec Obstet 123: 99-192, 1966.
- 67) *Ferguson D J et al*: Experimental resection of the trachea. Surgery 28: 597-619, 1950.

稿を終るに当たり、ご指導、ご校閲を賜った黒住静之前教授、原田康夫教授に深甚の謝意を表します。

最後に、耳鼻咽喉科学教室員並びに技官村尾学氏に感謝いたします。

本論文の要旨は、第75回日本耳鼻咽喉科学会総会および第3回中国地方部会連合講演会にて発表した。

(原稿受付 昭和 55. 1. 24日)

別刷請求先 〒733 広島市本川町 1-4-3

広島記念病院耳鼻科

屋敷 建夫

付 図 説 明

第1図 正常鼻中隔粘膜の走査電子顕微鏡像(以下 SEM 像)

第2図 鼻中隔で気管形成を行った群: 粘膜付鼻中隔軟骨を 10mm×10mm の広さに作成し、気管内腔面に面する側に粘膜を付着させて反対側の粘膜は除去し移植した術後1週間のHE染色所見で、上皮細胞層は正常に比べて浮腫状を呈している。

第3図 鼻中隔粘膜の術後1週間の SEM 像で、繊毛が脱落し、短縮した繊毛と microvilli に覆われたドーム状の細胞がみられる。

第4図 鼻中隔粘膜移植後2週間の HE 染色: 上皮層に空泡状に抜けた部分が認められる。

第5図 鼻中隔粘膜移植後2週間の SEM 像: 上皮の繊毛の脱落が術後週1間に比べて強い。

第6図 鼻中隔粘膜の移植後3週間の HE 染色: 上皮層が再び厚くなってきているように見える。

第7図 鼻中隔粘膜の移植後3週間の SEM 像: 上皮細胞上対しい繊毛の再生の像が認められる。

第8図 鼻中隔粘膜の移植後1カ月の HE 染色: 上皮細胞層全般にわたって繊毛が認められる。

第9図 鼻中隔粘膜の移植後1カ月の SEM 像: 移植床と同じように繊毛が密生している。

第10図 鼻中隔粘膜の移植後3カ月の HE 染色所見: 全く正常の気管粘膜上皮像を呈し、鼻中軟骨は生着している。

第11図 鼻中隔粘膜の移植後3カ月の SEM 像: 全く正常の気管の繊毛像を呈している。

第12図 気管軟骨のみの移植1週間後: 広さ 10mm×10mm の粘膜、軟骨膜を除去した気管輪軟骨を、気管に再移植した HE 染色像で、気管内面は肉芽組織で覆われている。

第13図 第12図の SEM 像: 移植片に血球様物質が付着し、移植片(G)と移植床(H)の境が極めて明確である。移植床の境界部の繊毛は脱落して粗となっている。

第14図 気管軟骨のみの移植2週間後: 境界付近の所見では上皮細胞層を認めたが繊毛は欠如していた。

第15図 気管軟骨のみの移植2週間後: A. 移植2週間後の移植片中央部は、肉芽組織様物質で覆われている。B. 移植片の境界部付近は、分泌物と microvilli と繊毛の新生が認められた。

第16図 気管軟骨のみの移植3週間後: 気管粘膜上皮細胞

層が認められる。

第17図 気管軟骨のみ移植3週間後のSEM像：A. 移植床(H)，移植片(G)部に繊毛著明。B. 移植片表面は繊毛密にて、分泌機能もさかんになっている。

第18図 気管軟骨のみ移植1カ月後のHE染色：気管粘膜上皮細胞の再生がみられ、気管輪軟骨は生着している。

第19図 第18図のSEM像：全く正常の気管上皮細胞像を呈している。

第20図 皮膚付耳介軟骨移植後1週間：軟骨と皮膚間に血球浸潤が著が著明である。

第21図 第20図のSEM像：H部が移植床，G部が移植片で血餅様物質でおおわれている。

第22図 皮膚付耳介軟骨移植後2週間のSEM像：表面はよごれた物質で覆れている。

第23図 皮膚付耳介軟骨移植後3週間のHE染色所見：移植片毛根部(矢印)の変性が強くなり、その上の重層扁平上皮にかわって気管粘膜上皮細胞の新生が認められる。

第24図 皮膚付耳介軟骨移植後3週間のSEM像：A. 境界部にナイロン糸が認められる。B. 移植表面は汚れた分泌物様物質の下に繊毛が認められる。

第25図 皮膚付耳介軟骨を絹糸を用いて気管に移植し、術後1カ月の症例：重層扁平上皮が残存しているのが認められる。

第26図 皮膚付耳介軟骨移植1植カ月のSEM像：A. 移植床は分泌物が多く付着している。B. 境界部弱拡大図であるが境界部分がはっきりしない。C. 移植片は移植床に比べて分泌物は少かった。A.B.C 軽度炎症を呈していた。

第27図 皮膚付耳介軟骨移植後3カ月のHE染色：気管上皮細胞が新生し、毛根部は変性し耳介軟骨は完全に生着している。A. 気管粘膜上皮細胞の出現と毛根の変性を認める。B. 移植耳介軟骨は完全に生着している。

第28図 第27図のSEM像：ほぼ正常の気管粘膜上皮像を呈している。

第29図 皮膚移植後1週間のHE染色像：扁平上皮細胞の変性剥離を呈し、その表面に白血球等の膿性物質が付着している。

第30図 皮膚移植後1週間のSEM像：移植片(G)に血餅様物質等で覆れている。H部は移植床の気管粘膜で繊毛の脱落が認められる。

第31図 皮膚移植後2週間のHE染色所見：皮膚の重層扁平上皮の凹凸不平は術後1週間に比べてかなり消失し扁平上皮剥離像が認められる。

第32図 皮膚移植後2週間のSEM像：移植片部(G)は表面無構造の状態を呈している。

第33図 皮膚移植後3週間のHE染色像：移植片の毛根部(矢印)はかなり変性が認められ、重層扁平上皮は完全に変性し、その下に凹凸著明な気管粘膜上皮細胞が認められる。

第34図 皮膚移植後3週間のSEM像：表面凹凸のある気管粘膜上皮細胞像を呈し、繊毛も認められる。

第35図 皮膚移植後1カ月後のHE染色像：毛根(矢印)はかなり変性し、重層扁平上皮はほぼ剥離して、これにかわって気管粘膜上皮細胞層が認められ、移植後3週間に比べ凹凸がなくなっている。

第36図 皮膚移植後1カ月のSEM像：繊毛が正常に近い状態に認められる。

第37図 端々吻合術後1カ月

第38図 端々吻合術後1カ月のSEM像：A. 吻合部(矢印)付近の弱拡大。B. 吻合部の繊毛は消失している。C. 端々吻合上部は繊毛の間にFilament状のものが認められる。D. 端々吻合下部は繊毛の間に分泌物様物質が認められる。

第39図 気管輪全周の再移植を行っている所。

第40図 気管輪全周を再移植を行って術後40日目に呼吸困難で死亡した気管狭窄部。

第41図 気管前壁に上下2箇所の窓をあけた所、スパイラルチューブを挿入している。

第42図 上、下移植片の方法：一方は方向を同じ、他方は逆に移植した。

第43図 上、下2箇所をいれかえて、一方は同方向に他方は逆方向に移植し、術後1カ月のもの。

第44図 第42図の方法で同方向に移植し術後1カ月のSEM像：A. 移植片(G)で繊毛は密生しているが方向性は乱れている。B. 境界部の強拡大像で繊毛の乱れが認められる。

第45図 第42図の方法で逆方向に移植し、術後1カ月のSEM像：A. 移植床の境界部付近の繊毛は粗で所々に分泌物様物質を認める。B. 移植片は繊毛が密にみられるが付着物が認められる。C.D.は境界部を示したものが上部が移植床で下部が移植片である。

屋敷論文付図(1)

第 1 図

第 2 図

第 3 図

第 4 図

第 5 図

第 6 図

第 7 図

第 8 図

屋敷論文付図(2)

第 9 図

第 10 図

第 11 図

第 12 図

第 13 図

第 14 図

第 15 図

屋敷論文付図(3)

第 17 図

第 16 図

第 19 図

第 18 図

第 21 図

第 20 図

第 22 図

屋敷論文付図(4)

第 23 図

第 25 図

第 24 図

第 26 図

第 27 図

第 28 図

屋敷論文付図(5)

第 29 図

第 31 図

第 33 図

第 35 図

第 30 図

第 32 図

第 34 図

第 36 図

屋敷論文付図(6)

第 37 図

第 39 図

第 38 図

屋敷論文付図(7)

第 40 図

第 41 図

第 42 図

第 43 図

第 44 図

屋敷論文付図(8)

第 45 図