カラゲニン注入による実験的滲出性中耳炎

東北大学医学部耳鼻咽喉科学教室（主任：河本和友教授）

柴原 義博, 高坂 知節, 新川 秀一, 武山 実,
朴沢 孝治, 原 晃, 遠藤 里見, 河本 和友

CARRAGEENINS-INDUCED OTITIS MEDIA IN ANIMAL

YOSHIHIRO SHIBAHARA, M. D., TOMONORI TAKASAKA, M. D.,
MINORU TAKEYAMA, M. D., KOJI HOZAWA, M. D., AKIRA HARA, M. D.,
SATOMI ENDO, M. D., HIDEICHI SHINKAWA, M. D.
and KAZUTOMO KAWAMOTO, M. D.

Department of Otolaryngology, Tohoku University School of Medicine, Sendai

Otitis media was induced in guinea pigs and chinchillas by intrabullar injection of 1% carrageenins. The animals were sacrificed for histological examinations at 1 to 14 days respectively. In chinchillas tympanogram was performed by means of impedance audiometry. The gross appearance of bulla was most hyperemic, and thickened mucosa reaction were observed on the 3rd or 4th day. Effusion was also most abundant on the 3rd or 4th day, and tympanogram showed the lowest compliance and gradient in chinchillas. Each specimen was examined under light and electron microscopes. At 24 hours, the subepithelial layer was edematous, and epithelial cells contained electron dense granules. On the 3rd day, epithelial and subepithelial layers were most remarkably edematous, and macrophages, neutrophils and mast cells were seen in the mucosa. The macrophages contained many electron dense granules and dispersed lysosomes. Some of them were present adjacent to the capillaries, which permeability appeared to be enhanced. The mast cells granules showed less electron density and some of them fused with each other. In the 7th and 14th day specimens, the edema had disappeared and infiltrated cells were not numerous. According to the morphological findings, columnar metaplasia and goblet cells in this study were less frequent than in clinical otitis media with effusion. We suspect that the mucociliary clearance system of the Eustachian tube almost maintains it normal condition. At least carrageenins induced otitis media did not effect tubal mucociliary transport.

Key words: カラゲニン中耳炎, チンパノグラム, 電顕的観察

A87—0690—22111

I 緒 言

鼓膜穿孔がなく中耳腔、乳突洞に無菌性の貯留液を認め、耳痛、発熱等の急性炎症の症状を欠く病態を滲出性中耳炎とよんでいるが、Politzer¹⁾ が最初に本症の存在を報告以来すでに一世紀以上を経過した今日でもなお本

症の病因・病態に関して多くの疑問点が残された状態にある。近年、本症が急激な増加をきたし、特に小児にその頻度が高いため^{2)~4)}、耳鼻咽喉科並びに小児科領域において、その病因究明のための研究報告や臨床的な対応・処置に関する報告がなされ、多くの論議をよんでい

る。そこで著者らは本症の病因病態の一端を解明する目的で、非細菌性起炎剤であるカラゲニンを中耳腔内に注入し滲出液を惹起させ得るか否かを検討し、更にカラゲニン中耳炎動物の粘膜病態について光顕並びに電顕的に検索した。

カラゲニン (Calcium Carrageenin) は紅藻類 *Chondrus crispus* の抽出物質で、淡黄色の粉末であり、東北大学薬学部生化学教室の鶴藤教授より供与をうけた。

Ⅱ 実験動物並びに方法

【モルモット】 体重 200～300g の白色モルモットでプライエル反射正常のものを使用した。ペントバルビタールナトリウム腹腔麻酔下 (28mg/kg) に仰臥位に固定した後、下顎部に水平切開を加え、両側中耳骨胞を露出した。両側の中耳骨胞に2個の小孔を開け中耳炎のないことを確認して、一側に1%カラゲニン生食液 0.05～0.1ml (ペニシリン濃度 0.1mg/ml 含有) を中耳腔内へ注入した。他側にはコントロールとして生食液 0.05～0.1ml (ペニシリン濃度 0.1mg/ml 含有) を注入した。各々注入後は、直ちにアロンアルファにて小孔を閉鎖し術創縫合を行った。断頭時間と例数は表1のごとくである。経時的に断頭し骨胞を開放し実体顕微鏡下に肉芽および中耳粘膜の状態、滲出液の有無を観察した。肉芽を含む中耳粘膜および耳管鼓室口をとり出し、3%グルタルアルデヒド燐酸バッファ液にて前固定後、1%オスミウム酸にて後固定を実施した。系列エタノールで脱水後、透過型電顕 (以下 TEM と略す) 標本はエポキシ樹脂に包埋し、マイクロトームにて超薄切片作成後、二重染色を施し、日本電子 100C 型電子顕微鏡にて観察した。走査型電顕 (以下 SEM と略す) 標本は 100% エタノール脱水後、酢酸イソアミルを通し臨界点乾燥を行い、イオンコーターにて金蒸着を施し、日立 S-450 型走査型電子顕微鏡にて観察した。

【チンチラ】 体重 400～640g の tympanogram (以下 T. G. と略す) 正常のチンチラ7匹を使用した (表2)。T. G. の測定には、Teledyne Impedance Audiometer TA-2C を用い、無麻酔下に幼児用イヤカフを外耳道に装着し、臨床に用いられるのと全く同じ方法で測定し

表 2 チンチラ

注入後経過時間	6時間	1日	2日	3日	7日	14日
症例数	1	1	1	2	1	1

た。塩酸ケタミン筋注麻酔 (20mg/kg) 後、経外耳道的に中耳骨胞の一侧に1%カラゲニン生食液 1ml、他側に生食液 1ml (各々ペニシリン濃度 0.1mg/ml 含有) を注入した。注入後は直ちにアロンアルファにて小孔を閉鎖した。経時的に T. G. を測定し中耳貯留液の状態を把握しながら、断頭し貯留液の状態、中耳粘膜等を実体顕微鏡下に観察した。中耳粘膜、耳管鼓室口、耳管を en bloc にとり出し、3%グルタルアルデヒド燐酸バッファ液にて前固定後、以下モルモットと同様の方法にて形態的観察を行った。

Ⅲ 結 果

1) Tympanogram の推移

T. G. 正常のチンチラにカラゲニンを注入し、各々経時的に T. G. を記録観察した。断頭時間は6時間、24時間、2日、3日、7日であった。1匹は14日まで T. G. で経過観察した。いずれのチンチラでも T. G. の推移はほぼ同様で、図1に示すごとく (左側に生食注入耳、中央に1%カラゲニン注入耳)、注入後6時間より Compliance の低下と Gradient の低下を認め、中耳腔内の滲出液の存在を示唆した。24時間では、Compliance および Gradient の軽度の回復をみるも、再び48時間より進行し、3～4日には Compliance および Gradient が最も低下していることを示した。5日目には対照とほぼ同型を示し、滲出液の産生が停止し、耳管より既存の貯留液も排泄され、液の減退を示した。5日以後は14日まで対照とほぼ同型の正常の T. G. を呈した。6、24時間および2、3、7日の断頭時の肉眼的観察でも同様の所見であり、液量をチンチラの中耳骨胞模式図で示すと図1の右のごとくとなり、3日が液量のピークであることがわかった。

2) モルモット

経時的に断頭後摘出した両側中耳骨胞は直ちに実体顕

表 1 モルモット

注入後経過時間	12時間	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	13日	14日	21日
症例数 (耳数)	1	6	5	9	4	2	4	2	3	3	2

図 1

微鏡下に開放し、固定包埋薄切後光顕、電顕にて観察した。なおカラゲニンは注入直後より嚥下運動により少量ずつ耳管より咽頭への排泄をみたが、一部は鼓室内に残り中耳粘膜に吸収された。

① 12時間後

a. 肉眼所見：コントロール側に比較して中耳粘膜の軽度肥厚があり、耳管鼓室口付近に少量の貯留液を認めた。生食注入側には貯留液は存在しなかった。

b. 光顕所見：上皮下の浮腫は一部の切片に認められ、そのような切片の上皮下には多数の円形細胞の浸潤が認められた。上皮下の出血は認められなかった(図2)。

c. 電顕所見：上皮細胞の配列はやや不規則となり、細胞間隙に好中球浸潤も認めるが、基底膜の断裂等の所見は明らかでなかった。上皮下には好中球を主とした多数の細胞浸潤が認められた。

② 24時間後

a. 肉眼所見：中耳粘膜の軽度肥厚があり、一部は隆起し肉芽状を示した。耳管鼓室口付近は12時間動物に比

して貯留液量が増していたが、粘膜の変化は著明でなかった。中耳粘膜全般にわたって毛細血管の拡張を認め、充血状を呈していた。

b. 光顕所見：粘膜下浮腫が著しく毛細血管周囲に出血がみられ、多数の赤血球漏出を認めた。また稀ながら上皮細胞間隙の拡大が一部の切片に認められた。

c. 電顕所見：鼓室粘膜では著しい上皮下の浮腫があり、コラーゲン線維束の集団が散在性になり、その間には明るい無構造物質が認められた。上皮細胞では、細胞質内に様々な空胞があり、腔内には円形の高電子密度顆粒を認めた(図3, 4)。上皮下には、マクロファージの浸潤があり、細胞内には少数ながら円形の高電子密度顆粒がとり込まれており、これらは注入したカラゲニンと考えられた(図5)。少数の mast cell が上皮下に存在し、様々な電子密度をもつ特徴的な顆粒を含有し、それらの一部は限界膜を失い各々融合していた(図6)。耳管鼓室口の繊毛上皮はほぼ正常構築であるが、上皮下には浮腫を認めた。しかし鼓室粘膜所見と異なり、浸潤細

胞はほとんど無く線維細胞が規則正しく配列していた。毛細血管はやや拡大傾向を認めた。

③ 2日後

a. 肉眼所見：粘膜肥厚はさらに進み、血管拡張も強く充血状を呈し、赤褐色の漿液性滲出液が貯留していた。

b. 光顕所見：鼓室粘膜上皮下は著しい浮腫で、毛細血管からの出血がみられた。耳管周囲では上皮下に軽度の浮腫を認めた。

c. 電顕所見：耳管周囲の繊毛細胞にはほとんど変化がないが、上皮下には浮腫によるコラーゲン線維束の分散を認めた。耳管周囲では24時間の標本同様浸潤細胞等はほとんど認められなかった（図 7）。

④ 3日および4日後

a. 肉眼所見：鼓室粘膜は中耳全域において著しく肥厚し肉芽状を呈し、血管拡張も広範囲に認められた。貯留液は更に増量し、中耳骨胞を満たし、これまでの標本の中では最大の変化を示した。

b. 光顕所見：鼓室粘膜の上皮下の浮腫は著しく、上皮細胞間隙は拡大し滲出液が充満していた。上皮下では赤血球の血管からの漏出が数多く認められた（図 8）。また一部には上皮は多層化しかつ円柱化する傾向を認めた（図 9）。耳管鼓室口付近の繊毛上皮下でも赤血球の漏出像を認めた。

c. 電顕所見：鼓室粘膜の一部は中耳腔側へ隆起し、扁平上皮の各細胞は丸石状の表面構造を呈する無繊毛細胞よりなり、このような表面像は随所で認められた（図 10, 11）。上皮下では好中球を中心とする細胞浸潤が著明であり（図 12）、中にはマクロファージが好中球を貪食している像も認められた（図 13）。血管壁は著しく伸展し、細静脈間隙がしばしば離開していた（図 14）。そのため上皮下には随所に赤血球の漏出が認められた。また血管壁に固着したマクロファージ内にはカラゲニン顆粒と思われる高電子密度顆粒を認めた（図 15）。

⑤ 5日後

a. 肉眼所見：貯留液の減少を認め、粘膜肥厚も軽減し、充血も消退してきていた。

b. 光顕所見：鼓室粘膜の上皮下の一部の標本では浮腫は消退し、出血もみられなかった。また耳管鼓室口の繊毛細胞には異常所見なく、上皮下の浮腫も消退していた。

c. 電顕所見：上皮下に軽度の浮腫は残存したが、マクロファージ、mast cell、好中球等の浸潤細胞はほとん

どみられなかった。

⑥ 7日後

a. 肉眼所見：粘膜肥厚は軽減、充血も消退し、少量の滲出液が耳管鼓室口付近に認められたのみであった。

b. 光顕および電顕所見：上皮細胞構築の回復および上皮下構築の回復もみられた。

⑦ 14日および21日後

a. 肉眼所見：ほとんどの症例でほぼ正常となり、1例において耳管鼓室口に少量の滲出液を認めた。

b. 光顕および電顕所見：粘膜肥厚、浮腫なく、正常構築を呈した。

以上モルモットの粘膜病態について述べたが、いずれの症例でも中耳骨胞の骨の肥厚等肉眼的には変化が認められなかった。また貯留液の培養は4耳に施行した。注入後、24時間で2耳、3日後で1耳、4日後で1耳に施行したが、いずれも培養は陰性であった。

3) チンチラ

モルモットと同様に観察したが、光顕所見を主とした。

① 6時間後

軽度の粘膜肥厚および発赤を鼓室粘膜に認めた。貯留液も少量認めた。光顕所見は鼓室粘膜では、上皮下の浮腫、肥厚の所見はなく、また細胞浸潤もなく一層の扁平上皮からなっていた。耳管粘膜は繊毛細胞よりなり、杯細胞は認められず、上皮下には浮腫並びに細胞浸潤もなかった。

② 24時間後

軽度の粘膜肥厚があり、毛細血管は、拡張し充血状を呈した。光顕では上皮下の著明な浮腫を認め、血管からの赤血球の漏出が出現しはじめた（図 16）。耳管腔には滲出液が認められ、一部赤血球や cell debris が存在した（図 17）。

③ 2日後

鼓室粘膜肥厚も強くなり、貯留液も増加した。光顕では耳管腔には、滲出液や変性細胞が認められた。また繊毛周囲腔にも液状物質が存在していた（図 18）。

④ 3日後

2日後よりさらに鼓室粘膜肥厚も強くなり、赤褐色の漿液性滲出液も増加した。光顕では上皮下の毛細血管から赤血球の漏出を認めた（図 19）。耳管腔には滲出液が存在した。電顕では鼓室粘膜で上皮下の浮腫を認め、上皮細胞は平坦でなく、ところどころ隆起を認めた。耳管鼓室口では上皮下の浮腫を認めたが、繊毛細胞は変化な

く、基底膜も断裂等の所見はなかった。

⑤ 7日後

貯留液は極めて少量認められるのみとなり、鼓室粘膜の肥厚は消退した。光顕、電顕共に浮腫や赤血球の漏出は認められず、また耳管腔にも貯留液も少なく、上皮細胞構築の回復がみられた。

Ⅳ 考 按

滲出性中耳炎の病因について従来より耳管閉塞説、炎症説などの諸説があるが、いまだ確固とした病因論の樹立をみないのが現状である。そこで本疾患の主病変のひとつである中耳腔内に滲出液貯留を作成し、本疾患病態の一端を解明するために病理組織学的検討を行った。

実験にはモルモットとチンチラを使用した。その理由はモルモットは以前より中耳、内耳の実験に頻用されており、その実験的中耳炎に関する報告も多いからであり、またチンチラは入手困難であるが、中耳骨胞が非常に大きく、外来診療で通常使用している tympanometry をそのまま応用でき、病態の推移を T. G. の波型より類推し中耳病態の把握が可能であるからである。またチンチラの中耳骨胞へのカラゲニン注入は経外耳道的に、侵襲も少なく容易に施行できる。その上自然発生の中耳炎はほとんどないとされ、本実験には非常に好都合で有用な動物である。

tympanometry は、外来での本症の臨床診断に広く用いられており、また学童検診への導入の試みもなされている⁷⁾⁵⁾。一般に $\pm 100\text{mmH}_2\text{O}$ の間にピークを認めるものを A 型、 $-100\text{mmH}_2\text{O}$ 以下にピークを認めるものを C 型、そして特にピークの低いものを Cs 型、平坦でピークのないものを B 型としている。滲出性中耳炎では B 型あるいは Cs 型を示す例が多いとされている。また Gradient の低いものや、ピークの低くなったもの⁹⁾、二峰性のもの¹⁰⁾ 滲出液の存在を示していると報告されている。チンチラにおけるカラゲニン注入による T. G. の推移で、臨床的に滲出性中耳炎によくみられる型を示し始めるのは約 6 時間後であり、また液量の確認からカラゲニン注入 3～4 日に最大の液貯留を認めた。これは組織所見の血管透過性亢進にも一致し、3～4 日が血管透過性のピークと考えられた。5 日目以後は治癒機転に移行し、ほとんどの動物で貯留液の減退ないし消失を認めた。これらの所見はモルモットの肉眼的貯留液量の観察でも同様の結果であった。

本実験にカラゲニンを使用した理由は以下のごとくで

ある。耳管閉塞などの物理的現象のみで滲出性中耳炎の発症原因を確定することはできないこと、急性中耳炎の発生の多い月に追従するように滲出性中耳炎が発生するとされ³⁾¹¹⁾、また滲出性中耳炎の 97% に急性中耳炎の既往をもつものがある¹²⁾等細菌感染による急性中耳炎が引き金になるとする報告が多いにもかかわらず単なる細菌感染のみで滲出性中耳炎に移行するとは考えられず何らかの他の誘因が考えられること、プロスタグランディンの貯留液内濃度が高いこと¹³⁾¹⁴⁾、細菌の endotoxin が液性または細胞性免疫機構に働くことが発症原因となる可能性があるという報告¹⁵⁾や、インフルエンザ菌をホルマリン処理した後に鼓室内注入し、実験的滲出性中耳炎を作ったという報告¹⁶⁾より、中耳局所免疫応答が何らかの形でかかわっていることが予想されること、などである。

従来カラゲニンは海藻より抽出された sulfated polygalactose よりなり、1962 年 Winter¹⁷⁾ が rat の後肢に起炎剤として初めて使用した。その後 rat 下肢の実験^{18)~21)}、胸膜²²⁾²³⁾、腹膜²²⁾、関節腔^{24)~27)}、肺胞²⁸⁾、気嚢²⁹⁾の報告があり、注入後約 3～6 時間に反応のピークがあることが知られている。また鶴藤³⁰⁾は皮下気嚢にて貯留液は最初 24 時間まで上昇しその後横ばいとなり、5 日目より再び上昇していくと報告している。Vinegar³⁰⁾はカラゲニン起炎機序行程について考察し、①カラゲニン注射 ②好中球走化性因子の発生 ③その放出 ④好中球の脈管周囲の局在 ⑤好中球の血管外の局在 ⑥好中球・カラゲニンの相互干渉作用 ⑦好中球 Lyso-somal Enzyme の放出 ⑧プロスタグランジン生合成活性化の経路 ⑨プロスタグランジン中間物質(血管活性)の生合成 ⑩血管活性プロスタグランジン中間物質の放出 ⑪血管透過性亢進 ⑫浮腫形成、以上 12 の段階を提唱した。以上のようなカラゲニン炎症の機序を参考にして、カラゲニン中耳炎の発生機序を考えてみると、鼓室粘膜では 24 時間以内にカラゲニンが上皮細胞を通過して上皮下に移行すると、異物処理細胞であるマクロファージが出現し、カラゲニン顆粒を貪食する。同じ標本には少数の mast cell があり脱顆粒像を示し、好中球も出現しているが、そのころより上皮下は浮腫状の変化を示し始める。3～4 日後には好中球を中心とする多数の細胞浸潤がおこり、また上皮層の浮腫も著明となる。このような形態的変化の発生機序はマクロファージのカラゲニン貪食が引き金と考えられ、その結果炎症細胞走化因子、mast cell 脱顆粒誘起因子の放出が

柴原論文付図(1)

図2 モルモット光顕(×900) 注入後12時間

図3 モルモット TEM (×6600) 24時間後

図 4 モルモット TEM ($\times 16600$) 24時間後

図 5 モルモット TEM ($\times 4000$) 24時間後

柴 原 論 文 付 図 (3)

図6 モルモット TEM (×6600) 24時間後

図7 モルモット TEM (×2000) 2日後

図8 モルモット光顕 (×280) 3日後

図9 モルモット光顕 (×280) 3日後

図10 モルモット SEM ($\times 1800$) 3日後

図 11 モルモット SEM ($\times 6600$) 3日後

図12 モルモット TEM ($\times 1750$) 3日後

柴 原 論 文 付 図 (5)

図13 モルモット TEM ($\times 6600$) 3日後

図14 モルモット TEM ($\times 1500$) 3日後

図15 モルモット TEM ($\times 1500$) 3日後

柴原論文付図(6)

図16 チンチラ光顕 (×900) 24時間後

図18 チンチラ光顕 (×1000) 2日後

図17 チンチラ光顕 (×1000) 24時間後

図19 チンチラ光顕 (×500) 3日後

あり、細静脈内皮間隙より多数の好中球や赤血球が流出し、血管透過性は亢進し、多量の滲出液が産生されると考えられた。

一方耳管鼓室口の繊毛細胞は、2 および 3 日目上皮下に浮腫および軽度の出血を認めるのみで、全経過中上皮層である繊毛細胞には変化がなく、また上皮下の細胞浸潤および赤血球漏出等の程度も軽く鼓室粘膜にくらべ耳管鼓室口付近の繊毛細胞はカラゲニン注入の影響を受けにくい印象を得た。また耳管の粘液繊毛輸送能に関しては、耳管腔内に存在した貯留液が、2 日目には繊毛周囲に存在しているものもあったが、3 日目にはそれほどの所見は消失し形態的に繊毛機能は正常に復しているように思われた。この耳管機能の回復が 5 日目からの貯留液の減退や鼓室粘膜、耳管鼓室口粘膜の病態改善傾向に結びつくものと思われた。

滲出性中耳炎の病理組織学的検索については Friedmann³¹⁾ および Senturia³²⁾ が、耳管閉塞による実験的滲出性中耳炎において粘膜上皮細胞のうち立方および扁平上皮細胞が円柱上皮化し、さらには腺様構造を呈するようになることを観察し、鼓室粘膜の円柱上皮化の重要性を提唱した。Hentzer³³⁾ は中耳粘膜が呼吸上皮であり、杯細胞は繊毛細胞と同様に basal cell より発達し、intermediate cell を經由してできると報告した。また Lim³⁴⁾ は滲出性中耳炎罹患児の電顕的研究で漿液性貯留液を認めた粘膜は、浮腫が主で、粘膜毛細血管透過性亢進像をみとめ、血管内から漏出した血漿に由来するだろうと考えた。また粘液性貯留液を認めた粘膜は、全体に肥厚し、粘膜上皮は円柱細胞と杯細胞よりなり、腺あるいは嚢胞様構造を認め、これらの分泌細胞から産生されたものと考えた。本実験のカラゲニン中耳炎は一時期一部に円柱上皮化がみられたが、全般的には立方あるいは扁平上皮が主であり、杯細胞や腺様構造は認められず、臨床的には漿液性滲出性中耳炎の病態と考えられた。

本実験におけるマクロファージのカラゲニン貪食像については前述したが、Velo³⁴⁾ は実験的カラゲニン肺炎でもマクロファージがカラゲニンの沈着物を貪食していると報告した。その貪食像と今回の標本が極めて類似した所見を呈していることから中耳粘膜のマクロファージもカラゲニン沈着物の顆粒を貪食していると考えられた。最近滲出性中耳炎患者の貯留液中に phagocytosis のため多くの偽足をもちまた粘液顆粒をとりこんでいるマクロファージを認め、これが中耳局所免疫機構に関与

している可能性を示唆する報告³⁶⁾ があり、更に Velo³⁷⁾ はカラゲニン胸膜炎にプロスタグランジンが、また Di Rosa³²⁾ はカラゲニン浮腫中にヒスタミン、セロトニン、キニンが放出されていることを報告し、更に米本³⁸⁾ はカラゲニンが補体を活性化する可能性のあることを報告した。臨床的にも滲出性中耳炎貯留液中より、プロスタグランジン、キニン、ヒスタミン、更に補体、C₃ proactivator が検出され、これらの関与が示唆されている^{13)(14)(39)~(42)}。これらの点でもカラゲニン中耳炎は臨床的滲出性中耳炎のモデルに少なからず近いものと推察された。しかし本実験におけるカラゲニン中耳炎は、その大部分の炎症反応および貯留液が 5 日目から消失し、この点いわゆる再発性難治性の滲出性中耳炎の臨床像とはかなり異なる病態であると思われた。つまり貯留液の長期停留と粘膜の肥厚、上皮細胞円柱化による各種分泌顆粒を有する細胞の著しい増加、杯細胞や腺組織の増加といった分泌機能亢進状態を示す像は得られなかった。従ってカラゲニン注入により惹起された滲出性変化が更に長時間存続するためには何らかの他の要因が加わる必要があると思われる。その要因の主なるものとしては、持続的・慢性的に加わる中耳への刺激や、貯留液の排泄口である耳管の輸送機能障害等が考えられるが、少なくともカラゲニンは耳管の粘液繊毛輸送能に重大な障害を与える程の病態を引き起こしていない。今後本実験に加えて、更に他物質による中耳炎惹起のための実験を組み立てていくことにより本実験と臨床像とのギャップを次第に狭めていくことができるものと思われる。いずれにしても、本実験では臨床によく遭遇する再発性難治性滲出性中耳炎は少なくとも単なる滲出性病変のみによって惹起されえないという事実を証明しているものと思われた。

V 結 語

1) 非細菌性起炎剤であるカラゲニンを耳管腔に注入して実験的中耳炎を作成し形態的に観察した。実験動物はモルモット、チンチラを使用し、チンチラは経時的に T. G. を測定した。

2) T. G. の推移は注入後 6 時間より軽度の Compliance と Gradient の低下を認め、3～4 日が最も低下した。また肉眼所見でも同時期が最も貯留液が多く認められた。

3) カラゲニン中耳炎粘膜病態は、鼓室粘膜では、24 時間で上皮下の浮腫があり、上皮細胞内と上皮下のマク

ロファージにカラゲニンと考えられる高電子密度顆粒を認めた。3日後には、上皮下の浮腫著明となり、上皮細胞間隙拡大、上皮下の好中球を中心とする細胞浸潤、細静脈間隙の離開、上皮下の赤血球の漏出が認められた。5日より上皮細胞および上皮下の構築回復が認められた。

耳管鼓室口では、上皮下の浮腫がみられたが繊毛細胞の変化は認められなかった。5～7日で上皮下の浮腫は治癒傾向を示した。

4) 以上の結果よりカラゲニン注入により惹起された滲出性変化が更に長期に存続するには貯留液の排泄口である耳管の輸送機能障害等が考えられた。

参 考 文 献

- 1) Politzer A: Diagnose und Therapie der Ansammlung seröser Flüssigkeit in der Trommelhöhle. *Wien Med Wochenschr* 17: 244-247, 1867.
- 2) Armstrong BW: Chronic otitis media. *South Med J* 50: 540-546, 1957.
- 3) Lemon AN: Serous otitis media in children. *Laryngoscope* 72: 32-44, 1962.
- 4) Draper WL: Secretory otitis media in children. *Laryngoscope* 77: 636-653, 1967.
- 5) 河本和友: 滲出性中耳炎 耳鼻 20: 241-296, 1974.
- 6) Kokko E: Chronic secretory otitis media in children. *Acta Otolaryng Suppl* 327, 1974.
- 7) 沖津卓二 他: インピーダンス・オージオメトリーの学童検診への導入の試み 日耳鼻 82: 785-792, 1979.
- 8) 柴原義博 他: インピーダンス・オージオメトリーの学童検診への導入の試み (第二報) 日耳鼻 84: 1536-1541, 1981.
- 9) Brooks DN: The use of the electro-acoustic impedance bridge in the assesment of middle ear function. *J Int Audiol* 8: 563-569, 1973.
- 10) 遠藤里見 柴原義博 他: 滲出性中耳炎のティンパノグラム 日耳鼻 86: 305-313, 1983.
- 11) Suehs OW: Secretory otitis media. *Laryngoscope* 62: 998-1027, 1952.
- 12) Giebink GS et al: The microbiology of serous and mucoid otitis media. *Pediatr Pediatr* 63: 915-919, 1979.
- 13) Bernstein JM: Biological mediators of inflammation in middle ear effusions. *Ann Otol Rhinol* 85 Suppl 25: 90-96, 1976.
- 14) Bernstein JM et al: Prostaglandins in middle ear effusion. *Arch Otolaryng* 102: 257-258, 1976.
- 15) Morrison DC et al: The effects of bacteril endotoxins on host mediation systems. *Am J Pathol* 93: 528-617, 1978.
- 16) DeMaria, TD et al: Experimental otitis media with effusion following middle ear inoculation of nonviable hemophilus influenzae. Abstracts of the Research Forum. AAO-HNS/ARO; p. 40, 1981.
- 17) Winter CA et al: Carrageenin-induced edema in hind paw of the rat as an assay for anti-inflammatory drugs. *Proc Soc Exp Biol NY* 111: 544-547, 1962.
- 18) Van Arman GG et al: Some details of inflammations caused by yeast and carrageenin. *J Pharmacol Exp Ther* 150: 328-334, 1965.
- 19) Vinegar R et al: Biphasic development of carrageenin edema in rats. *J Pharmacol Exp Ther* 166: 96-103, 1969.
- 20) Militzer K et al: Histometrische Untersuchungen am carrageenin, Formalin-und Aerosil-Pfoten-ödem der Ratte. *Exp Path Bd* 9: 342-353, 1974.
- 21) Delhon A et al: Study of the repercussions on blood of acute experimental inflammation in rats. *Arzneimittel Forsch Drug Res* 27: 2308-2311, 1977.
- 22) Di Rosa M et al: Studies of the mediators of the acute inflammatory response induced in rats indifferent sites by carrageenan and turpentine. *J Path* 104: 15-29, 1971.
- 23) 田中邦男: ラットカラゲニン胸膜炎における胸水の貯留 日胸疾患誌 17: 452-455, 1979.
- 24) Gardner DL: Production of arthritis in the rabbit by the local injection of the mucopolysaccharide, carrageenin. *Ann Rheum Dis* 19: 369-376, 1960.
- 25) Muirden KD et al: Light and electron microscope studies in carrageenin, adjuvant and tuber-

- culin induced arthritis. *Ann Rheum Dis* 28: 392-401, 1969.
- 26) Lowther DA et al: Carrageenin-induced arthritis. *Arthr and Rheum* 19: 769-776, 1976.
- 27) 荒井祐一朗 他: ラット滑膜からの Prostaglandin 遊離におよぼす Carrageenin 炎症の影響およびこれに対する抗炎症薬の作用 *日薬理誌* 75: 765-769, 1979.
- 28) Szereda-Przestaszewska M et al: Lung pathology in carrageenan pneumonia of intact and chronically vagotomized rabbits. *J Comp Path* 89: 449-456, 1979.
- 29) Tsurufuji S: How to assess inflammation in animals. *Drugs Exptl Clin Res* 5: 79-84, 1979.
- 30) Vinegar R et al: Quantitative studies of the pathway to acute carrageenan inflammation. *Fed Proc* 35: 2447-2456, 1976.
- 31) Friedmann I: The comparative pathology of otitis media. *J Laryngol Otol* 69: 588-601, 1955.
- 32) Senturia BH et al: Middle ear effusions, Pathologic changes of the mucoperiosteum in the experimental animal. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 71: 632-647, 1962.
- 33) Hentzer E: Ultrastructure of the middle ear mucosa. *Ann Otol* 85 Suppl 25: 30-35, 1974.
- 34) Lim DJ et al: Ultrastructural pathology of the middle ear mucosa in serous otitis media. *Ann Otol* 80: 838-853, 1971.
- 35) Velo GP et al: The origin and turnover of alveolar macrophages in experimental pneumonia. *J Path* 109: 7-19, 1973.
- 36) Sipilä P et al: Ultrastructural morphology of mucoid effusion in secretory otitis media. *Acta Oto-laryng* 90: 342-352, 1980.
- 37) Velo GP et al: Distribution of prostaglandins in inflammatory exudate. *J Path* 111: 149-158, 1973.
- 38) 米本光一: ラットカラゲニン胸膜炎における白血球浸潤と補体の活性化 *炎症* 3: 51-62, 1983.
- 39) Jung TTK et al: Effect of prostaglandin on the composition of chinchilla middle ear effusion. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 89 Suppl 68: 153-160, 1980.
- 40) Juhn SK et al: Biochemical and immunochemical findings. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 89 Suppl 68: 161-167, 1980.
- 41) Laurell AB et al: Immune complexes and complement in serous and mucoid otitis media. *Acta Oto-laryngol* 90: 290-296, 1980.
- 42) Maxim PE et al: Chronic serous otitis media. An immune complex disease. *Trans Am Acad Oph Otol* 84: 234-238, 1977.
-
- 稿を終えるに臨み、終始変らぬ御教示、御指導を賜わった東北大学薬学部生化学教室鶴藤丞教授、並びに第一病理学教室京極方久教授に深く感謝致します。
- 本研究の一部は昭和57、58年度文部省科学研究費（総合研究A・課題番号57370029）の援助を受けた。
-
- （原稿受付 昭和 59. 1. 6日）
- 別刷請求先 〒980 仙台市星陵町 1-1
東北大学医学部耳鼻咽喉科学教室 柴原 義博