耳鼻咽喉科臨床 第十九卷 第二號

大正十五年二月十五日發行

THE OTO-RHINO-AND LARYNGOLOGICAL CLINIC

VOL. 19 NO. 2. FEBRUARY 15. 1926

原 著

Ein kasuistischer Beitrag zur Hemihypertrophia faciei progressiva.

Von

Arzt u. Zahnarzt MITSUAKI SAYAMA.

Aus der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkrankheiten in Kioto.

(Direktor: Prof. T. HOSHINO.)

Unter Hemihypertrophia faciei verstehen wir einen halbseitigen Ueberwuchs des Gesichts, deren Hauptsymptom in auffallender Asymmetrie desselben besteht. Sie kann, wie in der Literatur zu finden ist, auf Trauma bei Schwer- oder Zangengeburt oder auf angeborener Anomalie beruhen und natürlich auch erworben sein. Die Neubildung und entzündliche Anschwellung sind hier auszuschalten. Es gibt dreierlei Krankheiten, die sich durch halbseitige Gesichtsentstellung manifestieren, nämlich Hemiatrophia fac., Hemihypoplasia fac., und Hemihypertrophia fac. Die erstgenannte ist relativ selten, die nächste ist erst neuerdings beschrieben worden, die letzte ist am seltensten. Kommt daher irgendwelche Gesichtsasymmetrie vor, so bedarf es exakter Beobachtung und eingehender Untersuchung um festzustellen, um welchen von den angegebenen Fällen es sich handelt, und weiter, ob die Missbildung angeboren oder erworben, stabil oder progredient ist. Neuerdings habe ich Gelegenheit gehabt, einen Fall von Hemihypertrophia faciei progressiva zu beobachten und erneunter Prüfungen zu unterliegen, so dass ich in der Lage bin, etwas zur Kenntnis der Sache beizutragen.

Im Mai 1924 erschien in unserer Polyklinik ein 18 jähriges Mädchen wegen

auffallender Gesichtasymmetrie, indem die rechte Gesichtshälfte viel grösser als die linke war.

Familienanamnese. Patientin stammt von völlig gesunden Eltern. Auch sind alle ihre Geschwister gesund. Nervenkrankheiten, Missbildungen, Tuberkulose und Geschwülste sind in der Familie nicht vorgekommen, auch zeigt kein Glied derselben eine Gesichtsveränderung ähnlich der der Patientin. Sie wurde als völlig ausgetragen geboren. Die Geburt verlief glatt. Ihre Mutter wurde durch keinen Unfall während der Schwangerschaft gefährdet, ebensowenig durch irgendwelche schweren Krankheiten. Die Pat. hat Masern im Frühkindesalter durchgemacht. Im 8. Lj. litt sie an Mumps, der ohne schwere Komplikationen leicht überstanden wurde. Sonst war sie nicht krank gewesen. Nur neigte sie zu Erkältungen und klagte dabei über Halsschmerzen, wobei ihr das Schlucken ein wenig schmerzhaft wurde. Aber die Beschwerden pflegten in einigen Tagen ohne ärztlichen Behandlung nachzulassen. Die Periode trat zum ersten Mal im 16. Lj. ein, und verlief regelmässig ohne Besonderheiten.

Ihre Mutter erzählte, die Pat. schnarche und knirsche während des Schlafs so stark mit den Zähnen, dass man bei ihr nicht ruhig in demselben Zimmer schlafen könne. Beim Kauen pflege sie sich immer der rechten Zähne allein zu bedienen. Wann diese Gesichtsentstellung zuerst aufgetreten sei, wies sie selbst ebensowenig wie ihre Familie. Nur erinnere sie sich, dass vor einigen Jahren ihr Bruder sie gefragt habe, ob sie rechts Wangenschwellung infolge irgendeines Zahnleidens habe; darüber habe sie aber damals nie geklagt und deswegen hätte sie und ihre Familie es vernachlässigt. Nach ihrer Aussage hätten ihre Schulkameraden die Gesichtsdeformität schon lang bemerkt. Doch habe sie selbst bisher von dem Leiden niemals Beschwerde gehabt. Vor einigen Tagen hätte sie einen Zahnarzt wegen Zahnschmerzen aufgesucht; der habe sie von neuem auf ihre Gesichtsentstellung aufmerksam gemacht. Allein wegen des Schönheitsfehlers stelle sie sich in unserer Sprechstunde ein.

Status praesens. Ein 18 jähriges Mädchen von verhältnismässig kleinem Wuchs, mit guter Konstitution, in gutem Ernährungszustande. Innere Organe und Nervensystem zeigen völlig normalen Befund. Aschner'sche und Tschermack'sche Symptome negativ. Auch bei pharmakodynamischen Prüfungen sind keine Zeichen von Sympathiko- oder Vagotonie festzustellen. Harn- und Blutuntersuchung zeigt keine Besonderheiten. WaR. (—). Pirquet'sche Reaktion (—). Der Knochenbau zeigt keine Unregelmässigkeiten mit Ausnahme des Gesichtsschädels. Trotzdem der Horizontalkopfumfang ganz symmetrisch ist, fällt die ungleiche Grösse der beiden Gesichtshälften sehr deutlich auf. Die rechte Hälfte abwärts vom Jochbogen ist grösser als die linke, indem die Wange rechts sich auffallend vorwölbt, während sie links steil abfällt. Die rechte Nasolabialfalte ist undeutlicher als die linke. Der rechte Mundwinkel sieht etwas herabgedrückt aus. Die Messung ergibt folgenden Unterschied:

	rechts	links
vom Mundwinkel bis zum Vorderrand des Masseters am Unterkieferrand.	6.5 c.	5.5 c.
von der Mitte des Unterkiefers bis zum Unterkieferwinkel.	8.5	7.5
vom Vorderrand des Masseters bis zum Unterkieferwinkel.	2.5	2.0
vom äusseren Augenwinkel bis zum oberen Ende des Ohrmuschelansatzes.	8.3	8.3
vom Nasenflügel bis zum unteren Ende des Ohrmuschelansatzes.	11.5	10.5

Die beiden unteren Orbitalränder fühlen sich gleich dick an. Die rechte Hälfte des Unterkiefers

ist wie oben geschildert, grösser als die linke, jedoch nur von geringem Dickenunterschied, und der unterste Rand des rechten Jochbeins lässt sich um $\frac{1}{2}$ Fingerbreite niedriger als der linke fühlen. Das entspricht völlig dem Röntgenbild.

Die Haut des Gesichts zeigt nichts Krankhaftes. Nirgend-wo sind abnorme Pigmentierungen oder Unterschiede der lokalen Hauttemperatur zu beweisen. Selbst bei pharmakodynamischen Prüfungen findet sich niemals eine halbseitige Ausschwitzung und Farbenveränderung des Gesichts. Das Unterhautfettgewebe ist normal entwickelt. Keine Vertiefungen an der Haut über Fossa canina. Behaarung des Kopfes und Gesichts normal. Auch die Lidspalten sind beiderseits gleich weit.

Die Muskulatur der rechten Gesichtshälfte, bes. der Masseter, ist stärker als die linke. Die rechte Wange fasst sich ein wenig dicker an als die linke. Die Zunge lässt sich geradlinig herausstrecken; die beiden Seiten sind gleich gross. Die Augen bieten keine Besonderheiten dar. Die Pupillen sind von gleicher Weite und von normaler Reaktion. Sehkraft normal. Die Sensibilität der Gesichtshaut ist völlig intakt. Keine motorische Störung. Keine degenerative Reaktion der Gesichtsmuskeln bei Galvanisation.

Die Mundhöhle ist rein erhalten. Die Schleimhaut des weichen Gaumens ist leicht injiziert und die der Wange ist beiderseits von normaler und gleicher Farbe. Die Mündung des ductus parotideus scheint rechts etwas dicker als links. Das Zahnfleisch ist im allgemeinen verdickt, dunkelrot, weich und leicht blutend, bes. im Bereich der unteren und oberen Vorderzähne, wo die Taschenbildungen per Gingiva auffallend sind und auf Druck eine geringe Menge Eiters herausfliessen. Der rechte Gaumenbogen steht nur etwas niedriger als der linke. Uvula hängt ein wenig schräg nach links. Rachenhinterwand granuliert und injiziert. Gaumentonsillen o. B. Der harte Gaumen ist steil gewölbt und zwar links mehr abgesteilt als rechts. Rachenmandeln persistieren noch; sie sind von Fingerkopfgrosse. Geschmacksvermögen intakt. Die Bezahnung ist normal. Der Weisheitszahn ist noch nicht erschienen. Die Grösse und Form des einzelnen Zahnes stellt keine Besonderheiten dar. Der obere Zahnbogen ist abgespitzt, während der untere normal ist. Alle Zähne stehen locker. Die beiden oberen mittleren Zähne samt Alveolarfortsatz protrudieren stark und erscheinen verlängert und aufgelockert. Auffallenderweise kamen abnorme Abrasionen der Eckzähne zu Tage, die für Knirschen sprechen. Hierüber später. Kehlkopf o. B. Beide Ohren intakt; Hörprüfung ergibt keinen bedeutenden Unterschied für die eine oder andere Seite. Ohrmuscheln sind von gleicher Grösse. Nase, Lippe und Hals o. B. Der Unterkiefer scheint etwas nach rechts verschoben zu sein.

Der Kaudruck, mit Bite Guage nach Zahnarzt Ono gemessen, ist rechts grösser als links, wie hierunter angegeben.

Kaudruck. (Pound)

rechts	links	rechts	links
24	32	40	20
25	30	50	30
29	20	26	26
42	29	22	24
32	25	23	20
45	40	22	22
20	15	45	40
6	4	20	15
24	21	20	21
29	30		
51	32		
30	27		
		Durchschnittlich	
		30	25

Sonstige Körperteile sind symmetrisch und normalgross. Die Patientin ist geistig auf der Höhe; in der Schule bestand sie die Prüfungen glänzend. Auf Grund des oben geschilderten Krankheitsbildes gelange ich zu der Diagnose: Hemihypertrophia fac. progr., auf die hauptsächlich das Knirschen und die Gewöhnheit des rechtseitigen Kauens zurückgeführt werden müssen.

Literaturübersicht:

Gegenüber der Häufigkeit der Hemiatrophia fac. progr., von der inzwischen über 100 Fälle mitgeteilt sind, und der der kongenitalen fortschreitenden Hemihypertrophia fac., in der bisher beinahe 30 Fälle beschrieben sind, ist die einseitige erworbene fortschreitende Gesichtshypertrophie, also Hemihypertrophia fac. progr. acquisita ein äusserst seltenes Vorkommnis. Es gibt bisher nur 11 Fälle. Diese sind die Fälle von Stilling (1840; 2 Fälle), Berger (1872), Schieck (1883), Montgomery (1893), Dana (1893); Hoffmann (1903), Minor (1903), Stier (1911), Nakamura (1914).

Da bei dem Fall Danas Akromegarie vorhanden war, tut man gut, ihn auszu-schliessen. Bezüglich des Geschlechts finden sich 5 männliche und 5 weibliche Fälle. Die rechte Seite ist in 5, die linke in 4 Fällen von dem Leiden befallen; bei dem Fall Bergers war keine Rede von Seite. Das Alter, in dem das Leiden zuerst manifest wurde, schwankt zwischen dem 2. und 13. Lj., mit Ausnahme von zwei Fällen, in denen bei dem einen, 23 Jahre alt, kurz nach einer Verletzung an der rechten Gesichtshälfte, und bei dem anderen, 30 Jahre alt, ein Jahr nach einer Abszessbildung an der rechten Halsseite die betreffende Gesichtshälfte anfang sich zu vergrössern. Keine hereditäre Belastung. Anamnetisch sind nur bei 4 Fällen als veranlassende Momente Verletzungen am Gesichte zu konstatieren. Die Symptomatologie ist sehr verschiedenartig. Nur bei einem Fall (Berger) gingen heftige neuralgische Schmerzen voran. Am auffallendsten ist natürlich die Asymmetrie des Gesichts. Die Hypertrophie beschränkt sich auf die Gesichtshälfte bei 7 Fällen (Stilling, Berger, Schieck, Hoffmann, Stier, Minor, Nakamura), während sie bei 2 Fällen (Mackey, Montgomery) auf die Kopfhälfte übergreift. Der befallene Gesichtsteil zeigt je nach der Intensität eine entzündliche Anschwellung (Hoffmann, Nakamura) oder irgendeine Neubildung, und zwar bis zu Kindskopfgrösse (Stilling). Sonstige Körperteile bieten keine Asymmetrie dar, mit Ausnahme des Mackeyschen Falls, bei dem die Ohrmuschel auf der hypertrophierten Seite sich auch vergrösserte. Bei 3 Fällen (Nakamura, Stilling, Berger) sind nur Weichteile befallen, während bei den übrigen sowohl die Weichteile als auch die harten Gewebe hypertrophieren. An der Hypertrophie ist immer die Wange beteiligt; in Mitleidenschaft gezogen sind bald der Mund (Hoffmann), bald Lippe, Augenlid, Nasenflügel (Schieck), bald

Mund- und Backenschleimhaut (Stilling), bald die Zunge (Hoffmann). Bezüglich des harten Gewebes sind bei 3 Fällen (Montgomery, Mackey, Stier) Gesichts- und Schädelknochen, bei 2 Fälle (Stier, Schieck) Gesichtsknochen allein und bei nur einem Fall (Mackey) Zähne mit betroffen. Es ist von grossem Interesse, dass bei dem Mackeyschen Fall die Molaren an der erkrankten Seite vergrössert waren, bei 2 Fällen (Stier, Schieck) die Zähne auf der hypertrophierten Seite in der Entwicklung zurückblieben. Sind Knochenteile vom Leiden angegriffen, so bleibt es nie aus, dass der Oberkiefer samt dem Alveolarfortsatz sich vergrössert (Mackey, Schieck, Stier); dabei kann der Unterkiefer ganz indifferent bleiben (Schieck). Jochbein samt Jochbogen (Montgomery, Mackey, Schieck) oder ohne ihn (Stier) werden von Hypertrophie heimgesucht. Auch Nasen-, Stirn-, Schläfenbein einschliesslich des Mastoidealfortsatzes (Montgomery, Mackey, Stier), Scheitel-, Keil-, und Hinterhauptbein (Montgomery, Mackey) können hypertrophieren. Beim Mackeyschen Fall ist Exostosis am Mastoidealfortsatze und Oberkiefer vorhanden.

Von den Weichteilen beteiligt sich immer die Wange mit ihren benachbarten Teilen, die sich mehr oder minder verdicken; dagegen bleibt die Unterlippe völlig verschont (Schieck); die Schleimhaut der Wange soll auf der grösseren Seite hypertrophieren (Hoffmann, Stilling). Bei dem Fall Stillings waren angioektatische Veränderungen zu konstatieren.

Die mikroskopische Untersuchung, die von Montgomery ausgeführt wurde, weist eine Zunahme der Haare an Dicke und Vergrösserung der Talgdrüsen ohne Ueberwucherung des subkutanen Bindegewebes auf; Berger sagt, dass dieses überhaupt bei seinem Fall vermehrt gewesen sei, während Hoffmann der Ansicht ist, dass eine abnorme Entwicklung des Unterhautfettgewebes die Ursache sei.

Bei dem Mackeyschen Fall findet man eine Augenkomplikation, indem die Sehkraft auf der hypertrophierten Seite gestört wurde, was sich durch eine Brille keineswegs besserte. Die Behaarung ist an der kranken Seite nicht bloss stärker, sondern die einzelnen Haare sind auch dicker als an der gesunden (Stilling, Hoffmann, Schieck, Montgomery).

Die Haut ist im Bereich des hypertrophierten Teils bei dem Fall Stillings anaesthetisch und bei dem Fall Stiers hyperaesthetisch. Bei den sonstigen Fällen ist die Hautsensibilität ganz intakt. Mobilitätsstörung sieht man nur bei einem Fall (Stilling). Bei dem Fall Hoffmanns findet sich Hautpigmentation, und die Haut fühlt sich schwammig an, was durch Wucherung des Unterhautfettgewebes erzeugt wurde. Bei dem Fall Mackeys vergrössert sich der Nasenflügel an der

kranken Seite knollig.

Was die vasomotorische Zeichen anbelangt, so finden sich ektatische Vergrößerung der gesamten Arterien im affizierten Bezirke, vielleicht insbesondere die der Carotis (Stilling Fall 1), die angioektatische Vergrößerung der Arterien beim Rücken (Stilling Fall 2), Verminderung der Schweisssekretion des erkrankten Teils (Stier), Hypertrichosis der Wange an der kranken Seite (Mackey), verringerte (Stier) und vermehrte Salivation (Stilling). Nur einer von den 10 Fällen zeigt eine geringe Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit (Stier). Bei sämtlichen Fällen ergeben die übrigen Körperteile keine krankhaften Erscheinungen. Die innere Organe sind normal. Atrophie, Hypertrophie, Störungen der Reflexe sind nirgendwo zu finden. Die Intelligenz ist überhaupt intakt.

Bezüglich der Pathogenese der Hemihypertrophia fac. vertraten bisher die Autoren verschiedenen Anschauungen, die aber wegen Mangels an Experimenten und pathohistologischen Untersuchungen nichts Anderes als Hypothese sein können.

Hiermit kehre ich zum vorliegenden Fall zurück. Worauf die Diagnose von der Hemihypertrophia fac progr. begründet ist, möchte ich folgendermassen erklären. Die Gesichtsasymmetrie bei diesem Fall ist bedingt durch die Hypertrophie der rechten Gesichtshälfte und nicht durch Atrophie oder Hypoplasie der linken, vorausgesetzt, dass von angeborenen Missbildungen keine Rede ist. Nirgendwo auf der kleinen Gesichtshälfte sind die Hauptsymptome der Hemiatrophie (Hautschwund, etc.) und ihre Folgeerscheinungen (Furchenbildung, Pigmentation, Veränderungen der Knochen, Muskeln, Haare, Ohren, Zunge etc.) überhaupt zu konstatieren. Auch fehlen vor und nach dem Ausbruch der Symptome auf der affizierten Seite sowohl Trigeminessymptome (neuralgische Schmerzen und Muskelzuckungen) als auch Sympathikussymptome (ungleiche Pupillenweite, Sekretionsanomalie, Unterschied der lokalen Temperatur, vasomotorische Zeichen etc.). Auch spricht das Krankheitsbild nicht für Hemihypoplasie, weil die kleine Gesichtshälfte nicht in der Entwicklung zurückgeblieben ist und dem Alter entspricht. Im Gegensatz dazu ist die Hemihypertrophie rechts von positiver Manifestation. Ober- und Unterkiefer, Jochbein und Jochbogen haben sich vergrößert, während die Kopfknochen intakt geblieben sind. Dass von sämtlichen Gesichts- und Schädelknochen die eben genannten allein von dem Leiden befallen werden, stimmt mit den Beschreibungen vieler Autoren überein. Aber nicht bloss das Knochengerüst ist beteiligt, sondern auch die weichen Gewebe, indem die Kaumuskeln rechts um 0.5 c.m. breiter als links messen, und der vordere Gaumenbogen rechts etwas niedriger steht als links. Bei diesem Fall

sind keine Verletzungen oder eitrigen Prozesse in dem betr. Bezirke zu konstatieren, die manchmal als veranlassende Momente anzusehen sind (Stilling, Nakamura, Mackey). Von früh an hat sich die Patientin gewöhnt, nur auf der rechten Seite zu kauen; dazu tritt starkes Knirschen während des Schlafs. Das Knirschen ist nichts Anderes als klonische horizontale Kaumuskelkrämpfe, und zwar des M. Pterygoideus ext. (nach vorn), der hinteren Fasern des M. Temporalis (nach hinten), des Masseter und des M. Pterygoideus int. (nach oben). Wenn diese Muskeln kontrahieren, wird der Unterkiefer an den Oberkiefer angedrückt und nach Art eines Hobels gezogen. Weil einerseits das Knirschen im Schlaf dem Knirschen im wachen Zustande entgegengesetzt und diese pathologische Erscheinung meist mit geringen Intervallen, von längerer Dauer ja die ganze Nacht hindurch wahrzunehmen ist, und es andererseits am häufigsten im Kindesalter, zumal im Wachstumsstadium auftritt, deswegen spielt es eine besondere Rolle bei der Entwicklung und Form des Ober- und Unterkiefers, verschiedenen Einwirkungen gegenüber nicht nur nachgiebig, sondern auch sehr adaptionsfähig sind. Dies scheint auch gestützt zu werden von amerikanischen Autoren die neuerdings behaupten, dass die Schlafgewohnheiten in Bezug auf die Lage auf dem Kopfkissen grossen Einfluss auf die Form des Gesichts und Kopfes ausüben.

Bei den Zähnen sind typische Eckzahnschliffe, viel stärker rechts als links, zu finden, während die Backenzähne davon frei geblieben sind, was für Knirschen spezifisch ist. Auch für parodontische Symptome, bes. im Bereiche der Frontzähne, bei dem sonst gesunden, jungen Mädchen, lässt sich diese Annahme verwerten. Ich bin der Ansicht, dass die Persistenz der Rachenmandelhypertrophie bei dieser Patientin mehr oder weniger dem Knirschen zuzuschreiben ist.

Wann die Hypertrophie bei diesem Fall aufzutreten anfang festzustellen, ist es sehr schwer, aber so viel ist sicher, dass die Gesichtssymmetrie ungefähr im 14. Lj. erst vor sich ging. Dies ist die Zeit der Vollendung des permanenten Gebisses. Man kann wohl mit Recht vermuten, dass der Prozess des Zahndurchbruchs in irgendwelche Beziehung mit der Förderung der Hypertrophie stehen muss. Schon Hoffmann hat gesagt, dass die Entwicklung der Zähne mit besonderen trophischen Einflüssen zu verknüpfen ist, unter denen die bis dahin schlummernden Keime in relativ kurzer Zeit zu dem Abschluss ihrer Entwicklung gelangen.

Alles in allem handelt es sich um Vergrösserung eines Körperteils als Ganzen in seinen eignen Formverhältnissen. Als ursächliches Moment einer solchen Steigerung der Wachstumstätigkeit kann man wohl an einen Reiz denken. Demnach sind

die hypertrophische Prozesse in diesem Fall, wie Stier beschrieb, den "passive Einwirkungen auf die Zellen, die diese zu einer Steigerung ihrer aktiven formativen Tätigkeit anregen," zu verdanken. Hierzu ist mechanischer oder thermischer Reiz nicht geeignet. Nur an Hyperämie, die dem thermischen Reiz sehr nahe steht, ist zu denken. Dieses Mädchen hat sich früh gewöhnt, nur auf der rechten Seite zu kauen; dazu tritt das Knirschen während des Schlafs, das auch auf derselben Seite ausgelöst wird. Da der Unterkiefer beim Kauen als Hebel wirkt, muss das einseitige Kauen die betreffende Hälfte des Unterkiefers mehr als die andere belasten. Das gilt ebenso für das Knirschen. So lange die Belastung als adäquater Reiz wirkt, werden sich die belasteten Teile demgemäss entwickeln und adaptieren. Es veranlasst die stärkere Hyperämie auf der funktionell wertvollern Seite gegenüber der funktionell weniger wertvollen. Darauf deutet der Umstand hin, dass im allgemeinen, falls es sich um Rechtshänder handelt, Hemiatrophie häufiger links als rechts, Hemihypertrophie dagegen öfter rechts als links aufzutreten pflegt. Die rechte Lokalisation der Hypertrophie bei diesem Mädchen ist leicht zu verstehen, wenn das oben Gesagte angenommen wird. Bei diesem Fall, wie bei den in der Literatur vorkommenden, beschränkt sich Hypertrophie auf das Gebiet des Trigeminus. Während manche Autoren trophische Einflüsse des Quintus auf die von ihm innervierten Teile als Ursache der Hypertrophie vermuten, in der Annahme, dass ihm besondere trophische Fasern beigemischt seien, denken die anderen ganz analog, dass der Sympathikus in irgendwelchen Beziehungen dazu stehe. Aber bisher hat noch niemand die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit gelenkt, dass der Kauakt und das Knirschen an und für sich unter besonderen Bedingungen durch mässige Leistungen die vorwiegend gebrauchten Teile sich stärker entwickeln lassen.

Zusammenfassend sei daher bemerkt:

Es handelt sich um Hemihypertrophia fac. progr. Die Veränderung greift an auf dem rechten Ober- u. Unterkiefer, dem Jochbein mit Jochbogen, Masseter und vielleicht der gesamten Kaumuskulatur rechts, kurzum, bei der Kaumuskulatur und ihrer Ansatzstelle. Als veranlassendes Moment möchte ich das rechtsseitige Kauen und Knirschen nennen. Durch Kauakt und Knirschen, war mässige Hyperämie auf der rechten Seite hervorgerufen, das im Verlaufe der langen Zeit im Wachstumsstadium zu Ueberwuchs anregte. Also die durch Hypertrophie verstärkte Seite ist es, die vorwiegend funktioniert und ihrerseits Hyperämie und Vergrösserung der im Kauakt beteiligten Teile anregt.

M. SAYAMA : Hemihypertrophia faciei progressiva

Literatur.

1. **Benjamins**: Grinding the teeth, a pretty sure symptom of Adenoid Growths. Laryngoscope. No. 3. 1922. P. 223.
2. **Bokker**: La Grincement des dens, symptomé presque certain de vegetation adenoides. Revue de Laryngologie et d'otologie. Nr. 21. 1924. P. 709.
3. **Cagitati**: Klinischer und pathologisches Beitrag zum Studium der halbseitigen Hypertrophie. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 32. S. 282.
4. **Dirska**: Ueber Hemihypoplasie des Gesichts. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 80. H. 5-6. 1924.
5. **Gerhartz**: Lypodystrophia progressiva superior. M.m.W. Nr. 23. 1916. S. 823.
6. **Köhler**: Anatomy of the Human Body. 1918. P. 163. 177.
7. **Grey**: Ueber die Kaudruck und eine neue Methode zu seiner Messung Zeitschr. f. Stomatologie. 3. Heft, 1922.
8. **Hoffmann**: Hemihypertrophia facialis progressiva. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1903. S. 431.
9. **Lauerbach**: Ein Fall von Hemihypoplasie des Gesichts. u. der Zunge, mit kritischen Bemerkungen zur Symptomenbild der Rombergschen Hemiatrophia faciei. Arch. f. Dermat. u. Syphilis. 1923. S. 144.
10. **Mackey**: On so-called Facial Hemihypertrophy. Brain. 1904. P. 388.
11. **Mering**: Lehrbuch der inneren Medizin. Bd. 2. 1921. S. 333.
12. **Minor**: Ein Fall von Hemihypertrophie des Gesichts. Neurologische Centralblatt. 1903. S. 486.
13. **Müller**: Die Wirkungen der Kaumuskelkrämpfe auf Zähne und Zahnstellung. Deutsche Zahnheilk. H. 58. 1923. S. 25, 26, 41.
14. **Nakamura**: Zwei Fälle von halbseitiger Gesichtshypertrophie. Hokuetsu Igakkai Kaihō. Nr. 169. S. 83.
15. **Nothnagel**: Spezielle Pathologie u. Therapie. XI. 2. 1909.
16. **Ono**: The Crushing Power and Masticating Area of the Teeth as the Foundations of Oral Hygienics. Dental Cosmos 1921. P. 1279.
17. **Oppenheim**: Lehrbuch d. Nervenkrankheiten. 11. 1923. S. 2174.
18. **Richter**: Ist der Unterkiefer eine einarmiger oder zweiarmiger Hebel? Deutsche Monatschr. f. Zahnheilk. 1921. H. 18-19.
19. **Sabrazès et Cabannes**: Hemihypertrophie faciale. Nouv. Icon. Tome XI. 1898. P. 343, 356, 357.
20. **Schieck**: Ein Fall von einseitiger Gesichtshypertrophie. Berliner kl. Wochenschr. 1883. Nr. 45. S. 700.
21. **Scheff**: Lehrbuch d. Zahnheilk. Bd. 1. 1909. S. 202, 591, 673, 679.
22. **Schwenke**: Ein Fall von Lipodystrophia progressiva. D.m.W. 1922. Nr. 9. S. 293.
23. **Stallard**: The General Relation of Pillowing to Malocclusion. Dental Cosmos. Vol. LXVII. No. 3.
24. **Stier**: Ueber Hemiatrophie u. Hemihypertrophie nebst einigen Bemerkungen über ihre laterale Lokalisation. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Ed. 45. S. 20, 40, 46, 50, 51, 54, 64.
25. **Strassburger**: Ueber unbeschriebenen Fettgewebsschwund des Gesichts. M. kl. 1908. S. 981.
26. **Tholuck**: Der Kaudruck. Deutsche Zahnheilk. Heft. 59. 1923. S. 25, 26, 41.
27. **Watsuji**: Hemihypertrophia fac. progr. Tokyo Iji Shinshi, Nr. 843.
28. **Winkler**: Zur Kaumechanik. Deutsche Monatschr. f. Zahnheilk. 1922. Heft 7, S. 207.