前庭迷路ノ生理的筋強直ニ及ボス 影響ニ就テ (第三回報告) 一側迷路曠置動物ニ於ル頸筋ノ酸度

醫學士 安 野 吉 郎

〔京都帝國大學耳鼻咽喉科教室(星野教授指導)〕

目 次

序

第1章 實驗方法

第2章 實驗成績

總 括

序

曩ニ余ハ⁽¹⁾ 前庭迷路ガ生理的筋強直ニ一定ノ影響ヲ及ボスコトヲ報ジ、該影響ハ前庭迷路ノ興奮ガ諸筋ノ酸形成ニ對スル反應ヲ左右スルニ依ルモノトナシ、更ニ前庭迷路ガ筋ノ死後乳酸生成ノ時間的經過ニ及ボス影響ヲ諸種ノ體筋ニ就テ闡明スル所アリタリ。⁽²⁾ 而テ一側迷路曠置動物ニ就テハ尋常動物トソノ趣ヲ異ニシ、頸筋ニ於テハ常ニ定型的ニ、迷路曠置側ニ速ニ強直ノ發來スルヲ確メタリ。茲ニ余ハ更ニ觀察點ヲ變ジ此間ノ消息ヲ詳細ニセントシテ、生理的筋強直ノ強弱ノ示標トシテ筋ノ酸〔アルカリ〕指數ヲ舉ゲタル L. Wacker⁽³⁾⁽⁴⁾ニ倣ヒ、一側迷路曠置動物ノ兩側ノ頸筋(廣義ニ於ル)ニ就テ死後一定時間ニ於ケル酸、〔アルカリ〕指數ヲ比較檢索シ、以テ本問題ニ寄與スル所アラント欲ス。

第1章 實驗方法

實驗供施動物、迷路曠置方法、致死方法等ハ凡テ既ニ叙述⁽¹⁾⁽²⁾セル所ニ準據ス。

酸度測定ニ供用セル頸筋ハ次ノ如シ。

- 1) 側頸筋、(前、中、後斜角筋、截域長筋、頸長筋、頭長筋、前直頭筋)。
- 2) 頭部筋、(後大直頭筋、後小直頭筋、側直頭筋、大及小斜頭筋)。
- 3) 脊長筋ノ一部。

以上ノ諸筋群ヲ可及的對稱的ニ摘出シテ之ヲ實驗ニ供用ス。

L. Wacker⁽³⁾ノ方法ニ從フ酸度測定ハ筋肉ノ煮沸汁ノ酸度及「アルカリ」度ヲ $n/10$ NaOH 及 $n/10$ H_2SO_4 ニテ滴定スルニアリ。

其方法ヲ記センニ筋肉ノ脂肪ハ可及的ニ之ヲ除去シ、個々細小ニ氷板上ニ於テ挾挫シテ胡桃大トシテ天秤ニテ嚴密ニ15gヲ秤量ス。

而テ凡テノ實驗ニ於テ筋群ノ摘出ハ可及的ニ同時對稱ナラシメ他側ノモノハ助手ヲシテソノ操作ヲ行ハシメタリ。

該操作ノ所要時間ハ凡ソ15分内外ナリ。

カクシテ細小ト爲セル筋肉塊ハ可及的ニ速ニ50.0c.c.ノ既ニ煮沸セル溜水中ニ投入シ15分間輕ク煮沸シ、次ニ14cm.ノ直徑ヲ有スル「フアルテン・フィルテル」ヲ以テ濾過シ、残渣ヲ再ビ50.0c.c.ノ煮沸溜水ヲ以テ15分間煮沸シ再ビ上述ノ「フアルテン・フィルテル」ヲ以テ濾過ス。於テ筋肉塊ハ木皿上ニ於テ極細小ニ細挫シ再ビ50.0c.c.ノ煮沸溜水ヲ以テ15分間煮沸ス。復同一ノ「フアルテン・フィルテル」ヲ以テ濾過ス。最後ニ30.0c.c.ノ煮沸溜水ヲ以テ此操作ヲ反覆ス。「フアルテン・フィルテル」ハ最後ニ煮沸溜水ヲ以テ後洗ス。濾液ハ良ク混淆セシメ二等分ス。而テソノ第一液ハ1%「フェノール・フタレイン」酒精溶液、3滴ニヨリテ $n/10$ NaOHヲ以テ酸度ヲ測定シ、他ノ濾液ハ1%飽和「メチールロート」酒精溶液7滴ヲ借リテ $n/10$ H_2SO_4 ヲ以テ「アルカリ」度ヲ滴定ス。ソノ色調化ニハ一定ノ變換度ヲ與フ。即1% Dinatriumphosphat 液5.0c.c.= $n/10$ H_2SO_4 1.4c.c.ヲ加ヘ之ヲノ變95.0c.c.ノ溜水ニ混ジタルモノニ7滴ノ「メチール・ロート」溶液ヲ和シタルモノガ示ス色調ナリ。

即色調變化トシテ初メ「カメリア」黃色ヲ呈スルモ直チニ薔薇紅色トナル。

第2章. 實 驗 成 績

第1節. 對 照 試 驗

迷路健康動物及ビー側中耳腔破壞動物ニ就テ之ヲ致死セシメ時間的經過ヲ追ヒテ兩側頸筋ノ煮沸汁ノ酸、 $「アルカリ」$ 指數ヲ檢索ス。而テ其成績ハ下記第1表ニ示スガ如シ。

第 一 表

實驗 番號	性	重 量 (g)	實驗期日	死後分 析迄ノ 時間	側	酸 度	「アルカリ」度	酸「アル カリ」指 數	備 考
						100g. 筋肉ニ對シテ使 用セル $n/10$ NaOH 量 (c.c.)	100g. 筋肉ニ對シテ使 用セル $n/10$ HCl量 (c.c.)		
I	♂	1650	6/VII. 1926	直後	左	44.0	25.4	1.74	}
					右	45.4	25.4	1.75	
II	♂	1870	5/VII. 1926	20'	左	45.3	18.7	2.43	}
					右	45.3	18.7	2.43	
III	♂	2150	30/VII. 1926	30'	左	32.0	28.0	1.14	}
					右	34.0	30.4	1.13	
IV	♂	1950	1/VII. 1926	1°	左	37.4	20.0	1.87	}
					右	38.0	20.4	1.86	
V	♂	2150	2/VII. 1926	1°30'	左	49.4	14.0	3.53	}
					右	49.4	14.0	3.53	
VI	♂	2335	3/VII. 1926	2°	左	60.0	13.3	4.51	}
					右	58.7	12.9	4.55	

上表ノ示スガ如ク第1例ハ右側ニ大ニシテ左右ノ差0.01, 第3例ハ左側ニ大ニシテ左右差0.01, 第4例ハ左右差0.01, ニシテ左側ニ大ナリ. 第6例ニ於テハ右側ニ大ニシテ左右差0.04ヲ示ス. 第2, 第5例ハ左右同値ヲ示スヲ見ル. ソノ諸差ノ平均ハ0.018ナリ. 而テ此平均値ヨリモ大ナルモノ第6例ノ0.04アルニ過ギズ. 今0.04以上ノ開キヲ示スモノハ生理的實驗の誤差範圍ヲ超スモノト做シ得ベシ.

第2節. 一側迷路曠置後自然位ニ放置セル モノニ於ル實驗

本實驗ニ於テハ一側迷路曠置後一定期日自然位ニ放置セシメ後致死セシメタルモノニ就キ檢索シ家兎6頭ヲ之ニ供用ス. 其成績ハ第2表ノ示スガ如シ.

第 二 表

實驗 番號	性	重 量 (g)	實驗期日	死後分 析迄ノ 時間	側	酸 度	[アルカリ]度	酸, [アル カリ] 指 數	備 考
						100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 NaOH 量 (c.c.)	100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 HCl量 (c.c.)		
I	♂	2020 186	17/VII. 1926	15'	左右	42.7 30.7	29.3 26.7	1.45 1.15	} l>r
II	♂	1860	23/VII. 1926	20'	左右	34.7 30.7	30.7 26.7	1.42 1.15	
III	♂	1820	16/VII. 1926	30'	左右	54.7 42.0	22.7 32.0	2.41 1.78	} l>r
IV	♂	1910	26/VII. 1926	45'	左右	37.3 37.3	26.7 29.3	1.4 1.27	
V	♀	2210	19/VII. 1926	1°	左右	40.0 40.0	29.3 30.4	1.36 1.32	}
VI	♀	1900	21/VII. 1926	1°30'	左右	54.9 54.6	25.3 25.3	2.17 2.16	

上表ノ如ク第1, 第2, 第3例及第4例ニ於テハ明ニ迷路曠置側ニ酸, 「アルカリ」指數大ニシテ而モ對照試驗ニ示セルヨリ以上ノ差ヲ示ス.

第3節. 去腦動物ノ一側迷路曠置後ニ於ケ ルモノニ就テノ實驗

本實驗ニ於テハ實驗動物ノ總テニ大腦ヲ摘出シ之ガ迷路ヲ曠置セルモノニ就キテ下記ノ如ク檢索セリ. ソノ成績次ノ如シ.

第 三 表

實驗 番號	性	重 量 (g)	實驗期日	死後分 析迄ノ 時間	側	酸 度	〔アルカリ〕度	酸,〔アル カリ〕指 數	備 考
						100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 NaOH 量 (c.c.)	100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 HCl量 (c.c.)		
I	♂	1800	24/VIII.1926	15'	左右	25.3 24.0	40.0 44.0	0.63 0.55	} 1>r
II	♀	1935	15/IX. 1926	20'	左右	30.2 26.3	36.0 36.0	0.84 0.73	} 1>r
III	♂	2010	26/VIII.1926	30'	左右	38.2 37.6	38.7 41.3	0.99 0.91	} 1>r
IV	♂	1720	9/IX. 1926	1°	左右	30.6 30.6	27.3 26.8	1.12 1.13	}
V	♂	1850	11/IX. 1926	1°30'	左右	35.8 34.8	21.8 21.5	1.64 1.62	}

上表ノ示スガ如ク第1, 第2, 第3例ニ於テ酸, 〔アルカリ〕指數ハ常ニ迷路
曠置側ニ於ルモノ大ニシテ而モソノ差ノ開キハ對照試驗ニ於ルモノヨリモ
大ナリ。

第 4 節. 一側迷路曠置後頭部ヲ體軀ニ對シテ

正常位ニ補正セル場合ニ於ル實驗

一側迷路ヲ破壊セルモノ、頭部ヲ體軀ニ對シテ正常位ニ補正シ眞直ナラ
シメタル動物ニ就テソノ兩體側頸筋ノ酸, 〔アルカリ〕指數ヲ測定セリ。之
ニ供用セルモノハ6頭ノ家兎ニシテソノ實驗成績次表ニ示スガ如シ。

第 四 表

實驗 番號	性	重 量 (g)	實驗期日	死後分 析迄ノ 時間	側	酸 度	〔アルカリ〕度	酸,〔アル カリ〕指 數	備 考
						100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 NaOH 量 (c.c.)	100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 HCl量 (c.c.)		
I	♂	2010	6/VIII.1926	10'	左右	21.3 25.3	42.7 44.0	0.66 0.58	} 1>r
II	♂	2125	9/VIII.1926	15'	左右	18.7 14.7	41.3 38.7	0.45 0.38	} 1>r
III	♀	1960	23/VIII.1926	20'	左右	26.7 25.3	38.7 40.0	0.69 0.61	} 1>r
IV	♂	1830	12/VIII.1926	30'	左右	29.3 22.7	41.3 49.3	0.71 0.46	} 1>r
V	♂	1730	28/VIII.1926	1°	左右	30.7 29.3	34.7 33.3	0.88 0.88	}
VI	♂	1650	4/VIII.1926	1°30'	左右	41.3 41.3	26.7 26.1	1.55 1.58	}

上表ニ觀ルガ如ク一側迷路曠置動物ノ頭部ヲ體軀ニ對シテ正常位ニ補正シ眞直ナラシメタル場合ニ於ル頸部筋肉ノ兩體側、酸、〔アルカリ〕指數ヲ計量スルニ、迷路曠置側ニ大ナルモノ第1, 第2, 第3, 第4例ニシテ此等ノ諸例ノ示ス差ノ開キハ凡テ對照試驗ニ示セルモノヨリモ大ナルヲ識ル。

第5節 一側迷路曠置時ニ生ズルガ如キ強迫體位ヲ執ラ

シメ一定時間放置セル動物ニ就テノ實驗。

本實驗ニ於テ供用セル動物ハ次表ニ示スガ如ク5頭ニシテ、恰モ左側迷路破壊時ニ生ズルガ如キ頭位ヲ執ラシメタル儘之ヲ星野式固定器上ニ緊縛シテ、一定時之ヲ放置シタル後死ニ致シ、後一定時後ソノ兩側頸筋ニ就テ酸、〔アルカリ〕指數ヲ計量セリ。其實驗成績ハ次表ニ示スガ如シ。

第 五 表

實驗 番號	性	重 量 (g)	實驗期日	死後分 析迄ノ 時間	側	酸 度	〔アルカリ〕度	酸、〔アル カリ〕指 數	備 考
						100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 NaOH 量 (c.c.)	100g. 筋肉ニ對シ使 用セルn/10 HCl量 (c.c.)		
I	♀	1720	13/VIII. 1926	10'	左右	34.7 33.3	40.0 38.7	0.87 0.86	}
II	♂	2060	18/VIII. 1926	20'	左右	28.0 26.0	36.0 36.0	0.78 0.72	} l>r
III	♂	1820	16/VII. II 1926	30'	左右	32.3 29.3	34.7 32.0	0.93 0.91	}
IV	♂	2150	7/IX. 1926	1°	左右	32.6 33.2	26.7 27.0	1.22 1.23	}
V	♂	1935	8/IX. 1926	1°30'	左右	50.5 41.3	27.3 22.7	1.85 1.82	}

上表ニ見ルガ如ク本實驗ニ於テハ兩側頸筋ノ酸、〔アルカリ〕指數ハ左右側ニ於テ差ヲ見ルモノノ開キハ對照試驗ニ於ルモノヨリ大ナルモノ第2例ヲ算スルニ過ギズ。即一側迷路ヲ曠置セルガ如キ強迫體位ヲ採ラシメタルモノニ於テハ頸筋ノ兩側ノ酸、〔アルカリ〕指數ハ迷路曠置時ニ於ルガ如キ著明ナル差等ヲ示サルヲ知ル。

總 括

本實驗成績ヲ總括スルニ一側迷路曠置動物ノ頸筋(廣義)ニ就テ、死後時間の經過ヲ趨ヒ酸度ヲ測定スル時ハ、一定時期ニ於テ常ニ迷路曠置側ニ於ルモノ大ナリ。此事實ハ一側迷路曠置動物ニ於テ迷路曠置側ノ頸筋ニ強直來至ノ速カナリシ余ノ前報告ノ實驗成績ト併行セルモノニシテ、其強直來

至ノ速カナルヲ更ニ他方面ヨリ證シ得タルヲ信ズ。而テ上述ノ筋ニ及ボセル影響ハ一側迷路曠置ニ歸因ス。

撰筆ニ蒞ミ當醫學部醫化學教室內野助教授ノ御垂教ヲ深謝ス。

本實驗ハ吾ガ星野教室ニ於テ帝國學士院研究費補助ノ下ニ行ヒタルモノナリ。記シテ謝意ヲ表ス。

引用文獻

- 1) 安野, 前庭迷路ノ生理的筋強直ニ及ボス影響ニ就テ (第一回報告). 耳鼻咽喉科臨床. 第廿卷. 第四號.
- 2) 安野, 前庭迷路ノ生理的筋強直ニ及ボス影響ニ就テ (第二回報告). 耳鼻咽喉科臨床. 第廿卷. 第四號.
- 3) Wacker, L., Physikalische & chemische Vorgänge in ueberlebenden Muskel als Ursache der Totenstarre. Biochem. Zeitschr. Bd. 75. 1916.
- 4) Oppenheim, F., & Wacker, L., Das Ausbleiben der postmortalen Saeurebildung im Muskel als Ursache der verschiedenen Intonsitaet der Totenstarre menschlicher Leichen. Berl. klin. Wochenschr. 1919.

Kurze Inhaltsangabe.

Über den Einfluss des vestibulären Labyrinths auf die physiologische Muskelstarre.

3. Mitteilung

Postmortale Acidität der Halsmuskeln bei einseitiger Labyrinthexstirpation.

Von

Dr. K. YASUNO.

(Aus der otorhinolaryngologische der kaiserlichen Universitat zu Kyoto. Direktor: Prof. T. HOSHINO.)

In der vorigen Mitteilung konstatierte Verf., dass die physiologische Muskelstarre der Halsmuskulatur bei einseitiger Labyrinthexstirpation auf der labyrinthlosen Körperseite früher als auf der anderen Seite auftritt. Das veranlasste uns, die Untersuchung der chemischen Verhältnisse in Angriff zu nehmen. L. Wacker fand in dem postmortalen Säuregehalt des Muskels einen sicheren Index für den Zustand des Muskels. Je grösser die gebildete Säuremenge ist, um so intensiver tritt die physiologische Muskelstarre auf. In dieser Mitteilung verglich der Verf. den Säure-Alkali-Index der beiderseitigen Halsmuskulatur bei einseitig labyrinthlosen Tieren. Er titrierte zu diesem Zwecke das Kochextrakt der Halsmuskulatur einmal $n/10$

Schwefelsäure und Methylrot als Indikator, und verwendete zum anderen n/10 Natronlauge und Phenolphthalein als solchen. Er konstatierte als Resultat der Untersuchung, dass der Säure-Alkali-Index der Halsmuskulatur auf der labyrinthlosen Seite nach einer bestimmten postmortalen Zeit immer grösser als der auf anderen normalen Körperseite ist, und dieser Einfluss durch die Fortnahme des Labyrinths auf der einen Seite bedingt ist.