家兎ニ於ケル椎骨動脈結紮ノ一新法

鹿 沼 政 雄   久 米 直 助

京都帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室(主任星野教授)

頭蓋内ニ於ケル諸種ノ實驗的研究ニ際シ總頸動脈ト共ニ椎骨動脈ノ持續的或ハ一時的ノ遮斷ヲ要スルコト多シ。

實驗動物トシテ弘ク使用セラルル家兎ニ於テ頸動脈ニ對スル操作ハ簡單容易ナルモ椎骨動脈ハ其解剖的關係上之レニ到達シテ更ラニ之レヲ完全ニ露出セシムルハ至難事ニ屬ス。

余等ハ等シク前庭迷路ノ神經生理學研究ニ從事シツ、アルガ偶々期ヲ同ジウシテ椎骨動脈結紮ノ必要ニ迫ラレ從來ノ方法ニ準據シテ之レヲ試ルニ操作甚ダ難澁ニシテ時ニハ致死の副損傷ヲ伴ヒ目的ヲ達スルマデニ少カラザル艱難ニ遭遇スルヲ常トセリ。

茲ニ於テ余等ハ別ニ簡易ナル方法ナキカニ苦心攻究シタル結果從來ノ諸方法ニ比シテ簡單確實ナル一改良法ヲ案出シ得タルヲ以テ茲ニ之レヲ報告セントス。

抑々家兎ニ於ケル椎骨動脈ハ鎖骨下動脈ノ上面ヨリ分岐シテ第六頸椎ノ横突起孔ニ入り之レヨリ頸椎柱ノ同名孔ヲ上昇シ大後頭孔ヲ通リテ頭蓋内ニ進入ス。

本動脈ノ血流ヲ杜絶セムトシテ從來數種ノ方法アリ。

曩キニ Scherrington ハ截域(第一頸椎)ト樞軸(第二頸椎)トノ間ニ於テ椎骨體及ビ軟部ト共ニ兩側椎骨動脈ヲ緊縛シテ以テ血流ヲ杜絶セシメタリトスルモ結紮法トシテ適確ナルモノニ非ルヤ論ヲ俟タズ。

一般ニ行ハル、ガ如キ指壓法ハ截域ト樞軸トノ間ニ於テ本動脈ヲ皮膚上ヨリ指ヲ以テ壓迫スル一時的止血法ナリ。 Magnus ハ專ラ此ノ方法ニヨルト雖モ之レ亦タ確實性ニ於テ缺クル所アルノミナラズ常ニ一助手ヲ必要トスルノ不利アリ。

1922年、廣神ハ頭部貧血ノ前庭性眼球震盪ニ及ボス影響ニ就キテノ實驗的研究ニ際シ本動脈ヲ其鎖骨下動脈ヨリ分岐シテ第五或ハ第六頸椎ノ横突起中ニ入ラムトスル以前ノ部位ニ於テ結紮スル方法ヲ發表シタリ。則チ先

ズ動物ヲ背位ニ固定シ氣管側方ヲ斜走スル筋肉ト頸靜脈トノ間ヨリ分離シテ頸椎ノ側面ニ對シ内下方ニ向テ諸組織ヲ分離シテ進ミ頸神經叢ヲ超エテ本動脈ニ到達スルカ或ハ鎖骨ヲ切除シ鎖骨下動脈ヨリ分岐セル箇所ニ於テ本動脈ヲ探索結紮スルニアリ。

本法ハ同氏ノ明記セルガ如ク亦タ余等ノ經驗セルガ如ク操作極メテ難澁ニシテ且ツ諸種貴重器官(特ニ諸神經)ニ接觸スルヲ免レズ。又鎖骨ヲ切除シテ本動脈ヲ探索スルニ當リ胸膜ヲ損傷シテ動物ヲ死ニ陷ラシムル事アリ深甚ノ注意ヲ要ス。

最近ニ至リ同僚森本, 齊藤兩氏ハ截域ト樞軸トノ間ニ於テ椎骨動脈ガ樞軸ノ横突起ヲ出デテ截域ノ同名孔ニ入ラムトスル部位ニ於テ之レヲ結紮スル方法ヲ發表シタリ。即チ動物ヲ腹位ニ固定シ外部諸項筋ヲ兩側ニ壓排シ深部項諸筋ノ附着部ヲ切り取りテ第一頸椎ノ背面ニ達シ以後注意深く鈍的ニ進ム時ハ本動脈ガ薄膜下ニ膊動スルヲ透視シ得ベシ。然ルニ此ノ薄膜ヲ破リテ本動脈ヲ完全ニ露出セシメムトスレバ容易ニ椎骨靜脈ヲ損傷シテ動物ヲ死ニ致スノ危險アリ。此ノ危險ヲ避ケムガ爲メ剝離前進ヲ前記薄膜下ニ膊動ヲ透見シ得ルニ止メ本動脈ト同方向ニ走レル結締組織ヲ以テ本動脈ヲ外側方ニ僅カニ抓舉シ薄膜上ヨリ靜脈ト共ニ本動脈ヲ結紮シ得ベシトセリ。本法ハ解剖的關係ノ示スガ如ク操作ヲ加ヘ得ベキ本動脈ノ範圍短キニ過ギ而モ創面ハ深狹加フルニ上述ノ危險ヲ有スルガ故ニ結紮ノ術式平易ナラザルヲ遺憾トス。

之ヲ要スルニ從來ノ諸方法中確實ナルハ廣神法及森本齊藤法ナルモ各々短所アリ。即チ前者ハ椎骨動脈ヲ露出シ得レバ之レガ結紮甚ダ容易ナルモ之レニ到達スルマデノ操作極メテ艱難ナリ。之レニ反シ後者ハ本動脈ノ部位ニ到達スルマデハ平易ナルモ之レガ結紮ノ操作容易ナラズ。而モ兩者孰レモ致死の副損傷アルヲ忘ル可カラズ。

余等ノ方法ハ特殊ノ頭部固定、即チ頭部ヲ後上方ニ固定スル事ニヨリ頸椎柱ノ下部ヲ著シク前方ニ持ち來シ以テ簡單容易ニ第七頸椎ノ横突起前面ニ達シ此處ヲ上昇スル椎骨動脈ヲ遊離結紮スルニアリ。即チ先ヅ動物ヲ腹位ニ於テ四肢ヲ固定シ然ル後、頭部ヲ上後方ニ固定スルコト頸部ガ固定器板面ニ對シ約90度ノ角ヲナスガ如クス。然ル時ハ頸下部ノ前側方諸軟組織

附 圖 說 明

Fig. I 動物固定位置

Fig. II 結紮局所解剖略圖

(Fig. I)

(Fig. II)

ハ後側方ニ移動シ頸椎柱ノ下部ハ氣管ト共ニ著シク前方ニ持チ來サルベシ
從ツテ皮膚ト椎骨動脈トノ距離ハ著シク短縮セラル。

術者ハ動物ノ長軸ニ對シテ直面シ型ノ如ク局所ヲ剪毛消毒シ反射鏡使用
ノ下ニ胸骨上端ヨリ正中線ニ於テ約5—6cm. ノ皮膚切開ヲ加ヘ胸乳頭筋ノ
外側緣ヨリ鈍的ニ剝離シテ前進スレバ容易ニ氣管ハ露出セラレ直チニ頸椎
ノ前側面ニ到達スルヲ得。

茲ニ於テ諸軟組織ヲ兩側方ニ壓排シ斜ニ前内方ヨリ後側方ニ向テ（即チ
其ノ外側緣ヲ剝離セル胸乳頭筋ト反對側ニ向テ）第七頸椎橫突起ノ前面ヲ
注視スル時ハ該部ガ白色ヲ呈セル膜樣粗鬆組織ヲ以テ被ハル、ヲ見ルベシ
而シテ第七頸神經ノ起始部ヲ目標トシテ注意深ク此ノ膜樣組織ヲ少ク分離
スレバ第七頸神經ノ前内方ニ之レト並列シテ稍々太キ（徑約1.5mm）一動
脈ノ上昇スルヲ見ルベシ之レ即チ椎骨動脈ナリ（椎骨靜脈ハ此部ニ於テ本
動脈ト並走セズ）依テ之レヲ露出遊離セシメ小鑷子或ハ動脈瘤針ヲ使用シ
テ其ノ後方ニ絲ヲ通シ置キ要ニ臨ミ簡單確實ニ之レヲ結紮スル事ヲ得。

術後動物ノ固定頭部ヲ下ゲテ自然位ニ復セシム。

備 考：—

本動脈ト接近シテ第七頸神經及ビ交感神經帶（Grenz strang）ノ一小枝
（Ramus Communicans）ガ存在スルモ僅小ノ注意ニヨリ之レガ刺戟乃至損
傷ヲ避クル事ヲ得。

本法ノ利點：—

1. 同一手術創面ニ於テ併セテ頸動脈ヲ結紮スル事ヲ得。
2. 他ノ方法ニ於テ見ルガ如キ致死の副損傷ハ全然無シ。
3. 皮膚切開後凡テ鈍的ニ術ヲ終ルガ故ニ出血量極メテ僅微ナリ。
4. 特殊ノ頭部固定ニヨリ容易ニ本動脈ニ到達シ得ルノミナラズ術野淺
ク廣ク從テ本動物ヲ充分長ク分離露出セシメ得ルガ故ニ結紮ノ操作亦タ簡
單ナリ。

（終リ）

*Kurze Inhaltsangabe.***Eine neue Methode zur unterbindung der A. vertebralis
beim Kaninchen.**

Von

Dr. M. KANUMA und Dr. N. KUME.

(Aus der oto-rhino-laryngologischen Universität zu Kyoto.)

(Direktor: Prof. Dr. T. HOSHINO.)

Mehrere Schwierigkeiten stehen im Wege bei der Unterbindung der A. vertebralis zum Zweck der experimentellen Forschungen.

Die wichtigste Punkte unserer neuen Unterbindungsmethode sind folgende:—

1. Das Tier wird auf horizontaler Bauchlage gelegt, indem der Rumpf direkt auf dem Brett, aber der Hals vermittlest Kopfhalters fast vertikal fixiert wird. Dadurch wird der Abstand zwischen der äusseren Haut des vorderen Halsteils und der Wirbelsäule beträchtlich verkürzt.

2. Nun legt man einen Hautschnitt in der Länge von ca. 5cm. am vorderen Hals gerade der Mittellinie entlang, dann präpariert man nur stumpf vom lateralen Rand des Kopfnickers in der schiefen Richtung nach der entgegengesetzten vorderen lateralen Fläche der Halswirbelsäule, so findet man leicht die A. vertebralis unter dem Querfortsatz des sechsten Halswirbelkörpers.

3. Wegen des seichten und breiten Operationsfeldes kann die Manipulation viel leichter als anderes Verfahren ausgeführt werden, und deshalb die A. vertebralis genügend freigelegt und sicher unterbunden, ohne dabei N. phrenicus und Pl. brachialis mitverletzt zu werden.

(Autoreferat)