一眼剔出家兎ニ於ケル廻轉性 眼球震盪ニ就テ

大學院學生 久 米 直 助

〔京都帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室(星野教授指導)〕

目 次

緒 言

第1章 實驗及觀察方法

第2章 實驗成績概要

第3章 考 察

第4章 結 論

文 献

附圖説明

緒 言

眼球震盪ナル現象ヲ弘ク其發生原因ニヨリテ分類スレバ現今尙ホ不明ニ屬スルモノアレ共1)前庭迷路性2)視器性及3)中樞神經性ノ三種ニ概別スルヲ得ベシ。

從テ吾人前庭性眼震ノ研究ニ携ハル者ハ前庭性眼震ト他種眼震トノ交渉關連ニ就テ顧慮スルヲ緊要事トス。

視器性眼震ハ從來主トシテ臨床的ニ觀察セラレ實驗的研究ニ乏シキヲ以テ其説明乃至本態ハ漠然トシテ明確ヲ缺クモノ多シ。最近星野教授⁽¹⁾及南雲ハ海獺及鳩ニ就テ迷路ニ毫モ關係ナク視性廻轉性眼震ヲ發來セシメ得、其結果トシテ從來單ニ迷路性ト見做サレタル廻轉中ノ眼震ガ迷路性及視性眼震ノ混和セルモノナルヲ確實ニセリ。次デ星野教授⁽²⁾及皆川ハ家兎ニ就テ視力ノ有無ガ廻轉性眼震ニ及ボス一定ノ影響ニ就テ報告スル所アリタリ。

最近余ハ各種前庭性眼震ノ比較研究ニ際シ眼震描畫ノ爲メニ一側眼球ヲ剔出セル家兎ニ弱刺激ニ屬スル廻轉刺激ヲ與ヘタルニ遇然ニモ廻轉性眼震ニハ廻轉ノ方向ニヨリテ一定ナル差異ガ定則的ニ存在スルヲ見出セリ。此所見ハ一側視力脫失ニ基ク視性影響ト解スベキニ由リ茲ニ之ヲ報告セントス。

第一章 實驗及觀察方法

實驗ニ供シタル家兎ハ健康ニシテ中等大以上、體重1500g.以上ナリ。

先づ動物ヲ地平腹位ニ固定シ一側眼筋ヲ分離シテ箇々ニ細絲ニ連結シ該側眼球ヲ剔出ス。即チ一側ノ視器ハ曠置サレ他側ノ視器ハ健存ス。此動物ヲ眼震描畫裝置ノ全部ト共ニ制輪機ヲ供ヘタル星野式大廻轉臺上ノ中央部ニ搭載シ分離セル眼筋ヲ書檯ニ連絡セシム。可及的上下動及遠心力ヲ避ケツツ一様均等ナル速度ニテ廻轉スル注意ノ許ニ左右交互ニ廻轉刺戟ヲ賦與ス。廻轉刺戟ハ比較的弱度ニシテ多クノ場合廻轉ノ速度ハ1廻轉ニ10秒内外。廻轉ノ回数ハ凡テ1或ハ2回ニ止メタリ。勿論各刺戟間ニ數分間以上ノ間隔ヲ置キタリ。此際發來スル廻轉中ノ眼震及廻轉後眼震ハ正確ニ描畫セラル。

斯クシテ得タル眼震曲線ニ就テ廻轉中ノ眼震及廻轉後眼震ノ持續時間及震盪數ガ廻轉方向ノ異ナルニ從テ如何ナル差ヲ示スカヲ比較吟味ス。

第二章 實驗成績概要

第一節 一眼別出動物ニ於ケル廻轉性眼震

一側眼球ヲ剔出セル家兎ニ第一章ニ詳述セシガ如ク1廻轉約10秒ノ速度ヲ以テ1或ハ2回ノ廻轉刺戟ヲ與フルニ廻轉中ノ眼震及廻轉後眼震ハ左右廻轉ノ方向ニヨリテ其持續時間及震盪數ニ顯著ナル差ヲ示ス。

第 1 表 (實驗時日大正15年自10月至12月)

動 物	眼 球 剔出側	實 驗 順 次	廻 轉 方 向	廻 轉 回 數	廻轉時間	廻轉中眼震	廻轉後眼震
Nr. 22. ♂ 2850g.	l.	1	r.	1	12''	26/12''	1/ 2''
		2	l.	1	9''	12/ 5''	21/14''
		3	r.	1	10''	25/10''	偏 位
		4	l.	1	10''	11/ 6''	16/13''
Nr. 24. ♂ 2200g.	l.	1	r.	1	9''	24/ 9''	偏 位
		2	l.	1	8''	18/ 8''	16/12''
		3	r.	1	7''	25/ 7''	偏 位
		4	l.	1	7''	17/ 7''	15/14''
Nr. 50. ♂ 3200g.	r.	1	r.	1	9''	17/ 9''	4/ 5''
		2	l.	1	9''	21/ 9''	偏 位
		3	r.	2	14''	23/14''	7/10''
		4	l.	2	14''	34/14''	2/ 3''
Nr. 51. ♂ 2750g.	r.	1	r.	1	6''	14/ 6''	3/ 4''
		2	l.	1	7''	15/ 7''	1/ 2''
		3	r.	2	13''	26/13''	6/ 7''
		4	l.	2	13''	28/13''	1/ 8''
Nr. 54. ♂ 2250g.	l.	1	r.	1	8''	6/ 8''	2/ 3''
		2	l.	1	8''	4/ 8''	5/ 7''
Nr. 55. ♂ 1750g.	l.	1	r.	1	11''	23/11''	偏 位
		2	l.	1	10''	23/10''	2/ 6''
Nr. 56. ♂ 1920g.	r.	1	r.	1	10''	12/10''	2/ 4''
		2	l.	1	9''	9/ 9''	7/ 6''
		3	r.	2	12''	14/12''	3/ 4''
		4	l.	2	12''	10/ 9''	12/ 8''
Nr. 57. ♂ 1850g.	r.	1	r.	1	10''	18/10''	9/19''
		2	l.	1	9''	20/ 9''	偏 位
		3	r.	1	9''	15/ 9''	23/21''
		4	l.	1	11''	21/11''	偏 位

Nr. 58. ♀ 1900g.	r.	1	r.	1	9''	18/9''	12/14''
		2	l.	1	10''	21/10''	3/7''
		3	r.	2	12''	33/12''	16/18''
		4	l.	2	12''	35/12''	2/7''
Nr. 59. ♀ 2100g.	r.	1	r.	1	10''	15/10''	12/14''
		2	l.	1	10''	29/10''	3/7''
		3	r.	1	12''	18/12''	16/18''
		4	l.	1	11''	28/11''	2/7''
Nr. 63. ♀ 1650g.	r.	1	r.	1	9''	5/7''	4/5''
		2	l.	1	9''	12/9''	偏位
		3	r.	2	14''	8/8''	5/7''
		4	l.	2	14''	13/14''	2/7''
Nr. 65. ♀ 1600g.	l.	1	r.	1	9''	17/9''	6/11''
		2	l.	1	9''	10/9''	10/14''
		3	r.	2	18''	23/18''	9/10''
		4	l.	2	21''	9/10''	14/15''
Nr. 66. ♀ 1850g.	l.	1	r.	1	11''	35/11''	偏位
		2	l.	1	12''	20/12''	16/14''
		3	r.	2	17''	53/17''	5/6''
		4	l.	2	18''	20/18''	37/25''

Fig. I

(表中ノ動物Nr.65ハ一眼剔出ニ因ル特發性眼震ヲ發來シ、其方向ハ地平性ニ健側眼ニ向ヒ震盪ハ不規則ニシテ一回ノ震盪ニ數秒乃至十數秒ノ不定ナル時間ヲ費シ振幅ハ小ナリ。上表ノ記載ハ此眼震持續中ニ於ケル所見ナリ)

附圖說明

同一動物(Nr. 66)ニ於ケル左眼剔出後ノ廻轉性眼震ガ廻轉ノ方向ニヨリテ差異アルヲ示ス。左側眼筋ニテ描畫ス。

Fig. I. 右方(健眼側方向)廻轉ノ場合。

Fig. II. 左方(視器曠置側方向)廻轉ノ場合。

↑廻轉開始 ↓廻轉停止。

1 内直筋 2 外直筋 3 時秒

而シテ此差ハ廻轉ノ方向ト毎常ニ一定關係アリ。即眼球剔出側方向廻轉ニ際シテハ廻轉中ノ眼震ハ震盪數少ク廻轉後眼震ハ震盪數著シク多ク持續時間亦タ長シ反之、健眼側方向廻轉ニ際シテハ廻轉中ノ眼震ハ震盪數多ク、廻轉後眼震ハ震盪數著シク少ク持續時間亦タ短キカ或ハ眼震全ク缺如ス。

尙詳細ニ査閱スルニ健眼側方向廻轉ノ

Fig. II

際ニ廻轉後眼震ノ全ク震盪セザルハ廻轉刺激ノ著シク弱度(約10秒間ニ1回ノ廻轉)ナル場合ニ於テノミ見ル所見ナリ。同一動物ニ廻轉刺激ヲ稍々強度(十數秒間ニ2回ノ廻轉)ナラシムルニ短續ニシテ震盪數ノ少キ廻轉後眼震ヲ發來スルニ至ル。

又1例(Ka Nr. 65)ニ於テ一眼剔出後直ニ健眼側ニ向フ地平性ノ眼震特發性ニ發現シ、振幅ハ前庭性眼震ニ比シテ小ニ震盪ハ不規則ニシテ1回ノ震盪ニ數秒乃至十數秒ノ種々ノ不定ナル時間ヲ費ス。此眼震持續中ニ於ケル廻轉性眼震ハ他ノ動物ニ於ケル上述ノ所見ト同趣ナリ。

實驗記錄ハ第一表ニ表示ス。

第二節 兩眼健存動物ニ於ケル廻轉性眼震(第一節ノ對照)

兩眼健存家兎ニ對シ第一節ト同様ナル弱度ノ廻轉刺激ヲ與フルニ廻轉後眼震ハ左右廻轉ニ於テ甚ダ僅小ナル差ヲ示スノミニシテ且此差ハ廻轉ノ方

向ト一定ノ關係ヲ有セズ即持續時間ニ於テ零乃至3秒、震盪數ニ於テ零乃至2回ノ差ヲ見ルノミニシテ是等ノ差ハ廻轉方向ト一定關係アルヲ見ズ。

實驗記錄ハ第二表ヲ以テ示ス。

第 2 表

動 物	實驗順次	廻轉方向	廻轉回数	廻轉時間	廻轉後眼震
Nr. 1 ♂ 1550g.	1	r.	1	10''	8/ 7''
	2	l.	1	10''	9/ 7''
Nr. 2 ♂ 1600g.	1	r.	1	9''	7/ 4''
	2	l.	1	10''	7/ 5''
	3	r.	2	14''	12/ 8''
	4	l.	2	14''	11/ 5''
Nr. 3 ♀ 1850g.	1	r.	1	9''	13/ 6''
	2	l.	1	8''	11/ 5''
	3	r.	2	13''	19/12''
	4	l.	2	14''	16/10''
Nr. 4 ♂ 1800g.	1	r.	1	11''	6 / 7''
	2	l.	1	10''	6 / 8''
Nr. 5 ♀ 1900g.	1	r.	1	10''	5/ 4''
	2	l.	1	9''	6/ 5''
	3	r.	2	15''	14/ 7''
	4	l.	2	16''	12/ 8''

兩眼健全家兎ニ20秒間ニ5回ノ廻轉刺戟ヲ與ヘタル場合ノ廻轉後眼震ノ左右廻轉ノ差ハ余ノ別報⁽³⁾ニ表示セル記錄ヲ査閱スルニ大多數ノ動物ハ持續時間ニ於テ零乃至數秒、震盪數ニ於テ零乃至數回ノ僅少ナル差ヲ示スノミニシテ唯ダ數頭ノ眼球震盪過多ノ動物ニ稍々顯著ナル差ヲ見ル。然レ共是等ノ差ハ廻轉ノ方向ト一定ナル關係ヲ有セズ。

第三章 考 察

視性眼震トシテ認メラル、モノ⁽¹⁾ヲ舉グレバ鐵道眼震、盲人ニ見ル眼震弱視性眼震、結膜刺戟ニ因ル眼震、一眼隱蔽ニヨル眼震、一眼剔出ニヨル眼震、迷路廢絶者ノ身體廻轉中ノ眼震、鑛山夫眼震、先天性眼震及側方凝視性眼震等ナリ。而シテ是等廣義ノ視性眼震ハ主トシテ臨床的觀察ニ立脚セル記載ニシテ之ニ關スル實驗的攻究ニ乏シク從テ其説明及發生「メカニスムス」ハ明確ヲ缺クモノ多シ。

最近星野教授⁽¹⁾及南雲ハ海獺及鳩ニ就テ初メテ實驗的ニ視性廻轉性眼震ヲ毫モ迷路ト關係ナク發現セシムルニ成セラレ、其結果トシテ從來單ニ迷路性ト見做サレタル廻轉中ノ眼震ハ少クトモ海獺及鳩ニ於テハ迷路性及視

性眼震ノ混和セルモノナル最早ヤ疑フノ餘地ナキニ至レリ。次デ星野教授⁽¹⁾及皆川ハ家兔ノ廻轉性眼震ガ兩眼ヲ黒布ヲ以テ蔽フカ或ハ視神經ヲ切斷スル場合ニ明カニ影響セラル、ヲ報告セリ。從テ家兔ニ於ケル廻轉性眼震ハ嚴格ニ云ヘバ純粹ナル迷路興奮ノ結果ノミニ非ズシテ之ニ視性影響ヲ隨伴セルモノナリ。

余ノ前章ニ詳記セル所見ヲ觀ルニ一眼剔出家兔ノ弱刺激ニヨル廻轉性眼震ハ廻轉ノ方向ニヨリテ一定ノ顯著ナル相違ヲ示スコト確實ナリ。即廻轉後眼震ハ眼球剔出側方向廻轉ノ際ニハ持續時間長ク震盪數多ク、健眼側方向廻轉ノ際ニハ持續時間短ク震盪數少キカ或ハ眼震缺如ス。然ルニ兩眼健存家兔ニ於ケル廻轉性眼震ハ既知ノ如ク左右廻轉ノ方向ニヨル差異僅小ニシテ且廻轉ノ方向ト一定關係ヲ示サズ。

由是觀レバ上記ノ事實の所見ハ一眼ヲ剔出セルコト恐ラク一側視力脫失ニ歸因スベク之ヲ一種ノ視性影響ト解スルヲ妥當トセン。

廻轉中ノ眼震モ亦ター一眼剔出家兔ニ於テ廻轉ノ方向ト一定ナル相違ヲ示ス。即視器曠置側方向廻轉ノ際ニ震盪數少ニシテ健眼側方向廻轉ノ際ニハ震盪數著シク多シ。此所見モ上述ノ知見ニ鑑ミテ一側視力脫失ニヨル一ノ視性影響ト認識シテ可ナラン。

雖然、眼球剔出ニ伴フ知覺(三叉神經)刺激ノ影響ガ上記ノ所見ニ全然關與スル所ナキヤ否ヤ茲ニ斷言スル能ハズ。

翻テ星野教授⁽¹⁾及南雲ノ記載ニヨレバ海獺及鳩ニ於ケル視性廻轉性眼震ハ視覺皮質中樞ト認メラル、一側ノ大腦後頭葉ヲ剔出スルニ、剔出ト反對方向ニ廻轉スル場合ニ同側方向ニ廻轉セル場合ニ比シ其震盪數著明ニ増加シ剔出側ト同方向ニ廻轉スル場合ニハ其震盪數ハ著シク減少ス。即廻轉ノ方向ニヨリテ一定ナル差ヲ示ス。此知見ト余ノ家兔ニ於ケル所見トヲ對鑑スルニ前者ハ視覺ノ皮質中樞、後者ハ視覺ノ末梢感受器ヲ剔出セル場合ノ所見ニシテ廻轉ノ方向ニヨル震盪數ノ増減、持續時間ノ長短ハ質的ニ兩者符合一致スルヲ觀ル。興味アル關連ナルベシ。

次ニ實驗的ニ家兔ノ一側眼球ヲ剔出スルニ稀ニ特發性眼震ヲ發來スルコトアリ。是レ單ニ視性現象ナルカ或ハ知覺(三叉神經)刺激ノ關與スルナキカ尙ホ未解決ナリ。余ハ1例(第一表Nr. 65)ニ於テ此眼震ノ發來ニ遭遇

シタルガ其方向ハ健眼側ニ向フ。其他詳細ハ既ニ記述セルガ如シ。而シテ此眼震持續中ニ廻轉刺戟ヲ與ヘタル場合ノ所見ハ此眼震ヲ發來セザル他ノ動物群ノ所見ト同趣ナリ。由テ一般ニ家兎ハ凡テ一眼剔出後健眼側ニ向フ眼震ノ眼震準備(Nystagmusbereitschaft)ヲ保有スト解釋シ得ルモノ、如シ。換言スレバ健眼側ニ向フ眼震ヲ潜伏セシメ居ルモノトセバ上來數次叙述セル如ク一眼剔出家兎ニ於ケル廻轉性眼震ガ廻轉ノ方向ニヨリテ一定ナル相違ヲ示ス事實ヲ容易ニ説明シ得。

蓋シ廻轉中ノ眼震ノ方向ハ廻轉ノ方向ト同一ニシテ廻轉後眼震ノ方向ハ廻轉ノ方向ト反對ナリ。從テ眼球剔出側方向廻轉ノ場合ニ廻轉中ノ眼震ノ震盪數少キハ其方向ガ上記假設潛在眼震ノ方向ト反對ナルガ故ニ兩者眼震ガ相殺シテ減少シタル結果ナルベク、廻轉後眼震ノ持續時間長ク震盪數多キハ其方向ガ潛在眼震ノ方向ト同一ナルガ故ニ兩者眼震ガ重合シタル結果ト見做シ得。健眼側方向廻轉ノ場合ニモ同様に方向ノ異同ニヨリテ其所見ヲ説明シ得ベシ。

要之、1)家兎ハ一眼剔出ニ因リテ稀ニ健眼側ニ向フ地平性ノ特發性眼震ヲ發來スルノ事實アリ。2)此眼震持續中ニ於ケル廻轉性眼震ノ廻轉ノ方向ニヨル相違ハ此眼震ヲ發來セザル他ノ多數家兎ニ於ケル所見ト同致ナリ。3)依テ一眼剔出後特發性眼震ヲ發來セザル多數ノ家兎ニ於テハ健眼側ニ向フ地平性眼震ガ潛在ストノ解釋ヲ許セバ一眼剔出家兎ニ於ケル廻轉性眼震ノ廻轉方向ニヨル相違ハ簡單ニ了解セラル。

是等ノ三因子ニ基キ一眼ヲ剔出スルモ特發性眼震ヲ發現セザル家兎ハ健眼側ニ向フ地平性眼震ノ準備ヲ保有セルヲ思考セシム。

第四章 結 論

上來ノ記述ニヨリ次ノ如ク結論ス。

1) 一眼ヲ剔出セル家兎ニ1廻轉約10秒ノ速度ヲ以テ1回或ハ2回ノ廻轉刺戟ヲ與フルニ廻轉性眼震ノ持續時間及震盪數ハ廻轉ノ方向ニヨリテ一定ナル差ヲ示ス。

a) 眼球剔出側方向ニ廻轉スル場合ニハ健眼側方向ニ廻轉セル場合ニ比シ廻轉中ノ眼震ハ震盪數少ニシテ廻轉後眼震ハ持續時間長ク震盪數著シク多シ。

b) 健眼側方向廻轉ノ際ニハ廻轉中ノ眼震ガ震盪數多ク、廻轉後眼震ハ持續時間短ク震盪數著シク少キカ或ハ眼震缺如ス。

2) 兩眼健存家兔ニ於ケル廻轉後眼震ノ左右廻轉ノ方向ニヨル差ハ既知ノ如ク僅小ニシテ且廻轉ノ方向ト一定ナラズ。依テ(1)ノ所見ハ一側視力脫失ニ因ル一種ノ視性影響ト解シテ妥當ナルベシ。

3) 一眼剔出ニ因ル健眼側ニ向フ特發性眼震持續中ニ於ケル廻轉性眼震ノ左右廻轉ノ方向ニヨル差異ハ一眼ヲ剔出スルモ特發性眼震ヲ發來セザル他ノ家兔ニ於ケル上記(1)ノ所見ニ同致ナリ。

4) 一眼剔出後、特發性眼震ヲ發來セザル家兔ニ於テハ健眼側ニ向フ眼震準備(Nystagmusbereitschaft)ノ保有ヲ思惟セシム。

主 要 文 献

1) 星野及南雲：視性眼球震盪ノ實驗的研究，北越醫學會雜誌第39年第5號大正13年。 2) 星野及皆川：視器ト廻轉性眼球震盪，大日本耳鼻咽喉科會々報，第30卷第1號，大正14年。 3) 久米：家兔ニ於ケル前庭性眼球震盪ノ個體的變動ニ就テ，耳鼻咽喉科臨床，第21卷第4號，昭和3年。

Kurze Inhaltsangabe.

Ueber den Drehnystagmus bei dem einseitiges Auge exstirpierten Kaninchen.

Von

N. KUME.

(Aus dem oto-rhino-u. laryngologischen Institute der kaiserlichen
Universität zu Kyoto. Direktor: T. Hoshino.)

In Bezug auf die Beziehung zwischen dem Drehnystagmus und dem Sehorgan hat der Verfasser aus einer Reihe von Experimenten folgende Resultate gewonnen.

1) Gibt man einem Kaninchen mit einseitig exstirpiertem Augapfel 1-oder 2 malige Drehung, infolgedessen es alle 10 Sekunden zu einer Drehung kommt, so treten je nach der Drehrichtung in der Zeitdauer und der Schlagzahl des Drehnystagmus Unterschiede auf.

a) Falls nach der Exstirpationseite hin gedreht wird, ist der Nystagmus in Drehung träger und der Nachnystagmus bedeutend frequenter und länger anhaltend als bei den nach der gesunden Seite hin gedrehten Fällen.

b) Falls nach der Seite des intakten Auges hin gedreht wird, weist der Nystagmus in Drehung grössere Schlagzahl auf, der Nachnystagmus dagegen an Dauer kürzer und langsamer ist oder gänzlich fehlt.

2) Nach Beseitigung eines Augäpfels tritt, wenn auch selten, spontaner Nystagmus nach der anderen Seite hin auf. Auch im Dauer dieses spontanen Nystagmus findet man dieselbe Unterschiede des Drehnystagmus wie oben unter 1).

3) Das Kaninchen, bei dem es trotz einseitiger Augapfelexstirpation zu keinem spontanen Nystagmus kommt, besitzt vermutlich Nystagmusbereitschaft nach der gesunden Seite hin.