電氣刺戟ニ因ル嗅器並ニ鼻粘膜變化 ノ病理組織學的研究

第II 刺戟後24時間乃至7日ニ於ケル所見

南 徳 次

〔京都帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室(星野教授指導)〕

目 次

緒 言	第3項 刺戟後7日ニ於ケル所見
實驗成績	總 括
第1項 刺戟後24時間ニ於ケル所見	結 論
第2項 刺戟後72時間ニ於ケル所見	附 圖

緒 言

余ハ前篇ニ於イテ、電氣刺戟直後ニ於ケル嗅器ノ組織學の所見ヲ詳カニセリ。續イテ本篇ニ於イテハ、斯ノ如ク一旦變化ヲ蒙レル嗅器組織ガ更ニ其後ノ經過ニ於イテ、如何ニ變遷スベキカヲ組織的ニ明ニシ以テ一旦失ハレタル嗅器脫出ノ豫後ノ如何ヲ窺ハントス。實驗方法並ニ標本製作方法ハ前篇ニ準ズ。

附記. 蛙ハ飼養中食ニ親マズ且電氣刺戟後ハ速ニ衰弱斃死スルヲ以テ、7日以上ニ亘ル實驗ハ特ニ蛙ノ生活力ノ旺盛ナル時期ヲ擇ビテ施行セシニ拘ラズ殆不可能ナリキ。而シテ饑餓ニヨル影響ハ對稱標本ト比較ノ下ニ嚴密ニ之ヲ考慮ス。

實 驗 成 績

第1項 刺戟後24時間ニ於ケル所見

蛙. Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24. (50_Lミリアンペア⁷2分間刺戟)

蛙. Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, (100_Lミリアンペア⁷1分間刺戟)

主鼻腔. 鼻腔内ハ剝離セル上皮細胞、血球ノ多數ト少量ノ雲絮狀滲出物ノ浮遊スルヲ見、殊ニNr. 23, Nr. 19, Nr. 21, ノ後盲囊附近ニ著明ナリ。

粘膜ニ於ケル變化ハ主鼻腔ノ前後兩端、即チ上盲囊、後盲囊並ニ鼻中隔ト嗅隆起間ノ谷ニ於イテ特ニ著明ニシテ、上皮層ニ於イテハ、各細胞(嗅上皮細胞並ニ支柱上皮細胞)ノ胞體ハ概ニ綿花狀ニ崩壞シ、核ハ腫脹染色不良ニシテ、時トシテ_Lクロマトリーゼ⁷ヲ呈シ、其排列ハ著シク混亂ス。而シテ著明ナル場合(Nr. 23, Nr. 19, Nr. 21. ノ後端部)ニアリテハ上皮層ノ一部ハ剝離シテ固有膜ヲ直接鼻腔内ニ露出セシム。

ボーマン腺. 腺細胞ハ核ヲ失ヒ、胞體ハ腫脹シテ、腺體ハ爲ニ無構像ナル綿塊狀ヲ呈ス。

粘膜下組織ニ於ケル變化ハ、上盲囊ニアリテハ硝子樣變性ヲ呈シ、後盲囊並ニ嗅隆起ト鼻中隔間

ノ谷＝アリテハ鬆疎水腫狀態ヲ呈スル事、及ビ色素細胞ノ黑色團塊狀ヲ呈スル事ハ尙刺戟直後ノ所見ト大差ナキモ、粘膜下＝於ケル血管ハ何レモ強度＝充盈シ、時トシテハ稍著明ナル粘膜下溢血ヲ見ル(Nr. 19, Nr. 21, Nr. 23. ノ後盲嚢並＝鼻中隔ト嗅隆起間ノ谷＝於イテ)

主鼻腔中央部各壁ノ粘膜ハ其全層＝亘リテ強く濃染、減厚シテ、壓縮狀態ヲ呈スル事、並＝嗅隆起尖端ノ粘膜＝於イテハ著變ヲ見ザル事等ハ刺戟直後＝於ケル所見ト大差ナキモ、粘膜下組織＝於ケル血管ノ充血ハ著明ナリトス。

副鼻腔. ヤコブソン器. 上皮層＝於イテハ一般＝胞體ハ腫脹シ且不透明ニシテ核ノ染色甚シク不良ナリ. 特＝外側ノ一部＝於ケル變化ハ著明ニシテ、嗅上皮細胞ハ其胞體ノ崩潰ト核ノ「クロマトリーゼ」ヲ呈シ、支柱細胞ハ胞體、核ノ強度＝萎縮濃染ヲ示シ且細胞ノ排列甚シク混亂ス. 之等ハNr. 23, Nr. 19, ニ著明ナリトス。

粘膜下組織ハ一般＝鬆疎水腫狀ヲ呈シ、強キ血管ノ充盈及ビ輕微ナル細胞浸潤(大多數ハ白血球ニシテ、少數ノ淋巴球及ビ組織球ヲ混ズ、以下細胞浸潤ト稱スルハ以上ノ細胞團ヲ意味ス)ヲ見、色素細胞ハ黑色不正散子形(Nr. 19, Nr. 20)或ハ褐色繩狀(Nr. 23, Nr. 24)ヲ呈ス。

中鼻腔並＝下鼻腔外側窩. 粘膜＝於ケル變化ハ主鼻腔後端部或ハ中央部ノ變化ニ類似スルモ各動物＝於イテ毎常一定セズ. 粘膜下膜＝於イテハ血管ノ充盈スル事亦著シク、Nr. 19, Nr. 24. ノ下鼻腔外側窩ノ一部＝アリテハ血管ノ周圍＝輕度ノ溢血並＝細胞浸潤ヲ見ル。

内鼻腺. 前方ヤコブソン器附近ノ腺管群＝アリテハ腺管ハ菲薄トナリ、腺腔ハ擴大シ、腺細胞核ハ強く濃染萎縮スルヲ見ルモ間質ハ却而鬆疎ニシテ異常細胞ノ浸潤ヲ見ズ. 此ヨリ後方＝到ルニ随ヒテ變化ハ輕微トナリ、鼻中隔中央部ノ兩側＝位スル腺管群＝アリテハ著變ヲ見ズ。

鼻淚管. 著變ヲ見ズ。

嗅神經. 纖維間結締組織細胞核ノ腫脹ト遊走白血球ノ増加ヲ見ルノ他、神經鞘内ヲ走行スル血管ハ何レモ強く充血シ、其著シキ場合(Nr. 19, Nr. 20, Nr. 22, ノ神經幹)ニアリテハ輕度ノ溢血ヲ見ル. 尙Nr. 19, Nr. 23, Nr. 21 ノ嗅隆起ト鼻中隔間ノ谷ヲ通過スル嗅神經分枝ノ一部＝アリテハ該部ノ著シキ粘膜下溢血＝ヨリテ包圍サレ、爲＝神經纖維ハ稍細條トナリ殊ニNr. 19. ニアリテハ神經纖維ノ像ヲ失ヒテ細網狀ヲ呈ス. 纖維間結締組織細胞核ハ萎縮シ、細桿狀ヲ呈ス. 「オスミウム」酸固定ノ標本ニアリテハ、神經幹、分枝共＝黑色顆粒ノ沈着ヲ見、其排列、沈着密度等ハ刺戟直後＝於ケル所見ト殆ド異ル所ヲ見ズ。

嗅神經中樞部. 糸毬層、分子層. 大細胞層ノ各層＝異常ヲ見ズ、且嗅葉腦室被膜細胞＝於ケル顆粒モ亦正常ナリ。

三叉神經鼻內枝. 各分枝＝於ケル變化所見ハ嗅神經＝於ケル其レト大差ナキモ、「オスミウム」酸固定標本ニアリテハ、纖維ノ念珠狀＝膨大スルモノ少ナカラズ. 更ニ末梢分枝ニシテヤコブソン器附近ノ纖維＝アリテハ「オスミウム」酸＝ヨリテ染色サレズ且黑色顆ノ沈着スルヲ見ル。

第2項 刺戟後72時間＝於ケル所見

蛙. Nr. 36, Nr. 37. (50_Lミリアンペア¹²分間刺戟)

蛙. Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35. (100_Lミリアンペア¹¹分間刺戟)

主鼻腔. 腔内＝ハ多數ノ剝離セル上皮細胞、赤血球、白血球及ビ雲絮狀物質ヲ見. 殊ニ主鼻腔ノ後半部＝集團ス。

粘膜＝於ケル變化ハ主鼻腔ノ後端部即チ後盲嚢並＝鼻中隔ト嗅隆起間ノ谷＝於イテ最モ著明ニシテ、上皮細胞ハ殆ド其核ヲ失ヒ、胞體ハ雲絮狀＝崩潰ス. 而シテ其排列ハ不整ヲ極メ甚シキニ到リテハ穹窿部＝於イテ、上皮層ヲ欠如シ、固有膜ヲ直接鼻腔内＝曝露ス. (Nr. 35, Nr. 36)

ボーマン腺ニ於イテハ腺細胞ハ全然核ヲ失ヒ、腺體ハ無構像ナル綿塊狀ヲ呈シ、且固有膜ヨリ離脱スルモノ多シ、粘膜下組織ハ強キ細胞浸潤ト溢血トニヨリテ占有サレ、漿液ノ滲出ハ此部ヲシテ甚ダ鬆疎ナラシム。

細胞浸潤ハ Nr. 34ニ於イテ最モ著明ニシテ、漿液性滲出物ノ瀦溜ト共ニ上皮層ヲシテ鼻腔内ニ向ヒテ膨隆セシメ、且軟骨膜及ビ軟骨組織ノ一部ヲ犯ス。

血管ニハ總テ血栓ヲ見、血管壁及ビ血栓ハ白血球ノ侵襲ヲ受ク、色素細胞ハ此部ニ於イテ概ネ崩潰シテ「メラニン」顆粒トシテ散逸ス。

上述ノ部ヨリ主鼻腔ノ前方ニ到ルニ隨ヒテ變化ハ輕微トナリ 主鼻腔ノ中央部各壁ノ粘膜ニ於イテハ上皮層ハ核ノ消失ト胞體ノ腫脹トニヨリテ無構像ナル帶狀ヲ呈シ、粘膜下組織ハ輕度ナル細胞浸潤ヲ受ク

主鼻腔ノ前約三分ノ一ヲ占ムル粘膜ハ其全層ニ亘リテ濃染、減厚シ恰モ壓縮セラレタルガ如キ形狀ヲ呈スト雖モ、前項主鼻腔ノ中央部ニ於ケルガ如ク著明ナラズ、其範圍又狹少ニシテ無核帶ノ境界膜明畫ナラズ。然ルニ上盲囊穹窿部ニアリテハ上皮細胞ノ胞體崩潰シ、核ハ染色不良或ハ「クロマトリーゼ」ヲ呈シ其排列混亂ス。粘膜下組織ハ此部ニ於イテ硝子樣變性ニ陥リ、ボーマン腺ハ無構像ナル綿塊狀ヲ呈ス。

粘膜下組織ニ於ケル血管ニハ一般ニ充血著明ニシテ上盲囊穹窿部ニ於イテハ血栓ヲ見ル。

嗅隆起尖端ニ於ケル粘膜ノ變化ハ每常輕微ニシテ上皮層ニアリテハ各細胞ノ胞體ハ輕ク腫脹シ、核ハ其染色不良ナリ、粘膜下組織ニ於イテハ血管ノ充盈著明ニシテ、時トシテ輕度ナル細胞浸潤ヲ見ル(Nr. 35)

副鼻腔. ヤコブソン器. 腔内ハ漿液性滲出物ヲ以テ充滿サレ、上皮層ニ於イテハ胞體強ク腫脹シ不透明ナリ、核モ亦一般ニ腫脹且染色甚シク不良ニシテ特ニ嗅上皮細胞ニ然リトス。

而シテ外側ノ一部ハ每常特ニ著明ナル變化ヲ示シ、細胞ノ排列著シク混亂シ、胞體ノ纖維狀ニ崩潰スルモノ少カラズ。

粘膜下組織ハ一般ニ鬆疎水腫狀ヲ呈シ、外側ノ一部ハ溢血並ニ細胞浸潤ヲ蒙ル。

中鼻腔並ニ下鼻腔外側窩. 腔内ニハ剝離セラレタル上皮細胞、血球並ニ雲絮狀物質ヲ見ル。中鼻腔粘膜ノ變化ハ主鼻腔前端ニ於ケル變化ト殆ド同様ナルモ、粘膜下組織ニ於イテ著シキ溢血並ニ細胞浸潤アリ。下鼻腔外側窩ノ變化ハ主鼻腔後端部ニ於ケル其レニ匹敵ス。

内鼻腺. 前方ヤコブソン器附近ノ腺管群ニアリテハ腺細胞ハ何レモ腫脹シ、核ハ其染色不良ニシテ、間質ハ稍鬆疎ナリ。後方ノ腺管群ニアリテハ、腺體ハ腺細胞ハ個々ニ萎縮シテ其斷面菊花狀ヲ呈シ(Nr. 35, Nr. 33)或ハ腺細胞核ノ消失ニヨツテ無構像ナル環狀ヲ呈シ、著シキ場合ニアリテハ腺體崩壊シテ、間質ニ稍著明ナル細胞浸潤ヲ見ル(Nr. 36, Nr. 37)

鼻淚管. 管腔ニハ僅少ナル雲絮物質ヲ見、上皮細胞ノ胞體稍不透明ニシテ、核ノ染色、稍不良ナルカノ感アルモ、他ニ著變ヲ呈セズ。

嗅神經. 神經幹. 神經纖維ニ異常ヲ見ズ。纖維間結締組織細胞核ハ腫脹シ、遊走白血球稍増加ス。鞘内血管ハ一般ニ著明ナル充血ヲ示ス。

分枝. 一般ニ幹ニ比シテ變化ハ著明ニシテ、上壁枝ノ一部ヲ除ク外ハ神經纖維ハ其構像ヲ失ヒテ細網狀ヲ呈シ、結締組織細胞核ハ萎縮シ、細桿狀ニ變形スルヲ見ル。

「オスミウム」酸固定ノ標本ニアリテハ幹並ニ分枝ニ著明ナル黑色顆粒ノ沈着ヲ見、分枝ニ於イテハ顆粒ノ大サ及ビ沈着密度ハ一般ニ神經幹ニ比シテ大ナルモ、神經纖維ノ網狀ヲ呈スル部位ニアリテハ顆粒ノ沈着密度ハ却而小ニシテ、顆粒ハ大小不同ニシテ甚シク粗大ナリ。

嗅神經中樞部. 嗅葉各層ニ著變ヲ見ザルモ、「オスミウム」酸固定ノ標本ニ於イテハ時トシテ、糸

絨層、並ニ纖維層ニ少數ノ微細ナル黑色顆粒ノ析出ヲ見ル(Nr. 36)

三叉神經鼻內枝、前項ニ於ケルト大差ナシ。

第3項 刺戟後7日ニ於ケル所見

蛙、Nr. 41, Nr. 57. (50_Lミリアンペア⁷2分間刺戟)

蛙、Nr. 40, Nr. 55, Nr. 58. (100_Lミリアンペア⁷1分間刺戟)

主鼻腔、鼻腔ハ多數ノ剝離セル上皮細胞、白血球、並ニ少數ノ赤血球ヲ以テ殆ド充サル。

粘膜ニ於ケル變化ハ主鼻腔ノ前後兩端ニ著明ニシテ中央部ニ比較的輕微ナル事ハ前第1, 第2項ニ於ケルト同様ナルモ一般ニ劇烈ニシテ荒蕪甚シ。

後端部即チ後盲嚢及ビ鼻中隔ト嗅隆起間ノ谷ニ於イテハ上皮層、固有膜並ニボーマン腺ハ全然崩壞シテ、粘膜下組織ヲ直接腔内ニ露出ス。粘膜下組織ニ於イテハ著明ナル溢血ト細胞浸潤ヲ見、結締組織纖維及ビ核ハ腫脹シ、染色甚シク不長ニシテ且著明ナル細胞浸潤ニヨリテ其像分明ナラズ。而シテ細胞浸潤ハ軟骨或ハ骨ノ表面ニ近ク特ニ密集シ、鼻中隔軟骨ノ一部ニ於イテハ其表面ヲ侵シテ粗糙ナラシメ、或ハ軟骨組織内ニ侵入シテ、該部及ビ其周圍ノ軟骨細胞ヲシテ消失或ハ染色不長ナラシム。

此部ニ於ケル血管ハ概ネ血栓ヲ以テ充填セラレ、細胞浸潤ハ特ニ其周圍ニ強ク且血栓内ニ侵入ス色素細胞ノ多クハ其胞體ノ崩壞ヲ來シテ、_Lメラニン⁷顆粒ヲ散逸セシム。

主鼻腔前端部粘膜ニ於イテハ上皮層、固有膜ハ各細胞核ノ消失ト胞體ノ強キ腫脹トニヨリテ無構像ナル帶狀ヲ呈シ、其染色ハ不平等ニシテ且汚穢ナリ。上盲嚢穹窿部ハ上皮層、固有膜ヲ欠キ粘膜下組織ヲ直接鼻腔内ニ露出ス。粘膜下組織ハ或ハ硝子樣變性ニ陥リ、或ハ大小不同ノ雲絮狀塊ニ變化シ、血管ニハ總テ血栓ヲ見ル。前端部粘膜ハ一般ニ其染色汚穢ニシテ、異常細胞ノ侵入ヲ蒙ラズ。

主鼻腔中央部及ビ嗅隆起尖端ノ粘膜ニアリテハ其所見ハ略前端部ノ其レニ類似スルモ、一般ニ其變化稍輕微ニシテ上皮層ノ崩壞ヲ見ズ。

粘膜下組織ハ輕度ナル細胞浸潤ヲ受ケ後方ニ到ルニ隨ヒテ著明トナルヲ見ル。

副鼻腔、中鼻腔、下鼻腔ノ各部位ニ於ケル粘膜ノ變化ハ或ハ主鼻腔ノ前端部ノ變化ニ或ハ後端部ノ變化ニ一致シ且動物ニヨリテ一定セズ。

內鼻腺、各腺體ニ於イテ腺細胞ハ強ク腫脹シ、核ヲ失ヒ無構造ノ環狀ヲ呈スト雖前方ヤコブソン器附近ノ腺管群ニアリテハ每常變化ハ著明ニシテ、腺體ハ崩壞シテ半環狀ヲ呈スルモノ多ク後方ノ腺體ニアリテハ細胞浸潤ヲ蒙ル。間質ノ結締組織ハ雲絮狀ニ變化シ、後方ニ到ルニ隨ヒテ細胞浸潤著シ。

鼻淚管、管腔ハ微細ナル雲絮狀滲出物ヲ以テ充サレ上皮細胞ハ稍腫脹シ核ノ染色不長ナリ。

嗅神經、嗅神經ニ於ケル變化ハ前第2項ニ於ケル其レト異ル所ナシ。

嗅神經中樞部、嗅葉各層ノ細胞核ノ染色ハ一般ニ稍不長ニシテ殊ニ糸絨層、大細胞層ニ於イテ然リトス。大細胞層ニ於イテハ各細胞ハ萎縮シテ胞體ノ周圍ニ間隙ヲ見、糸絨層ニ於イテハ糸絨ノ像甚ダ鮮明ヲ欠ク。

_Lオスミウム⁷酸固定ノ標本ニ於イテハ、微細球菌大ノ黑色顆粒ノ平等ニ纖維層、糸絨層ニ沈着スルヲ見、時トシテ大細胞層ニ及ビ(Nr. 57)糸絨層ニ於イテハ_Lビンゼン⁷細胞及其周圍ニ甚シク粗大ナル顆粒ノ沈着スルヲ見ル。

三叉神經鼻內枝、變化ハ前項ニ於ケル其レト大差ナシ。

總 括

以上ノ實驗成績ヲ總括スルニ、

鼻粘膜。電氣刺戟後24時間ニ於イテハ其所見ハ刺戟直後ニ於ケル其レニ比シテ大ナル逕庭ヲ示サズ。唯主鼻腔粘膜下膜ノ血管ノ一般ニ強ク充血スル事ト副鼻腔粘膜下膜ニ於ケル輕微ナル細胞浸潤トハ炎症性狀況ヲ暗示スル處ナシトセザルモ、其他ノ部ノ粘膜ニ於イテハ尙電氣刺戟時ニ受ケタル「イオン」ノ游動及ビ水分ノ泳動ノ影響ヲ多分ニ保持ス。

刺戟後72時間ニ到レバ、主鼻腔後端部並ニ副鼻腔等ノ電導子ヲ距リタル部ノ粘膜下膜ニ於ケル著明ナル溢血或ハ充血ト細胞浸潤トハ該部粘膜ノ炎症ヲ確定ス。而シテ其炎症性變化ハ主鼻腔中央部並ニ嗅隆起尖端ノ粘膜ニモ、若干波及スルヲ見ルモ電導子ニ近キ部即チ主鼻腔前端部ノ粘膜ニ於ケル所見ハ尙刺戟直後ノ像ヲ距ル事遠カラズ。

更ニ刺戟後7日ニ於イテハ、主鼻腔後端部及ビ副鼻腔粘膜ノ炎症ハ粘膜全層ノミナラズ、更ニ深部硬組織(軟骨)ヲ犯スニ到リ、電導子ニ近キ主鼻腔前半ノ粘膜ハ其全層ニ亘リテ胞體ノ強キ腫脹ト核ノ消失トニヨリテ無構像ナル帶狀ヲ呈シ、且其染色ハ不平等ニシテ汚穢ナリトス。即チ主鼻腔前端部ノ粘膜モ亦此處ニ於イテ刺戟直後ノ像ヲ消失シテ、組織壞死ノ像ヲ示スニ到ル。

嗅神經。電氣刺戟後24時間ニ於ケル所見ハ刺戟直後ニ於ケル其レト殆ド同様ニシテ、刺戟後72時間ニ於イテモ末梢部ニアリテ、結締組織細胞核ノ稍著明ナル腫脹、遊走白血球ノ増加、並ニ神經纖維ノ網狀變化ヲ呈スル區域ノ擴大等多少變化ノ高度トナルヲ示ス事實少カラズト雖尙刺戟直後ノ像ヲ距ル事少シ、然ルニ中樞部ニアリテハ、纖維層並ニ糸毬層ニ微細ナル「オスミウム」顆粒ノ析出ヲ見、更ニ刺戟後7日ニ到レバ大細胞層ニ迄之ヲ追及シ得、即嗅神經ノ變化ハ時ノ經過ト共ニ末梢部ニ於イテ高度トナリ、中樞部ニ向ヒテ上行スル見ル。

鼻淚管、內鼻腺、三叉神經鼻內枝。

之等ノ所見モ亦刺戟後24時間乃至7日ニ於イテハ或ハ炎症ニ或ハ變性ニ陷ルヲ見ル。

以上ノ鼻粘膜並ニ嗅神經ノ電氣刺戟後24時間乃至7日ニ於ケル變化所見ヲ更ニ約言セバ、鼻粘膜ハ其電導子ニ近キ部位ニアリテハ、刺戟後7日ニシテ全ク壞死ニ陷リ、其電導子ヲ距リタル部位ニアリテハ、刺戟後72時間

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

ニシテ明カニ炎症像ヲ呈シ、嗅神經ノ變性モ亦刺激後72時間ニシテ中樞部ヲ犯スニ到ル。而シテ之等病變ヲ呈シタル諸組織ノ運命ニ關シテハ、電氣刺激後7日以上ニ亘リテ觀察スル事能ハザリシヲ以テ、茲ニ之ヲ確示シ得ズト雖モ特種感覺細胞ヨリナル其等組織ノ再生ノ困難ナルヲ考フレバ嗅覺ノ恢復モ亦容易ナラザルヲ窺知ルヲ得ンカ。

結 論

- 1) 鼻粘膜ハ電氣刺激後24時間乃至7日ニ於イテハ、二次的病變ヲ呈ス。即チ電導子ニ近キ部位ニアリテハ刺激後7日ニシテ組織壞死ニ、電導子ヲ距リタル部位ニ於イテハ刺激後72時間ニシテ明カナル炎症像ヲ見ル。
- 2) 嗅神經ノ變化ハ刺激後72時間ニシテ、其中樞部ヲ犯スリ到リ、尙上行スルノ傾向アリ。
- 3) 電氣刺激ニ因ル嗅器並鼻粘膜ノ病變ハ余ノ實驗ノ範圍内ニ於イテハ時間ノ經過ト共ニ増強ス。

終ニ茲ニ恩師星野教授ノ御指導ヲ深謝シ、併セテ病理學教室井上助教授ノ御教示ヲ謝ス

文 献

- 1) **Achoff**, Handbuch der allg. Pathologie. 2) 清野, 生體染色研究ノ現況及其検査術式.
- 3) **Bielschowsky, M.** Handbuch. d. Neurologie. 4) 南, 本誌本號

附 圖 說 明

Fig. 1. 蛙. Nr. 55. ノ嗅葉 (Leitz 3×3)

Fig. 2. 同上ノ糸絨層ノ擴大 (Leitz. 3×7)

O. 「オスシウム」顆粒

Fig. 3. 蛙. Nr. 41. ノ主鼻腔前端部ノ粘膜 (Leitz. 3×3)

S. 粘膜下組織 c.p. 主鼻腔 K. 鼻中隔軟骨 B. ボーマン腺

P. 色素細胞 E. 上皮層

Fig. 4. 蛙. Nr. 36. ノ嗅神經上壁枝 (Leitz. 3×3)

No. 嗅神經 I. 三叉神經鼻内枝 G. 血管

Fig. 5. 蛙. Nr. 34. ノ嗅隆起ト鼻中隔間ノ谷ノ粘膜 (Leitz. 1×3)

I. 細胞浸潤 Ss. 溢血 K. 鼻中隔軟骨 c.p. 主鼻腔

Fig. 6. 蛙. Nr. 35. ノ後盲囊 (Leitz 3×3)

S. 粘膜下組織 X. 細胞浸潤並ニ溢血 c.p. 主鼻腔 E.o. 嗅隆起

E. 剝離セル上皮細胞群

*Abstract.***Experimental studies on the pathological changes of
olfactory organs owing to the galvanisation.**

by

Dr. T. MINAMI.

From the oto-laryngological laboratory of Kyoto Imperial University.
(director Prof. T. HOSHINO.)

The author has stimulated the olfactory organs of frogs (*Rana esculenta*) with direct currents of various strengths, and researched microscopically their pathological changes.

The results are as follows;

1) Immediately after the galvanisation, the nasal mucous membranes show two different changes,—the one always occurs in the nearest portion of the electrode (positive), and all the layers of mucous membranes are darkly stained and grow thin; the other takes place in the distant regions of the electrode, and it has two particular characters, the loosening of epithelial layers and the edema of submucous tissues.

2) The nasal mucous membranes proceed, during the days between 3 and 7 after the galvanisation, to inflammatory or necrotic changes.

2) Chief changes of olfactory nerves are the haemorrhage among nervous sheathes and the degeneration, which is represented by the precipitation of osmium granules of nerve fibres

4) The pathological changes, above mentioned, are explainable to be caused by the migration of ions and the electric cataphoresis.