内 聽 道 X 線 撮 影 法

福 渡 六 郎

〔日本赤十字社大阪支部病院耳鼻咽喉科(主任二本杉醫長)〕

久 保 稔

四 ツ 田 勝 作

〔日本赤十字社大阪支部病院レントゲン科〕

顙顙骨岩様部ハ頭蓋底ノ一部ヲ構成スルヲ以テ此部ニ發生スル 疾病ハ嘗ニ耳科學の方面ヨリノミナラズ、一般神經病學的ニ特ニ緊要ナル部位ナリトス。大腦顙顙葉、小腦、腦橋部ハ勿論腦靜脈ナルS字狀竇、頸靜脈球、上下岩様靜脈等何レモ岩様部ノ周圍ヲ走行シ、且又其前内端ニ於テハ内頸動脈、土耳其鞍、三叉神經節、滑車神經、後下方ニ於テハ迷走神經、副神經ト親密ナル局所解剖的關係ヲ有シ、事實臨牀的ニ此部ノ疾患ハ屢々上記ノ部位ニ由來スベキ複雑ナル諸症狀ノ發現ヲ見ルハ吾人ノ已ニ知ル所ナリ。然ルニ其中央部ニ於テハ聽神經並ニ顔面神經ガ岩様骨錐體ヲ恰モ隧道ノ如ク横斷シテ走行スル内聽道アリ。從來此内聽道内ニ於ケル病變ニツイテハ、聽神經並ニ顔面神經ノ機能障礙ニヨリ之ヲ推斷セリト雖モ、確實ナラズ。多クハ他ノ部ノ罹患ヲ除外シテ僅ニ其局所診斷ヲ推定的ニ試ミルノ程度ナリ。今若シ内聽道骨壁ノ變化ヲ直接目撃シ得レバ其効果ハ耳科並ニ神經學上尠小ニ非ザルナリ。

余ハ偶々聽神經腫瘍ノ一患者ニ内聽道X線撮影法ヲ試ントシテ、文献ヨリ Stenvers, Schüller, Cushing 氏法ヲ得タルヲ以テ、之等諸氏ノ法ノ優劣、相違ヲ頭蓋骨ニ就テ比較シ、最後ニ余ノ行ヘル法ヲ述ベン。

1. Stenvers 氏法

イ。内、外聽道入口ニ於テ、左右共鉛ノ針金ノ輪ヲ貼リ、撮影像ヲ明確ニス。以下以レモ同一ノ頭蓋骨ヲ用ヒタリ。

ロ。寫眞板ハ水平トナシ、撮影セントスル耳ヲ寫眞板ノ中央ニオク、

ハ。頭蓋骨ハ顔面ヲ以テ寫眞板上ニ立テ、 $\perp$ ドイツエ $\perp$ 水平線ヲ垂直トナシ、撮影セントスル耳ノ側ニ、上下軸ノ周圍ニ45度廻轉ス。即チ内外聽道ヲ水平ノ位置トナセリ。

ニ。 $\perp$ レントゲン $\perp$ 線ハ上下軸ニ平行ニシテ、撮影セントスル外聽道口ト同側ノ眼窩ノ外縁トヲ結ブ線ノ中點ヲ通ル垂直面中ニアリテ、且ツ垂直線トハ12度下方ニ傾ク。

即チ外後頭結節附近ヨリ、前記ノ中點ヲ通ル。(A圖)

Stenvers ノ法

Fig. A 1.

Fig. A 2.

ホ. 管球. 「アルゴン」.

ヘ. 硬度. 「ベノアー」5度

ト. 遮光板. 「チウブス」ノ長サハ20糎, 直径ハ21糎.

チ. 電壓, 135.0 K.V. 電流, 40. M.A.P. (丸中製アポロ機)以下同機

リ. 焦點距離. 65糎.

ヌ. 時間. 2秒.

ル. 結果. 内外聴道口ノ輪, 内外聴道, 蝸牛殻ハ一直線上ニアリ, 上及外方ニ上三半規管及水平三半規管アリ. 何レモ甚ダ明瞭ナリ.

2. Schüller 氏法

イ. 寫眞板ハ水平トス.

ロ. 頭蓋骨ハ側位ヲトリ, 撮影セントスル耳ヲ下方ニオク. 前後軸及上下軸ヲ水平トナス.

ハ. 「レントゲン」線ハ, 「ドイツチエ」水平線ニ垂直ニシテ左右外聴口ヲ通レル平面内ニアリ, 且ツ垂直線トハ上方ニ30度開キ, 撮影セントスル耳ヲ通ル. (B圖)

ニ. 「レントゲン」装置ハ前ニ同ジ.

ホ. 結果. 内外聴道ハ橢圓形ノ像ヲ呈スルモ, 内外聴道口ノ輪ハ接シテ重ナラズ. 即チ内外聴道ハ完全ニ重複セズ何レモ深部ノ一部分ノミガ重レル像ニシテ, 内聴道ノ完全ナル像ニ非ズ.

Schüller ノ法

Fig. B 1.

Fig. B 2.

X. Röntgen 線ノ方向
 D.H. Deutsche Horizontallinie
 O.V. Ohrvertikal
 M. Mittellinie

3. Cushing 氏法

- イ. 寫眞板ハ上方ヲ5度高ク傾ク.
- ロ. 撮影セントスル耳ヲ下ニ, 側位トナシ, 前後徑ニ於テ後方ヲ10度高ク, 上下軸ニオイテ, 上方ヲ15度高ク傾ク.
- ハ. レントゲン線ハ上方ナル外聽道口ノ上後方3糎 (生體ナラバ耳翼ノ後上角) ノ點ヨリ下方ノ外聽道口ヲ通ル. (C圖)

Cushing ノ法

Fig. C 1.

Fig. C 2.

ニ. 管球以下時間マデ前ニ同ジ.

ホ. 結果, 内外聽道口ニ於ケル輪ノ像ハ不明ナリ. 内聽道像ハ四角形ニシテ, 正シ

キ像ニ非ズ。

4. 余ノ行ヘル撮影法

イ. 余ハ先ヅ内, 外聴道ガ「ドイツチエ」水平線及前後軸ト如何ナル關係ニアルカタ知ラント欲シ, 概水平線及前後軸ニ鉛ノ針金ヲ貼り, 頭蓋骨ヲ正シク水平及臥位トナシ, 撮影シ, 内外聴道口ノ輪ノ中心ヲ結ブ線ト, 上記ノ2針金ノ像トノナス角度ヲ計レリ。即チ内, 外聴道ノ中心ヲ結ブ線ハ前後軸トハ85度, 「ドイツチエ」水平線ヲ含ム平面トハ20度ノ角度ヲ以テ交ルコトヲ知り得タルヲ以テ, 次ノ如ク寫眞板及頭蓋骨ヲ置ク。

ロ. 寫眞板ハ水平トス。

ハ. 頭蓋骨ハ撮影セントスル耳ヲ下ニ側位トナシ, 前後徑ニ於テ, 後方ヲ5度高ク, 上下軸ニオイテ, 上方ヲ20度高ク傾ク。

ニ. 「レントゲン」線ハ撮影セントスル外聴道口ヲ通り, 垂直ニ寫眞板ニ落ツ。(D圖)

余ノ法

Fig. D 1.

Fig. D 2.

ホ. 「レントゲン」装置ハ前ニ同ジ。

ヘ. 結果: 内聴道口ノ輪ハ外聴道口ノ輪ノ中ニ正シク入り, 大ナル外聴道内ニ小ナル内聴道ガ正シク重ナリ。透明ナル内聴道像ハ周圍ノ黒キ骨質像ト明カニ區別スルコトヲ得。

上述ノ如ク, 余等ハ内聴道ヲ正シク外聴道中ニ重ネ, 内聴道ノ像ヲ比較的的正シク撮影シ得タルヲ以テ之ヲ生體ニ試ミントシ, 6歳ノ少女ノ左右内聴道ヲ撮影ス。

イ. 管球. 「ハンザー」。

ロ. 硬度以下焦點距離マデ前ニ同ジ。

ハ. 時間. 4秒.

ニ. 結果. 前記頭蓋骨ノ像ニ於ケルガ如ク, 左右共外聴道像内ニ, 圓形ニシテ大, 且明瞭ナル内聴道像ヲ得タリ.

之ヲ要スルニ内外聴道, 蝸牛殻及三半規管ヲ同一平面上ニ並ベタル時ハ, Stenvers 氏法ニヨリ完全ナル像ヲ得タルモ, 内外聴道ヲ垂直トナシ, 二者ヲ相重ネタル像ハ Schüller 及 Cushing 氏法ニヨリテハ, 十分ナル像ヲ得タリト言フベカラズ. 然ルニ余ノ法ヲ用ヒテ, 撮影シタルモノハ, 内聴道ハ正シク外聴道ト重ナリ, 圓形ニシテ大, 且ツ明瞭完全ナル内聴道像ヲ得タリ. 故ニ Stenvers 氏法及余ノ法ヲ合セ用ヒ, 左右耳ヲ比較撮影スレバ, 岩様骨ノ局所的變化ヲ明カニシ, 且又内聴道ニオケル骨ノ變化, 即チ破潰, 擴大若クハ狹窄等ヲ惹起セル疾病ニ有力ナル診斷ヲ與ヘ得ベシ.

擧筆スルニ臨ミ京都帝國大學教授星野博士ノ御懇篤ナル御校閲ト醫長二本杉博士ノ御指導ヲ深謝ス.

要 主 文 献

- 1) **V. Sonnenkalb-Chemnitz**, Röntgendiagnostik. Denker-Kahler. Handbuch d. H.N.O. Heilkunde. Bd. VI. S. 1048. 2) **Cushing**, The Acoustic Tumor. 1917. 3) **Mayer, E. G.**, Ergebnisse der Röntgenologischen Untersuchung des Schläfenbeins bei Erkrankungen des Ohres. Fortsch. a. d. Geb. a. Röntg. Bd. 32. 4) **Mayer, E. G.**, Otologische Röntgendiagnostik. Handbuch. d. Röntgenkund Bd. II.

Kurze Inhaltsangabe.

Eine neue Methode zur Röntgenaufnahme des inneren Gehörganges.

Von

R. HUKUWATARI, M. KUBO und K. YOTUDA.

Aus dem oto-rhino-und laryngologischen Institut des Hospitals des Vereins vom Roten Kreuze zu Osaka. [Direktor: Dr. K. NIHONSUGI und Prof. T. HOSHINO an der Kaiserlichen Universität zu Kyoto.]

Verfasser nehmen das Röntgenogramm des inneren Gehörganges mit einer neuen Methode auf.

1) Die Kinn-Nasenlinie bildet einen scheitelwärts offenen Winkel von 20° und die Sagittalacshe einen hinterwärts offenen Winkel vom 5° mit der horizontalen Kassette.

左耳

右耳

福渡, 久保, 四ツ田論文附圖

Stenvers 氏法 A

Schüller 氏法 B

Cushing 氏法 C

福渡ノ法 D

E

F

2) Die Röntgenstrahlen werden senkrecht auf das unteren aufzunehmenden Ohr eingestellt.

Auf diese Weise können Verfasser den rundlichen Schatten des inneren Gehörganges in der Mitte des grossen Schattens des äusseren Gehörgangs darstellen.