迷走神経背核刺戟ノ代償性眼球 震盪ニ及ボス影響ニ就テ

吉 武 惟 揚

〔京都帝國大學醫學部耳鼻咽喉科教室(星野教授指導)〕

緒 言

前庭迷路機能ト植物性神経系トノ關連ニ就テノ研究ハ、各方面ヨリ實驗的ニ臨床的ニ數多ク報告サル、ト云ヘドモ、其等ノ多クハ前庭迷路及植物性神経系ノ末梢ヲ主トシタル觀察ニシテ、兩者ノ中樞機轉ニ關スル研究ハ甚ダシク寥々タルモノアリ。是ヲ文献ニ求ムルニ、スピーゲル、デメトリアーデス、ラウトン、漆原、高橋等ヲ纔カニ舉グルニ止ムナリ。

余ハ前庭神経中樞ノ代償性興奮性亢進ニヨリ發現スル中樞性代償性眼球震盪ヲ對照トシ、今日植物性神経ノ一ノ中樞核ト目サル、迷走神経背核ヲ刺戟シ、兩者ノ關係ニ就テ觀察スルノ機會ヲ得タルヲ以テ此處ニ報告セントス。

實 驗

從來本教室ニテ行ヒツ、アル吉田、久米兩氏ノ方法ニ依リ、兩側迷路ヲ相異リタル日時ニ破壞シ、所要ノ代償性眼球震盪ヲ起サシム。家兎ヲ星野式固定器ニ腹位ニ固定シ、動物ノ頭部ヲ可及の前屈セシメ、第一頸椎後頭骨間膜ヲ開キ次デ、第四腦室後半部ヲ露出スル時ハ迷走神経背核ハ容易ニ見出サル。

刺戟方法トシテ、細長キ針ニ由ル刺針法及本教室備附ノ感應電氣裝置ニヨリ弱キ電流ヲ以テ、細キ白金線ノ先端ヲ圓ク屈曲シ組織ヲ損傷セシメザル様爲セル傳導子ニ依リ電氣刺戟ヲ與フルニ方法ヲ採用セリ。此際豫メ家兎腦組織標本ニテ、迷走神経背核ノ部ヲ熟知シ置キ上記ノ方法ニ由リ、背核ノ種々ノ部ニ刺戟ヲ與ヘ、本教室ノ法ニ從ヒ代償性眼震運動ノ變化ヲ煤煙紙上ニ觀察ス。尙對照實驗トシテ迷走神経背核ノ隣接部ニ刺針法及電氣刺戟ヲ加ヘタルモノヲ使用ス。

實驗成績概括

全實驗動物十四頭ニ及ブモ、今代表的實驗例ノミヲ舉グレバ次ノ如シ。

動物. Nr. 1. ♂ 1900.0瓦

第1回破壞右側迷路。第2回破壞左側迷路、左側水平ニ眼筋分離、左側迷走神経背核ヲ刺針ス。刺戟後直チニ緩縮筋ニ於テハ、其振幅刺戟前ノ5.0mmヨリ刺戟後ノ7.5mmニ増大シ、震盪數刺戟前ノ10秒10回ヨリ刺戟後ノ10秒28回トナリ何レモ著シキ増大ヲ示ス。急縮筋ニテモ同様ニ振幅及

單位時間ノ震盪數ノ著明ナル増大ヲ來シ、斯カル變化ハ刺戟後約35秒間持續シ後漸次ニ舊ニ復ス
動物. Nr. 2 ♂ 1800.0瓦

第1回破壊右側迷路第2回破壊左側迷路、左側水平ニ眼筋分離、右側迷走神経ノ背核上半部ヲ刺戟ス。而ル時ハ刺戟後直チニ緩縮筋ニ於テハ其振幅ニハ著明ナル變化ナキモ、10秒間ノ震盪數對照ノ8回ヨリ刺戟後ノ19回ニ増加スルニ反シ、急縮筋ニテハ其振幅及震盪數共ニ増大シ刺戟後斯カル状態ハ約20秒間持續シ後漸次ニ恢復ス。

動物. Nr. 3. ♀ 1950.0瓦

第1回破壊左側迷路、第2回破壊右側迷路、左側水平ニ眼筋分離、左側迷走神経背核ノ上半部ヲ刺戟ス。

刺戟後直チニ緩縮筋ニテハ、其振幅對照ノ7.5mmヨリ刺戟後ノ9.0mmニ増大スルヲ認メ、10秒間ノ震盪數12回ヨリ32回ニ増加シ、急縮筋ニテモ、同ジク其振幅及單位時間震盪數ノ著明ナル増大ヲ來タス。尙斯カル變化ハ刺戟後32秒間持續シ後漸次ニ舊ニ復ス。

動物. Nr. 4. ♀ 1800.0瓦

第1回破壊左側迷路、第2回破壊右側迷路、左側水平ニ眼筋分離、左側迷走神経背核ノ上半部ヲ電氣刺戟ス。電流ノ強サ、電源2_Lボルト⁷捲軸距離12、而ル時ハ電流放射後直チニ緩縮筋ニ於テ其振幅對照ノ6.5mmヨリ刺戟後ノ8.0mmニ増大シ、10秒間ノ震盪數對照ノ11回ヨリ刺戟後ノ27回ニ増加ス。急縮筋ニテモ同様ニ著明ナル震盪數及振幅ノ増大ヲ招來スルモ、斯カル現象ハ電流遮斷後ハ直チニ舊ニ復ス。

動物. Nr. 5. ♂ 2000.0瓦

第1回破壊左側迷路、第2回破壊右側迷路、左側水平ニ眼筋分離右側迷走神経背核ノ上半部ヲ刺戟ス。電流ノ強度電源2_Lボルト⁷、捲軸距離12、2秒間ノ潜伏期ヲ置キ。先ツ緩縮筋ニテハ其振幅對照ノ8.5mmヨリ刺戟後ノ10.0mmニ増大シ、10秒間ノ震盪數對照ノ13回ヨリ刺戟後ノ23回ニ増加シ、急縮筋ニテモ著明ナル震盪數及振幅ノ増加及増大ヲ認メ、電流遮斷後ハ漸次舊ニ復ス。

動物. Nr. 6. ♂ 1800.0瓦

第1回破壊左側迷路、第2回破壊右側迷路、左側水平ニ眼筋分離、左側迷走神経背核ノ上半部ヲ電氣刺戟ス、電流ノ強サ電源2_Lボルト⁷捲軸距離、12、刺戟直後ヨリ緩縮筋ノ振幅對照ノ7.5mmヨリ刺戟後ノ10.5mmニ増大シ、10秒間ノ震盪數對照ノ16回ヨリ28回ニ増加ス。急縮筋ニテモ同様ニ其振幅及震盪數ノ著明ナル増加乃至増大ヲ來スモ電流遮斷後ハ直ニ舊ニ復ス。

實驗成績總括並ニ考按

刺戟法及感應電氣刺戟ヲ迷走神経背核ノ上半部ニ應用スル時ハ代償性眼球震盪ノ振幅ヲ増大シ、單位時間ノ震盪數ヲ増加ス。而シテ迷走神経背核ノ左側ニ於ケル刺戟ハ第一回迷路破壊側ノ如何ニ係ラズ右側ニ於ケル刺戟ノ場合ヨリ本眼震ノ亢進ハヨリ強度ニ現ハル。更ニ刺戟及電氣刺戟ヲ迷走神経背核ノ上半部ノ附近又ハ背核ノ後部ニ應用スル際ハ斯カル影響ハ惹起スルコトナキカ又ハ極メテ僅カニ影響サル、ヲ認ム。斯クノ如キ事實ハ Sanghton ノ胃ノ運動ヲ對照トセル實驗成績ト一致スルモノニシテ、高橋、其他ガ前庭神経中核核ノ中三角核ト迷走神経背核トノ間ニ纖維ノ連合ヲ認ムルモ迷路性眼球震盪トハ何等ノ交渉ヲ有セスルニ對シ、逆ニ迷走神経背核ニ刺戟ヲ與フル時ハ中樞性眼球震盪ニハ一定ノ影響ヲ與フルノ事實ヨリ按ズル時ハ迷走神経背核

ヨリ前庭神經中樞核ニ至ル何等カノ連絡アルヲ思考セシメ、且又第一回迷路破壊側ノ如何ニ係ラズ左側背核ヲ刺戟スル時ハ右側ノ背核ヲ刺戟スル場合ヨリ常ニ、代償性眼球震盪ノ興奮ガヨリ強度ニ現ハル、ノ事實ハ左右ノ前庭神經中樞核間ニモ何等カノ交渉ノ存在スルヲ思ハシムルモノナリ。

結 論

- 1) 迷走神經背核ヲ刺戟スル時ハ中樞性代償性眼球震盪ニ質的ニ一定ノ影響ヲ與フ。
- 2) 代償性眼球震盪ハ第一回迷路破壊側ノ如何ニ係ハラズ、迷走神經背核ノ右側ヲ刺戟スル場合ヨリ左側ヲ刺戟スル際ノ方^々ニ強度ニ影響サル。
- 3) 中樞性代償性眼球震盪ハ迷走神經背核ノ上半部ヲ刺戟スル場合最モ強度ニ興奮ス。

主 要 文 献

- 1) **Bechterew**; Ergebnis der Durchschneidung des N. acusticus, nebst Erörterung der Bedeutung der semicircul. Canäle für das Körpergleichgewicht. Pflüger's Arch. Bd. 30 (1883).
- 2) **N. B. Laughton**; The effect on the stomach of stimulation of the dorsal vagus nuclei. American Journal of Physiol. June I, (1929).
- 3) **Spiegel, Demetriades**; Der Einfluss des Vestibularapparates auf das Gefäßsystem. Arch. f. gesamte Physiol. (1922).
- 4) **Claude Bernard**; Müller's die Lebensnerven. S. 279. (1914).
- 5) **布施**; 小腦ト植物性神經系トノ關係ニ關スル疑義, 神經學雜誌, 第三十二卷, 第二號 及第三號.
- 6) **久米**; 代償性眼球震盪ノ實驗的研究. 耳鼻咽喉科臨床. 第二十一卷, 第三號.
- 7) **高橋**; 前庭神經中樞核ト迷走神經背核トノ結合ニ就テ. 耳鼻咽喉科臨床. 第二十六卷, 第二號.

附 圖 說 明

A圖 刺針刺戟(迷走神經背核)

1. 急縮筋
2. 緩縮筋
3. Pro. Sek.

B圖 電氣刺戟(迷走神經背核)

1. 電氣刺戟曲線
2. 急縮筋
3. 緩縮筋
4. Pro. Sek.

吉武論文附圖

Ueber den Einfluss der Reizung des Nucl. dorsalis nervi vagi auf den kompensatorischen Nystagmus.

Von

Dr. K. YOSHITAKE

[Aus dem Oto-rhino-laryngologischen Institute der kaiserlichen
Universität zu Kyoto. (Direktor: Prof. T. HOSHINO.)]

Der Verfasser studiert beim Kaninchen den Einfluss der Reizung mit dem Nadelstich und dem Galvanismus an dem Nucl. dorsalis nervi vagi auf den kompensatorischen Nystagmus und kommt zu folgenden Resultaten :

1) Wenn man an dem dorsalen Vaguskern elektrisch reizt, vergrößert sich die Amplitude und vermehrt sich die Schlagzahl des kompensatorischen Nystagmus.

2) Wenn man an dem dorsalen Vaguskern mit einer Nadel reizt, vergrößert sich die Amplitude und vermehrt sich die Schlagzahl des kompensatorischen Nystagmus.

3) Bei der Reizung mit Nadelstich und dem Galvanismus an die linke Seite des dorsalen Vaguskerns tritt stärker Erregung des kompensatorischen Nystagmus auf, als an die rechte Seite desselben.

4) Wenn man oberhalb des dorsalen Vaguskerns reizt, so tritt deutliche Erregung des kompensatorischen Nystagmus.