研 究

中枢性平衡障害例の視運動眼振の研究

すず 鈴 き 木 とも 智 お 雄*

目 次

I 緒 言	(I) 中枢性平衡障害例の視運動眼振検査成績
II 検査方法	A 大脳腫瘍
A 一般平衡機能検査	B 大脳核障害
B 視運動眼振検査	C 小脳障害
a 装置	D 視床, 四丘体部, 橋脳, 延髄障害
b 検査条件	E 小脳橋角部腫瘍
c パラメータ及び判定	(II) 視運動眼振異常と自発眼振
d 視運動眼振の自動分析	(III) 視運動眼振異常と迷路眼振異常
III 被 験 者	V 総 括
IV 検査成績	VI 結 語

I 緒 言

視運動眼振検査は Bárány (1921) により臨床検査に導入されて以来, 半盲症の検査 (Bárány, 1921, Cods, 1926, J. Ohm, 1932) 視力検査 (J. Ohm, 1949) 眼運動障害例の検査 (Dodge & Fox, 1928, Kornmüller, 1931) 中枢神経障害例の検査 (Bárány, 1921, Fox & Holmes, 1926, Cogan & Loeb, 1949, Carmicheal, Dix & Hallpike, 1954, 森本, 1954, 佐藤, 1955, J. Ohm, 1955, Enoksson, 1956, Smith & Cogan, 1959, 1960, Smith, 1963, Jung & Kornhuber, 1964, Davidoff et al, 1966, 坂田ら, 1966, 1968, 石川, 1970) に用いられてきた. 更に, 近時は脳循環不全, 頭部外傷後遺症によるめまい・平衡障害を平衡機能の面から検討する需要が増加し, 耳鼻科医が, 前庭性めまい, 平衡障害例の診断のみならず, 中枢性めまい・平衡障害例の診断をも守備範囲とするに到り, 平衡機能検査の一環として視運動眼振検査の重要性が唱えられるようになっている. 昭和45年, 日本平衡神経科学会で行われた平衡機能検査法の基準化においても視運動眼振検査が一部門として取りあげられている. 時田 (1968, 1969) は平衡機能検査の1つとして視運動眼振検査が必要な理由を次の如く述べている. 第一の特徴は, 生理的な眼振の検査である点である. 迷路刺激眼振検査 (温度眼振, 回転後眼振検査) が眼振の機能である“眼前を相次いで移動する対象物を中心窩に把え明視する”ことと関係のない非生理的な眼振の検査であるのに対し, 視運動眼振

Optokinetic nystagmus in the cases with central equilibrium disturbances.

Tomoo Suzuki

* 岐阜大学医学部耳鼻咽喉科学教室 (主任: 福田 精教授)

検査は眼振本来の働きを検査するものである。眼振検査において視運動眼振、迷路性眼振両者の特質を理解し、両者を比較検討すれば眼振異常の性質をよりよく把握することができる。第二の特徴は、視性一眼反射路の検査を行うことである。本反射は網膜→上丘→網様体→眼運動核を介する反射で、大脳、小脳、脳幹網様体がこの反射に促進、抑制を与えているので、視運動眼振検査により、これらの部位の異常を検出することができる。第三の特徴は、視性の平衡機能を検査しうることである。視運動眼振検査で動く対象物に対する眼の適応能力を検査することにより球技選手の優れた眼の機能、あるいは飲酒時の固視機能の破綻を捉えることができる。

福田(1971)は「平衡機能検査」の冒頭に次の如く述べている。『視性眼振はめまいおよび Ataxia の routine test として検査さるべきである。その理由は、optokinetic nystagmus の反射路は単に optokinetic nystagmus を発来するのみならず、同時に激しいめまいおよび Ataxia を正常人の誰にも惹起することを注目したい。しかし、このめまいおよび Ataxia は前庭迷路とは何の関係もない。よって一般の愁訴としてめまいおよび Ataxia が訴えられた場合、これを直ちに前庭迷路のみに結び、いわゆる vestibular test に終始することなく、視性反射検査の見地に立って、めまいおよび Ataxia の他覚的所見を求むべきである。この視刺激を与えて実験的に惹起される視性のめまいおよび Ataxia は視性眼反射路のどこかに恒常的の病変があれば、この反射路の病状として、めまいおよび Ataxia を特発性に発来することは当然考えられる。よって検査にあたっては、従来の前庭機能検査に終ることなく、さらに視性眼振の検査が routine に行われ、この反射路の何処かに存する病的所見を探すべきである。従来前庭機能検査と呼ばれていたテストを平衡機能検査と呼ぶに到った原因はここにある。すなわち optokinetic reflex の検査を新らしく加えたからである。』

このように視運動眼振検査の重要性が確認せられるに伴い眼振検査法にも検討が加えられている。すなわち視運動刺激装置としては Jung 型あるいは Ohm 型装置の優れていることは平衡神経学会の Workshop においても認められた。しかし得られた眼振の分析、成績の解釈、異常の分類についてまだ標準となる良い方法が確立されているとはいえない。眼振電計の普及した現在においても、定量的な眼振検査法は確立されていない。従来行われている方法を見ると、大きく二つに分けることができる。一つは眼振の波形を一つずつ見うる速度で記録を行い、波形、眼振数を計測する方法であり、一つは眼振を遅い paper 速度で記録し、眼振発来の型を pattern としてみる方法である。前者においては従来の方法は数量化が不充分であった。後者としては鈴木ら(1961)の提唱する OKP-test がある。眼振波形を pattern として把える方法であり、臨床検査として簡易な利点はあるが、眼振の評価が主観的でかつ眼振の性質を定量的に解析しうるものではない。この問題を解決するため、我々(時田, 1972)は視運動眼振検査法として計測法と呼ぶ方法を考案、提唱しつつある。

眼振のパラメータとして打数、速度、振巾を取り上げ、等加速度視運動刺激に対する眼振発来経過の正常値(信頼限界、棄却限界)を算出し、この値を図示し、この図中に被験者の計測値を記入し、成績を評価する方法である。この方法は①正常域が明確であること、②患者における測定値が数値で正常者の値と比較するので成績の判定が容易であること、③各種のパラメータを使用するので異常の性質の把握がしやすい利点がある。更にこの計測を容易にするため眼振自動処理装置を製作した。

著者はこの視運動眼振検査法を用い、中枢性平衡障害例の検査を行い、眼振を客観的に評価することにより、各部の障害で生ずる視運動眼振異常の性質をよりよく把握することができたので報告する。

II 検査方法

本研究の対象とした症例には視運動眼振検査とともに平衡機能検査を行った。

A. 一般平衡機能検査

a. 立直り反射検査：直立検査，マン氏検査，単脚起立検査。

b. 偏倚検査：書字検査 (Fukuda, 1959)，足踏検査 (Fukuda, 1959)。

c. 自発眼振検査：自発眼振（裸眼，坐位，正面視およびフレンツェル眼鏡下，坐位，正面視）検査，注視眼振検査，頭位眼振検査，頭位変換眼振検査。

d. 迷路刺激眼振検査：回転後眼振検査（クプロメトリー，Bárány 回転），温度眼振検査。

判定は1961年の日本前庭研究会において規定された判定基準に従った。なお，回転後眼振検査のクプロメトリーの正常範囲は $30^\circ/\text{sec}$ の場合回転後眼振の持続時間が6秒～22秒， $60^\circ/\text{sec}$ の場合の持続時間は13秒～32秒である。Bárány 回転（20秒，10回転刺激）の場合の正常範囲は回転後眼振の持続時間が16秒～39秒である。正常範囲を下まわるものを hyponystagmus，上まわるものを hypernystagmus とした。温度検査は，冷温交互試験（ 30°C の冷水， 44°C の温水を 20ml，10秒かけて注入）を行い，眼振持続時間で左右20%以上の差のあるものを異常 (CP, DP, CP+DP) とした。

B. 視運動眼振検査

a. 装置

1. 水平眼振検査

(1) 回転大円筒 (Ohm 型回転大円筒)：直径 2 m，高さ 2 m，内面に幅 5 cm の黒い線条を付してある。線条数は12本である。なお昭和45年8月以前は16本である。(2) 回転ドラム：直径 90 cm，幅 50 cm，表面に幅 5 cm の黒線が8本等間隔に付してある。この装置は被験者が坐位を取れぬ場合，ベッドで寝たまま検査する為である。

2. 垂直眼振検査

(1) Jung 型スクリーン投影装置：幅 90 cm，半径 95 cm，周囲 150° の投影式，スリットは12本でスクリーンに 3 cm 幅の白色光線が投影される。(2) 回転ドラム：直径 90 cm，幅 50 cm で表面に幅 5 cm の黒線が8本等間隔に付してある。この装置は昭和45年4月以前に使用。

3. 視標追跡運動装置

リオン K.K 製 NY-82 型視運動刺激装置。この装置にて水平振子運動を起させる。

b. 検査条件

1. 刺激

(1) 水平眼振検査：① 回転大円筒；線条数12本の場合は $2^\circ/\text{sec}^2$ ，90秒間で最終円筒速度は $180^\circ/\text{sec}$ である。なお線条数16本の場合は $3^\circ/\text{sec}^2$ ，60秒間で最終円筒速度は $180^\circ/\text{sec}$ である。② 回転ドラム； $3^\circ/\text{sec}^2$ ，60秒間，最終ドラム速度は $180^\circ/\text{sec}$ である。

(2) 垂直眼振検査：① Jung 型投影装置； $1^\circ/\text{sec}^2$ ，90秒間，最終線条速度 $90^\circ/\text{sec}$ である。② 回転ドラム； $3^\circ/\text{sec}^2$ ，60秒間で最終ドラム速度は $180^\circ/\text{sec}$ である。

(3) 視標追跡運動検査：0.5cps の水平振子運動刺激。

2. 被験者の位置

(1) 水平眼振検査：① 回転大円筒；被験者を円筒の中央に置いた椅子に坐らせ，頭部を支持台で固定し，眼前を横切る線条を1本1本数えて見る様に指示し視刺激終了後は直ちに閉眼させた。(2) 回転ドラム；被験者をベッドに寝かせたまま，眼前 50 cm に置いたドラムを右および左に回転させる。

(2) 垂直眼振検査：① Jung 型投影装置；スクリーンより 95 cm の所に坐らせ，頭部を支持台で固定する。② 回転ドラム；ドラムより 50 cm の所に坐らせ，頭部を支持台で固定する。

(3) 視標追跡運動検査：視標前 70 cm の所に頭部を支持台で固定し，坐らせる。

3. 記録

眼振記録には三栄測器製 6 channel の眼振電計を用いた。第 1ch. には時定数 1.5 の水平眼振波形、第 2ch. には時定数 0.03 の水平眼振波形、第 3ch. には時定数 1.5 の垂直眼振波形、第 4ch. には時定数 0.03 の垂直眼振波形、第 5ch. には円筒あるいは線条速度、第 6ch. には線条シグナルを記録した。

導出電極は AC 記録には直径 1 cm の皿状銀電極、DC 記録には直径 1 cm の E.M.I. Ruber suction cup surface electrode を使用した。電極糊は日本光電製脳波用ペーストを使用した。

水平眼振誘導には左右外眼角より 1 cm 外方に電極を伴創膏で固定して行った。垂直眼振誘導には一側の上眼窩と下眼窩に電極を固定した。較正は眼球運動の偏位角 10 度が記録上 1 cm になる様にした。また眼振記録において右向き眼振（円筒左回転）および上向き眼振（下向き視運動刺激）は波形の急速相が中心線上より上

に、左向き眼振（円筒右回転）および下向き眼振（上向き視運動刺激）は急速相が中心線上より下方に記録される様にした。振盪野を測定する場合には第 1, 第 3ch. を直流増幅器に切り換えた。

上記の如く、水平、垂直眼振を同時に記録し、合わせて円筒の速度、および線条のシグナルも同時に記録した。記録用紙の速度は 10mm/sec とした。図 1 は上記の方法による正常人の眼振電図 (ENG) 記録の 1 例である。本例では水平眼振のみ示してある。

c. パラメータおよび判定

眼振電図の記録より次の事項の観察、計測を行った。この方法は岐大耳鼻科の提唱する計測法（時田，1972）に従ったものである。

1. 水平眼振検査

(1) 波形

第 1ch. の記録（時定数 1.5 あるいは DC の眼振波形）より緩徐相、急速相の波形を観察し

図 1 正常人の眼振電図記録（刺激：水平右回転， $2^{\circ}/\text{sec}^2$ ，90秒）

た。正常な緩徐相は滑らかな波形であり、鋸歯状、階段状にはならない。正常な急速相は直線的な動きである。

(2) 方向

正常では視刺激と反対方向に視運動眼振の急速相が出現するが、視刺激と同方向に急速相が出現する場合を錯倒という。

(3) 打数（眼振数）

90秒間の眼振総数を計測するとともに、90秒間の ENG 記録を10秒ごとに9つに区分し、各10秒間の眼振数を計測し、正常人の95%の信頼限界、5%の危険率における棄却限界を印刷した図に記入する。棄却限界の上限を上まわる場合を高頻度眼振、棄却限界の下限を下まわる場合を低頻度眼振とする。なお視刺激開始から optokinetic adaptation limit の $60^\circ/\text{sec}$ までを低速部、それ以後を高速部と呼ぶ。

(4) 眼球速度（緩徐相、急速相）

(i) 緩徐相速度

90秒間の ENG 記録を10秒毎に9つに区分し、各10秒間における緩徐相速度の平均を正常人の信頼限界、棄却限界を印刷した図に記入する。棄却限界の上限を上まわる場合を高速部、棄却限界の下限を下まわる場合を低速部という。なお視刺激開始から optokinetic adaptation limit の $60^\circ/\text{sec}$ までを低速部、それ以後を高速部と呼ぶ。

(ii) 急速相速度

第2ch.の時定数0.03記録より各10秒間における急速相速度の平均を信頼限界、棄却限界の印刷してある図に記入する。棄却限界の上限を上まわる場合を高速部、棄却限界の下限を下まわる場合を低速部と呼ぶ。

なお高眼振 (hypernystagmus) という言葉は高頻度眼振および、あるいは高速度眼振をさして用いる。また低眼振 (hyponystagmus) は低頻度眼振および、あるいは低速度眼振をさして用いる。

(5) 振巾

90秒間の ENG 記録を9つに区分し、各10

秒間の眼振振巾の平均を測定する。棄却限界の上限を上まわる場合を大振巾、棄却限界の下限を下まわる場合を小振巾とよぶ。なお、振巾の性質を知るために、10秒間毎の振巾 histogram を作り、検討した例もある。

(6) 振盪野

90秒間の ENG 記録 (DC) において、各眼振1つずつの緩徐相の中点を計り、基線との距離を測定する。この場合、基線の偏倚を生ずる例が少なくないので、記録終了時、基線が5mm以上偏倚しないことが条件である。振盪野は遅い刺激の間は急速相側によるが、刺激が少し強くなると一時振盪野は緩徐相側に移り、更に刺激が増加すると中央に戻る。なお、これは全例には検査してない。

(7) 後眼振

90秒間の視刺激終了と同時に閉眼させる。視刺激停止後10秒以上眼振が持続する例を後眼振陽性とした。

(8) 左右差

(i) 正常範囲（両側棄却限界）内での左右差

1側が信頼限界の上限より上で、棄却限界の上限より下、他側が信頼限界の下限より下で、棄却限界の下限より上の場合、これを非対称とよぶ。

(ii) 1側が棄却限界を出た場合の左右差

i) 1側が棄却限界の上限より上で、他側が棄却限界の上限より下の場合患側の判明した症例においては、患側あるいは健側（右あるいは左）向き高眼振あるいは大振巾眼振と呼ぶ。

患側不明の例は単に右あるいは左向き高眼振、あるいは大振巾眼振とよぶ。

ii) 1側が棄却限界の下限より下で、他側が棄却限界の下限より上の場合。

上記i)の高眼振を低眼振、大振巾眼振を小振巾眼振とかえて用いる。

(iii) 両側が棄却限界を出た場合の左右差

i) 両側とも棄却限界の上限をこえ、9つの測定値の3つ以上において20%以上の差のある場合。

患側の判明した例においては両側高眼振, あるいは大振巾眼振, 患側あるいは健側 (右あるいは左) 向き眼振高度と呼ぶ。

患側不明の例においては両側高眼振あるいは大振巾眼振, 右あるいは左向き高度と呼ぶ。

ii) 両側とも棄却限界の下限を下まわり, 9つの測定値の3つ以上において20%以上の差のある場合。

上記 i) の高眼振を低眼振, 大振巾眼振を小振巾眼振とかえて用いる。

なお $3^\circ/\text{sec}^2$, 60秒間の刺激の場合は, ENG記録を6つに区分し, 各10秒間毎に打数, 眼球速度, 振巾を測定し, $3^\circ/\text{sec}^2$, 60秒間の刺激における正常値と比較検討した。垂直眼振も同様である。

2. 垂直眼振検査

垂直眼振は緩徐相, 急速相の波形および90秒間の眼振数の発来経過を10秒毎に9つに区分し, 各10秒間の眼振数を観察したが, 結果の判定は正常, 低頻度, 高頻度とした。なお文中垂直眼振検査のみ垂直眼振と記載し, 他は水平眼振を意味する。

3. 視標追跡運動検査

視標を円滑に追跡できる場合を正常, その他のものを階段状と判定した。

d. 視運動眼振の自動分析

被験者から得られた眼振記録より総眼振数, 10秒間毎の眼振数, 10秒間毎の平均緩徐相速度, 10秒間毎の平均振巾を的手法にて計測するには時間がかかり, 短時間に客観的に所見を得ることは非常に困難である。よってこの眼振分析には時田の指導により日本光電で特別製作された眼振処理専用コンピュータを用い, 記録と

同時に判定ができる様にした。

この装置は (i)AD 変換, 演算部分 (ii)記憶表示部分 (iii)モニター用ブラウン管 (日本光電製 VC-7A) (iv)X-Y レコーダ (渡辺測器製) より成っている。眼振電計とこの眼振処理専用コンピュータを on-line で連結し, モニター用のブラウン管上の波形 (眼振電計の第1ch. および第2ch. の波形が入っている) を観察し, 処理装置への入力を調節した。入力は眼球偏倚角10度を1V, 眼球速度波形10度を0.25Vにした。マーカーにて視刺激開始と終了をマークした。

以上の如くセットし, 第1ch. (振巾計測用) の波形の基線をブラウン管上の計測用の第1基線に合せ, 次いで第2ch. (眼振数および緩徐相速度計測用) の波形の基線をブラウン管上の計測用の第2基線に合わせる。

検査開始のマーカーのスイッチとともに眼振電計が作動し, (i)経時的に眼振数を計測し, 処理装置パネル上の Counter に表示するとともに, (ii)10秒間毎の眼振数の計測, (iii)10秒間毎の平均緩徐相速度の計測, (iv)10秒間毎の平均振巾の計測を行う。90秒間の計測終了時90秒間の総眼振数が Counter に表示され, 眼振数, 緩徐相速度, 振巾の計測値が記憶されている切り換えスイッチと Display のボタンを押すことにより, 各々の10秒間毎の発来経過がブラウン管上にプロットとして表示される。また read out ボタンを押すことにより, この値を X-Y レコーダ上に置いた眼振数, 緩徐相速度, 振巾の信頼限界, 棄却限界を印刷した図上に書き出すことができる。この記録より検査値が正常か否か判定する。

III 被 験 者

病理解剖, 手術, 神経学的検査によって, 障害部位の明らかになった中枢性平衡障害例36例である。内訳は大脳腫瘍8例, 大脳核障害7例,

小脳腫瘍5例, 小脳変性症5例, 視床腫瘍1例, 四丘体部腫瘍1例, 橋脳血管障害2例, 延髄腫瘍1例, 小脳橋角部腫瘍6例である。

IV 検 査 成 績

〔I〕 中枢性平衡障害例の視運動眼振検査成績

A. 大脳腫瘍

a. 被検者

大脳腫瘍症例 8 例. 内訳は前頭脳腫瘍 (falx-meningioma 4 例, oligodendroglioma 1 例) 5 例, 頭頂・側頭葉腫瘍 (round cell sarcoma) 1 例, 後頭葉腫瘍 (glioma) 1 例, 側脳室腫瘍 (chorioid plexus papilloma) 1 例である. なお腫瘍局在の分類は Tönnis による.

b. 前頭脳腫瘍

1. 検査成績

症例: bilateral falx meningioma U.N. 28 才. 女.

病歴: 昭和 45 年 10 月頃より両手指のシビレ感, 視力障害 (眼がかすむ) あり. 12 月頃より左前腕の筋硬直, 左難聴, 言語障害および歩行時のふらつきおよび左方に偏倚を認む. 昭和 46 年 1 月 8 日本院第 2 外科に入院. 神経症状として左咽頭後壁の知覚鈍麻あり.

手術所見: 2 月 2 日, 開頭術施行. 大脳鎌より前後径 6 cm, 横径 4.5 cm, おおよそ鶏卵大, 暗赤色の腫瘍が発生. 両側の前頭葉にこの腫瘍による圧迫の為, 軽度の浮腫が認められた. 病理組織診断は falx meningioma であった.

耳鼻科検査: 昭和 45 年 10 月 22 日.

聴力検査: 右 5~25db 水平型感音系難聴, 左 10~60db 低音障害型感音系難聴.

平衡機能検査: 立直り反射検査; 開眼にて中等度, 閉眼にて高度障害, 転倒する. 偏倚検査; 書字検査では左へ 4° 偏書. 足踏検査は閉眼, 直立不能の為できず. 自発眼振検査; 自発眼振は裸眼 (坐位, 正面視) にて認めず, フレンツェル眼鏡下 (坐位, 正面視) では左向き 10/7" の水平眼振を認めた. 注視眼振, 右注視時右向き 10/12" の水平眼振を認めた. 頭位眼振は認めなかった. 迷路刺激眼振検査: 回転検査; クブローメリーにて 30°/sec で右回転 13/16", 左回転

32/23", 60°/sec で右回転 44/24", 左回転 50/33". 温度検査では冷刺激で右耳 152/83", 左耳 93/181", 温刺激で右耳 153/100", 左耳 49/50" を呈した.

視運動眼振検査: 図 2 は水平右回転時の記録である. 視刺激開始とともに小振巾で, 振巾がほぼ同じの眼振が発生している. この眼振は図中に示した線条シグナル (第 4ch.) に比べ, 数が多く, 線条と眼振の対応が直ちにはつかみ難い. 円筒右回転刺激 (図 2) および円筒左回転刺激に対する眼振数を計測し, 図示した結果は図 3 の如くである. すなわち円筒回転速度の遅い間 (右回転では 0~50 秒, 左回転では 0~30 秒) の眼振数は棄却限界を越えている. 総眼振数は右回転 347 打, 左回転 276 打であった.

緩徐相速度の計測値は図 4 に示す如くである. 右回転, 左回転ともに信頼限界よりは下まわっているが, 棄却限界内にあり正常である. 振巾の計測値は図 5 の如くである. 右回転, 左回転とも一部にて棄却限界を下まわっている. この振巾の性質を見る為に histogram を作った結果は図 6 の如くである. 視運動刺激負荷の全経過にわたって振巾はほとんど 0~10 度の小振巾である. すなわち本例の眼振は小振巾眼振である. 左右差を検討すると, 両側高眼振, 右向き高度. 振巾では左向き眼振が小振巾であった.

垂直眼振は下向き (上向き眼振), および上向き (下向き眼振) 視運動刺激に対して基線の動揺と区別しうる明瞭な眼振は認めなかった.

視標追跡運動は視標の動きと一致する眼運動を認め正常と判定した.

症例: bilateral falx meningioma T.Y. 28 才. 男.

病歴: 昭和 43 年 4 月より左側頭部から後頭部にかけて, 頭痛が強くなった. 45 年 9 月車を運転中突然眼前暗黒感を 1 度だけきたしたが, 30 秒ほどにて止まった. 10 月には左側頭痛, 左肩こりをきたした. 45 年 10 月 12 日本院第 2 外科へ入

図2 両側前頭脳腫瘍 (falx meningioma) 28才, 女.
刺激: 水平右回転, $2^\circ/\text{sec}^2$, 90秒

図3 両側前頭脳腫瘍 (falx meningioma) 28才, 女.
打数の発来経過. 両回転とも低速部で棄却限界上限を越えている.

図4 両側前頭脳腫瘍 (falx meningioma) 28才, 女.
 眼振緩徐相速度の発来経過.

図5 両側前頭脳腫瘍 (falx meningioma) 28才, 女.
 振巾の発来経過, 両回転とも一部にて棄却限界の下限を下まわっている.

院.

手術所見: 45年10月27日本院第2外科にて左
 頭頂開頭術施行. 両大脳鎌より腫瘍発生し, 両

側前頭葉を圧迫. 大きくて全摘できず. 病理組
 織診断にて falx meningioma であった.

耳鼻科検査: 45年10月22日.

図6 両側前頭脳腫瘍 (falx meningioma) 28才, 女.
振巾 histogram. 振巾は大部分 0~10°である.

平衡機能検査：自発, 注視, 頭位, 頭位変換眼振検査全てに眼振認めず. 迷路刺激眼振検査; 回転検査, 温度検査ともに正常であった.

視運動眼振検査：右回転, 左回転にて波形は正常, 方向も正常であった. 打数は10秒間毎の発来経過で棄却限界内にあり正常であった. 総眼振数は右回転 361打, 左回転 324打であった. 緩徐相, 急速相速度, 振巾も正常範囲内であり, 左右差も認めなかった.

垂直眼振は波形, 数とも正常であった.

視標追跡運動も視標を円滑に追跡し, 正常であった.

症例: l-falx meningioma 42才, 女.

病歴：昭和45年2月より前頭部に鈍痛, 46年8月頃よりバスの乗り降りに際して足がもつれ

る感じがした. 10月には全身の強直性痙攣があり, 10分間意識喪失. 同様な発作が以後3回あり, 昭和46年3月3日本院第2外科へ入院.

手術所見：3月11日本院第2外科にて両側前頭頭頂開頭術施行. 大脳鎌より 3×3×4cm の腫瘍発生. 病理組織診断にて falx meningioma であった.

耳鼻科検査：昭和46年3月10日.

平衡機能検査：自発眼振検査; 自発, 注視, 頭位, 頭位変換眼振検査全てに眼振認めず. 迷路刺激眼振検査; 回転検査, 温度検査にて正常であった.

視運動眼振検査：波形, 方向は両回転とも正常であった. 眼振数は右回転にて10秒間毎の発来経過にて, 視刺激開始から30秒までの低速部

において棄却限界を上まわり、高頻度眼振を呈した。総眼振数は238打であった。左回転時の眼振発来経過も棄却限界を低速部において上まわり高頻度を呈した。総眼振数は193打であった。緩徐相速度、急速相速度、振巾は両回転とも正常であった。後眼振は両回転にて認めた。左右差は両側高眼振、患側左向き高度であった。

垂直眼振では波形は正常であったが、下向きおよび上向き視運動刺激に対して眼振の解発が悪く、低頻度眼振を呈した。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず、階段状を呈した。

症例：r-oligodendroglioma 41才、女。

病歴：昭和45年7月某医にて記憶障害、性格の変化（短気、怒っぽい）を指摘された。11月勤務中急に何をしているのか分からなくなり、5分間意識喪失、悪心、嘔吐を来した。12月より頭痛、46年1月中旬より軽度の視力障害を来し、本院第2外科へ46年2月1日入院。神経症状として記憶障害、性格の変化を来した。

手術所見：2月16日本院第2外科にて右前頭開頭術施行。右側脳室の底部に拇指頭大の半球形、表面平滑な腫瘍を認めた。病理組織診断はoligodendrogliomaであった。

耳鼻科検査：昭和46年2月8日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発眼振認めず、右注視方向性眼振あり、頭位眼振検査にて左側臥位、懸垂頭位、仰臥位にて右への定方向性水平眼振を認めた。迷路刺激眼振検査；温度検査にて右へのDPを認めた。

視運動眼振検査：波形、方向は両回転とも正常であった。打数について、右回転にて10秒間毎の発来経過は低速部において棄却限界を上まわり、高頻度を呈した。総眼振数は219打であった。左回転でも低速部で高頻度を呈し、総眼振数は284打であった。緩徐相、急速相速度、振巾は両回転とも正常であった。左右差は数にて認められ、両側高眼振、患側右向き高度であった。

垂直眼振は下向き、上向き視運動刺激に対し

て波形正常にて打数も正常範囲内であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡し、正常であった。

症例：l-falx meningioma 38才、女。

病歴：昭和46年9月誘因なく、舌がもつれて上手に話しをする事ができなくなった。47年1月言語障害が増強し、歩行がぎこちなく、細かい作業ができなくなった。時期は不明であるが、左難聴および時々右耳鳴あり。昭和47年2月25日本院第2外科へ入院。神経症状として軽度の記憶、注意力、指南力障害あり、熟練運動障害を認めた。

手術所見：3月2日本院第2外科にて手術。大脳鎌より3×3×3cm大の腫瘍発生し左前頭葉を圧迫。病理組織診断の結果falx meningiomaであった。

耳鼻科検査：昭和47年3月16日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査、温度検査にて正常であった。

視運動眼振検査：右回転、左回転とも波形、方向正常、打数も10秒間毎の発来経過は棄却限界内にあり正常。総眼振数は右回転182打、左回転160打であった。緩徐相、急速相速度、振巾何れも正常であった。左右差は認められなかった。

垂直眼振は下、上向き視運動刺激とも波形正常であり、数も正常範囲内であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず階段状波を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

以上前頭脳腫瘍5例の視運動眼振成績をまとめると次の如くである。波形、方向は5例とも正常であった。眼振数は5例中3例にて低速部で高頻度を示した。緩徐相、急速相速度は5例とも正常であった。振巾は5例中1例で小振巾を示した。左右差を検討すると、障害が両側であった1例では、数、振巾にて左右差を認めた。腫瘍が1側性であった3例中2例は数にて左右差を認め、患側向き眼振が高頻度であったが、

緩徐相, 急速相速度, 振巾においては左右差を認めなかった。

垂直眼振では波形は1例で緩徐相が鋸歯状であり, 1例は基線が動揺するだけであった。数は5例中2例で低頻度眼振であり, うち1例は基線の動揺のみで測定不能であった。

視標追跡運動は5例中2例で階段状波を呈した。

c. 頭頂・側頭葉腫瘍

1. 検査成績

症例: r-round cell sarcoma H.S. 43才. 男.

病歴: 昭和41年誘因なく突然全身の強直性痙攣を来し約30分意識喪失, 以後3年間に年2回の割で同様な発作あり。昭和45年2月頃より右側頭部および後頭部にかけて強い頭痛を来した。昭和45年3月16日本院第2外科へ入院。

手術所見: 3月31日本院第2外科にて右減圧開頭術施行。右側頭葉より一部組織採取。病理組織診断にて round cell sarcoma であり, ^{60}Co 照射をし, 右頭頂, 側頭葉に手拳頭大の陥凹を認める。視野検査にて左同側半盲を認めた。

耳鼻科検査: 昭和46年4月22日。

聴力検査: 右 0~15db, 左 40~80db の高音障害型感音系難聴。

平衡機能検査: 立直り反射検査; 開閉眼ともに中等度障害。偏倚検査; 書字検査で右 3° 偏書, 足踏検査で右 150° 回転し, 病的偏倚を認めた。自発眼振検査; 自発, 注視, 頭位, 頭位変換眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査; 回転検査, クプロメトリーにて 30°/sec で右回転 12/19'', 左回転 13/21'', 60°/sec で右回転 23/28'', 左回転 25/27''. Bárány 回転は右回転 62/30'', 左回転 63/28'' であった。温度検査は冷刺激で右耳 70/90'', 左耳 65/99'', 温刺激で右耳 53/102'', 左耳 82/126'' であった。

視運動眼振検査: 右回転, 左回転時の記録は図7の如くである。第1ch. に L-nyst (円筒右回転), 第2ch. に R-nyst (円筒左回転) が並べてある。第1ch. の左向きすなわち健側向き眼振の振巾が異常に小さいのが著明である。波

形は左向き, 右向き眼振とも緩徐相は正常であるが, 急速相では左向き眼振は視刺激開始から20秒位まで, 右向き眼振は視刺激開始から10秒位まで鋸歯状を呈している。方向は両回転とも正常であった。眼振数の計測値は図8の如くである。円筒速度 (cylinder speed) が 50°/sec 以上になると右回転, 左回転ともに棄却限界を下まわり, 高速部低頻度眼振である。健側左向き眼振が少ない傾向にある。総眼振数は右回転 144 打, 左回転 165 打であった。緩徐相速度の計測値は図9の如くである。右回転では円筒速度が 10°/sec 以上, 左回転では 40°/sec 以上になると, 棄却限界を下まわり, 右回転では全経過, 左回転では高速部において低速度を示した。健側左向き眼振が低速であり, 明らかに左右差を認める。急速相速度は右回転では低速度であったが, 左回転は正常であった。振巾の計測値は図10の如くである。眼振記録図からも一見して分るが, 図10の如く, 健側すなわち左向き眼振の振巾が棄却限界の下限を下まわり, 異常に小さく, 明らかに左右差を認める。左右差を検討すると, 緩徐相速度, 急速相速度, 振巾にて認められ, 健側左向き低眼振および小振巾眼振であった。

垂直眼振では波形は緩徐相, 急速相ともに正常であったが, 数は上向き眼振67打, 下向き眼振58打と低頻度であった。

視標追跡運動は視標を全然追跡しなかった。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形では緩徐相は正常であったが, 急速相は鋸歯状であった。方向は正常であった。打数は高速部になると低頻度を示した。緩徐相, 急速相速度は低速であった。振巾は小振巾を示した。左右差は緩徐相, 急速相速度, 振巾にて認められ, 健側向き低眼振を示した。

垂直眼振では波形は正常であったが, 打数は低頻度であった。

視標追跡運動では全然視標を追跡しなかった。

d. 後頭葉腫瘍

図7 右頭頂・側頭葉腫瘍 (round cell sarcoma) 43才. 男.
刺激: 水平右及び左回転, $2^\circ/\text{sec}^2$, 90秒
L-nyst は右回転時の眼振, R-nyst は左回転時の眼振である.
L-nyst が R-nyst に比べ振幅が小さい.

NUMBER OF NYSTAGMUS BEATS (MALE)

図8 右頭頂・側頭葉腫瘍 (round cell sarcoma) 43才. 男.
打数の発来経過, 両回転とも高速部になると棄却限界の下限を下まわる.

図9 右頭頂・側頭葉腫瘍 (round cell sarcoma) 43才. 男.
 眼振緩徐相速度の発来経過.

図10 右頭頂・側頭葉腫瘍 (round cell sarcoma) 43才. 男.
 振巾の発来経過. 右回転では棄却限界の下限を下まわっている.

1. 検査成績

症例: l-meningioma 48才. 女.

病歴: 昭和42年4月より左後頭部に強い頭痛

をきたし, 治療を受くも軽快せず, 11月より視力障害および視野狭窄をきたし, 左耳鳴時に眩暈を訴える様になり, 昭和43年2月20日本院第

2 外科に入院。視力：右眼 0.06 (0.8)，左眼 0.02 (0.5)。視野：右側同側半盲。

手術所見：2月29日開頭術施行。後頭葉に前後 5.4cm，左右 3.9cm，上下 4.2cm の腫瘍を認め摘出。

耳鼻科検査：昭和43年2月27日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発，注視，頭位眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；温度検査にて左向き DP を認めた。

視運動眼振検査：両回転とも波形，方向は正常であった。打数は全経過にわたり両回転とも低頻度であり，総眼振数は右回転91打，左回転60打であり，健側右向き眼振が左向き眼振に比べて少なかった。緩徐相速度は両回転とも低速であったが，急速相速度は正常であった。振巾は右回転にて小振巾を呈したが，左回転では正常であった。すなわち健側向き眼振が小振巾であった。左右差は健側向き低眼振および小振巾眼振であった。

垂直眼振では波形は緩徐相，急速相とも正常であったが，数は低頻度を示した。

視標追跡運動は検査をしなかった。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形，方向は正常，眼振数は低頻度，緩徐相速度は低速であったが，急速相速度は正常であった。振巾は健側向き眼振にて小振巾を呈した。左右差は打数，振巾にて認め，健側向きが低眼振および小振巾眼振であった。

垂直眼振では波形は正常であったが，打数は低頻度を示した。

e. 皮質下腫瘍

1. 検査成績

症例：側脳室腫瘍 (r-chorioid plexus papilloma) 22才。女。

病歴：昭和44年7月睡眠中に左上肢が後方にねじれ，次いで全身の硬直性痙攣を来し，意識喪失が約5分間あった。以後同様な発作が2ヶ月の間に2週間で1度の割合で起った。10月頃より発作が多くなり，11月下旬には左下肢の振顫，12月より左足に力が入らず，引きづって歩

く様になったが，次第によくなった。しかし1年後に同様な症状を再び来し45年12月11日本院第2外科へ入院した。

手術所見：昭和45年12月17日本院第2外科にて右頭頂・側頭開頭術施行。頭頂部の手の中枢に当る部位と思われる運動領の附近に茶褐色鳩卵大の腫瘍を認め，深部へ約6cm進入していた。病理組織診断では chorioid plexus papilloma であった。

耳鼻科検査：昭和45年12月14日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発，注視眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査にて両側 hypernystagmus を認めた。

視運動眼振検査：波形，方向は両回転とも正常であった。打数は10秒間毎の発来経過にて両回転とも高速部になると，低頻度を示した。総眼振数は右回転126打，左回転125打であった。緩徐相速度は両回転とも高速部になると低速を示したが，患側すなわち右向き眼振の緩徐相速度がより低速にて左右差を認めた。急速相速度は両回転とも正常であった。振巾は両回転とも棄却限界内であったが，患側右向き眼振の方が小さい傾向であった。左右差は両側低眼振患側右向きが高度に障害された。また振巾は非対称であった。

垂直眼振では波形は正常にて打数も棄却限界内であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡し正常であった。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形，方向は正常であった。打数は高速部に低頻度を示した。緩徐相速度は高速部において低速であった。急速相速度は正常であった。振巾は正常範囲であったが，非対称であった。垂直眼振は波形正常，数も正常であった。視標追跡運動も円滑で正常であった。

f. まとめ

表1は大脳腫瘍8例の検査成績のまとめである。

前頭脳腫瘍は打数において5例中3例が低速

表1 大 腦 腫 瘍（8例）

障害部位と例数 パラメータ			前 頭 脳 5	頭頂・側頭葉 1	後 頭 葉 1	皮 質 下 1
視 運 動 眼 振	水 平	波 形	正	正	正	正
		緩 徐 相 急 速 相	正	鋸 歯 状	正	正
		方 向	正	正	正	正
		打 数（10秒間毎）	低速部高頻度 3	高速部低頻度	全経過低頻度	高速部低頻度
		平均緩徐相速度（10秒間毎）	正	全経過低速度	全経過低速度	高速部低速度
		平均急速相速度（10秒間毎）	正	全経過低速度	正	正
		平 均 振 巾（10秒間毎）	小振巾 1	健側向き小振巾	健側向き小振巾	正
		振 盪 野	検査せず	偏倚せず	検査せず	検査せず
	垂 直	後 眼 振	+ 1	-	-	-
		左右差（数・速度・振巾）	両側高眼振にて 患側向き高度 両側高眼振にて 右向き高度	2 健側向き低眼振	健側向き低眼振	両側低眼振にて 患側向き高度
視 標 追 跡（水平）	垂 直	波 形	鋸歯状 1* 正 1*	正 正	正 正	正 正
		打 数（10秒間毎）	低頻度 2*	低頻度	低頻度	正

* 5 例中 1 例は基線の動揺と区別出来ず測定不能

部高頻度眼振であった。振巾は 5 例中 1 例で小振巾を認めた。左右差を示した 3 例中患側の分っている 2 例では、患側向き眼振が高頻度を示した。垂直眼振検査においては、水平眼振にて低速部高頻度を呈した 3 例中 2 例が低頻度眼振を示した。視標追跡運動検査では 3 例中 2 例が階段状を呈した。

頭頂・側頭葉腫瘍では波形は急速相で鋸歯状を呈した。打数は高速部低頻度、緩徐相、急速相速度はともに全経過低速度、振巾は小振巾であった。左右差を認め、健側向き低眼振および小振巾眼振であった。垂直眼振も低頻度であり、視標追跡運動は視標をほとんど追跡できなかった。

後頭葉腫瘍では打数は全経過低頻度で、緩徐相速度も全経過低速であった。振巾は健側向き小振巾であった。左右差を認め、健側向き低眼振および小振巾眼振であった。垂直眼振は低頻

度眼振であった。

皮質下腫瘍では高速部低頻度眼振で、緩徐相速度も高速部にて低速度であった。左右差を認め、両側低眼振であり、患側向きが高度であった。振巾は非対称であった。

g. 考按

以上、大脳腫瘍患者の視運動眼振検査結果について述べた。次に大脳障害で現われる視運動眼振異常について考按してみる。

1. 大脳と眼運動

大脳皮質は眼運動と密接な関係がある。前頭注視中枢、すなわち Brodman 第 8 領野は意志的な眼球運動、ことに探索運動 Spähbewegung を主として取扱い、後頭注視中枢 area praecoccipitalis (area 19) は視覚感覚によって発動せられ、また制禦せられる眼球運動を支配する中枢とされている。また側頭注視中枢が上側頭回転後半に存在するとされている(荻原, 1961)。

Vogt (1919) は猿, Foerster (1926) は人において, これらの部位の電気刺激で反対側に向う眼運動が現われることを明らかにしている。

従って, これらの大脳皮質領野, 更にこれらの中枢を連絡する神経線維の障害では, 視運動眼振に異常を来す可能性, また, 眼運動に対する機能の差に伴い, 障害部位により視運動眼振異常の型にも差を生ずる可能性, またこれらの眼運動皮質中枢は刺激で反対側へ向う眼運動を生ずることより, これらの部位の障害で, 眼振に左右差を来す可能性も当然考えられるわけである。

2. 視運動眼振異常をおこす部位について —文献的考察—

大脳障害例の視運動眼振異常については, Fox & Holmes (1926), Cogan & Loeb (1949), Carmichael, Dix & Hallpike (1954), 森本 (1954), 佐藤 (1955), Ohm (1955), Enoksson (1956), Smith & Cogan (1959), Smith (1963), Jung & Kornhuber (1964), Davidoff et al (1966) らの報告を認め, 動物における大脳破壊時の視運動眼振の観察は星野および南雲 (1923), 森本 (1954), 長谷川 (1956), Pasik et al (1959) らにより報告せられている。

大脳障害で視運動眼振異常を生ずる部位, またどのような視運動眼振異常を生ずるかについては, Fox & Holmes (1926) は臨床例の観察で障害が頭頂葉の下部, 側頭葉の後部, 第2前頭回転に存する時, 反対側に向う視運動眼振が障害されることを認め, 後頭葉, 第2前頭回転に存する視運動眼振の反射中枢が障害された時, また半球白質を通り両中枢を結ぶ線維が障害された時, 視運動眼振異常を生ずると解釈している。

Carmichael et al (1954) は臨床例で, 前頭葉, 側頭葉上部, 側頭葉前半の障害では視運動眼振に異常を示さず, 側頭葉の後半より supramarginal gyrus および angular gyrus での障害で, 障害側への視運動眼振の DP (directional preponderance) が起ることを報告している。佐藤 (1955) は頭頂, 側頭, 後頭葉

腫瘍で患側向き眼振の振巾が小となった例, 前頭葉腫瘍で健側への視運動眼振が出現しなかった例, 側頭葉腫瘍で患側向き眼振が発来しなかった例を報告している。Enoksson (1956) は大脳半球障害で健側向きの眼振が減少し, 時には不規則眼振を呈することを報告している。

Smith and Cogan (1959) は頭頂葉障害で視運動眼振に左右差 (positive optokinetic sign) を示し, 頭頂葉障害を含まない側頭, 後頭, 前頭葉障害では negative optokinetic sign を示したと報告している。Jung and Kornhuber (1964) は大脳半球障害において 障害と反対側に向う眼振が低減すること, 後頭, 頭頂, 側頭葉白質の大きい皮質下障害において視運動眼振の障害が著明で, 皮質障害のみでは視運動眼振異常は軽度であると記載している。Davidoff et al (1966) は臨床例の観察より大脳皮質に視運動眼振発現に関する特定の部位はなく, 半球白質の大きい障害が最も頻々水平眼振障害を起すと述べている。

動物実験においては星野, 南雲 (1923) はモルモット, 鳩において, 森本 (1954), 長谷川 (1955) は兎で片側の大脳皮質を除去すると視性・前庭性眼振とも術側向き DP が発現する。大脳における DP の責任領野は視性眼振では人の oculo-gyric area に当る領野4で, 後頭部, 側頭部を取っても視運動眼振数に差を生じないことを述べている。Pasik et al (1959) は猿において前頭, 頭頂, 側頭, 後頭葉を単独にあるいは色々の組合せで破壊し, 両側後頭葉を破壊し, 光に対する瞳孔反射, 瞬目反射以外の反射を失った場合, 視運動眼振の長期に亘る欠損を来すこと, 他の部位の障害では視運動眼振の欠損を生じなかったことを述べている。

以上大脳障害例の視運動眼振異常についての報告は, その責任を後頭, 前頭葉とする説 (Fox & Holmes), 後頭葉後部から頭頂葉とする説 (Hallpike), 頭頂葉とする説 (Smith) また半球白質の広範な障害とする説 (Jung & Kornhuber, Davidoff et al) がある。

我々の経験した例では、前頭葉腫瘍例、頭頂・側頭葉腫瘍例、後頭葉腫瘍例、何れにも視運動眼振異常を認めた。腫瘍は何れも皮質にのみ限局したのではなく、皮質下への障害を認めている。また対象が腫瘍例であるため腫瘍の発生した部位以外での圧迫も当然考えられるので、これらの例より大脳障害で、視運動眼振異常を生ずる部位に対し結論を下せるとは考えていない。しかし前頭葉腫瘍症例では高頻度視運動眼振を認め、頭頂・側頭葉腫瘍、後頭葉腫瘍例では健側向き眼振の小振巾と低頻度、低速度眼振を認め、障害部位によって性質の異なる視運動眼振異常を認めたことは、前頭葉、頭頂・側頭葉、後頭葉障害が各々特徴を持った視運動眼振異常を示す可能性のあることを示すものと考えている。このように、大脳のいずれの腫瘍においても視運動眼振異常を認めたことは、一つは我々の被験例が腫瘍例で視運動眼振異常を示し易い例であったこと、更に我々が各種の parameter において検査成績を数量的に評価する方法を用いた為と考えている。

3. 大脳障害で現われる視運動眼振異常の性質について

大脳障害で現われる視運動眼振異常の型としては、健側への眼振発来 of 障害 (Fox & Holmes, Enoksson), 視運動眼振の対称 (Smith & Cogan), 患側への眼振方向優位性 (Carmicheal et al) との記載が多い。表現に差があるが何れも健側への眼振発現の低減を意味している。Carmicheal et al は眼振方向優位性 DP との言葉を用いているが、迷路眼振における如く、hypernystagmus ではない。また佐藤は大脳障害では振巾の狭少の現われることを記載している。著者の経験例でも後頭葉腫瘍例、頭頂・側頭葉腫瘍例は健側向き眼振の減少、眼球速度の低下、振巾の狭少を示した。そして眼振数は低速部は正常範囲であったが、視運動刺激速度が増すと低減する傾向を認めた。また眼振数における低減より、眼球速度の低下で異常が明瞭であった。また眼振振巾の狭少も特徴的と考

えている。

前頭葉障害例はこの型と異なり、低速度の視運動刺激に対し振巾の同じ様な眼振の多発が認められた。従来視運動眼振異常は眼振の低減として発来し、迷路眼振における如き、hyperresponsiveness はない (Jung & Kornhuber) との記載もなされている。Henderson & Crosby (1949) は前頭葉の小さい障害で視運動眼振の増多を認め、後頭眼領野が視運動反射を司どり、前頭眼領野がこの働きに抑制作用を持つ為としている。Tokita et al は臨床例に現われる optokinetic hypernystagmus を臨床例で検討し、黄斑部変性症の症例において前頭葉障害例と同じ性質の optokinetic hypernystagmus を観察している。これらのことより前頭脳腫瘍例の視運動刺激低速部における高頻度眼振は、(i) 後頭葉への抑制の欠除、あるいは、(ii) 中枢性の foveal vision の障害を考えるべきと思っている。

4. 半盲との関係

半盲と視運動眼振異常の関係は古くから検討せられ、Bárány (1921) は半盲側より反対側に動く視運動刺激に対する眼振が出現し難いことを述べている。Ohm (1932) は半盲でも視運動眼振左右差を生ずる場合 (Bárány type) と、差を生じない場合 (Ohm type) のあることを記載している。Cords (1926) は視運動眼振の左右差には遠心性眼運動線維の障害が関係することを述べている。Kestenbaum (1961) は半盲が存在して視運動眼振に左右差のない時は頭頂葉障害を 100 % 除外できるとしている。Smith (1963) は頭頂葉障害で白質障害が存しかつ半盲のある例では視運動眼振左右差を生ずると述べている。著者の経験した症例中、半盲の存した例すなわち頭頂・側頭葉腫瘍例、後頭葉腫瘍例は眼振左右差を示した。

5. 大脳障害における垂直視運動眼振異常について

中脳前部が障害された時、垂直眼振異常を生ずることは、垂直眼運動皮質下中枢が中脳前部

にあること、また臨床例の観察より諸家の報告は一致している。

大脳障害時の垂直眼振異常については Davidoff et al は両側の大脳障害をもった例では垂直眼振が障害されること、また垂直注視中枢障害のあった例では垂直眼振障害のあったことを述べている。

我々の経験例では両側前頭脳障害例、1側前頭脳障害例、1側頭頂・側頭葉障害例、後頭葉障害例に垂直眼振の低減をみた。これらの例に垂直注視麻痺は認めなかった。

B. 大脳核障害

a. 被験者

パーキンソン病2例、舞蹈病4例（小舞蹈病2例、Huntington 舞蹈病2例）、片側アテトーゼ1例。

b. パーキンソン病

1. 検査成績

症例： 58才。女。

病歴：23才の時、出産後左上肢の脱力感に気付く。その後両上肢、頸部、顔面の振顫を来した。

耳鼻科検査：昭和45年12月24日。

聴力検査：正常。

平衡機能検査：立直り反射検査；開眼にて中等度、閉眼にて高度障害。偏倚検査；書字検査にて左5°偏書、足踏検査にて右80°回転。両手挙上不充分、足踏中左手極度に下り、振顫あり。自発眼振検査；自発、注視、頭位、頭位変換眼振いずれも認めず。迷路刺激眼振検査；回転検

査、クプロメトリーにて30°/secで右回転25/23″、左回転24/23″、60°/secで右回転34/23″、左回転32/22″であった。Bárány回転にて右回転39/21″、左回転45/17″であった。温度検査は冷刺激で右耳84/64″、左耳90/74″であり、温刺激では右耳70/65″、左耳94/73″であった。

視運動眼振検査：円筒左回転時の記録は図11の如くである。これは視刺激開始から12秒間の記録である。視刺激開始と同時に線条シグナル（第3ch.）に対応しない数多くの眼振が解発している。波形は緩徐相、急速相とも鋸歯状を呈している。右回転は急速相のみ鋸歯状を呈した。方向は両回転とも正常であった。右回転、左回転の90秒間の眼振数の発来経過を計測した結果は図12の如くである。円筒速度の遅い間（0～30秒）で、眼振数は両回転とも棄却限界の上限を上まわっている。すなわち低速部高頻度眼振を呈している。なお30秒から90秒までの間はほぼ信頼限界内である。総眼振数は右回転261打、左回転246打であった。緩徐相、急速相速度、振巾は両回転とも棄却限界内であった。左右差は認められなかった。

垂直眼振では波形は下向き、上向き視運動刺激にて緩徐相、急速相とも鋸歯状であり、打数は低速部において高頻度を呈した。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず、階段状を呈した。

症例： 37才。男。

病歴：昭和42年10月、工作中（車の運転）突

図11 パーキンソン病 58才。女。
刺激：水平左回転、波形は鋸歯状を呈している。

図12 パーキンソン病 58才. 女.

打数の発来経過. 低速部にて棄却限界の上限を越えている.

然心悸亢進し、急にエレベーターが下降した感じがした。以後体が浮いた感じが時々ある。またその頃より歩き方がつまずく様になり昭和46年3月8日本院第2外科へ入院。

耳鼻科検査：昭和46年3月17日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視、頭位、頭位変換眼振認めず。迷路刺激眼振検査；異常認めず。

視運動眼振検査：波形は両回転とも緩徐相では正常であったが、急速相は鋸歯状であった。方向は両回転とも正常。眼振数は両回転とも低速部にて高頻度を呈し、総眼振数は右回転246打、左回転228打であった。緩徐相、急速相速度、振巾は両回転とも正常範囲であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振では波形は下向き、上向き視運動刺激に対して緩徐相、急速相に所々で階段状波を認め、数は低速部において高頻度であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず階段状を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形は緩徐相で2例中1例が鋸歯状を呈し、急速相は2例とも鋸歯状であった。方向は2例とも正常であった。眼振数は2例とも低速部高頻度であった。緩徐相速度、急速相速度、振巾は2例とも正常であった。左右差は2例とも認められなかった。

垂直眼振では2例とも波形は緩徐相、急速相とも鋸歯状で、眼振数は低速部高頻度であった。

視標追跡運動は2例とも階段状であった。

c. 舞蹈病

(a) 小舞蹈病

1. 検査成績

症例： 32才. 男.

病歴：昭和40年自動車事故にて、10時間意識不明。昭和43年頃より浮動感、後頭部痛、腰痛、下肢のふらつきあり。昭和44年より両上肢の不随意運動、運動障害あり。昭和45年より両下肢の不随意運動および硬直を認める。昭和46年4月12日本院第2外科に入院。

耳鼻科検査：昭和46年4月21日。

聴力検査：両耳とも正常。

平衡機能検査：立直り反射検査；開眼にて中等度，閉眼にて高度障害。偏倚検査；書字検査にて失調文字。足踏検査にて後方へ転倒。自発眼振検査；自発，注視，頭位，頭位変換眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査ではクプロメトリーにて $30^\circ/\text{sec}$ で右回転 $11/15''$ ，左回転 $18/23''$ ， $60^\circ/\text{sec}$ で右回転 $30/35''$ ，左回転 $25/35''$ ，Bárány 回転にて右回転 $52/50''$ ，左回転 $30/46''$ であった。温度検査では，冷刺激で右耳 $41/66''$ ，左耳 $26/58''$ ，温刺激で右耳 $45/62''$ ，左耳 $46/59''$ であった。なお急速相が不明瞭で緩徐な眼球運動であった。

視運動眼振検査：円筒右回転時の記録は図13の如くである。これは視刺激開始から45秒間の記録である。この波形は緩徐相，急速相とも速度の傾斜がゆるやかである。このような波形は動揺形である。左回転も同様であった。方向は両回転とも正常であった。90秒間の眼振数は両回転とも全経過低頻度であり，総眼振数は右回転115打，左回転42打であった。緩徐相速度は両回転とも全経過低速度であった。急速相速度を計測した結果は図14の如くである。右回転，左回転とも棄却限界の下限を下まわり，低速度を示した。振巾は両回転とも棄却限界内であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振では下および上向き視運動刺激に対して，波形は正常で，眼振数は低速部にて高頻度を呈した。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず，階段状を呈し，所々に鋸歯状を示したが階段状と判定した。

症例：[] 12才。女。

病歴：昭和46年4月初旬より四肢の不随意運動に気付く様になり，昭和46年5月21日本院第2内科へ入院。

耳鼻科検査：昭和46年6月21日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発，注視，頭位，頭位変換眼振認めず。迷路刺激眼振検査；温度検査にて右への DP を認めた。

視運動眼振検査：両回転とも波形，方向は正常であった。眼振数は低速部では棄却限界内であったが，高速部になると棄却限界の下限を下まわり低頻度を示した。総眼振数は右回転127打，左回転135打であった。緩徐相速度，急速相速度は両回転とも棄却限界内にて正常であった。振巾は両回転とも棄却限界の上限を上回り，大振巾を呈した。後眼振を両回転にて認めた。左右差は認めなかった。

垂直眼振では下，上向き視運動刺激とも波形は正常で，眼振数も正常であった。

視標追跡運動は円滑に追跡できず，階段状を呈した。

図13 小舞蹈病 [] 32才。男。

刺激：水平右回転。波形は動揺形を呈し，眼球速度が遅い。

図14 小舞蹈病 32才. 男.

眼振急速相速度の発来経過。右回転, 左回転とも棄却限界の下限を下まわっている。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形は2例中1例で動揺形を示した。方向は2例とも正常であった。眼振数は2例とも低頻度であったが、1例は全経過、1例は高速部に低頻度を示した。緩徐相、急速相速度は2例中1例で低速であった。振巾は2例中1例で大振巾を示した。後眼振は1例で認められた。左右差は2例とも認められなかった。

垂直眼振は2例とも波形、眼振数いずれも正常であった。

視標追跡運動は2例とも階段状であった。

(b) Huntington 舞蹈病

1. 検査成績

症例： 42才. 女.

病歴：昭和40年頃より歩行障害、不随意運動をきたし、昭和43年より本院神経精神科に入院。

耳鼻科検査：昭和46年8月3日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視、頭位、頭位変換眼振認めず。迷路刺激眼振検

査；異常認めず。

視運動眼振検査：両回転とも波形は緩徐相では正常であったが、急速相では直線的でなく、動揺形を示した。方向は正常であった。眼振数は両回転とも全経過にわたり低頻度であり、総眼振数は右回転93打、左回転106打であった。緩徐相、急速相速度は両回転とも全経過低速度であった。振巾は正常であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振では波形は基線の動揺と区別しがたく、ほとんど眼振は解発されなかった。

視標追跡運動は追跡がきわめてまずく、ほとんど追跡しない部分があったが、全体に階段状を呈した。

症例： 52才. 男.

病歴：昭和38年9月より頭重感、および四肢の不随意運動をきたす様になった。

耳鼻科検査：昭和47年3月13日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視、

頭位、頭位変換眼振認めず。迷路刺激眼振検査にて異常認めず。

視運動眼振検査：両回転とも波形は緩徐相がゆっくりした動きで動揺形を示したが、急速相は直線的で正常であった。方向は両回転とも正常であった。眼振数は右回転では全経過にわたり低頻度であり、総眼振数は164打であった。左回転では眼振発来経過は棄却限界内で、正常であり総眼振数は210打であった。緩徐相速度は両回転とも高速部になると低速度であった。急速相速度、振巾は両回転とも正常であった。左右差は眼振数にて認められ、左向き低眼振であった。

垂直眼振では、下、上向き視運動刺激に対して波形は動揺形を呈したが、眼振数は正常範囲内であった。

視標追跡運動は視標を十分追跡できず、階段状であった。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形は2例中1例で緩徐相、1例で急速相にて動揺形を示した。方向は2例とも正常。眼振数は2例とも全経過にわたり低頻度であった。緩徐相速度は2例とも低速で、急速相速度は1例で低速であった。振巾は2例とも正常であった。

垂直眼振では波形は2例とも動揺形を呈したが、眼振数は1例ではほとんど解発されず、1例は正常であった。

視標追跡運動は2例とも階段状であった。

d. 片側アテトーゼ

1. 検査成績

症例：■■■■ 28才。女。

病歴：1才の時小児麻痺に罹患、子供の頃より左手が自由にきかず、左足が膝から下が自由に動かない。

耳鼻科検査：昭和47年3月6日

平衡機能検査：立直り反射検査；ほぼ正。偏倚検査；書字検査で軽度失調文字、足踏検査は左足不自由のため検査できず。自発眼振検査；自発、注視眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査ではBárány回転にて右回

転52/28"、左回転45/25"であった。温度検査では冷刺激にて右耳69/60"、左耳104/95"、温刺激にて右耳103/85"、左耳72/65"であった。

視運動眼振検査：円筒右回転時の記録は図15の如くである。波形、方向とも正常である。眼振数は発来経過にて棄却限界内であり正常である。総眼振数は190打であった。振巾は時定数1.5秒の原波形からも振巾の大きいことが伺えるが、これを計測した結果は図16の如くである。右回転では50秒以上、左回転では60秒以上になると棄却限界の上限を越えて、大振巾を示している。左回転時の波形、方向、打数の発来経過は正常範囲内であり、総眼振数は162打であった。また緩徐相、急速相速度は両回転とも正常であり、左右差は認めなかった。

垂直眼振では下、上向き視運動刺激に対して波形、眼振数とも正常であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形、方向正常であり、眼振数、緩徐相速度、急速相速度も正常であった。振巾は大振巾を呈した。左右差は認めなかった。

垂直眼振では波形、数とも正常であった。

視標追跡運動も正常であった。

e. まとめ

大脳核障害時の視運動眼振検査成績のまとめは表2の如くである。

パーキンソン病（2例）では波形は鋸歯状を呈し、眼振数は低速部にて高頻度を示した。垂直眼振でも波形は鋸歯状で、眼振数は高頻度であった。視標追跡運動は階段状を呈した。

舞蹈病（4例）では波形は4例中2例にて動揺形を呈した。眼振数は4例とも低頻度眼振にて、1例は高速部で、3例は全経過低頻度であった。緩徐相速度は4例中3例が低速度で、そのうち1例は高速部で、2例は全経過低速であった。急速相速度は4例中2例で全経過低速であった。振巾は4例中1例で大振巾を呈した。

片側アテトーゼ（1例）では振巾にて大振巾を呈した。

図15 左半身アテトーゼ 28才. 女. 刺激: 水平右回転, $2^{\circ}/\text{sec}^2$, 90秒
波形, 打数, 眼球速度は正常であるが, 振巾が大である.

図16 左半身アテトーゼ 28才. 女.
振巾の発来経過. 高速部になると棄却限界の上限を越え大振巾となっている.

表2 大脳核障害 (7例)

診断名と例数			パーキンソン病 2	舞 踏 病 4	片側アテトーゼ 1	
パラメータ						
視 運 動 眼 振	水	波 形	緩 徐 相 急 速 相	鋸歯状 1 鋸歯状 2	動 揺 形 2 動 揺 形 2	正 正
			方 向	正	正	正
		打 数 (10秒間毎)	低速部高頻度 2	高速部低頻度 1 全経過低頻度 3	正	
		平均緩徐相速度(10秒間毎)	正	高速部低速度 1 全経過低速度 2	正	
		平均急速相速度(10秒間毎)	正	全経過低速度 2	正	
	平	平 均 振 巾 (10秒間毎)	正	大 振 巾 1	大 振 巾	
		振 盪 野	検査せず	偏 倚 せ ず 1/1	検査せず	
		後 眼 振	—	+ 1	+	
		左右差 (数・速度・振巾)	—	両側低眼振にて左向き高度 1	—	
		垂 直	波 形	緩 徐 相 急 速 相	鋸歯状 2 鋸歯状 2	動 揺 形 2 動 揺 形 2
打 数 (10秒間毎)	高頻度 2			低 頻 度 1	正	
視 標 追 跡 (水平)			階段状 2	階 段 状 4	正	

f. 考 按

眼運動を支配する中枢機構は大脳皮質中枢、皮質下中枢、核上中枢、眼筋核の作用によって営まれる。水平運動の皮質下中枢は大脳核と視床核に、垂直運動の皮質下中枢は線条体および淡蒼球に存在している(生井, 1953)。よってこの部位の障害は水平、垂直視運動眼振異常をきたしやすい。これまでの大脳核障害による視運動眼振検査成績については余り記載されていないが、Smith (1963) は Parkinsonism において垂直眼振の解離が起ることを述べている。この解離とは上向き視運動刺激に対して眼振は解発されるが、下向き視運動刺激に対しては眼振が解発されぬ場合、またはこの逆のことを言う。これは視床下部において垂直性の視運動線維の分離が行われるためであろうと述べている。Jung & Kornhuber (1964) は parkinsonism では視性、前庭性眼振は著明に障害されず、垂直眼振の減少が時々認められ、また視標追跡運動は軽い saccadic movement を呈す

ると述べている。

著者の観察した Parkinson 病では水平眼振での波形が鋸歯状を呈した。これは眼が saccadic movement をする為と考えられる。また眼振数は低速部にて高頻度を呈した。垂直眼振も波形は鋸歯状で、高頻度眼振を呈し、Smith, Jung & Kornhuber の指摘する如く、数の減少は認めなかった。しかし視標追跡運動は Jung & Kornhuber の述べている如く階段状を呈した。舞踏病では波形は動揺形を呈し、眼振数は低頻度、眼球速度(緩徐相、急速相)は低速度であり、垂直眼振も波形は動揺形を示すのが特徴であった。

片側アテトーゼでは振巾のみ大振巾を呈したのみで、波形、数、眼球速度は正常であった。

C. 小脳疾患

a. 被験者

小脳疾患10例である。内訳は腫瘍5例 (medulloblastoma 2例, glioblastoma 1例, hemangioblastoma 1例, 不明1例) および脊髄

小脳変性症 5 例〔小脳型 (Marie) 2 例, 脊髄型 (Friedreich) 2 例, 晩発性小脳皮質萎縮 1 例〕である。

b. 腫瘍

1. 検査成績

症例：虫部腫瘍 (medulloblastoma) 16才. 男.

病歴：昭和45年10月頃急な頭位変換時に眩暈をきたし、転倒する様になった。徐々に症状が増強し、昭和46年8月より言語障害、歩行障害と複視、右手の熟練運動が困難になり、昭和46年9月10日本院第2外科に入院。

検査所見：眼底は乳頭境界やや不鮮明、指一指試験、指一鼻試験は拙劣、括抗反復不能。

手術所見：(9月28日)後頭下開頭術にて虫部から発生した軟かいやや暗赤色小指頭大の腫瘍が第4脳室に出ているのを確認した。

耳鼻科検査：昭和46年9月2日。

聴力検査：両耳とも正常。

平衡機能検査：立直り反射検査；開閉眼とも軽度障害。偏倚検査；足踏検査で右120度回転し、病的偏倚を認め、蹣跚歩行であった。自発眼振検査；自発眼振は裸眼(坐位、正面視)にて上眼瞼向き10/7"の眼振を認めるが、フレンツェル眼鏡下(坐位、正面視)では眼振認めず。注視眼振は右注視時10/5"、左注視時10/4"の注視方向性眼振、上方および下方注視時10/

4"の上眼瞼向き眼振を認めた。頭位眼振は右側臥位にて10/12"、左側臥位にて10/13"の上行性眼振、懸垂頭位にて7/19"の左向き眼振であった。迷路刺激眼振検査；回転検査では、クプロメトリーにて30°/secで右回転14/15"、左回転9/14"、60°/secで右回転33/24"、左回転26/22"であった。Bárány回転にて右回転73/38"、左回転56/28"であった。温度検査では冷刺激で右耳98/95"、左耳96/110"、温刺激で右耳43/75"、左耳56/75"であった。

視運動眼振検査：円筒右回転時の記録は図17の如くである。これは視刺激開始から30秒までの記録を示している。波形は緩徐相が滑らかでなく、線条をうまく追跡せず、時に線条より前方に眼が動き、いわゆる階段状波形を呈しているが、急速相は直線的である。方向については初め左向き眼振であったのが、途中にて右向き眼振に変わり、錯倒眼振を呈している。左回転でもこの様に緩徐相が階段状を呈し、方向も錯倒を示した。両回転とも10秒間毎の眼振発生経過は全経過低頻度眼振であった。緩徐相速度は波形が階段状であるので測定不能であったが、急速相速度は正常であった。振巾も正常であった。左右差は数、眼球速度、振巾いずれにも認めなかった。

垂直眼振は下向き視運動刺激に対しては波形は正常であったが、上向き視運動刺激では階段

図17 小脳虫部腫瘍 (medulloblastoma) 16才. 男.
刺激：水平右回転。波形は階段状を呈している。

状を呈した。10秒間毎の眼振数の発来経過は両刺激とも低頻度であった。

視標追跡運動は階段状を呈した。

症例：左半球腫瘍 (glioblastoma multiforme) 25才。男。

病歴：昭和42年8月頃より頭重感および浮動感を訴え、左へ左へ偏倚する様になった。9月になると足が思う様に前に進まず、言語障害、右顔面のシビレ感に気付いた。11月には両難聴、耳鳴に付き11月29日本院第2外科へ入院。

検査成績：V, VII, VIII, IX, X脳神経障害、小脳症状を認めた。

解剖所見：昭和43年1月29日。

脳橋部を中心とし脳幹、小脳虫部、右大脳脚におよぶ鶏卵大、出血を伴う硬～軟な腫瘍にて、病理組織学的診断は glioblastoma multiforme であった。

耳鼻科検査：昭和42年12月2日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発眼振は裸眼で右および上眼瞼向き、フレンツェル眼鏡下で上眼瞼向きであった。注視眼振は左右注視方向性、上方視では下眼瞼向き、下方視では右水平性眼振であった。頭位眼振は右、左側臥位にて上行性、仰臥位で右水平性、懸垂頭位にて左下眼瞼向き眼振を認めた。迷路刺激眼振検査では回転検査にて両側 hypernystagmus を認めた。

視運動眼振検査：両回転とも波形は緩徐相にて階段状を呈したが、急速相は直線的で正常であった。方向は途中にて錯倒を示した。10秒間毎の眼振発来経過にて眼振数は低頻度であり、総眼振数は右回転44打、左回転13打であった。緩徐相速度は波形が階段状であるので測定不能であったが、急速相速度は正常であった。振巾は正常範囲内であった。左右差は認められなかった。

垂直眼振では下向き視運動刺激に対しては緩徐相が階段状を呈したが、上向き視運動刺激に対しては正常であった。眼振数は両刺激とも低頻度であった。

視標追跡運動は視標を滑らかに追跡できず、

階段状を呈した。

症例：左半球腫瘍 (hemangioblastoma)

44才。男。

病歴：昭和47年3月40度の発熱、後頭部に限局した発作性の激痛をきたした。発熱は翌日には下熱し、後頭部痛も軽快した。5月上旬より再び後頭部痛をきたし、持続性となった。この頃より悪心、嘔吐、軽度の歩行障害に付き、昭和47年6月23日本院第2外科へ入院。

手術所見：昭和47年7月13日。

腫瘍は左小脳半球の約半分を占めており、上部では小脳の表面にまでおよび、硬膜との癒着が認められた。左小脳半球の約1/3切除した。病理組織診断は hemangioblastoma であった。

耳鼻科検査：昭和47年9月21日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視、頭位眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査、温度検査ともに正常であった。

視運動眼振検査：右回転、左回転とも波形、方向は正常であった。10秒間毎の眼振発来経過において打数は棄却限界内であり、総眼振数は右回転252打、左回転241打であった。眼球速度、振巾も両回転とも棄却限界内であった。左右差は数、眼球速度、振巾いずれにも認められなかった。

垂直眼振では下および上向き視運動刺激に対して波形はほぼ正常であったが、打数は上向き視運動刺激に対して発来が低頻度であった。

視標追跡運動は視標の動きに追跡の悪い所があり階段状波と判定した。

症例：小脳腫瘍。8才。男。

病歴：昭和45年10月中旬より時々前頭部、後頭部に軽い疼痛と両耳鳴に気付いた。11月には、頭痛、耳鳴が増強、朝起床時に5分位浮動感をきたし、昭和45年11月25日本院第2外科へ入院。視野検査にて両側中心性狭窄、眼底検査で両側うっ血乳頭を認め、臨床症状、神経学的検査、脳血管撮影、コンレイ脳室撮影の結果小脳腫瘍と診断。

耳鼻科検査：昭和45年12月2日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発，頭位眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査，温度検査とも正常。

視運動眼振検査：両回転とも波形，方向は正常であった。10秒間毎の眼振発来経過において打数は両回転とも全経過低頻度で，総眼振数は右回転 82打，左回転 108打であった。緩徐相速度は全経過低速度であったが，急速相速度は正常であった。振巾は棄却限界内であり正常であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振では上および下向き視運動刺激に対して波形は正常であったが，打数は低頻度であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず，階段状を呈した。

症例：虫部腫瘍 (medulloblastoma) 10才。男。

病歴：昭和45年2月より頭痛，悪心，嘔吐が続き9月より立ち上った時に眩暈を訴える様になり昭和45年3月28日本院第2外科へ入院。

手術所見：昭和45年4月9日。

後頭下開頭術施行。虫部が腫脹しており，虫部の深部へ腫瘍の浸潤が認められた。病理組織診断は medulloblastoma であった。

耳鼻科検査：昭和45年3月31日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発，注視，頭位眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査，温度検査ともに正常。

視運動眼振検査：右回転，左回転とも波形，方向は正常であった。10秒間毎の眼振発来経過において打数は両回転とも全経過低頻度であったが，特に右向き眼振が少なかった。総眼振数は右回転 110打，左回転 40打であった。緩徐相速度は両回転とも全経過低速度であったが，急速相速度は正常であった。振巾は正常であった。左右差は打数にて認められ，両側低眼振右向き高度であった。

垂直眼振では上および下向き視運動刺激に対して，波形は緩徐相，急速相とも正常であった

が打数はともに低頻度であった。

視標追跡運動は視標の追跡が円滑でなく，階段状を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

小脳腫瘍5例の視運動眼振検査成績をまとめると次の如くである。

波形は緩徐相にて2例で階段状を示した。急速相は5例とも直線的で正常であった。方向は2例で錯倒を認めた。打数は4例で低頻度を認めた。緩徐相速度は2例で低速度であり，2例は緩徐相が階段状の為測定不能であった。急速相速度，振巾は5例とも正常であった。左右差は虫部腫瘍1例で認められた。

垂直眼振では波形は緩徐相にて階段状を呈したのが2例あったが，急速相はすべて直線的で正常であった。打数は5例とも低頻度であった。視標追跡運動は5例とも階段状を呈した。

c. 脊髄小脳変性症

(a) 晩発性小脳皮質萎縮症

1. 検査成績

症例：45才。男。

病歴：昭和37年製図作成中に線を真つすぐに引けず，体動に際し回転性眩暈をきたした。その後徐々に眩暈がひどくなり，昭和44年頃より言語障害，下肢の脱力感，歩行障害をきたした。

耳鼻科検査：昭和46年5月29日。

平衡機能検査：立直り反射検査；開閉眼とも高度障害。偏倚検査；書字検査にて失調文字，足踏検査は検査不能。自発眼振検査；自発眼振は裸眼，フレンツェル眼鏡下にて10/8"の右下および下眼瞼向き眼振であり，注視眼振は右，左，上方，下方注視時いずれも10/8"の右下および下眼瞼向き眼振であり，頭位眼振は右，左側臥位とも10/5"の上向性，仰臥位にて10/23"，懸垂頭位にて10/10"の右下および下眼瞼向き眼振であった。迷路刺激眼振検査；回転検査ではクプロメトリーにて30°/secで右回転75/36"，左回転112/59"，60°/secで右回転79/56"，左回転90/50"であり，Bárány回転にて右回転190/60"，左回転190/60"であった。温度検査で

は冷刺激で右耳322/139'', 左耳235/125'', 温刺激で右耳236/132'', 左耳282/128''であった。

視運動眼振検査：円筒左回転時の記録は図18の如くである。これは視刺激開始から28秒間の記録である。0~23秒までは、波形は緩徐相で階段状を呈している。しかし急速相の波形は直線的である。なお右回転においても波形は緩徐相で階段状を呈した。方向は両回転とも正常。10秒間毎の眼振発生経過では打数は両回転とも全経過低頻度であり、総眼振数は右回転11打、左回転31打であった。両回転とも緩徐相速度は波形が階段状であるので、測定不能であったが、急速相速度、振巾は正常であった。左右差は認められなかった。

垂直眼振は上および下向き視運動刺激に対して波形は正常であったが、打数は低頻度であった。

視標追跡運動は視標を十分円滑に追跡できず階段状を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形は緩徐相で階段状を呈したが、急速相は直線的であった。方向は正常であった。打数は全経過低頻度であった。緩徐相速度は測定不能であった。急速相速度、振巾は正常であった。垂直眼振では波形は正常であったが、打数は低頻度であった。視標追跡運動は階段状を呈した。

(b) 小脳型 (Marie)

1. 検査成績

症例：[] 57才。男。

病歴：昭和34年より歩行に際し、真つすぐに歩けなくなったが、一方向に偏倚することはない。この症状は徐々に進行し、昭和43年より話しをする際に力を入れねばならず、また動作、言語障害が徐々に進行し、昭和46年4月9日本院第1内科へ入院。

耳鼻科検査：昭和46年4月12日。

平衡機能検査：自発眼振検査；裸眼、フレンツェル眼鏡下にて左水平性眼振を認む。注視眼振検査では左右注視方向性眼振、頭位眼振検査では右、左側臥位にて上行性、仰臥位、懸垂頭位にて左水平性眼振を認めた。迷路刺激眼振検査では回転検査、温度検査ともに正常であった。

視運動眼振検査：波形は右回転では0~10秒、左回転では0~15秒において緩徐相が階段状を示したが、急速相は直線的で正常であった。右回転、左回転とも方向正常であり、10秒間毎の眼振発生経過において、打数は全経過低頻度であり、総眼振数は右回転65打、左回転64打であった。緩徐相速度は波形が階段状の為測定不能であったが、急速相速度は正常であった。振巾は棄却限界内であり正常。左右差は数、速度、振巾いずれにも認められなかった。

図18 晩発性小脳皮質萎縮症 [] 45才。男。
刺激：水平左回転。波形は階段状を呈している。

垂直眼振では上および下向き視運動刺激に対し、波形は正常であったが、打数は低頻度であった。

視標追跡運動は視標を滑らかに追跡できず、階段状を呈した。

症例： 52才。男。

病歴：昭和44年12月下旬より足がふらつき、次第に足に力が入らなくなり、歩行障害をきたし、昭和46年6月頃より言語障害を認む。7月2日本院第1内科へ入院。

耳鼻科検査：昭和46年7月19日。

平衡機能検査：自発眼振検査では自発、注視、頭位、頭位変換眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査では回転検査、温度検査ともに正常であった。

視運動眼振検査：波形、方向は両回転とも正常であった。10秒間毎の眼振発来経過において打数は両回転とも高速部になると低頻度を示し、総眼振数は右回転134打、左回転127打であった。緩徐相速度は両回転とも棄却限界以下であり、全経過低速度であった。しかし急速相速度は正常であった。振巾は両回転とも正常であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振は上および下向き視運動刺激に対して波形は正常であったが、打数は低頻度であった。

視標追跡運動は階段状を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

小脳型2例の視運動眼振検査成績のまとめは次のごとくである。

波形は1例では緩徐相にて階段状を呈したが、1例は正常であった。方向は2例とも正常。打数は2例とも低頻度であった。緩徐相速度は1例では低速度であり、1例は緩徐相が階段状の為測定不能であった。急速相速度、振巾は2例とも正常であった。左右差は2例とも認められなかった。

垂直眼振では2例とも波形は正常であったが、打数は低頻度であった。

視標追跡運動は2例とも階段状であった。

(c) 脊髄型 (Friedreich 病)

1. 検査成績

症例： 30才。男。

病歴：昭和32年頃より歩行が不自由、話し方も不明瞭となり仕事（うどん屋の出前）も満足にできなくなった。昭和38年頃より症状が徐々に進行し、昭和41年より本院神経精神科に入院。家族歴にて兄弟に1名同病者を認む。

耳鼻科検査：昭和47年3月4日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視、頭位眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；回転検査にて hypernystagmus であった。

視運動眼振検査：右回転、左回転とも波形は視刺激開始より緩徐相、急速相ともはっきりしなく、動揺形を呈した。方向は正常であった。10秒間毎の眼振発来経過において打数は全経過低頻度であり、総眼振数は右回転59打、左回転76打であった。緩徐相速度、急速相速度はともに全経過低速度であった。振巾は正常であり、左右差は認めなかった。

垂直眼振では波形は基線の動揺と区別し難く、眼振数を測定することは不可能であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず、小さな階段状の波形を呈した。

症例： 33才。女。

病歴：昭和40年頃より軽い歩行障害あり、昭和43年頃より程度が強くなった。昭和44年より言語障害を認め、字を上手に書くことができず、階段の昇り降りは手すりを使わねばならなくなり、またこの頃より緊張時に首の不随意運動が現われてきた。昭和45年11月13日本院神経精神科へ入院。家族歴として兄弟に同病者1名を認める。

耳鼻科検査：昭和47年2月26日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発、注視眼振検査にて眼振認めず。迷路刺激眼振検査；温度検査にて正常であった。

視運動眼振検査：波形は右回転、左回転とも緩徐相、急速相の区別がはっきりせず、動揺形を呈した。方向は両回転とも正常であった。10

秒間毎の眼振発生経過において、打数は両回転とも全経過低頻度であり、総眼振数は右回転132打、左回転96打であった。緩徐相速度、急速相速度はともに全経過低速度であった。振巾は正常範囲内であった。左右差は認められなかった。

垂直眼振では上および下向き視運動刺激に対して波形は不規則であり、打数は計測不可能であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず、階段状を呈した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

脊髄型2例の視運動眼振検査成績のまとめは次の如くである。

波形は2例とも動揺形を呈した。方向は2例とも正常であった。打数は2例とも低頻度で、緩徐相速度、急速相速度は2例とも低速度であった。振巾は2例とも正常。左右差は認めなかった。

垂直眼振では2例とも波形が不規則で、打数

は測定不能であった。

視標追跡運動は2例とも階段状であった。

d. まとめ

小脳障害における視運動眼振検査成績のまとめは表3の如くである。

小脳腫瘍では波形が階段状を呈したのが5例中2例であった。方向が錯倒を示したのが2例であった。打数では5例中4例が全経過低頻度であった。緩徐相速度では計測のできた2例は全経過低速度で、2例は測定不能であった。垂直眼振では波形が階段状を呈したのが5例中2例で、打数は5例とも低頻度であった。視標追跡運動は5例とも階段状であった。

脊髄小脳変性症では波形が階段状を呈したのが5例中2例、動揺形を呈したのが2例であった。打数は5例中1例が高速部においてまた4例は全経過低頻度であった。緩徐相速度については計測できた3例は全経過低速であり、2例は計測不能であった。急速相速度は5例中2例

表3 小脳障害(10例)

診断名と例数			小 脳 腫 瘍 5		脊髄小脳変性症 5		
パラメータ							
視 運 動 眼 振	水	波 形	緩 徐 相 急 速 相	階 段 状 正	2 5	階 段 状 動 揺 形 動 揺 形	2 2 2
		方 向		錯 倒	2	正	5
		打 数 (10秒間毎)		全経過低頻度	4	高速部低頻度 全経過低頻度	1 4
		平均緩徐相速度(10秒間毎)		全経過低速度	2 *	全経過低速度	3 *
		平均急速相速度(10秒間毎)		正	5	全経過低速度	2
	平	平 均 振 巾 (10秒間毎)		正	5	正	5
		振 盪 野		偏倚認めず	2/2	偏倚認めず	2/2
		後 眼 振		—		—	
		左右差 (数・速度・振巾)		両側低眼振にて右向き高度 1		—	
		垂 直	波 形	緩 徐 相 急 速 相	階 段 状 正	2 5	不 規 則
打 数 (10秒間毎)			低 頻 度	5	低 頻 度	3 **	
視 標 追 跡 (水平)			階 段 状		5	階 段 状	5

*階段状眼振例各2例を除く、 **不規則例2例を除く

で全経過低速度であった。垂直眼振では波形が不規則を示したのが2例、打数は測定できた3例すべて低頻度であった。視標追跡運動は5例とも階段状であった。

e. 考 按

1. 小脳と眼運動

小脳と眼運動は解剖学的にどんな関係があるかを成書でみると、直接の線維連絡における記載は見出し難い。Dow & Manii (1964) は“Lowy, Marburg, Kuzume, Gerebtzoff が flocculus より眼筋核への小脳遠心線維を仮定しているが、その後の研究者 Jansen, Brodal は確認していないことを述べ、小脳と眼運動の間接的な関係として、小脳が前庭神経核に影響を与えているので、前庭眼反射を修飾することにより、小脳は眼運動に関係している”と述べている。平沢 (1949) の小脳伝導路に関する論文においても、小脳と眼運動の直接の線維連絡は記載されていない。小脳と頭顔部との連絡において“知覚脳神経、特に三叉神経、一部はなお舌咽神経、迷走神経などから始まって、頭顔部からの筋覚を小脳に伝え、かくて小脳からの反射を頭部、顔面部の筋に起すもので、刺激源は顔面および頭部の筋、腱などにあるが、詳細にはまだ不明の点が少なくない”と記載している。この反射の小脳よりの遠心路としては旧小脳核、下小脳脚經由の小脳遠心線維、橋、延髄の広義の被蓋運動核、末梢神経運動起始核、末梢運動神経、横紋筋をあげている。著者はこれを眼筋にあてはめ、小脳の眼運動支配の一つと解している。

小川 (1951) は中脳四丘体部より結合腕の内側をへて小脳、それも旧小脳に終る視蓋小脳路を述べ、最近小脳と視覚の関係が言われているが、これがその道かもしれないと記載している。

小脳の電気刺激実験においては Hoshino (1921) の業績が有名である。兎の Lobulus simplex とその上、下部の刺激で刺激側への眼球偏倚が起ることを記載している。Dow & Moruzzi (1958) は lobulus medius medianus,

folia の前後, declive, pyramis の刺激で眼運動が現われるとし、Cohen & Goto (1965) は猿の半球部刺激ではほとんどあらゆる種類の動きが、各所に見られることを述べている。Snider & Stowell (1944) は光刺激で ingvar の lobulus medius medianus, 前葉, 後葉, 斜台, 虫垂部に活動電位を生ずることを述べ、Dow & Manii (1964) はその部の刺激で眼運動が起ると述べている。

小脳破壊実験においては猿において、Carrea et al (1947) は flocculonodular lobe の破壊により、Cramer et al (1951) は虫垂および小脳核の破壊により自発眼振、頭位眼振の現われることを記載し、これは一側性の小脳破壊で前庭系への小脳からの抑制がとれ、眼振が出現したものと解釈している。小脳の刺激実験、破壊実験は膨大なものであるが、以上は小脳障害時に現われる視運動眼振異常の成立機転の解釈に必要なものを取り上げてみた。

これらの業績より小脳障害で視運動眼振異常が出現する機転として次のものをあげることができると考えている。①小脳は前庭神経核に抑制を与えているので、小脳の障害ではこの抑制がとれ、眼運動異常が出現する。②眼筋の深部受容器から小脳を介し眼筋にもどる反射があるので、小脳障害ではこの反射の障害のため眼運動障害が出現する。

2. 小脳障害例の視運動眼振異常

小脳障害例の自発眼振、注視眼振、頭位眼振、迷路眼振における業績は多い。小脳障害例の視運動眼振においては余り詳細な記載をみない。

小脳変性症の視運動眼振：Jung & Kornhuber (1964) は小脳萎縮症の進展した例において、上向き眼振と水平眼振の減少が認められたこと、Friedreich 症例で小脳障害の程度と、視性・前庭性障害の程度の一致しなかったことを記載している。竹森ら (1968) は脊髄小脳変性症例に OKP-test を行い、正常から高度の障害まで認めたことを述べ、OKP が“くしの歯”

の如き pattern を呈することが特徴であると記載している。

小脳腫瘍例の視運動眼振異常：佐藤（1955）は小脳虫部の astroblastoma において一側への眼振の発現をみなかったこと、左小脳半球 meningioma にて左向き眼振が発現しがたかったが、右向き眼振が正常に発来したことを記載し、動物の小脳破壊実験とあわせて、小脳障害における視運動眼振異常として、旧小脳核が侵害されると原則として非患側向の視運動眼振が障害されること、また旧小脳皮質が侵害されると患側向き視運動眼振が障害されると述べている。藤崎ら（1962）は小脳虫部腫瘍において視運動眼振は左右とも解発不全であったと述べている。坂田ら（1968）は半球腫瘍においては特徴とする所見は認められないと記載している。

著者の経験した症例では小脳腫瘍例、変性症例とも眼振数、眼球速度の低減と眼振緩徐相が階段状になることが特徴的であった。疾患による視運動眼振異常の形に特徴があるか、否かにおいては、変性症例において眼振の低減、眼球速度の低下を示し、更に波形の異常を示した例は小脳型 2 例中 1 例で、波形は階段状、晩発性小脳皮質萎縮の 1 例も階段状であり、脊髓型 2 例はどれも急速相、緩徐相とも眼球運動は直線的でなかった。腫瘍例においては、半球腫瘍 2 例、虫部腫瘍 2 例、どれも眼振数の低減、眼球速度の低下を認め、虫部腫瘍の 1 例、半球腫瘍の 1 例に階段状波形を認めた。著者の経験例は腫瘍例、変性症例どれも障害がすでに高度な例が多く、部位的特徴を検討するのに適当な症例ではなかったが、変性疾患例と腫瘍例、小脳半球障害例と虫部障害例でその異常の型に差を認めえなかった。しかし、第四脳室天蓋部の腫瘍例の 1 例は腫瘍が小さくても眼振の波形が階段状であったことは、旧小脳核障害では波形の異常を生じ易いことを示すと考える。また手術により半球の約 1/3 を切除した症例でも波形の異常を示さなかったことは、半球障害では波形異常を呈し 難いことを示すものと考えてい

る。また脊髓小脳変性症症例で、晩発性小脳皮質萎縮例、小脳型例は階段状波形を示したが、脊髓型症例（Friedreich）では急速相、緩徐相とも直線的でなくなることを認めた。これらは小脳障害の部位により、視運動眼振異常の性質に差のあることを示すものと考えている。また小脳障害において波形に異常をきたす転機としては眼筋の自己受容性の反射の障害が一因と考えられる。

D. 視床、四丘体部、橋脳、延髄障害。

a. 被験者

視床腫瘍（膠芽腫）1 例、四丘体部腫瘍（松果体腫瘍）1 例、橋脳障害（Foville 症候）2 例、延髄腫瘍（上衣腫）1 例。

b. 視床腫瘍

1. 検査成績

症例：左膠芽腫 30才。男。

病歴：昭和46年1月頃より物がはっきり見えず、二重に見えるなど視力障害および頭痛を来し、6月15日本院第2外科へ入院。脳室造影の結果、松果体腫瘍または第Ⅲ脳室附近の腫瘍と診断。腫瘍は非常に大きくて摘出は不可能のため、V-A shunt 手術をうけ、⁶⁰Co 照射にて症状軽快し9月1日退院。10月下旬より右上肢が使いにくく、歩行に際して右方へ倒れやすくなり、動作も緩慢になったため昭和46年11月1日本院第2外科へ再入院。

剖検所見（昭和47年2月19日）：左視床から中脳にかけ小鶏卵大（3×4×5cm）の腫瘍が存在し、Ⅲ脳室は腫瘍にて埋められていた。病理組織診断は glioblastoma であった。

耳鼻科検査：昭和46年6月14日。

聴力検査：両耳とも 25db～50db の水平型感音系難聴。

平衡機能検査：立直り反射検査；開閉眼とも高度障害。マン、単脚起立は不能であった。偏倚検査；足踏検査にて左後方へ転倒。自発眼振検査；自発、注視、頭位眼振認めず。なお上方注視不能であった。迷路刺激眼振検査；回転検査ではクプロメトリーにて 30°/sec で右回転 29/

図19 左視床腫瘍(膠芽腫) 30才. 男. 刺激: 水平右及び左回転, $2^\circ/\text{sec}^2$, 90秒
これはDC記録である. L-nyst は右回転時, R-nyst は左回転時の眼振.
両回転とも視刺激が速くなると眼振は緩徐相側に偏倚している.

18'', 左回転46/22'', $60^\circ/\text{sec}$ で右回転 50/23'', 左回転 52/25''であった. Bárány 回転にて右回転 58/22'', 左回転 49/24''であった. 温度検査では冷刺激で右耳 196/105'', 左耳 118/85'', 温刺激で右耳 80/104'', 左耳 133/105''であった.

視運動眼振検査: 円筒右および左回転時の記録は図19の如くである. これは DC 記録にて偏倚があれば分る様になっている. 第1段目の L-nyst は円筒右回転時の眼振すなわち左向き眼振で, 第2段目の R-nyst は円筒左回転時の眼振すなわち右向き眼振である. L-nyst, R-nyst とも波形は緩徐相も急速相も遅く, 動揺形を呈している. 方向は正常である. 10秒間毎の眼振発来経過において打数は全経過低頻度であり, 緩徐相速度, 急速相速度とも全経過低速度であった. 振巾は小振巾を呈した. 左右差は認めなかった. またこの眼振は刺激の加重につれ

て, 眼位が次第に緩徐相側に偏倚している. この眼振の振盪野を測定すると, 図20の如くである. 上段には円筒右回転時の, 下段には円筒左回転時の眼振の振盪している部位を示している. 刺激が速くなるにつれて眼振がおこらなくなっているため, 偏倚した位置を眼位として記入した. 左端縦に中央からの偏倚角度を示し, 横は時間的経過を示している. 両回転とも初め rapid phase (急速相側) にて眼振が起っているが, 次第に slow phase (緩徐相側) に偏倚している. すなわち振盪野が緩徐相側に偏倚していることを示している.

垂直眼振は上, 下向き視運動刺激とも発来せず.

視標追跡運動は視標の追跡に一部鋸歯状を呈したのみで, はば正常と判定した.

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

図20 左視床腫瘍(膠芽腫) 30才. 男.

振盪野の経過. 両回転とも視刺激の遅い間は急速相側, 速くなるにつれて緩徐相側に偏倚している.

両回転とも波形は動揺形, 方向は正常, 打数は低頻度, 眼球速度は低速度, 振巾は小振巾であった. 振盪野は緩徐相側に偏倚していた. 左右差は認めなかった. 垂直眼振は全然発来しなかった. 視標追跡運動はほぼ正であった.

c. 四丘体部腫瘍

1. 検査成績

症例: 松果体腫瘍 21才. 男.

病歴: 昭和39年12月中旬より後頭部痛, 両眼の霧視に気付き, 昭和40年1月頃より歩行に際し体が動揺し, 右方へ転倒する様になり昭和40年2月1日本院第2外科へ入院. Parinaud 症候, 右顔面の軽度不全麻痺を認めた. 2月9日本院第2外科にて右頭頂, 後頭開頭術下に試験切片採取. 病理組織診断は pinealocytoma であった.

耳鼻科検査: 昭和40年2月3日.

平衡機能検査: 自発眼振検査; 自発眼振は裸眼で認めなかった. 注視眼振は側方注視に際し注視方向に向う眼振であった. なお開散運動に際し, 両眼同時に内側に向く急速相をもつ輻輳

眼振を示した. この眼振は左眼に明瞭(振巾が大)であった. 迷路刺激眼振検査; 温度検査にて正常であった.

視運動眼振検査: 回転ドラムでの検査である. 右回転, 左回転とも波形, 方向は正常であった. 10秒間毎の眼振発来経過において打数は両回転とも全経過にわたり低頻度で, 総眼振数は右回転110打, 左回転93打であった. 緩徐相速度は両回転とも全経過低速度であったが, 急速相速度は正常であった. 振巾は正常であった. 左右差は認めなかった.

垂直眼振では下向き視運動刺激に対しては水平性輻輳眼振のみであるが, 上向き視運動刺激に対しては波形は正常であるが, 打数は低頻度であった.

視標追跡運動は視標をほぼ円滑に追跡した.

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形, 方向は正常であった. 打数は低頻度, 緩徐相速度は低速であったが, 急速相速度は正常であった. 振巾も正常であった. 左右差は認められなかった. 垂直眼振では波形は下向き眼

振にて正常であり、打数は低頻度であったが、上向き眼振は発生しなかった。視標追跡運動はほぼ正常であった。

d. 橋脳障害

1. 検査成績

症例：脳循環不全（左 Foville 症候）XXXXXXXXXX 46才。女。

病歴：昭和 39 年 11 月突然、後頭部のシビレ感、鈍痛および悪心、嘔吐をきたし、翌朝より身体動揺感、複視、顔面左右不对称、左耳鳴、右半身知覚異常、12 月上旬より嚥下障害、左上眼瞼運動障害をきたし、12 月 15 日本院第 2 外科へ入院。脳血管撮影の結果、左椎骨動脈の血栓との診断をうけた。昭和 40 年 2 月症状軽快し退院。その後も同様な発作が時々起る。

脳神経症状：左眼瞼下垂、左眼外転障害、右顔面温痛触覚鈍麻、右角膜反射減弱、左顔面運動麻痺および舌左前 2/3 の味覚障害、左僧帽筋の萎縮、舌尖端の左への偏位を認める。その他に、右膝蓋腱反射亢進、括抗反復不能、指一指、指一鼻試験拙劣であった。

耳鼻科検査：昭和 47 年 4 月 7 日。

聴力検査：右山型感音系、左水平型感音系難聴。

平衡機能検査：立直り反射検査；開眼にて中等度、閉眼にて高度障害。偏倚検査；書字検査にて左 12° の病的偏書、足踏検査にて左 45° 偏倚。自発眼振検査；自発眼振は裸眼では認めず、フレンツェル眼鏡下では $10/20''$ の右向き水平性眼振、注視眼振は $10/15''$ の右注視方向性眼振、左注視不能。上、下方視は眼振認めず。頭位眼振は仰臥位にて $5/15''$ の右向き水平性眼振であった。迷路刺激眼振検査；回転検査では Bárány 回転にて右回転 $26/18''$ 、左回転 $48/23''$ 、温度検査では冷刺激で右耳 $6/15''$ 、左耳 $11/10''$ 、温刺激で右耳 $19/45''$ 、左耳発生しなかった。

視運動眼振検査：円筒右回転の記録は図 21、円筒左回転の記録は図 22 の如くである。どちらの図も左外転神経麻痺があるため、第 1 ch. には右眼 (R-eye)、第 2 ch. には左眼 (L-eye) の如く別々に記録してある。左眼は眼筋麻痺がある為小振幅の眼振で、波形も余りはっきりし

図21 脳循環不全（左 Foville 症候）XXXXXXXXXX 46才。女。刺激：水平右回転、 $2^\circ/\text{sec}^2$ 、90秒
R eye は右眼、L eye は左眼での記録を示している。

図22 脳循環不全 (左 Foville 症候) 46才. 女. 刺激: 水平左回転, $2^{\circ}/\text{sec}^2$, 90秒.

ないが、右眼 (R-eye) の眼振の波形は両回転とも正常である。10秒間毎の眼振発生経過において打数は両回転とも高速部になると低頻度であり、患側左向き眼振が特に低である。総眼振数は右回転25打、左回転95打であった。緩徐相速度は健側の右眼より測定すると両回転とも高速部になると低速度であった。急速相速度、振巾は両回転とも正常範囲内であった。両回転とも視刺激終了後も右向き眼振を認めるが、これは自発眼振である。左右差を認め、両側低眼振、患側左向き眼振高度であった。

垂直眼振では上、下向き視運動刺激とも波形は不規則にて階段状であるが、急速相は直線的で正常であった。右眼の方が左眼より波形は円滑であるが、正常の波形ではなかった。打数はほぼ正常範囲内であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず、少しギザギザしているが、ほぼ正と判定した。

症例: 脳循環不全 (左 Foville 症候)

29才. 男.

病歴: 昭和44年11月トイレに入った時、突然

頭全体に熱感を感じ、右上下肢の運動障害、眼球運動障害、右半身の知覚障害に気づき、昭和45年1月20日後頭下開頭術にて後下小脳動脈からの A-Vmalformation を認めた。Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅵ, Ⅷ脳神経障害を認める。

耳鼻科検査: 昭和45年3月16日。

平衡機能検査: 自発眼振検査; 自発, 注視 (右, 上, 下方視) 眼振検査にて右向きおよび上眼瞼向き眼振を認めたが、左方注視できず。頭位眼振検査にて右水平性眼振を認めた。迷路刺激眼振検査; 温度検査で左CP+右へのDPを示した。

視運動眼振検査: 波形は右回転時、右眼では左向き眼振が発生し、緩徐相、急速相とも正常であった。左眼はほとんど眼振発生しなかった。左回転時、右眼では右向きの眼振が発生し、緩徐相、急速相とも正常であった。左眼ではきわめて小振巾の波形であるが、ほぼ正常であった。方向は両回転とも正常であった。以下健眼の右眼の記録について述べる。10秒間毎の眼振発生経過において、打数は両回転とも高速

部になると低頻度となり、特に患側左向き眼振が低頻度であった。総眼振数は右回転13打、左回転55打であった。緩徐相速度は両回転とも高速部になると低速度を示したが、患側左向き眼振が特に低速であった。急速相速度は右回転で低速度であったが、左回転は正常であった。振巾は両回転とも正常範囲であった。左右差を認め両側低眼振、患側左向き眼振が高度であった。

垂直眼振では健眼にて、波形は正常で、打数は正常であった。

視標追跡運動は視標をほぼ円滑に追跡した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

橋脳障害 (Foville 症候) 2 例の視運動眼振検査成績をまとめると次の如くなる。

2 例とも波形、方向は正常、打数は低頻度、緩徐相速度は低速度、急速相速度は正常、振巾は正常であった。左右差は 2 例とも認め両側低眼振であったが、患側向き眼振の障害が強かった。垂直眼振では波形は 1 例で階段状を呈したが、打数は 2 例とも正常であった。視標追跡運動は 2 例ともほぼ正常であった。

e. 延髄腫瘍

1. 検査成績

症例：上衣腫 38才。男。

病歴：昭和45年4月嚙下障害、左上下肢の知覚障害、四肢の筋力低下にて本科へ入院。症状軽快し7月に退院。12月より再度、嚙下障害を来し再入院。昭和46年1月18日本院第2外科へ転科。

剖検所見：昭和46年4月1日、延髄から頸髄にかけて腫瘍を認め、病理組織診断は脳室上衣腫であった。

耳鼻科検査：昭和46年1月13日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発眼振はフレンツェル眼鏡下にて左向き水平性眼振を認めた。注視眼振は認めなかった。迷路刺激眼振検査；回転検査にて hypernystagmus であった。

視運動眼振検査：右回転、左回転とも波形、方向は正常であった。10秒間毎の眼振発来経過

において、打数は両回転とも低速部にて高頻度を呈し、総眼振数は右回転320打、左回転258打であった。眼球速度、振巾は両回転とも正常であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振は上および下向き視運動刺激に対して波形、打数ともに正常であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡した。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

波形、方向は正常、打数は低速部にて高頻度であった。眼球速度、振巾いづれも正常であった。

f. まとめ

視床、四丘体部、橋脳、延髄障害例の視運動眼振検査成績のまとめは表4の如くである。

視床腫瘍では波形は動揺形、打数は全経過低頻度、眼球速度（緩徐相、急速相）は全経過低速度、振巾は小振巾であった。振盪野は緩徐相側に偏倚した。垂直眼振は発来しなかった。

四丘体部腫瘍では打数は全経過低頻度、緩徐相速度は全経過低速度であった。垂直眼振では上向き眼振は発来せず、下向き眼振は低頻度であった。

橋脳障害では打数は高速部低頻度、緩徐相速度は高速部低速度であった。左右差を認め患側向き眼振が高度に障害された。垂直眼振は正常であった。

延髄腫瘍では打数は低速部高頻度を示した。

g. 考 按

視床、四丘体部、橋脳、延髄の眼運動に対する役割は、生井（1953）の綜説より次の如く要約しうる。眼運動を支配する中枢機構は、運動の衝撃を発する大脳皮質中枢、眼運動神経（動眼、滑車、外転神経）および両者の中間に介在する中間中枢、すなわち皮質下中枢および核上中枢より成り立っている。水平運動の皮質下中枢は大脳核と視床核に、核上中枢は四丘体、橋脳に存在しており、垂直運動の皮質下中枢は線条体および淡蒼球、核上中枢は四丘体上丘にある。またこのうち水平運動の核上中枢は橋脳に、垂直運動の核上中枢は四丘体上丘にあると

表 4. 視床, 四丘体部, 橋脳, 延髄障害 (5 例)

障害部位, 診断名と例数 パラメータ			視 床 膠芽腫 1	四丘体部 松果体腫瘍 1	橋 脳 Foville 症候 2	延 髄 上衣腫 1
視 運 動 眼 振	水 平	波 形	緩 徐 相 急 速 相	動 揺 形 動 揺 形	正 正	正 正
		方 向	正	正	正	正
		打 数 (10秒間毎)	全経過低頻度	全経過低頻度	高速部低頻度 2	低速部高頻度
		平均緩徐相速度(10秒間毎)	全経過低速度	全経過低速度	高速部低速度 2	正
		平均急速相速度(10秒間毎)	全経過低速度	正	正	正
		平 均 振 巾 (10秒間毎)	小 振 巾	正	正	正
		振 盪 野	緩徐相側に偏倚	検査せず	検査せず	正
		後 眼 振	—	—	—	—
		左右差 (数・速度・振巾)	—	—	両側低眼振にて 患側向き高度 2	—
	垂 直	波 形	緩 徐 相 急 速 相	発来せず	下向き視刺激に対し 水平性輻輳眼振	階段状 1 正
打 数 (10秒間毎)		発来せず	上向き眼振発来せず 下向き眼振低頻度	正	正	
視 標 追 跡 (水平)			ほ ぼ 正	ほ ぼ 正	ほ ぼ 正	正

する説が多いと記載されている。以上の如く脳幹は眼球運動にとってまことに重要であり、かつ脳幹には前庭神経核、内側縦束、脳幹網様体が存在することにより、この部の障害は視運動眼振の障害を来しやすいことは当然考えることである。

これまでの脳幹刺激あるいは破壊実験などにより、視運動眼振との関係が色々報告されている。動物実験としてはまず上丘についてみると、Smith & Bridgman (1943), Arimoto (1958) Takebayashi (1960), 長谷川 (1955), 前島 (1960) らの報告をみるが、いずれも視運動眼振に対して上丘の意義を重視しているが、Pasik et al (1966) は 1 側あるいは両側の上丘を除去しても持続的な視運動眼振障害は現われなかったと反論している。また脳幹網様体、内側縦束の破壊実験は佐藤 (1955), 石黒 (1959), Teng et al (1958) らにみられる。特に Teng は猿において脳幹とくに橋脳被蓋の paramedian zone における傷害は小さくても、傷害側

から注視中枢方向へドラムがまわった時に視運動眼振は完全に消失すると述べている。

臨床例においては、Fox & Holmes (1926), 佐藤, Jung & Kornhuber (1964), Davidoff et al (1966), 坂田ら (1966, 1968), 上田 (1968), 石川 (1970) らの観察がある。佐藤は左視索より左視床部におよぶ oligodendroglione にて左向きの視運動眼振で不規則、不活発な眼振を認めている。Jung & Kornhuber は視床の傷害 (血管障害) では反対側への視運動眼振の減少することを記載し、また定位脳手術で視床を破壊した例において円筒スピードが 40°/sec の時は両側視運動眼振は正常であったが、60°/sec 以上に速くなると反対側への眼振はほとんど発来しないことを述べている。更に中脳被蓋の傷害では水平眼振は 1 側あるいは両側とも障害され、内側縦束の傷害では内転した眼ではある程度眼振数が減少するが、また視運動眼振が正常であった例も報告し、また橋脳被蓋の傷害では急速相と緩徐相の移行がはっきり

しなくなり、また注視麻痺のある例では急速相は消失し、視運動刺激を与えても小さなゆっくりとした眼の偏倚のみを示すにすぎないこと、また水平眼振の傷害は著明であるが垂直眼振の障害は少ないことを述べている。延髄障害すなわち、Wallenberg's syndrom, 延髄空洞症にては視運動眼振はほとんど正常に近く、このことより前庭核は視運動眼振に必要なでないことを示している、と以上の如く述べている。Davidoff et al (1966) は両側の上丘の障害では、水平眼振は正常の対称的な視運動眼振反応であり、視蓋前域の傷害(両側上丘を含む)では非対称であったと述べている。坂田らは脳幹部とくに内側縦束とその周囲の脳幹網様体が視運動眼振解発に一次的な意味で重要性をもっていると推察し、① OKP にて緩徐相速度の上昇が少なく、② optokinetic fusion limit が著しく低下し、③ 異型反応がみられるものなどは脳幹障害によるとしている。上田は橋脳被蓋の腫瘍で、上丘、下丘、視蓋前域は正常であった症例について、OKP は緩徐相速度の連続的増加はなく、頻度も少なく、かつ急速相が逆方向にも解発され、著しい錯倒現象を示したと報告している。石川は小脳、中脳、脳幹部にわたる広範囲の病巣において、しばしば水平眼振、垂直眼振ともに抑制現象を示し、脳定位手術による上丘部病巣例に垂直視運動眼振異常を認めたと報告している。

著者の経験した症例について検討すると、視床腫瘍例では波形は緩徐相、急速相とも動揺形を呈し、眼振数は円筒速度が増加するにつれてほとんど発来していない。これは Jung & Kornhuber が視床障害において円筒速度が等速度であるが、 $60^{\circ}/\text{sec}$ 以上の時にはほとんど眼振が発来しなかったと指摘したことと一致する。また緩徐相速度、急速相速度はともに低速度であった。Teng et al (1958) は橋脳附近の paramedian zone の障害により急速相が遅くなることを指摘しているが、本例は橋脳まで障害はおよんでいなかった。また振盪野が緩徐相

側に偏倚したことは特徴的なことであった。これについては Jung & Kornhuber は橋脳被蓋障害にて、視運動刺激で小さなゆっくりとした眼の偏倚のみで、急速相が解発しないことを指摘している。著者の経験したこの症例は剖検により左視床から中脳にかけ小鶏卵大の腫瘍が存在し、これによる周囲への圧迫も十分考えられる。垂直眼振はほとんど発来しなかった。これは垂直眼振の中枢とも考えられる四丘体上丘の部位にも傷害が進んでいたためと考える。

四丘体部腫瘍すなわち松果体腫瘍においては、水平眼振では波形は正常で、打数は低頻度、緩徐相速度は低速度であったが、これに比べて垂直眼振の発来がきわめて悪く、特に上向き眼振が発来しなかった。Jung & Kornhuber も中脳被蓋の障害では垂直眼振異常がおきると述べている。これは垂直眼運動中枢が上丘に存在することを考えれば当然のことと思われる。

橋脳障害—Foville 症例においては、垂直眼振では波形、打数は正常であるが、水平眼振では健側眼による波形は正常、打数は低頻度、緩徐相速度は低速である。すなわち垂直眼振に比べて水平眼振の障害が著明である。これは水平眼運動中枢が橋脳附近に、垂直眼運動中枢が中脳に存在することにより、この解離現象が起ると Cogan (1964), Jung & Kornhuber は指摘している。ここに注目すべきことは、視運動反射路の一部というべき“側方注視中枢”が障害され乍ら、波形に異常を認め難いことである。山田(1968)は Foville syndrome における視運動眼振検査について、水平刺激の場合はドラム右回転、左回転とも反応を認めないが、垂直刺激を行った場合には不規則ながらも反応を認めたと述べている。

延髄腫瘍においては、Jung & Kornhuber は延髄障害では視運動眼振は正常であったと述べているが、著者の経験した症例では水平眼振は低速部高頻度であった。

E. 小脳橋角部腫瘍

a. 被験者

聴神経腫瘍 4 例 (neurinoma), 橋角部襄腫 2 例.

b. 聴神経腫瘍

1. 検査成績

症例: l-neurinoma 43才. 女.

病歴: 昭和 39 年左耳鳴, 昭和 42 年舌のシビレ, 昭和 44 年頃より左難聴, 左顔面の硬わばりをきたし, 歩行時左方へふらつく様になり, 当科へ昭和 45 年 1 月 8 日入院. 1 月 28 日経迷路法にて腫瘍摘出. 4 月 28 日退院. 術後運動失調増強のため, 昭和 46 年 3 月 12 日本院第 2 外科へ再入院.

手術所見: 昭和 46 年 4 月 27 日, 後頭下開頭法により, 左内耳道より小脳にかけてクルミ大の腫瘍を摘出. 病理組織診断は neurinoma であった.

検査成績: V, VII, VIII, IX 脳神経障害, 両側膝蓋腱, アキレス腱反射亢進, 膝クロヌス陽性, 拮抗反復不能であった.

耳鼻科検査: 昭和 46 年 1 月 13 日.

聴力検査: 右耳正常, 左耳全聾.

平衡機能検査: 立直り反射検査; 開眼にて中

等度, 閉眼にて高度障害. 偏倚検査; 書字検査にて右 10° 偏書, 足踏検査にて蹣跚歩行であった. 自発眼振検査; 自発眼振は裸眼にて $10/7''$ の右向き水平性眼振であったが, フレンツェル眼鏡下では眼振を認めなかった. 注視眼振検査では, 右注視時 $10/4''$ の右向き水平性眼振, 左注視時 $10/7''$ の左向き水平性眼振, 上方視では $10/8''$ の上眼瞼向き眼振, 下方視では $10/12''$ の左向き水平性眼振を認めた. 頭位眼振検査では右側臥位にて $10/19''$ の下行性, 左側臥位にて $10/15''$ の下行性, 懸垂頭位にて $10/4''$ の右回旋性, 仰臥位にて $10/15''$ の上眼瞼, 右上眼瞼, 右向き水平性眼振を認めた. 迷路刺激眼振検査; 回転検査では, クプロメトリーにて $30^\circ/\text{sec}$ で右耳発来せず, 左耳 $6/10''$, $60^\circ/\text{sec}$ で右耳 $10/4''$, 左耳 $10/17''$ であった. Bárány 回転にて右耳 $25/15''$, 左耳 $68/34''$ であった. 温度検査では冷刺激で右耳 $86/90''$, 左耳発来せず, 温刺激で右耳 $57/70''$, 左耳発来しなかった.

視運動眼振検査: 円筒右回転時の記録は図 23 の如くである. 波形は視刺激開始から 20 秒位の間に於いて緩徐相にて所々で階段状を呈してい

図 23 左聴神経腫瘍 (neurinoma) 43才. 女. 刺激: 水平右回転, $2^\circ/\text{sec}^2$, 90秒

図24 左聴神経腫瘍 (neurinoma) 43才. 女. 刺激: 垂直上向き回転, $1^{\circ}/\text{sec}^2$, 90秒

るがほぼ正常である。方向は正常である。10秒間毎の眼振発来経過にて打数は高速部になると棄却限界の下限を下まわり低頻度であった。総眼振数は77打であった。緩徐相, 急速相速度は棄却限界の下限を下まわり全経過低速度であった。振巾は正常であった。左回転では波形, 方向は正常であり, 打数は高速部になると低頻度を示し, 総眼振数は99打であった。眼球速度は全経過低速度であり, 振巾は正常であった。左右差を認め, 両側低眼振, 患側左向き高度障害であった。

垂直眼振では, 上向き視運動刺激に対する記録は図24の如くである。波形は緩徐相, 急速相ともほぼ正常であるが, 打数の発来経過は棄却限界下限であるが正常であった。下向き視運動刺激に対しても波形は正常で, 打数も正常であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず, 階段状波を呈した。

術後1ヶ月(5月26日)の検査成績

波形は右回転では術前と比べて所々に階段状波の出現を多く認める。左回転は正常であつ

た。方向は両回転とも正常, 打数は両回転とも低頻度で, 総眼振数は右回転 103打, 左回転 78打と術前と比べて健側向き眼振数が少なくなっている。眼球速度も変わらず低速度であった。振巾は正常であった。垂直眼振では波形, 打数とも術前と同じで, 視標追跡運動も変わらず階段状を呈した。

症例: r-neurinoma 32才. 女.

病歴: 昭和43年6月頃より両側難聴, 耳鳴に気付く。昭和44年2月より歩行時右へ偏倚する様になった。6月より右耳がほとんど聞えず, 昭和45年10月より肩こりを前駆症状として, 眩暈発作をきたし10月29日本科へ入院。本人の希望により12月8日九州大学外科にて手術。

手術所見: 右内耳道より小脳にかけて $3.5 \times 4 \times 4 \text{ cm}$ の腫瘍を摘出。病理組織診断は neurinoma であった。

耳鼻科検査: 昭和45年10月29日。

平衡機能検査: 自発眼振検査; 自発眼振検査では裸眼にて左水平性眼振, 注視眼振検査では左右注視方向性眼振, 頭位眼振検査では右側臥位にて下行性, 左側臥位にて上行性, 仰臥位に

て右水平性眼振を認めた。迷路刺激眼振検査；温度検査にて右耳反応なし。

視運動眼振検査：両回転とも波形，方向は正常であった。打数は両回転とも円筒速度が高速になると低頻度を呈した。総眼振数は右回転44打，左回転55打であった。眼球速度は全経過にわたり低速度であった。振巾は正常であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振では波形は上向き視運動刺激で不規則であり，下向き視運動刺激では正常であった。打数は上向き刺激ではほとんど発来不良であったが，下向き刺激では正常であった。

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず，階段状であった。

症例：I-neurinoma 53才。女。

病歴：昭和43年頃より左耳鳴，左難聴に気付く。昭和46年1月より言語障害，歩行時右側へ転倒傾向，複視，左顔面，右上半身の知覚鈍麻に気付く昭和46年12月8日本院第2外科へ入院。

手術所見（12月16日）：左内耳道より小脳にかけて小鷲卵大の腫瘍が存在し，脳幹を強く圧迫。

検査成績：Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅶ，Ⅷ，Ⅸ，Ⅹ，Ⅺ，Ⅻ脳神経障害。Hoffman, Trömner 病的反射陽性，括抗反復不能，共同運動障害，測定障害，はね返り現象陽性。

耳鼻科検査：昭和46年11月16日。

聴力検査：右耳 20~40db，左耳 80db の水平型感音系難聴。

平衡機能検査：立直り反射検査；開閉眼とも高度障害，閉眼では検査不能。偏倚検査；書字検査にて失調文字，足踏検査は不能。自発眼振検査；自発眼振は裸眼にて10/5"の右水平性，フレンツェル眼鏡下にて10/5"の右水平性眼振であり，注視眼振は完全注視方向性眼振にて右注視時10/3"，左注視時10/10"，上方注視時10/3"，下方注視時10/5"の眼振であった。頭位眼振は右側臥位にて10/8"の下行性，左側臥位にて10/6"の上行性，懸垂頭位にて10/5"の右水平性，仰臥位にて10/6"の右水平性眼振であった。迷路刺激眼振検査；温度検査にて冷刺激で右耳発来せず，左耳は自発眼振と区別できず，温刺激では右耳は自発眼振と区別できず，左耳は右への自発眼振のみであった。

図25 左聴神経腫瘍 (neurinoma) 53才。女。刺激：水平左回転， $2^{\circ}/\text{sec}^2$ ，90秒

図26 左聴神経腫瘍 (neurinoma) 53才. 女. 刺激: 垂直下向き回転, $1^\circ/\text{sec}^2$, 90秒

視運動眼振検査: 円筒左回転時の記録は図25の如くである。波形は緩徐相にて階段状を呈している (0~25 秒間) が, 急速相は直線的である。方向は正常である。打数は緩徐相が階段状にて不規則のため計測できず。眼球速度も計測できず。振巾は小振巾であった。右回転では波形は緩徐相にて階段状を呈し, 不規則であり30秒以降にて錯倒眼振を呈した。打数, 眼球速度は測定できなかった。振巾は小振巾であった。左右差は認めなかった。

垂直眼振において, 下向き視運動刺激に対する記録は図26の如くである。波形は緩徐相, 急速相ともに不規則であり, 打数は測定できなかった。上向き視運動刺激に対しても同様であった。

視標追跡運動は視標追跡に右向きの自発眼振が乗っていた。

症例: r-neurinoma 32才. 女.

病歴: 昭和42年6月頃より歩行に際し, 右へ偏倚する様になり, 10月頃より右難聴に気がつきふらつきが増加し, 11月15日本科へ入院し, 精

査後11月22日本院第2外科へ転科。

検査成績: V, VII, VIII, IX脳神経障害。

手術所見 (11月30日): 鶏卵大の腫瘍が前方は pons acustico internus を通りこし, 橋の外側に沿って incisura tentorie の先端まで進んでいた。病理組織診断は neurinoma であった。

耳鼻科検査: 昭和42年11月15日。

平衡機能検査: 自発眼振検査; 自発眼振は裸眼では左水平性, フレンツェル眼鏡下では左水平および回旋性眼振であった。注視眼振検査では左注視方向性, 上方, 下方注視にて左水平性眼振を認めた。頭位眼振検査では右側臥位にて上行性, 左側臥位にて下行性, 仰臥位にて左水平性眼振を認めた。迷路刺激眼振検査; 温度検査にて冷水, 温水とも右耳反応せず。

視運動眼振検査: 波形は両回転とも緩徐相にて階段状を呈した。方向は右回転にて途中で錯倒を示した。左回転では, はっきりした錯倒は認められなかった。打数, 眼球速度は測定不能であり, 振巾は棄却限界下限であった。

垂直眼振では波形は正常、打数は低頻度であった。視標追跡運動は検査せず。

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

聴神経腫瘍4例のまとめは次の如くである。波形にて緩徐相が階段状を呈したのが4例中2例であった。急速相は4例とも正常であった。方向は4例中2例にて錯倒を認めた。打数は2例で低頻度を示し、他の2例は階段状波形のため測定不能であった。眼球速度では2例は低速度であり、他の2例は測定不能であった。振巾は1例で小振巾を呈した。左右差は1例で認められ、両側低眼振で患側向き眼振の障害が強かった。

垂直眼振では波形が不規則を示したのが1例、打数が低頻度であったのが1例認められた。

視標追跡運動を検査した3例とも階段状であった。

c. 橋角部嚢腫

1. 検査成績

症例：左橋角部嚢腫 16才。女。

病歴：昭和45年2月初旬より左難聴の程度増強し、2月下旬より真っすぐ歩行できず、左右にふらつく様になった。またこの頃より左顔面のシビレ感、左上下肢に力が入らなくなり3月23日本科へ入院。諸検査の結果5月4日本院第2外科へ転科。

手術所見（5月7日）：後頭下開頭術にて腫瘍は小脳の左半球側前面にあり、外見上暗赤色の嚢腫状のもので、破ると黄色の液体流出。左小脳半球外側1/3を切除。

耳鼻科検査：昭和45年3月23日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発眼振検査にて右水平性眼振、注視眼振検査にて左右注視方向性、上、下方視にて右水平性眼振を認めた。頭位眼振検査にて右水平性眼振を認めた。迷路刺激眼振検査では温度検査にて、左CP＋右へのDPを認めた。

視運動眼振検査：昭和45年3月23日（術前）

両回転とも緩徐相、急速相はゆるやかな波形

であった。方向は両回転とも正常であった。10秒間毎の眼振発生経過において、打数は両回転とも全経過低頻度で、特に左回転では60秒以降はほとんど眼振発生せず。総眼振数は右回転63打、左回転21打であった。眼球速度は両回転とも全経過低頻度であった。振巾は正常範囲内であった。左右差は打数にて認められ、両側低眼振にて健側右向き眼振が少なかった。

垂直眼振では下向き視運動刺激に対しては、波形は正常であったが、上向き視運動刺激に対しては緩徐相やや鋸歯状を呈し、不規則であった。打数では上向き眼振は正常範囲であったが、下向き眼振は低頻度であった。

視標追跡運動は階段状を呈した。

術後5ヶ月目の検査成績：

波形は両回転とも緩徐相にて階段状であったが、急速相は直線的になった。方向、打数、緩徐相速度は術前と比べ著変ないが、急速相速度は正常に戻った。振巾、左右差は術前と変わらず。垂直眼振、視標追跡運動も同じ傾向であった。

症例：右橋角部嚢腫 40才。男。

病歴：昭和44年2月頃より右顔面にシビレ感、歩行障害をきたし、徐々に歩行困難になり、昭和44年10月6日本科へ入院。精査後10月22日本院第2外科へ転科。

手術所見（10月30日）：右後頭下開頭術にて右小脳橋角部にLiquor Cystを認め、右小脳半球は正中線を越えていた。なおCyst吸引後は聴神経はよく見え、萎縮像なく、内耳道は大きく盆状を呈し、小指頭大の陥凹を認め明らかな拡大が認められた。

耳鼻科検査：昭和44年10月7日。

平衡機能検査：自発眼振検査；自発眼振認めず、注視眼振は右注視方向性、上方視にて左回旋性眼振を認めた。頭位眼振は仰臥位にて右および右上眼看向き眼振を認めた。迷路刺激眼振検査は温度検査にて右CPを認めた。

視運動眼振検査：10月7日（術前）

右回転、左回転とも波形、方向は正常であっ

た．10秒間毎の眼振発来経過において，打数は両回転とも全経過低頻度であったが，特に健側向き眼振が少なかった．緩徐相速度は両回転とも全経過低速度であったが，急速相速度は正常であった．振巾は両回転とも正常．左右差を認め，両側低眼振，健側左向き眼振が高度に障害された．

垂直眼振では上および下向き視運動刺激に対して波形は正常であった．打数は上向き刺激では正常であったが，下向き刺激では低頻度であった．

視標追跡運動は視標を円滑に追跡できず階段状を呈した．

術後1年目の検査成績：

右回転では波形，方向ともに正常であるが，打数は低頻度にて途中より特に少なくなった．左回転では波形は正常であるが，右向き眼振出現せず，方向にて左への眼振が出現するのみであった．この時，開眼では自発眼振を認めなか

ったが，閉眼にて右向き自発眼振を認め，また注視方向性眼振も認めた．その他眼球速度，振巾には著変はなかった．垂直眼振では打数がやや増加したのみであった．視標追跡運動は階段状であるが，術前より改善された．

2. 視運動眼振検査成績のまとめ

橋角部囊腫2例のまとめは次の如くである．波形，方向は2例とも正常．打数は2例とも低頻度．緩徐相速度は2例とも低速度であった．急速相速度は2例中1例で低速度であった．振巾は2例とも正常．左右差は2例とも認められ，健側向き眼振が特に低頻度であった．

垂直眼振では波形は1例で下向き眼振が不規則であり，打数は2例とも下向き眼振が低頻度であった．

視標追跡運動は2例とも階段状であった．

d. まとめ

小脳橋角部腫瘍の視運動眼振検査成績のまとめは表5の如くである．

表 5. 小脳橋角部腫瘍（6例）

診断名と例数			聴 神 経 腫 瘍 4	橋 角 部 囊 腫 2	
パラメータ					
視 運 動 眼 振	水 平	波 形	緩 徐 相 急 速 相	階 段 状 2 正 4	正 正
		方 向		錯 倒 2	正
		打 数 (10秒間毎)		高速部低頻度 2 *	全経過低頻度 2
		平均緩徐相速度 (10秒間毎)		全経過低速度 2 *	全経過低速度 2
		平均急速相速度 (10秒間毎)		全経過低速度 2 *	全経過低速度 1
		平 均 振 巾 (10秒間毎)		小 振 巾 1	正
		振 盪 野		検査せず	検査せず
		後 眼 振		一	一
	左右差 (数・速度・振巾)		両側低眼振にて患側向き高度 1	両側低眼振にて健側向き高度 2	
	垂 直	波 形	緩 徐 相 急 速 相	不 規 則 1	下向き眼振不規則 1 正
打 数 (10秒間毎)		低 頻 度 1 **	低 頻 度 2		
視 標 追 跡 (水平)			階 段 状 3/3	階 段 状 2	

*階段状眼振2例を除く， **不規則例1例を除く

聴神経腫瘍4例においては、波形が階段状を呈したのが2例で、これはいずれも方向にて錯倒を呈した。計測できた2例では、打数は高速部低頻度、眼球速度は全経過低速度であった。垂直眼振では波形が不規則を呈したのが1例、打数が低頻度を呈したのが1例であった。

橋角部嚢腫2例においては、打数にて全経過低頻度を示したのが2例、緩徐相速度にて全経過低速度を示したのが2例、急速相速度にて全経過低速度を示したのが1例であった。左右差は2例とも認められ、両側低眼振であるが健側向き眼振が特に高度であった。垂直眼振では下向き眼振の解発が悪かった。

e. 考 按

聴神経腫瘍は腫瘍が小さく内耳道に局限している間は視運動眼振に異常をきたさないが、腫瘍が大きくなり小脳橋角部に拡がったり、橋角部の嚢腫が大きくなり、脳幹を圧迫する様になると前述の如く脳幹は眼運動にとって非常に重要な所であるので、圧迫の程度により色々の視運動眼振障害をきたす。

これまでの小脳橋角部障害における報告には Fox & Holmes (1926), 森本 (1954), 佐藤 (1955), Enoksson (1956), 勝見 (1963), 坂田 (1966), 吉本 (1968), 河村 (1970), 石川 (1970), 吉田 (1971) らがある。森本, 佐藤は自発眼振(または眼振準備性)のもつ意味を重要視し、聴神経腫瘍には原則的に視運動眼振に障害を認めないものと、障害を認めるものの2群あることを確認し、前者を外側腫瘍、後者を内側腫瘍と仮称しかつ視運動眼振障害は自発眼振(または眼振準備性)による消去と解釈している。また錯倒現象が現われるのも自発眼振の影響であると述べている。著者の経験した例では聴神経腫瘍4例中2例において錯倒を認めた。Enoksson, 石川は聴神経腫瘍にて病巣側の眼振解発抑制を認めている。著者の経験した例では1例にて患側向き眼振が低頻度、低速度であった。勝見は聴神経腫瘍5例とも視運動眼振の解発は抑制されており、1例は錯倒を示し、

また周囲への圧迫が著明であった1例は両側共解発されなかったと述べている。坂田, 吉本, 河村らは OKP test にて腫瘍が小さい場合は余り眼振解発に抑制をうけないが、腫瘍が大きくなり脳幹部を圧迫する様になると視運動眼振の解発が悪く、しかも緩徐相曲線の上昇が少ないなど特徴ある中枢型障害型(とくに患側において著しい)を呈し、更に大きくなると健側へも圧迫が加わるため、両側が障害され左右差を認めないと述べている。吉田も聴神経腫瘍にて眼振の解発が悪く、また左右差も認めなかったと述べている。著者の経験した聴神経腫瘍4例を視運動眼振異常の経過でみると次の如くなる。①水平眼振では波形、方向は正常であるが、打数は低頻度、眼球速度は低速度である。左右差を認め、患側向き眼振が低頻度、低速度である。垂直眼振では波形、打数とも正常である。この腫瘍の大きさはクルミ大位であった。②水平眼振では波形、方向とも正常であるが、打数は低頻度、眼球速度は低速度である。左右差は認められない。これは健側にも圧迫の影響がおよんでいるためと考えられる。垂直眼振では上向き眼振の波形、打数は正常であるが、下向き眼振の波形は不規則で、打数は測定不能である。この腫瘍の大きさは3.5×4×4cmであった。③水平眼振では波形は階段状になり、方向は錯倒し、打数、眼球速度は波形が階段状のため測定不能、左右差は障害が強いため認めず。垂直眼振でも波形は不規則になり、打数も測定不能である。腫瘍の大きさは鶏卵大〜鵝卵大で脳幹を強く圧迫していた。以上より水平眼振、垂直眼振検査をすることにより、障害の程度を推察することが可能である。また左右差を検討すると、聴神経腫瘍の1例は両側低眼振で患側向き眼振が高度であるが、橋角部嚢腫の2例は両側低眼振で健側向き眼振が高度であった。この様に障害も色々とも異っている。これは同じ橋脳の障害でありながら Foville 症候のように注視麻痺のある場合は必ず注視麻痺側への視運動眼振が障害されると明らかな差である。

〔Ⅱ〕視運動眼振異常と自発眼振

A. 検査成績

自発眼振（裸眼およびフレンツェル眼鏡下）、注視眼振、頭位眼振、頭位変換眼振検査成績と視運動眼振検査成績との関連性について検討する。

a. 大脳腫瘍8例

自発眼振（裸眼）は全例で認められなかった。フレンツェル眼鏡下では8例中1例で左水平性眼振を認めた。この例は両側前頭脳腫瘍症例で、視運動眼振は両側高眼振、左向き高度で、自発眼振と同方向の眼振が多かった。

注視眼振は2例で認められた。1例は右前頭脳腫瘍症例で、右注視時のみ右向き眼振を認め、視運動眼振は両側高眼振、患側右向き眼振が高度であった。他の1例は両側前頭脳腫瘍症例で、右注視時のみ右向き眼振を発現し、視運動眼振は両側高眼振で左向き眼振が多かった。

頭位眼振は検査した5例中1例に認めた。この症例は右前頭脳腫瘍症例で、方向固定性眼振を示し、視運動眼振は両側高眼振、患側右向き眼振が多かった。

頭位変換眼振検査は3例に行なったが、すべての例に眼振は認められなかった。

b. 大脳核障害7例

自発、注視、頭位、頭位変換眼振検査において、全例とも眼振を認めなかった。

c. 小脳障害10例

自発眼振（裸眼）を認めたもの4例、認めなかったもの6例であった。認めた4例中1例は脊髄小脳変性症（小脳型）例で左水平性、1例は小脳半球腫瘍症例で右水平性と上眼瞼向き、1例は小脳虫部腫瘍症例で上眼瞼向き、1例は晩発性小脳皮質萎縮症例で右下眼瞼および下眼瞼向き眼振であった。視運動眼振は4例とも両側低眼振であった。

注視眼振を認めたものは10例中4例であり、左小脳半球腫瘍、小脳虫部腫瘍、脊髄小脳変性症（小脳型）、晩発性小脳皮質萎縮症例である。この4例の視運動眼振はいずれも両側低眼振で

あった。

頭位眼振は検査した9例中4例で認められ、自発、注視眼振を認めた症例であり、これらはいずれも方向変換性であった。これらの視運動眼振はいずれも両側低眼振であった。頭位変換眼振は検査した2例中1例（小脳型）で認められ定方向性眼振であった。この視運動眼振は両側低眼振であった。

d. 視床、四丘体部、橋脳、延髄障害

視床腫瘍例は自発（裸眼、フレンツェル眼鏡下）、注視、頭位眼振いずれも認めなかった。なお上方注視不能であった。視運動眼振は両側低眼振であった。

四丘体部の松果体腫瘍例では自発眼振は認めなかったが、注視眼振は左右注視時に注視方向への眼振を認めた。視運動眼振は両側低眼振であった。

橋脳障害すなわち Foville 症候2例中1例については自発眼振は裸眼では認めず、フレンツェル眼鏡下では健側右向き眼振を認めた。注視眼振は右注視方向性眼振であり、左方注視は不能であった。頭位眼振は方向固定性（右向き）眼振であった。他の1例では、自発眼振は裸眼では上眼瞼、右上眼瞼、右水平性眼振であり、フレンツェル眼鏡下では右水平性眼振であった。注視眼振は右、上、下方視にて上眼瞼、右上眼瞼、右水平性眼振であり、左方注視は不能であった。この2例の視運動眼振は両側低眼振であるが、何れも注視麻痺側すなわち患側左向き眼振が少なかった。

延髄腫瘍1例では、自発眼振は裸眼においては認められなかったが、フレンツェル眼鏡下では左水平性眼振を認めた。注視眼振は認めなかった。この視運動眼振は両側高頻度であったが、左右差は認めなかった。

e. 橋角部腫瘍6例

自発眼振（裸眼）を認めたものは5例であった。このうち3例は右水平性眼振を示した。この例の視運動眼振検査では、1例（患側右）は両側対称性低眼振、1例（患側左）は両側低眼

振で自発眼振の向く右向き眼振が少なく、1例（患側左）は両側低眼振で自発眼振方向と反対の左向き眼振が少なかった。左水平性眼振を示した1例（患側右）、左回旋性眼振を示した1例（患側右）では、視運動眼振は両側対称性低眼振であった。自発眼振（フレンツェル眼鏡下）を認めたものは3例であった。このうち2例（患側右および左）は右水平性眼振を示した。この例の視運動眼振検査では1例（患側右）は両側対称性低眼振、1例（患側左）は両側低眼振で自発眼振の向く右向き眼振が少なかった。左水平性眼振を示した（患側右）例は1例で、視運動眼振は両側対称性低眼振であった。

注視眼振、頭位眼振は全例にて認められ、これらの視運動眼振検査では3例は両側対称性低眼振、1例（患側左）は両側低眼振で右向き眼振が低、2例（患側右および左）は両側低眼振で左向き眼振が少なかった。

B. 考 按

自発眼振の存在する時、視運動眼振の発現がどのような影響を受けるかにおいては、Brunner (1932), 佐藤 (1955), Kestenbaum (1961), 水越 (1966) の記載がある。Brunnerは末梢迷路性自発眼振は視運動眼振でかくされ、正常な視運動眼振がおこること、振子様固視眼振は視運動眼振がかくされず眼振の錯倒(Inversion)が現われること、中枢性迷路性眼振も視運動眼振でかくされ、正常の視運動眼振が現われること、眼科疾患による律動眼振は大部分の例では錯倒を示すが、一部の例では正常な視運動眼振が現われることを述べている。佐藤は聴神経腫瘍例において腫瘍が内耳道孔附近に局限する例では、自発眼振<視運動眼振であり、腫瘍が脳幹、小脳を圧迫する例では自発眼振>視運動眼振であったことを述べ、また小脳虫部ならびに半球腫瘍、大脳側頭葉障害例において自発眼振>視運動眼振であった例を報告している。Kestenbaum は迷路性自発眼振のある例に視運動刺激を加えると、自発眼振に新しく誘発された視運動眼振が加算されて現われること、固

視障害による自発眼振では、視運動刺激負荷にかかわらず自発眼振が続いたり、錯倒眼振が現われたりすることを述べている。

著者の観察例では小脳腫瘍例、橋角部腫瘍例とも小脳、脳幹障害による視運動眼振異常の所見が強く、自発眼振の影響により視運動眼振に変化が生じたと判定するより、視運動眼振発来自体が障害されていると解すべき症例が大部分であった。

〔Ⅲ〕 視運動眼振異常と迷路眼振異常

A. 検査成績

視運動眼振異常と迷路眼振異常との関係は図27の如くである。

大脳腫瘍8例中2例は視運動眼振正常であり、迷路眼振も正常であった。3例は視運動眼振低頻度で、迷路眼振では1例は正常、2例はhypernystagmusであった。3例は視運動眼振hypernyst. であり、迷路眼振では1例は正常、2例はhypernyst. であった。

大脳核障害7例においては、1例は視運動眼振、迷路眼振とも正常であった。4例は視運動眼振hyponystagmusであり、迷路眼振では2

図27 迷路眼振異常との関連でみた視運動眼振異常。

例が正常, 2例は hypernyst. であった. 2例は視運動眼振 hypernyst. であり, 迷路眼振では2例とも正常であった.

小脳障害10例中9例は視運動眼振 hyponyst. であり, この迷路眼振は6例が正常, 3例が hypernyst. であった. また10例中1例は視運動眼振, 迷路眼振とも正常であった.

視床腫瘍1例, 四丘体部腫瘍1例では, 視運動眼振は hyponyst. であったが, 迷路眼振は正常であった. 橋脳障害2例では視運動眼振, 迷路眼振とも hyponyst. であった. 延髄腫瘍1例は視運動眼振 hypernyst. で迷路眼振も hypernyst. であった.

小脳橋角部腫瘍6例においては, 全例とも視運動眼振 hyponyst. であり, 迷路眼振も hyponyst. であった.

次に片側病巣例で, 視運動眼振検査にて左右差を認めた10例につき視運動眼振左右差と迷路眼振左右差の関係を検討する.

前頭脳腫瘍2例は視運動眼振にて患側向き hypernyst. を認め, 迷路眼振では1例は正常, 1例は患側向き hypernyst. であった. 頭頂・側頭葉腫瘍では視運動眼振は健側向き hyponyst. であったが, 迷路眼振は対称性で正常であった. 後頭葉腫瘍では視運動眼振は健側向き hyponyst. で迷路眼振は患側へ hypernyst. を示した. 大脳皮質下腫瘍では視運動眼振は患側向き hyponyst. で迷路眼振は対称性に hypernyst. を示した. 橋脳(Foville 症候)障害2例では, 視運動眼振は患側向き hyponyst. で, 迷路眼振も患側向き hyponyst. であった. 橋角部腫瘍3例のうち, 聴神経腫瘍1例では視運動眼振は患側向き低頻度で, 迷路眼振も患側向き hyponyst. であった. 橋角部嚢腫2例では, 視運動眼振は健側向き hyponyst. で, 迷路眼振は2例とも患側向き hyponyst. であった.

以上10例をまとめると, 視運動眼振にて患側向き hypernyst. を示したのは2例で, ともに前頭脳腫瘍であった. 患側向き hyponyst. を示したのは4例で, 大脳皮質下腫瘍1例, Foville

症候2例, 聴神経腫瘍1例であった. 健側向き低頻度を示したのは4例で, 頭頂・側頭葉腫瘍1例, 後頭葉腫瘍1例, 橋角部嚢腫2例であった.

B. 考 按

以上視運動眼振異常と迷路眼振異常の関係について述べた.

迷路眼振方向優位性と視運動眼振方向優位性との関係を検討する目的で, 視運動眼振の異常と迷路眼振異常を検索した研究は Carmichael et al (1954), 小池(1964), 水越(1966)らによりなされている. しかし, 視運動眼振と迷路眼振の生理的意義の異なることに着目して, 中枢神経障害で現われる両眼振の異常の関係を検討したものは時田ら(1964, 1969)をみるのみである. 時田らは眼振検査においては, その反射路が異り, かつ生理的意義の異なる視運動眼振と迷路眼振の両者の成績より異常の解釈を行うことが必要であることを述べ, 視運動眼振異常と迷路眼振異常の関連でみた眼振異常の主なる型として, ①視運動眼振正常, 迷路眼振 hyponyst. となる型, ②視運動眼振, 迷路眼振とも hyponyst. となる型, ③視運動眼振は hyponyst., 迷路眼振は hypernyst. を示す型をあげている. そして第一の型は末梢迷路障害例に, 第二の型は脳幹障害で視性眼運動系, 迷路性眼運動系の両者が障害された例に, 第三の型は小脳, 大脳障害例に認められることを述べている. 本論文に述べた成績は, 中枢性平衡障害例のみの観察結果であり, 時田らが末梢迷路障害に現われるとする, 視運動眼振正常, 迷路眼振 hyponyst. を示す例は認めなかった. 視運動眼振, 迷路眼振とも hyponyst. を示した例は Foville 症候2例と橋角部腫瘍例6例のあわせて8例で, 何れも脳幹障害であった. 視運動眼振 hyponyst., 迷路眼振 hypernyst. 例は7例で, 大脳腫瘍, 大脳核, 小脳障害例であった. 視運動眼振 hyponyst., 迷路眼振正常例は11例で, 大脳腫瘍例, 大脳核障害例, 小脳障害例, 視床腫瘍例, 四丘体部腫瘍例に認めた. 視運動眼振 hypernyst. で, 迷路眼振正常例は3例で, 大脳(前頭脳)

腫瘍例, 大脳核障害例に認めた. 視運動眼振, 迷路眼振とも hypernyst. を示した例は 3 例で, 大脳 (前頭脳) 腫瘍, 延髄腫瘍例であった.

視運動眼振左右差と迷路眼振左右差との関係については Carmichael et al., 小池, 水越, 時田らがある. Carmichael らは温度眼振における眼振方向優位性 (directional preponderance, DP) は側頭葉の後半で, 視運動眼振および迷路眼振両者の DP は側頭葉後半のみでなく, supramarginal および angular gyrus の障害で現われることを報告している. 小池, 水越は中枢神経疾患例, 迷路性疾患例において視性 DP と迷路性 DP の関係を検討している. 時田らは中枢神経障害例で迷路眼振左右差は 1 例

の眼振の hypernystagmus により現われる場合が多いが, 視運動眼振の左右差は一側の眼振低減により生ずる例が多いことより, 両者の左右差を DP という言葉で同じに表現することに反対し, hyper 型 asymmetry と hypo 型 asymmetry を区別し, 両眼振左右差につき検討している. 上記の観察例より代表的な型として Foville 症候例で視運動眼振, 迷路眼振とも患側向きが低減する型, 後頭葉腫瘍例で視運動眼振は健側向きが低減し, 迷路眼振は患側向きに高眼振を示す型, 前頭脳腫瘍例で, 視運動眼振, 迷路眼振とも患側向きに高眼振を示す型をあげることができる.

V 総

近時, 耳鼻科医が前庭性めまい, 平衡障害の診断のみならず, 中枢性めまい, 平衡障害の診断をも守備範囲とするに到り, 平衡機能検査の一環として視運動眼振検査の重要性が認められ, 検査する機会が多くなってきた. しかし, これらのデータを定量的に解析し異常を客観的に把握する方法は確立されていない. よって岐大耳鼻科において計測法と呼ぶ方法を考案し眼振のパラメータとして, 打数, 眼振緩徐相速度, 振巾をとりあげ, 等加速度視運動刺激に対する眼振発来経過の正常値 (信頼限界, 棄却限界) を導出し, この値を印刷した図に被験者の計測値を記入し, 成績を評価する方法を行っている. しかし被験者のデータをパラメータごとに用手法にて計測するには労力と時間がかかる為, 眼振自動処理装置を製作して解析にあたり, 短時間のうちに客観的に成績を評価できる様にした. 今回上記の計測法に加えて, 更にパラメータとして波形, 方向, 眼振急速相速度, 振盪野, 後眼振, 左右差を取りあげて, 中枢性平衡障害例に検査を行ない, 眼振を客観的に観察し各部の障害で生ずる視運動眼振異常の性質をよりよく把握できた. 以下各部の障害における視運動眼振異常の性質を要約すると以下の如くで

括

ある.

A. 大脳腫瘍例

a. 前頭脳腫瘍例では打数は低速部において高頻度を呈し, 振巾は小振巾となりやすい.

b. 頭頂・側頭葉腫瘍例では打数は高速部低頻度, 緩徐相速度は全経過低速, 振巾は健側向き小振巾, 左右差は健側向き低眼振であり, 垂直眼振も低頻度であった.

c. 後頭葉腫瘍例では打数は全経過低頻度, 緩徐相速度は全経過低速度, 振巾は健側向き小振巾, 左右差は健側向き低眼振であり, 垂直眼振も低頻度であった.

d. 皮質下腫瘍例では打数は高速部低頻度, 緩徐相速度は高速部低速度であった.

B. 大脳核障害例

a. パーキンソン病例では波形は鋸歯状, 打数は低速度高頻度であった.

b. 舞蹈病例では波形は動揺形, 打数は高速部または全経過低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は低速度であった. 垂直眼振でも波形は動揺形であった.

c. 片側アテトーゼ例では波形, 打数, 眼球速度は正常であるが, 振巾は大振巾であった.

C. 小脳障害例

a. 小脳腫瘍例では波形は階段状, 打数は全経過低頻度, 緩徐相速度は全経過低速度であった.

b. 脊髄小脳変性症例では波形は階段状または動揺形, 打数は全経過低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は全経過低速度であった.

D. 視床, 四丘体部, 橋脳, 延髄障害例

a. 視床腫瘍例では波形は動揺形, 打数は全経過低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は全経過低速度, 振巾は小振巾, 振盪野は緩徐相側に偏倚した. 垂直眼振は発来しなかった.

b. 四丘体部腫瘍例では打数は全経過低頻度, 緩徐相速度は全経過低速度. 垂直眼振では上向き眼振は発来しなかった.

c. 橋脳障害例では波形は正常, 打数は高速部低頻度, 緩徐相速度は高速部低速度, 左右差は患側向き眼振が低であった.

d. 延髄腫瘍例では打数は低速部高頻度であった.

E. 小脳橋角部腫瘍例

a. 聴神経腫瘍例で, 腫瘍が小さい場合では波形, 方向は正常, 打数は低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は低速度にて, 左右差を認め, 患側向き眼振が低頻度, 低速度であった. 垂直眼振は波形, 打数とも正常であった. 腫瘍が大きくなるにつれ, 波形, 方向は正常, 打数は低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は低速度と腫瘍が小さい場合と同じであるが, 左右差を認めなくなり, 垂直眼振では上向き眼振は正常であるが, 下向き眼振の波形が不規則になってくる.

更に腫瘍が大きくなると, 波形は階段状になり, 方向は錯倒し, 打数, 緩徐相速度, 急速相速度は階段状波のため測定できず, 左右差も認めない. また垂直眼振も波形が不規則になる.

b. 橋角部囊腫例では波形, 方向は正常, 打数は全経過低頻度, 緩徐相速度, 急速相速度は低速度であった.

以上は障害部位における視運動眼振の特徴的な成績であるが, 正常値を示す場合もある. 以上の如くパラメータを多くすることにより視運動眼振異常をより多く把握できる. 更に生理的な視運動眼振の異常は非生理的な迷路眼振との両者の関連でみると, 更にその異常を深く把握することができると考える. すなわち①視運動眼振, 迷路眼振とも *hyponyst.* を示した例は *Foville* 症候, 橋角部腫瘍例など脳幹部障害を示した例で認めた. ②視運動眼振は *hyponyst.* で迷路眼振は *hypernyst.* を示した例は大脳(後頭葉, 皮質下)腫瘍, 大脳核障害(小舞蹈病), 小脳障害(半球腫瘍, 変性症)例でみとめた. ③視運動眼振は *hypernyst.*, 迷路眼振は正常であった例は大脳(前頭脳)腫瘍, 大脳核障害(パーキンソン病)例でみとめた. ④視運動眼振, 迷路眼振とも *hypernyst.* を示した例は大脳(前頭脳)腫瘍, 延髄腫瘍例でみとめた. ⑤視運動眼振は *hyponyst.* で迷路眼振は正常であった例は大脳(頭頂・側頭葉)腫瘍, 大脳核障害(*Huntington* 舞蹈病), 小脳障害(虫部腫瘍, 変性症), 視床腫瘍, 四丘体部腫瘍で認めた.

VI 結 語

中枢性平衡障害例に視運動眼振検査を行った.

1. 検査としては計測法を行った. 本法は $2^\circ/\text{sec}^2$ の等加速度刺激を 90 秒間与えて, 打数, 眼球速度, 振巾, 波形, 方向, 振盪野, 後眼振, 左右差をパラメータとして, 眼振発来経過を把握する方法である. 本法は成績を客観的に判定しうる利点がある.

2. 視運動眼振の計測処理は用手法で行なう他に, 眼振自動処理装置を製作して行った.

3. 大脳, 大脳核, 小脳, 脳幹, 小脳橋角部疾患で現われる視運動眼振異常の特徴を明らかにした.

4. 視運動眼振異常と迷路眼振異常の両者の関連において中枢性平衡障害例を検討した.

稿を終るにあたり、懇切なる御助言ならびに御高閤を賜った恩師福田精教授に心より深く感謝しますとともに、研究に際し絶えず御指導と御教示を頂いた時田喬助教授に深く御礼申し上げます。また御協力いただいた教室員各位ならびに検査に際し御便宜を計っていただいた本学第2外科、神経精神科教室に心から謝意を表します。

なお本論文の要旨は第28回日本平衡神経科学会、第31回、33回耳鼻咽喉科臨床会、第19回日耳鼻中部地方連合会、第237、239、242、243回日耳鼻東海地方会において発表した。

文 献

- 1) Arimoto, K. : Superior Colliculus, as Center of Nystagmus. Wakayama Medical Report. 4 : 1-35, 1958
- 2) Bárány, R. : Zur Klinik und Theorie des Eisenbahnnystagmus. Arch. f. Augenheilk. 88 : 139-142, 1921
- 3) Brunner, H. : Zur Klinischen Bedeutung der Inversion des Optokinetischen Nystagmus. Arch. für Ophthalm. 129 : 30-56, 1932
- 4) Carmichael, E.A., Dix, M.R., and Hallpike, C.S. : Lesions of the Cerebral Hemispheres and their Effects upon Optokinetic and Caloric Nystagmus. Brain. 77 : 345-372, 1954
- 5) Carrea, R.M.E., and Mettler, F.A. : Physiologic Consequences Following Extensive Removals of the Cerebellar Cortex and Deep Cerebellar Nuclei and Effect of Secondary Cerebral Ablations in the Primate. J. Comp. Neurol. 87 : 169-288, 1947
- 6) Cogan, D.G., and Loeb, D.R. : Optokinetic Response and Intracranial Lesions. Arch. Neurol. and Psychiat. 61 : 183-187, 1949
- 7) Cogan, D.G. : Brain Lesions and Eye Movements. The oculomotor system (Bender) Hoeber (New York) 417-423, 1964
- 8) Cohen, B., Goto, H., Shanzer, S., and Weiss, A.H. : Eye Movements Induced by Electric Stimulation of the Cerebellum in the Alter Cat. Experimental Neurology. 13 : 145-162, 1965
- 9) Cords, R. : Optisch-motorisches Feld und Optischmotorische Bahn. Ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Rindeninnervation der Augenmuskeln. Arch. Ophth. Berlin, 117 : 58-113, 1926
- 10) Cranmer, R. : Nystagmus Related to Lesion of the Central Vestibular Apparatus and the Cerebellum. Ann. Otol. Rhinol. and Laryng. 60 : 186-196, 1951
- 11) Davidoff, R.A., Atkin, A., Anderson, P.J., and Bender, M.B. : Optokinetic Nystagmus and Cerebral Disease. Clinical and Pathological Study. Arch. Neurol. 14 : 73-81, 1966
- 12) Dodge, R., and Fox, J.C. : Optic Nystagmus, I. Technical Introduction with Observations in a Case with Central Scotoma in the Right eye and External Rectus in the Left Eye. Arch. Neurol. Psych. 20 : 812-823, 1928
- 13) Dow, R.S., and Moruzzi, G. : The Physiology and Pathology of the Cerebellum. The University of Minnesota Press, Minneapolis, 1958
- 14) Dow, R.S., and Manii, E. : The Relationship of the Cerebellum to Extraocular Movements, The oculomotor system. (Bender) Hoeber, (New York) 280-292, 1964
- 15) Enoksson, P. : Optokinetic Nystagmus in Brain Lesions. Acta Ophthalm. 34 : 163-184, 1956
- 16) Foerster, O. : Die Topik der Hirnrinde in ihrer Bedeutung für die Motilität. Deutsche Zeits 5 Neurvenheilk 94 : 1926 cit 平沢 興 : 大脳の最高中枢 京都日本医出版 1950
- 17) Fox, J.C., and Holmes, G. : Optic Nystagmus and its Value in the Localization of Cerebral Lesions. Brain. 44 : 333-371, 1926
- 18) Fukuda, T. : Vertical Writing with Eyes Covered. A New Test of Vestibulospinal Reaction. Acta Otolaryngol. (Stockh.) 50 : 26-36, 1959
- 19) Fukuda, T. : The Stepping Test. Two Phases of the Labyrinthine Reflex. Acta Otolaryngol. (Stockh.) 50 : 95-108, 1959
- 20) 福田 精 : 平衡機能検査, 耳鼻臨床 64 : 89-106, 1971

- 21) 藤崎茂己, 酒井俊一, 長谷川進, 福田宗弘 : 小脳虫部 (扁桃) 腫瘍症例, 日耳鼻 65 : 860-864, 1962
- 22) 荻原 朗 : 眼機能 ; 両眼視, 輻輳及びその障害, 日本眼科全書 7 : 4 冊 金原出版, 1-246, 1961
- 23) 長谷川慧介 : 脳病変と視性眼振に関する実験的研究, 新潟医学会誌, 70 : 990-1003, 1956
- 24) Henderson, J.W., and Crosby, E.C. : An Experimental Study of Optokinetic Responses. A.M.A. Arch. of Ophthal. 47 : 43-54, 1949
- 25) 平沢 興 : 小脳の伝導路, 脳研究 3 : 86-101, 1949
- 26) Hoshino, T. : Beiträge zur Funktion des Kleinhirnwurmes beim Kaninchen. Acta Otolaryng. suppl II ; 1921
- 27) 星野貞次, 南雲覚治 : 視性眼球震盪の実験的研究, 北越医学会雑誌 38 : 545-563, 1923
- 28) 生井 浩 : 眼筋 : 眼位, 斜視及び眼球振盪, 日本眼科全書第11巻, 金原出版 1953
- 29) 石黒栄一 : 視性眼振に関する知見補遺, 新潟医学会誌 73 : 1664-1683, 1959
- 30) 石川和光 : 水平・垂直性視機性眼振検査の臨床的研究, 日耳鼻 73 : 1329-1349, 1970
- 31) Jung, R., and Kornhuber, H.H. : Results of Electronystagmography in Man. The Value of optokinetic, Vestibular and Spontaneous Nystagmus for Neurologic Diagnosis and Research. The Oculomotor system (Bender) Hoeber (New York) 428-482, 1964
- 32) 勝見 右 : 加速度刺激による視性眼振検査法, 新潟医学会誌 77 : 37-55, 1963
- 33) 河村正三, 土屋 寛, 飯村晃彦, 久保田肇 : 脳腫瘍に関する神経耳科学的考察, 耳鼻臨床 62 : 1055-1066, 1970
- 34) Kestenbaum, A. : Clinical Methods of Neuroophthalmologic Examination. Grune and Stratton 335-399, 1961
- 35) 小池吉郎 : 眼振所見よりみた眩暈症(抄) 日耳鼻第65回シンポジウム「めまい」別冊 1964
- 36) Kornmüller, A.E. : Eine Experimentelle Anästhesie der Äusseren Augenmuskeln am Menschen und Ihre Augenwirkungen. J. Psychol. Neurol. 41 : 354-366, 1931
- 37) 前島禎也 : 視動性眼振発現機構に関する実験的研究, 和歌山医学 11 : 619-638, 1960
- 38) 水越鉄理 : ルーチンテストとしての平衡機能検査法の問題点, 実験的眼振検査(特に視性眼振検査)の意義について, 耳鼻臨床 59 : 361-366, 1966
- 39) 森本正紀 : 脳腫瘍と視性眼振, 耳鼻臨床 47 : 929-931, 1954
- 40) 小川鼎三 : 脳の解剖学, 南山堂 1951
- 41) Ohm, J. : Optokinetischer Nystagmus und Nystagmographie im Dienste der Hirndiagnostik. Archiv für Augenheilk. 106 : 185-220, 1932
- 42) Ohm, J. : Die objektive Sehschärfenbestimmung mit Hilfe des optokinetischen Nystagmus bei einem einäugigen „Kriegsblinden“ (3Abb.) Klin. Monats bl. f. Augenh. 115 : 193-197, 1949
- 43) Ohm, J. : Der Neurogene Nystagmus. Ein Treffpunkt für Augenärzte, Ohrenärzte und Nervenärzte. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart, 1955
- 44) Pasik, P., Pasik, T. and Krieger, H.P. : Effects of Cerebral Lesions upon Optokinetic Nystagmus in Monkeys. J. Neurophysiol. 22 : 297-304, 1959
- 45) Pasik, T., Pasik, P. and Bender, M.B. : The Superior Colliculi and Eye Movements. Arch. Neurol. 15 : 420-436, 1966
- 46) 坂田英治, 五島一吉, 許 端光 : 視性運動性眼振検査の診断的意義に関する検討, 日耳鼻 69 : 2034-2042, 1966
- 47) 坂田英治, 長島親男, 吉浜博太, 岩間和生, 瀬戸口寿一, 許 端光, 林 宏典 : メマイ, 平衡障害における眼球運動検査の診断的価値と限界, 耳鼻臨床 61 : 543-562, 1968
- 48) 坂田英治, 瀬戸口寿一, 許 端光, 篠沢貞夫, 林宏典 : 小脳障害に関する神経耳科学的研究, 一第1報 : 小脳半球障害は眼球運動検査によって診断可能か? 耳鼻臨床 61 : 1642-1658, 1968
- 49) 佐藤 博 : 脳腫瘍の視性眼振に関する研究, 新潟医学会誌 69 : 59-73, 1955
- 50) Smith, K.U., and Bridgman, M. : The Neural Mechanism of Movement Vision and Optic

- Nystagmus. J. Exper. Psychol. 33 : 165-187, 1943
- 51) Smith, J.L., and Cogan, D.G. : Optokinetic Nystagmus : A Test for Parietal Lobe Lesions. Amer. Journal of Ophthalm. 48 : 187-193, 1959
- 52) Smith, J.L., and Cogan, D.G. : Optokinetic Nystagmus in Cerebral Disease. A report of 14 autopsied cases. Neurology. 10 : 127-137, 1960
- 53) Smith, J.L. : Optokinetic Nystagmus. Its use in topical neuro-ophthalmologic diagnosis. Charles C Thomas. Publischer Springfield. Illinois. U.S.A. 1963
- 54) Snider, R.S., and Stöwell, A. : Receiving Areas of the Tactile, Auditory, and Visual Systems in the Cerebellum. J. Neurophysiol. 7 : 331-357, 1944
- 55) 鈴木淳一, 小松崎篤, 徳増厚二, 坂田英治, 五島一吉 : 視性運動性眼振の臨床的応用 —OKP テストについて—, 日耳鼻 64 : 1422-1425, 1961
- 56) Takebayash, H., Arimoto, K., Maeshima, J., and Kimoto, T. : Role of Superior Colliculus Playing in the Mechanism of the Optokinetic Nystagmus. Wakayama Medical Reports 5 : 211-218, 1960
- 57) 竹森節子, 上田良穂 : 脊髄小脳変性症の神経耳科学的考察, 耳と臨 14 : 205-212, 1968
- 58) Teng, P., Shanzer, S., and Bender. M.B. : Effects of Brainstem Lesions on Optokinetic Nystagmus in Monkeys. Neurology (Minneapolis) 8 : 22-26, 1958
- 59) 時田 喬 : 内耳性めまいの素因 (眩暈準備状態) の検査と治療, 日耳鼻 第65回 総会 シンポジウム (めまいをめぐる諸問題) 於徳島 1964
- 60) 時田 喬, 渡辺忠彦, 宮田英雄, 加藤道雄, 永田隆郎, 島田 六郎, 田口 拓雄, 鈴木 智雄, 桜井 道子, 服部智美 : 視機性眼振異常の分類, 耳と臨 14 : 補冊 1 : 186-196, 1968
- 61) 時田 喬, 宮田英雄, 藤垣 熙, 永田隆郎, 小林武, 加藤祐峰, 鈴木智雄, 田口拓雄, 島田六郎, 日比孝也 : 視機性眼振異常とその解釈, 耳鼻臨床 62 : 923-953, 1969
- 62) Tokita, T., Suzuki, T. and Hibi, T. : Clinical Observations of optokinetic hypernystagmus. Equilibrium Res. Suppl. 2 : 79-89, 1971
- 63) 時田 喬 : 眼振の生理と検査 第73回日耳鼻総会 (岐阜) 宿題報告 日耳鼻 75 : 11 : 1309-1328, 1972
- 64) Tönnis, W. : Diagnostik der intrakraniellen Geschwülste. Olivecrona, H., and Tönnis, W. Handbuch der Neurochirurgie III/IV Springer, Berlin. 1962
- 65) 上田良穂 : 橋脳背側部の障害と眼球運動, 耳喉 40 : 127-137, 1968
- 66) Vogt, C. and O. Allgemeine Ergebnisse Unserer Hirnforschung. J.b. psychol. u neurol. 25 : Ergänzungsheft 1/3 399-462, 1919
- 67) 山田隆志, 岡谷透 : 脳幹障害によるめまい症例, —Foville's syndrome—, 耳と臨 14 : 197-204, 1968
- 68) 吉田昭男 : 視運動性眼振における意志の問題, 日耳鼻 74 : 912-937, 1971
- 69) 吉本 裕 : 聴神経腫瘍の臨床的ならびに文献的考察 (その2) —神経耳科学的検査所見について—, 耳喉 40 : 531-538, 1968
- 70) 前庭研究会編 : 前庭研究会の歩み経過報告, 日耳鼻 64 : 1614-1621, 1961

(原稿到着 : 昭和47年11月29日
別刷請求先 : 鈴木智雄
〒500 岐阜市司町
岐阜大学医学部耳鼻咽喉科)