臨床ノート

扁桃と腎炎

小 林 収
こ ばやし おさむ

小児の急性糸球体腎炎の大部分はA12型による上気道感染とくに扁桃炎が先行疾患となつて、1~3週の潜伏期間後に発症しているのは衆知のことである。ここには腎炎発生後扁桃の役割について今までの本教室にての成績の要点を次にあげる。

1. 第1回急性腎炎発作のさい扁桃炎持続によりその後にも影響をもつと思われるときには、急性症状の一応鎮静した発病1.5ないし2ヵ月後に扁桃摘出を行なっている。術前後に数日間つづ止血剤を与えておくといふようで、今までに強い腎炎悪化例を経験していない。手術侵襲にて蛋白尿、血尿の一過性に増強あるいは出現することは少なくないが、大体数日、1~2週にてもとの状態に復している。抗生剤にて強い扁桃病巣を鎮静し得ないときには早期に手術が行われるが危険性は少ないようである。

2. 経過の遷延するとき扁桃摘出にて経過を短縮しうるか。小児では急性腎炎は比較的短期間に治るので、少数例の成績にて十分に比較し

えないが、あまり影響はないようである。

3. 再燃を防止しうるか。軽快している経過中に種々の原因とくに扁桃炎発生により蛋白尿、血尿などの増悪のみられることは稀でない。これは再燃といい、数%から10%例にあり、これによって経過がゆがめられ、遷延し、1年以上にわたることもある。今までの経験例は表のようで炎症原因による慢性経過は16例で、10才以下の年少児に多いことが目立つ。このうち15例が上気道感染により、年少群にとくに扁桃炎の役割の大きいことが判明した。しかし進行性腎障害は1例も認められていない。抗生剤および扁桃摘出にて上気道感染、扁桃炎発生を減らすことによって再燃を防止して全例とも治癒せしめている。

4. 急性腎炎の諸症状が一応消滅して臨床的治癒とされている例が、その後短期間に養護過誤、上気道炎などにて経過中の再燃と同様に急性腎炎初発作症状、血尿、蛋白尿などの出現することがある。この場合には前述の再燃のときと同様に先行誘因疾患から尿異常発現まで、すなわち潜伏期間は初回発作とは異なつて、短くて1乃至数日以内である。原因疾患は再燃の場合と同様に溶連菌でなくて他の何れの菌、ウイルスによる非特異的感染にて発現する。またこのような感染時に種々の程度の血尿発作のおこる例もあり、このような例では腎機能は正常であるが、何れにしても慢性腎不全への進展と

Correlation between Chronic Course of Acute Glomerulonephritis and Exacerbation

Age Years \ Sex	Sex		Total
	Male	Female	
Under 10	6	5	11
Over 10	3	2	5
Total	9	7	16

Tonsillitis and Glomerulonephritis
Osamu Kobayashi
新潟大学小児科

誤られることがある。腎生検による組織像には一般に著しい病変は認められなく、電子顕微鏡的にも免疫蛍光染色法にても軽微変化である。

このような病変でも1部には進行性のこともあるといわれている。以上のように臨床的治癒と腎組織学的鎮静とは平行的關係はなく、腎病変活動性は臨床的治癒よりも長い期間つづくことが考えられる。

5. 再発を防止しうるか。急性腎炎の完全治癒後に新たな第2の発作は非常に稀れとされていたが、サルファ剤、抗生剤の開発にてこれらが先行疾患に早期に用いられて、特殊起腎炎性菌抗体形成不十分に第2の新たな発作が稀れでなくあり、著者らは約7%例を経験している。新再発作は初回発作と全く同様の免疫反応によって発症することを認めている。扁桃炎を再三くり返えすとき扁桃摘にてかなりこれを防止しえているが、完全には防止しえない。第2の新発作は年長児に比較的多く、扁桃炎によるこ

とは比較的少なくなるが、年長児とくに女兒例では経過の遷延しやすいことから、意義は少ない。

6. 扁桃摘により腎炎発症を完全に予防しうるか。扁桃摘を行なった小児の急性腎炎発作のあった数例を経験している。扁桃摘によりある程度急性腎炎発症を防止しうるとしても完全には防止しえないと考えられる。これは扁桃摘にて起腎炎性菌感染を防止しえないことから当然なことであらう。

7. 慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、血管性紫斑病性腎炎などの経過中に扁桃炎発生にて、しばしば悪化、再燃などの要因の1つとなっていることから、これを減少させることは治療法の大切な1つであるが、原因疾患の本質には大きい影響はないとされている。

(原稿到着：昭和49年1月7日)

別刷請求先：小林 収

〒951 新潟市旭町通1の754

新潟大学医学部小児科

腎 炎 と 扁 桃 炎

きの
木 下

やす
康 たみ
民

急性糸球体腎炎が感染症の炎症消退後、多くは数日乃至1～2週後に発症することは周知の事実であるが、感染症の中でも扁桃炎と、またかつては猩紅熱の占める位置は極めて重大なものであったが、猩紅熱のほとんどみられなくなった今日では扁桃炎が極めて重要である。多くの文献にみられる数字は扁桃炎を含む上気道感染症は先行感染の30%～60%を占めている。急性糸球体腎炎のみならず、腎炎の再燃にも、扁桃炎の発症に決して無視できない。

猪教授門下の菱沼は腎炎患者の摘出扁桃の病理組織学的検討を行ない、罹患扁桃が、ある時期の腎炎の focus 病巣となることを明らかにし、また猪教授門下の2、3の方々により扁桃の病巣抗原性、腎炎における病巣抗原の役割などが、動物実験的に詳しく検討され、証明されている。このような実験的事実と、臨床例の摘出扁桃の病理組織学的検査ならびに臨床的経験から、腎炎と扁桃炎の密接な関係は極めて明らかなものとなっている。

The Effect of Tonsillitis on Glomerulonephritis

Yasutami Kinoshita

新潟大学医学部教授