研 究

アミノ配糖体系抗生物質による内耳障害様式
に関する実験的研究とよ だ や はち ろう
豊 田 弥 八 郎

緒 言

1946年, Brown and Hinshaw³⁾ がストレプトマイシンによる平衡感覚障害および聴覚障害について報告して以来, 臨床的にストレプトマイシン, カナマイシンなどのアミノ配糖体系抗生物質がその副作用として, 時に重篤な聴平衡感覚障害を来することが明らかにされてきた. その後, これらの機能障害を来す原因となる障害部位をめぐって Mushett and Martland¹⁶⁾, Stevenson et al²¹⁾, Rüedi et al¹⁸⁾, Floberg et al⁹⁾ らの報告が見られ, 第八神経領域の種々の部位での病理組織学的変化が報告されているが, 1951年, Berg²⁾ がストレプトマイシンの侵襲の第一義的な部位が, 内耳末梢受容器の感覚細胞であることを実験的に明らかにして, アミノ配糖体系抗生物質による聴平衡感覚障害の病理はほぼ確立した. しかし, その後の多くの臨床的, 実験的研究の成果にもかかわらず, それらの抗生物質が何故, 内耳感覚細胞を選択的に侵襲するのかといった基礎的問題に対する解明は現在に至るまで成功しているとはいえない.

今回, 著者は Engström⁵⁾ 鈴木²³⁾, Lindemann¹²⁾ らにより開発されたコルチ器および前庭感覚器の surface preparation の方法を用いて, ストレプトマイシンおよびカナマイシンによる内耳毛細胞障害の様式をコルチ器と *organ of Corti* に詳細に比較検討することにより, アミノ配糖体系抗生物質による毛細胞障害の本質を示唆する結果を得たので報告する.

実験目的および実験方法

実験目的

カナマイシン (以下KMと略す) の侵襲部位は臨床的にも実験的にも前庭系より聴覚系により強く偏在していること, 逆に硫酸ストレプトマイシン (以下SMと略す) では前庭系の障害がより優位であることは, 今日までの多くの研究の結果認められている事実である. しかし, KMとSMではその化学構造がほんの僅か異っているだけでもかかわらず, 内耳での侵襲部位

が何故このように明らかに異なるかといった問題については, 今日なお明確な解答は得られていない. この問題の解答としては次の二通りのことが考えられる.

1) 前庭系と聴覚系でそれぞれの部位の毛細胞にKMおよびSMに対する細胞レベルでの感受性の差が存在する.

2) 細胞レベルでの感受性には差がなく, 毛細胞に達するKMとSMの量が前庭系と聴覚系

An Experimental Study upon the Mode of Inner Ear Destruction of Guinea Pig by Kanamycin and Streptomycin sulfate

Yahachiro Toyoda

京都府立医科大学耳鼻咽喉科学教室 (主任: 水越 治教授)

で異なる。

このいずれが正しい考え方であるかを直接的な方法で知することは困難である。しかし、KMおよびSMを筋肉内あるいは腹腔内に全身的に投与し血行を介して毛細胞に達せしめると、上述したように両者で障害部位が異なってくるが、たとえばKMおよびSMを鼓室内に直接注入して、毛細胞に達する経路を変えて実験したらこれらの障害部位が変化するかどうかなどの間接的な方法でこれらの抗生物質の内耳障害の本質を示唆する傍証を得られるかも知れないと考えた。すなわち、鼓室内に注入した場合には、KMもSMもおそらく主として正円窓を介して、一部は卵円窓の第2円窓の比較的薄い結合組織の間隙を介して、直接鼓室階外リンパ腔および前庭階外リンパ腔に侵入し、その後血行を介さずにコルチ器および前庭器毛細胞に移行するものと考えられ、全身投与の場合とは明らかに異った経路で毛細胞はKMやSMにさらされると思われる。鼓室内に大量のKM、SMを注入すると、全身投与の場合より明らかに高濃度のKM、SMが急速に内耳に浸透し、毛細胞は短時間の間に急激な変化を受けるものと考えられ、この際、注入後一定時間を経れば、蝸牛内においても、前庭系内においてもほぼ同じ濃度の大量のKMおよびSMが侵入しているものと思われる。このような条件下で、なおKMを注入した場合にはコルチ器毛細胞がより強く障害され、SMを注入した場合には前庭系毛細胞がより強く障害されるとすれば、前庭系と聴覚系でKM、SMに対する毛細胞レベルでの易傷性の差を認めることができ、一方、この方法ではKMとSMでそれぞれ特異的な障害部位の差を形成し得ないとなれば、全身投与されたKM、SMがそれぞれいずれかの部位で聴覚系と前庭系へふり分けられるために障害部位に特異な差を生ずるという可能性を認めることができる。この結果から、とりもなおさず毛細胞がアミノ配糖体系抗生物質に特異的に障害され易いために内耳障害を来すのか、あるいは毛細胞が特

にこれらの抗生物質に弱いのではなく、他の物質に比して、アミノ配糖体が特に内耳へ移行し易い（あるいは停滞し易い）ために毛細胞内代謝が阻害されて内耳障害をひきおこすのかの解答をも示唆するものと考えられ、毛細胞障害機構の本質にせまることができる。

以上の事実を確かめる目的で今回の実験を企図した。

実験方法

i) 実験材料および投与方法

実験には体重200~400 gのプライエル反射正常成熟赤目モルモットを使用した。投与薬剤はカナマイシン (KM) と硫酸ストレプトマイシン (SM) の両者である。投与は動物をエーテル全身麻酔にて安静にし、耳鏡を通じて動物の左側鼓膜を明視しつつ注射針にて注意深くKMかSMを鼓室内に注入した。注入に際し、注入孔より薬液があふれ出る点を終了点として測定したところ約0.5ml注入できた。右耳は対照とした。

薬剤の総投与量は以下の通りである。

SMとKMの内耳への影響の仕方を比較するために、まず動物を二群に分け、200mg/mlの濃度になるように蒸留水で溶解したKMを投与した群と、同濃度のSMを投与した群を作って比較検討した。投与後、右耳は対照として、無処理にしたのでプライエル反射は残っており、投与側の聴力の経時的変化は電気生理学的方法を用いる以外的手段では観察できなかったが、動物はKMを投与した群でも、SMを投与した群でも、投与後3~4時間で非注入側に向う水平性自発眼振を示し、投与側への転倒傾向を示して注入側の前庭機能脱落状態が観察できた。この平衡障害は約1日で代償されるものであるが、動物が前庭機能脱落状態を来すことをもって薬剤の注入が成功したと判定して以下の実験の材料に供した。投与は1回にとどめ、投与後24時間、48時間および1週間後に動物を断頭して内耳障害の程度を観察した。投与後三種の経過時間において観察したのは、投与後の経時的

変化を観察すると共に, initial lesionが内耳のいずれの部位に現われるかを知るためである。

一方, 投与薬剤の濃度により病変がいかに変化するかを知る目的で, KM, SMともそれぞれ 50mg/ml, 100mg/ml, 200mg/ml 濃度の水溶液を作って投与した。これらの動物はいずれも 1 週間後に断頭して観察した。

鼓室内注入法は 1 回の投与で確実に内耳病変を作り得る簡便な方法であるが, 一方で非常に高濃度の薬剤を注入するために, 投与薬剤の浸透圧などの影響が内・外リンパ液のそれと著しく異なり, 特異的な内耳毒性による障害とともに, 毛細胞膜に物理的障害を来す可能性があり, したがって常にそのことを念頭においた対照を設定する必要がある。そのために, 1 群は生理的食塩水を投与して, リンパ液とは異なった浸透圧組成を有する液の影響を観察し, 他の 1 群は電解質を含まない蔗糖液を用いて 5%, 10%, 20%, 40% のものを投与して,

浸透圧の影響を観察した。

ii) 観察方法

前項のごとく処置した動物を断頭後, 耳骨胞を切離し, 骨胞を解放して双眼実体顕微鏡下に蝸牛・前庭器官の骨壁を解放して膜迷路を露出した。生存毛細胞のみを撰択的に染色する目的で, succinic dehydrogenase (SDH) 染色をほどこした。染色のための反応液は Nachla の処方に準じ, 1 時間反応せしめたのち, 10% 中性フォルマリンに 24 時間以上冷蔵固定して観察した。

コルチ器は各回転別に surface preparation をおこない, グリセリンに封入して光学顕微鏡下に観察した。前庭器官は球形のう, 卵形のう平衡斑および水平・前・後三半規管膨大部稜の感覚細胞層を細い注射針で注意深く剝離して, コルチ器同様グリセリンに封入して光学顕微鏡下に観察した。

実験結果

KM と SM での障害様式の比較

KM, SM の各々による毛細胞障害様式の比較は, それぞれ前項で述べたごとく 200mg/ml の濃度を有する水溶液を注入して 1 週間を経過した内耳を用いて観察, 比較検討した。標本とした内耳は 1 耳ごとに蝸牛各回転, 卵形球形両平衡斑および三半規管膨大部稜をすべて観察して全体の障害様式を比較通覧し考察した。

全体的にみて最も特徴的なことは, 全身投与の場合と違って, KM による変化と SM による変化とでその障害部位, 障害程度ともに有意の差を示さなかった事実である。

コルチ器における病変を KM, SM の両者について共通の変化として以下に述べる。

コルチ器上方回転では, 内毛細胞 (以下 IHC と略す) の細胞体消失が外毛細胞 (以下 OHC と略す) の消失に比してより高度であった。OHC は第 I 列 (最内列すなわちコルチトンネル側の列), 第 II 列 (中央列) で消失している

が, 第 III 列 (最外列すなわち Deiters 細胞側の列) にはまだ光顕的に健常な細胞を残している段階で, IHC はすでにすべて消失している像が認められた。また, 毛細胞障害の程度が軽度で, 上方回転 OHC に変化の認められなかった内耳でも IHC はすでにかなりの程度に障害されて, 所々歯が抜けるがごとき細胞体消失を認めた。このことより, コルチ器上方回転では OHC より IHC の方が KM, SM に障害され易いと判断される。

下方回転では OHC が IHC より強く障害され, OHC がすべて消失した段階でも IHC は光顕的には全く健常な整然とした細胞列を残していた。上方回転で OHC の消失のなかった内耳では, 上方回転 IHC がすでに変化を受けていても下方回転では OHC, IHC ともに変化を認めなかった。下方回転では, このことより, 上方回転とは逆に OHC がより障害され易いことが判った。

コルチ器では上方回転 IHC が最も障害されやすく、次いで下・上方回転 OHC が障害されやすいものと考えられ、下方回転 IHC は KM, SM に最も抵抗性を示した。

前庭器官における KM, SM による変化を以下に述べる。前庭器官における変化も KM と SM で差は認められなかった。

球形のう、卵形のうの平衡斑ではいずれの部位も Striola 部の I 型・II 型細胞の両者を強く障害し、それに反して Striola 部以外の周辺部ではほぼ完全な形で I 型・II 型細胞とも残存していた (図 1)。Striola 部の病変が軽い場合、I 型細胞の障害が先行し、II 型細胞は残存して

図 1. 200mg/ml 濃度 SM 注入内耳の球形のう斑. Striola 部の感覚細胞は全んど消失している. (SDH 染色)

図 2. 200mg/ml 濃度の SM 注入内耳の球形のう斑. Striola 部に II 型細胞のみが散在性に残存している. (SDH 染色)

いる像も認められた (図 2)。このことより、平衡斑では Striola 部に病変が限局し、Striola 部では I 型よりも II 型細胞の方が KM, SM に抵抗性を示すことが判った。

半規管膨大部稜では、水平半規管、前半規管での変化が強く、後半規管でも変化は強く認められたが同一内耳で比較するとその程度はやや軽いように思われた。膨大部稜での変化は中央部 (頂部) で最も強く、周辺部 (裾部) へいくに従って次第に変性・消失した細胞の数は減ずるが、この場合も平衡斑で認められたと同様に I 型細胞の消失が II 型細胞の消失に先行した。ただ膨大部稜では細胞の変性、消失は中央部より連続的に周辺部へ拡大しており、平衡斑にみられるような、Striola 部を離れると細胞の抵抗性が急に増大して非常に強固になるといった傾向は認められず、病変部と健常部の境が明瞭ではない (図 3)。中央部の I 型細胞が消失し少数の II 型細胞を残している段階で、I 型細胞の変性はかなりの程度まで周辺へ拡大している像が認められた。

鼓室内注入による毛細胞障害の様式を KM と SM で正常像と比較して図 4 に示した。

投与薬剤の濃度差による毛細胞変性像の変化について

注入される KM, SM の濃度を低くしていくと、当然外リンパ腔を経て毛細胞に達する薬剤

図 3. 200mg/ml 濃度の KM 投与内耳の水平半規管膨大部稜感覚上皮. 中央部での毛細胞変性消失が著しく、周辺部へいくにしたがって正常細胞が増えてくる. (SDH 染色)

図4. 200mg/ml 濃度の KM および SM 注入内耳における障害度の比較 (SDH 染色)
KM と SM で同程度の同一様式の毛細胞障害が認められる。

の量も少なくなるため、それに従って毛細胞病変は軽くなっていく訳であるが、毛細胞障害をひきおこすのに必要な最低濃度での変性像は内耳の中で最も抵抗性の弱い部位に限局して現われるものと考えられる。先に述べたように、この群では KM, SM ともそれぞれ、50mg/ml, 100mg/ml, 200mg/ml の3種の濃度をもった水溶液を注入して観察した。断頭はすべて投与後1週間で標本を作成した。

50mg/ml 濃度の KM, SM を注入した内耳では、コルチ器でも前庭器でも全く毛細胞変性を認めなかった。

100mg/ml 濃度の KM, SM を注入した内耳では、コルチ器上方回転で毛細胞変性が認められ、IHC, OHC の一部に細胞体消失を認めた。コルチ器下方回転および前庭器官では全く変化

を認めなかった (図5)。

以上のことから、コルチ器上方回転の IHC および OHC が最も抵抗性の弱い部分であることが判った。

図5. 100mg/ml 濃度 KM 注入一週間後のコルチ器第4回転, (SDH 染色)

200mg/ml 濃度のKM, SMによる毛細胞変性の様式については前項で述べた。

投与後の経時的变化について

200mg/ml 濃度のKM, SMを鼓室内に注入された動物は, 注入後約3~4時間で非注入側へ向う水平性自発眼振および注入側への転倒傾向を示した。このことから, 動物は注入後3~4時間の時点ですでに注入側の迷路機能失調を来しているものと想像されるが, この時断頭して観察した内耳は光顕形態学的には何らの変化

も示していなかった。水越¹⁴⁾も単離有毛細胞の膜構造の変化を経時的に追う実験から, 内耳毛細胞がKM, SMの影響を受けて膜の興奮機能を失ってから光顕形態学的変化という終局的な変性像を示すまでに一定時間を要すると述べている様に, 今回の実験条件においても, 毛細胞変性を光顕的にとらえ得るまでにはかなりの時間を要した。

KM, SMによる毛細胞障害機構の詳細に関しては不明の点が多いが, これらアミノ配糖体

図6. 200mg/ml 濃度 SM 注入, 48時間後の内耳各部位での毛細胞病変, コルチ器上方回転 IHC, OHC および球形のう斑, 卵形のう斑に細胞の変性消失を認める. (SDH 染色)

(1. 水平半規管膨大部稜 2. 球形のう斑 Striola 部 3. 卵形のう斑 Striola 部 4. コルチ器第4回転 5. コルチ器基底回転)

系抗生物質は強い陽イオンとしての性格を有しており¹⁴⁾、このことにより、これら抗生物質が膜表面の陰性荷電¹⁹⁾に吸着され易い性格を示すと同時に、一部膜構成成分と置換され¹⁴⁾、膜構造を変化させてしまうことが第一次的な障害作用であろうと想像されている。しかし、この段階の変化は光顕形態学的な変化としてはとらえ難く、これら抗生物質が細胞内にとりこまれて、細胞内代謝機構を障害するという第二次的な段階での変化が進行して形態変化を惹起し、はじめて光顕的形態変化としてとらえられる。以上の考え方からすると、終局的にとらえられる形態変化は、最初の膜変化および細胞内代謝障害といった機能的変化を受ける程度に比例して現われるものと思われ、早く強く機能的変化を受けた部位は、早く強く一定時間後に形態変化を示すものと考えられる。

以上の考察から、KM, SM投与後終局的に形態変化を観察し、これら抗生物質に最も早く強く障害される部分を形態学的にとらえようとしてこの項の実験を企図した。

200mg/ml濃度のKM, SM投与後24時間の内耳ではほとんど形態変化を認めなかった。

考

KM と SM での障害部位の異同について

1951年、Berg²⁾が猫の内耳に対するストレプトマイシンの影響について報告して以来、アミノ配糖体系抗生物質の内耳障害性に関する実験的観察例の報告は多いが、現在までの多くの報告は、コルチ器障害の観察には動物にKMを投与している場合が多く、また前庭器障害の観察にはSMを投与している場合が多い。逆にKMによる前庭器障害やSMによるコルチ器障害に言及して比較検討をおこなっている研究は少ない。

KMによる前庭器障害に関しては、これを認めるとする報告よりも、認めずとする報告の方が多い。例えば、Ward²⁸⁾は球形のう、卵形のう平衡斑の感覚細胞数に減少を認めたと述べて

投与後48時間を経過すると、コルチ器上方回転でOHCは第I列から、またIHCは篩状に障害されて、ところどころ消失を来している像を認め、下方回転ではいまだ細胞体の外形は保持しているが、しばしばOHCで細胞体の著しい膨化を来している像が観察された。前庭器ではほぼ正常の形態を保っているが、詳細に観察すると多くの耳石器平衡斑で点状にI型細胞の消失を認め、この傾向は卵形のうより球形のうに著しかった(図6)。

以上の結果より、コルチ器上方回転OHCおよびIHC、ならびに球形のうのI型細胞が最も早く障害されることが判った。

対照例の観察

生理的食塩水を投与した内耳および5%, 10%, 20%, 40%の各蔗糖液を投与した内耳では、強い化膿性中耳炎を併発していたが、内耳に炎症が波及したと思われるものを除いては、すべての内耳で毛細胞は正常の形態を示し、一時的な外リンパ腔中のイオン組成変化および滲透圧変化²²⁾では毛細胞に光顕形態学的な変化を示さないことが判った。

按

いるが、Hawkins¹⁰⁾、Portmann¹⁸⁾、Farkashidy⁷⁾は何ら変化を認めていない。Lindemann¹⁸⁾、綿貫³⁰⁾、Watanuki³¹⁾はKM障害はコルチ器により顕著に現われ、前庭器障害は少ないがある程度認められるとしている。

一方、SMによるコルチ器障害に関しては、これを認めるとする報告よりも、やはり認めないとする報告のほうが多い。例えば、Berg²⁾は猫を用いて実験を行ない、多くの実験動物のうち一匹のみで蝸牛第一、第二回転に若干の細胞消失を認めたと述べ、また、Duvall¹⁴⁾は極く僅かにコルチ器障害を認めたとしている。Lindemann¹⁸⁾はSMでもコルチ器障害を認めているが、Lindemannはこの実験に鼓室内注入法を用いており、著者の実験結果と一致するとこ

ろとして、全身投与時の変化とは異ってコルチ器障害を認めたものと考えられる。

以上の文献に見られるように、多くの報告では KM, SM を筋肉内あるいは腹腔内に投与して血行を介して内耳に達せしめると、KM はコルチ器を主に障害し、SM は前庭器を主に障害していることが判る。しかし、今回著者が KM, SM をモルモット鼓室内に投与しておこなった実験では、コルチ器と前庭器で両薬剤に対する易傷性の差は認められなかった。

一般に、薬剤を鼓室内に投与した場合、内耳毛細胞に達する経路は表 1 のように考えられている。

コルチ器毛細胞に薬剤の達する経路が、経ライスネル膜によるのか、habenulla perforata を介してコルチリンパ腔から達するかは議論のあるところであるが、Kohonen¹¹⁾ は helicotrema から前庭階外リンパ腔→ライスネル膜→コルチ器毛細胞の経路を想定しており、また著者も低濃度の KM, SM によるコルチ器障害および投与後短時間での障害がコルチ器上方回転に局限していたことから、早期に KM, SM にさらされるのはこの部位であるために、KM, SM による初期変化をコルチ器上方回転に局限して認めたという考え方に立って、正円窓から侵入した KM, SM は鼓室階を上昇して helicotrema で回帰し、ライスネル膜を介して毛細胞に達する経路が主流であると想定した。しかし、いずれの経路をたどるにしても、鼓室内に 200mg/ml 濃度の KM, SM を投与するという条件では、全身投与時に観察される外リンパ腔中濃度のレベルと比較しても、それと比較にならないくらい大量の KM, SM が正円窓、卵円窓を介して、しかも短時間に外リンパ腔に侵入することになるので、投与された KM は投与後、比較的短時間でコルチ器毛細胞にも

前庭器毛細胞にも均等に達するものと考えられ、この時点ではコルチ器毛細胞も前庭器毛細胞も同一条件下で KM, SM にさらされているので、その結果観察される毛細胞の障害様式は各部位の毛細胞が十分に均等に KM, SM に接した場合の毛細胞障害様式と考えられる。すなわち、コルチ器毛細胞も、前庭器毛細胞も KM, SM に接すればいずれもたやすく障害される訳で、この際いずれの毛細胞も KM あるいは SM に対して特異的な易傷性の差を示すことはない。KM, SM を全身的に投与した場合には、投与部位より血行を介して内耳毛細胞に達する訳であるが、この場合に、コルチ器と前庭器で KM あるいは SM のそれぞれに対する易傷性に差を生ずるとすれば、今回の実験結果より、それは各部位の毛細胞に到達するあるいは集積する KM と SM の量が部位的にそれぞれ異なった分布を示すための障害様式の違いと考えるのが妥当である。つまり、KM はコルチ器毛細胞部位により多く集まり、逆に SM では前庭器毛細胞部位により多く集まると考える訳であるが、一方で KM と SM では非常に似かよった化学構造を有しており、その抗菌作用の機序も同様であることから、これらの薬剤が到達経路のいずれの部位で、いかにして特別の場所へふり分けられるのかは現在のところ判然としない。しかし、渡辺²⁰⁾ は外リンパ腔と内リンパ腔の間に blood-brain barrier 様の barrier の存在を想定しており、また、著者ら²⁶⁾ が一般に内耳障害性を有さないとされているテトラサイクリンの誘導体であるミノサイクリンで、わずかに側鎖が変化しただけで、内耳障害性を示した実験例を報告しているように、ある種の抗生物質が内耳障害性を発揮するか否かは、いずれかの部位の barrier を越え得るか否かにかかっている可能性が強く、しかも抗生物質ではその側鎖の僅

かの違いが barrier 通過性を大きく支配しているものと考えられる。KMとSMで内耳毛細胞部位への透過性あるいは分布動態が僅かの側鎖の変化で異ってしまう可能性は充分考えられる。

KM, SM による内耳障害の各部位での特異性について

200mg/ml 濃度のKM, SM投与後1週間目に観察される内耳毛細胞障害の様式は各部位で特異的な現われ方をしており、全身投与時のKMによるコルチ器障害とSMによる前庭器障害を合せたような障害像を示した(図7)。

コルチ器では、下方回転で IHC がKM, SMに強い抵抗性を示しているのに、OHC は強

く障害され、逆に上方回転では IHC の障害の方が OHC の障害より強く現われている。

コルチ器毛細胞障害様式に関する研究は多く、多くは動物に KM を投与して観察している。

OHC の障害のパターンに関しては、Hawkins¹⁰⁾ はKMを投与した猫で OHC 障害は第1, 第2回転に局限し、モルモットでは全回転に及ぶとした。Portmann¹⁷⁾, Ward & Fernandez²⁸⁾ らはモルモットにおいてはKMの場合 OHC 障害は下方回転でより強いとしている。Engström⁶⁾ は surface preparation 法を用いて観察し、KMによる OHC 障害は第1, 第3回転で強く、第2, 第4回転での変性は軽微

図7. 200mg/ml 濃度の KM または SM 鼓室内注入による感覚細胞の障害部位 (黒い部分が細胞消失部位を示す) コルチ器では上方回転内毛細胞 (IHC), 下方回転外毛細胞 OHC が消失している。耳石器平衡斑では Striola 部のみが選択的に障害されるが、膨大部嵴感覚上皮では、周辺部より中央部へ進むにしたがって、次第に消失細胞数が増えてくる。外、前半規管膨大部の障害が、後半規管膨大部での障害より強くあらわれ、耳石器平衡斑、膨大部嵴ともに I 型細胞の障害が II 型細胞の障害に先行した。

であるとし、一般に OHC 障害は基礎回転の第1列より始まるとしている。この OHC 障害の始まりが基礎回転第 I 列であるとする考え方は、Beck¹⁾、半藤⁹⁾らも認めるところである。Lindemann¹³⁾ は腹腔内に投与した KM も、鼓室内に注入した SM も共にコルチ器毛細胞を障害し、一般に OHC では下方回転で強い障害性を認めている。一方で、モルモットで KM、SM による OHC 障害が頂回転で最も著しいとの報告もみられた²⁷⁾。

IHC の障害の様式に関しては、Lindemann¹³⁾ の上方回転でより障害され易いとの報告の他に、Hawkins¹⁰⁾ は逆にモルモットでは第1、第2回転に局限し、人でも主に基礎回転に局限されるが、猫では全回転に亘って障害を認めたとして、全体の傾向としては IHC も OHC と同様 KM に対して下方回転でより障害を受け易いとしている。Ward & Fernandez²⁹⁾ も下方回転 IHC の易傷性を認めている。Engström⁶⁾ はモルモットの場合、IHC 障害は OHC のそれより遅れて、頂回転より始まり次第に下方へ拡大すると述べている。

以上の報告に見られるように、コルチ器毛細胞は回転ごとにアミノ配糖体系抗生物質に対して感受性が異なり、易傷性を示す部位に関しては各報告で異なるが、現在のところ一般に下方回転 OHC および上方回転 IHC が実験条件のいかににかかわらず障害を受けやすいと考えられている。水越¹⁵⁾ は正常モルモットのコルチ器では、SDH 活性が下方回転 OHC および上方回転 IHC で他の部位に比して強い活性を示すことから、酸素消費率の高い部位が細胞内代謝阻害因子に対してより labile であるとの考えに立脚して、この部位で KM、SM などの代謝阻害物質による障害が顕著となると述べ、一方 Mizukoshi²⁰⁾ は microrespirometry を応用してコルチ器で各回転別の酸素消費量を測定し、下方回転での酸素消費率がより高いことから下方回転での毛細胞易傷性に対する根拠を水越⁵⁾ と同様の立場から説明している。

今回の実験条件では、正円窓より侵入した KM、SM は高濃度であれば一定時間後に蝸牛各回転毛細胞にほぼ均等に達するものと考えられ、この条件下で上方回転 IHC、下方回転 OHC に局限して障害を認めたことは、コルチ器の各部位で細胞レベルでの易傷性の差の存在を示している。水越¹⁴⁾ は音受容の機構に関して、OHC は音振動の受容を受けもち、IHC は入ってきた音振動の Intensity を調整する機能を分担していることを KM 障害内耳での CM、EP 変動より解析し明らかにしているが、音振動の変換器としての OHC のエネルギー消費率はより多くの周波数で振動する下方回転でより高度であることが考えられる。組織化学的に下方回転 OHC と上方回転 IHC でより高い酵素活性を示していることと一致して、この部位での代謝レベルが他の部位に比して高いことが想像されるが、このために KM、SM などの代謝阻害物質がこれらの部位に特異的に強い障害性を示すことが考えられる。

一方、前庭器での毛細胞障害は KM、SM の両方で図7の如き障害像を示しており、水平・前半規管膨大部稜での障害が後半規管のそれよりやや強く、平衡斑では球形のう斑の障害が卵形のう斑のそれより強かった。膨大部稜における変性の程度と平衡斑における変性の程度は、後に述べるように変性のパターンが異なっており、正確な比較は困難であったが、初期変化として毛細胞変性を最も早く現わしたのは球形のう斑であった。

各前庭器官での易傷性の順位に関しては、鈴木²⁵⁾ はモルモットに SM を投与して、水平半規管 > 前半規管 > 後半規管の順で障害され、平衡斑では卵形のう斑 > 球形のう斑の順で障害され易いと述べ、Lindemann¹³⁾、綿貫³⁰⁾ はモルモットに SM を鼓室内法で投与して、膨大部稜 > 卵形のう斑 > 球形のう斑の順で障害され易いと述べている。Duvall & Wersäll⁴⁾ はモルモットに SM を投与して、膨大部稜と平衡斑で易傷性に差はないとし、Berg²⁾ は猫における SM 障害では卵

形のう斑での障害が球形のう斑のそれより強いと述べている。

以上より、一般に各前庭器官間での易傷性の順位は、水平・前半規管膨大部稜での障害が後半規管膨大部稜での障害より強いとされ、今回の実験結果と一致したが、平衡斑では、一般に卵形のう斑での障害が球形のう斑での障害より強いとされているが、今回の実験では逆の結果が得られた。これは鼓室内注入時の薬剤の侵透が正円窓により近い部位より始まることから、蝸牛管あるいは蝸牛前庭階よりの侵入門戸に位置する球形のう斑でより強い障害が認められたのではないかと考える。

膨大部稜での毛細胞障害は感覚細胞層の中央より始まり、病変が進展するに従って周辺部へ変性が拡大しているのを認めた。I型細胞の変性がII型細胞の変性に先行した。平衡斑での毛細胞変性はほぼ Striola 部 (Werner³²⁾) に限局し、その他の部位では、Striola 部に健常な毛細胞が全く認められなくなった段階でも、極く僅かのI型細胞の脱落を見るにとどまった。

平衡斑 Striola 部が機能的に重要な意味をもっていることは、鈴木²⁴⁾がSMにより平衡斑 Striola 部に軽度の変性の認められたモルモットですでにかなりの程度に立直り反射の失調を来していることからこの部の機能的な重要性は類推される。正常モルモットで平衡斑 Striola 部は周辺部に比して、はっきりと境されてSDH強活性を示し、このことからこの部位が身体平衡維持に重要な役割を果たしていることが類推され、高度の代謝活性を有しているために、KM, SMなどの代謝阻害剤にこの部位が特異的に障害され易いことも理解できる。平衡斑での障害は Striola 部I型細胞に始まり、次いで Striola 部II型細胞が障害される。Striola部を離れるとI型、II型両者ともKM, SMに抵抗性を示し、ごく僅かのI型細胞の脱落が認められるにとどまることから、Striola 部の機能面での特異的な役割が想像される。

膨大部稜では平衡斑に比して障害の拡がり方

はばくぜんとしており、Lindemann¹⁸⁾が述べているような中央部と周辺部の境は認められず連続的に変性が拡大している。この場合、I型細胞の障害が主流をなし、中央部に一部II型細胞の残存している状態でもI型細胞の消失はかなり周辺まで拡大していた。正常モルモット膨大部稜では中央部でI型細胞が多く存在し、周辺部へいくに従ってII型細胞の比率が多くなり、又、中央部の毛細胞はI型、II型とも周辺部の毛細胞より大型で分布もまだらであるが、その境は明瞭ではなく分布形態の移行は連続的である。鈴木²⁴⁾は膨大部稜での感覚受容機構に関し、膜迷路中の内リンパ液の流動状態の考察から、中央部になる程鋭敏に刺激を感じる必要があることを述べているが、ここでの感覚受容の様式は平衡斑において Striola 部が有していたような特異的な役割を果たす部分が存在する必要はなく、頂上部から裾部へいくに従って連続的に毛細胞の興奮閾値が上昇していく構造を有していることが要求される。以上のことから、膨大部稜での細胞内代謝活性は中央部から周辺部へ連続的に変化していくものと思われ、SM, KMなどの代謝阻害因子により連続的に中央部より障害されてくる理由が理解できる。

ところで、一般にアミノ配糖体系抗生物質が前庭感覚上皮を障害する場合、I型細胞がII型細胞より障害され易いとされている⁴⁾¹⁸⁾¹²⁾²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾³⁰⁾³¹⁾。前庭感覚上皮におけるI型、II型細胞の易傷性の差について、綿貫³⁰⁾はI型とII型の周辺支持細胞との相関々係に着目して述べているが、Winter³³⁾はX線照射による前庭器障害では、障害が周辺部で強く、しかもII型細胞の障害がI型細胞の障害より強いことを示唆しており、I型およびII型細胞の障害性の差異に関しては未だ不明の点が多く残されている。ただ膨大部稜においてはより鋭敏な刺激感受機構を有すると思われる頂上部でI型細胞がより多く分布しており、また、SDH活性はI型の方がII型より高いことから、I型細胞がII型細胞よりも高い代謝活性を示し、したがって刺激に

対する反応閾値も低いことは確かであるが、その機能分化の意味は不明である。KM, SMなどの代謝阻害因子がI型細胞をより強く障害するのは、I型細胞での代謝活性の高いことと関連をもっていると考ええる。

以上の考察から、内耳毛細胞においては、コルチ器でも前庭器でも機能的に重要な役割を果たしていると考えられる部位で毛細胞は高い代謝活性を有しており、したがってSM, KMなどの代謝阻害因子によってそれらの代謝活性の高

い部位より障害されていくものと考えられ、この障害様式は、おそらくはKM, SMにかぎらず、全ての代謝阻害物質に共通のものと考えられる。

KM, SMによる毛細胞障害は毛細胞の特異的なアミノ配糖体に対する感受性によるのではなく、KM, SMという代謝阻害因子がたまたま、特異的に高い内耳移行性あるいは貯留性を有するために毛細胞障害を発生するものと思われた。

ま と め

1. KM およびSMをモルモット鼓室内に注入して内耳毛細胞変性様式を光顕形態学的に検索したが、KM, SMの両者において、その障害様式は同一であり、毛細胞はコルチ器においても前庭器においてもKM, SMに接しさえすれば、同程度に障害されることが判った。

2. コルチ器における毛細胞変性は、KM, SMの両者で、上方回転内毛細胞、下方回転外毛細胞に強く現われ、この障害部位は機能的に重要な役割を果たす部位および組織化学的に高い代謝活性を示す部位に一致した。

3. 前庭器における毛細胞変性は、KM, SMの両者で、平衡斑 Striola 部、膨大部稜中央部に強く現われ、この障害部位は機能的に重要な役割を果たす部位および組織化学的に高い代謝活性を示す部位に一致した。

4. 前庭毛細胞のうちでI型細胞の変性がII型細胞の変性より高度に認められ、この障害度の違いはI型細胞がII型細胞より高度な機能を有しており、高い代謝活性を有しているためと考えられたが、その機能分化の意味については不明であった。

5. 鼓室内注入による毛細胞変性は、対照実験より、非特異的な変化ではなく、KM, SMによる特異的な代謝阻害によるものであることが判った。

本論文の要旨は第20回内耳生化学会、第17回日本オーディオロジー学会、第31回日本平衡神経科学会において発表した。

稿を終えるにあたり、御指導御校閲をいただきました水越治教授に深謝致します。

また、実験の当初より御指導御教示をいただきました大阪鉄道病院耳鼻咽喉科鈴木政昭博士に謝意を表します。

文 献

- 1) Beck, C. and Krael, P.: Experimentelle und feingebliche Untersuchungen über die Ototoxizität von Kanamycin. Arch Ohr, Nas.-u. Kehl. Heilk. 179: 594, 1961.
- 2) Berg, K.: The Toxic Effect of Streptomycin on the Vestibular and Cochlear Apparatus. Acta otolaryng. suppl. 97: 1, 1951
- 3) Brown, H.A. & Hinshow, H.C.: Toxic Reaction of Streptomycin on the Eighth Nerve Apparatus. Proc. Statt. Meet., Mayo Clin. 21: 347, 1946.
- 4) Duvall, A.J. & Wersäll, J.: Site of Action of Streptomycin upon Inner Ear Sensory Cells. Acta otolaryng. 57: 581, 1964.
- 5) Engström, H., Ades, H. & Hawkins, J.: Structure and Functions of the Sensory Hairs of

- the Inner Ear. J. Acoust. Soc. Am. **34** : 1356, 1962.
- 6) Engström, H. & Hawkins, J. : Effect of Kanamycin on Cochlear Architecture. Acta otolaryng. suppl. **188** : 102, 1964.
- 7) Farkashidy, J., Black, R.G. & Briant, T.D.R. : The Effect of Kanamycin on the Internal Ear : An Electrophysiological and Electron Microscopic Study. Laryngoscope **73** : 713, 1963.
- 8) Floberg, L.E., Hambarger, C.A. & Hydén, H. : Inhibition of Nucleic Acid Production in Vestibular Nerve Cells by Streptomycin. Acta otolaryng. suppl. **97** : 1, 1951.
- 9) 半藤 裕子 : コルチ氏器のカナマイシンに対する受傷性に関する研究 耳鼻臨 : **57** : 3, 428, 1964.
- 10) Hawkins, J. : The Ototoxicity of Kanamycin. Ann. Otol. **68** : 698, 1959.
- 11) Kohonen, A. & Tarkkanen, C. : Cochlear Damage from Ototoxic Antibiotics by Intratympanic Application. Acta otolaryng. **68** : 90, 1969.
- 12) Lindeman, H.H. : Cellular Pattern and Nerve Supply of the Vestibular Sensory Epithelia. Acta otolaryng. suppl. **224** : 86, 1967.
- 13) Lindeman, H.H. : Regional Difference in Sensitivity of the Vestibular Sensory Epithelia to Ototoxic Antibiotics. Acta otolaryng. **67** : 177, 1969.
- 14) 水越 治 : 内耳毛細胞の病態 日耳鼻, **75** : 11 ; 1300, 1972.
- 15) 水越 治, 斉藤 等, 鈴木政昭, 佐藤良暢 : 蝸牛生化学現象の部位的特異性 耳鼻 **16** : 2 ; 51, 1970.
- 16) Mushett, C.W. & Martland, H.S. : Pathologic Changes Resulting from the Administration of Streptomycin. Arch. Path. **42** : 619, 1946.
- 17) Portmann, M. : Etude experimentale de l'action antitoxique de cellules de l'organe de Corti. Acta otolaryng. **57** : 266, 1964.
- 18) Rüedi et al. : Über die Lokalisation der Streptomycinschädigung in den Statoacusticuskernen des Meerschweinchens. In Fanconi und Löffler : Streptomycin und Tuberkulose. B. Schwabe & Co., Basel. 261, 1948.
- 19) Saito, H. & Daly, J.F. : Quantitative Analysis of Acid Mucopolysaccharides in the Normal Guinea Pig Cochlea. Acta otolaryng. **69** : 333, 1970.
- 20) Mizukoshi, O. & Daly, J.F. : Oxygen Consumption in Normal and Kanamycin Damaged Cochlea. Acta otolaryng. **64** : 45, 1967.
- 21) Stevenson, L.D., Alvord, E.C. and Correll, J.W. : Degeneration and Necrosis of Neurones in Eighth Cranial Nuclei Caused by Streptomycin. Proc. Soc. Exp. Biol. & Med., **65** : 86, 1947.
- 22) Spöndlin, H. : Zur Ototoxizität des Streptomizins. Pract. otorhinolaryng. **28** : 305, 1966.
- 23) 鈴木政昭, 中村文雄 : 前庭迷路の cytoarchitecture. Vestibular Research **18** : 69, 1966.
- 24) 鈴木政昭 : 前庭迷路の形態学および組織化学的研究ならびに前庭感覚受容器についての考察. 日耳鼻 **75** : 11 ; 1300, 1970.
- 25) 鈴木政昭 : 感覚細胞の障害度と前庭反応 Equilibrium **31** : 119, 1972.
- 26) 豊田弥八郎, 鈴木政昭 : ミノサイクリンのモルモット内耳に及ぼす影響 耳鼻臨 **65** : 11 ; 1269, 1972.
- 27) Voldrich, L. : The Kinetic of Streptomycin, Kanamycin and Neomycin in the Inner Ear. Acta otolaryng. **60** : 243, 1964.
- 28) Ward, D.H. and Fernandez, C. : The Ototoxicity of Kanamycin in Guinea Pig. Ann. Otol **70** : 132, 1961.
- 29) 渡辺泰夫 : 内耳液とメニエール病の関連性に関する考察 (内耳液の比較生化学的研究より) 耳鼻臨 **66** : 10 ; 1007, 1973.
- 30) 綿貫幸三 : 前庭感覚器のSMおよびKM中毒の病理学的研究 日耳鼻 **74** : 10 ; 1028, 1971.
- 31) Watanuki, K. : Toxic Effect of Streptomycin and Kanamycin upon the Sensory Epithelium of the Crista Ampullaris. Acta otolaryng. **72** : 59, 1971.
- 32) Werner, C.F. : Die Differentierung der Maculae im Labyrinth, insbesondere bei Säugetieren. Z. Anat. Entwickl. Gesch. **99** : 696, 1966.
- 33) Winter, F. : X-ray Irradiation of the Inner Ear

of the Guinea Pig. Acta otolaryng. 68 : 514,
1969.

（原稿到着：昭和49年2月20日
別刷請求先：豊田弥八郎
〒602 京都市上京区河原町広小路
京都府立医科大学耳鼻咽喉科）