身体の物体の平衡

は せ がわ たか とし
長 谷 川 高 敏

目 次

I 序 説

II 身体平衡に関する歴史

III 身体平衡の生理

1. 迷路なしには無意識に立てない
2. 立つ時足の筋肉は頸の筋肉を介して迷路性筋緊張を受ける

3. 身体の物体の平衡に奉仕する迷路性筋緊張

4. 物体の平衡に与る迷路性筋緊張は平衡斑より起る

5. 斜面に立つと下腿伸筋は迷路性筋緊張を制御する

IV 結 語

I 序 説

身体平衡がどんな風に行なわれるか、未だ一般にはっきりしていない。迷路や視覚、圧覚などの諸感覚あるいは小脳その他がこれに関与するといわれている。これらが障害されると、身体の保持がうまく行かないのがその主たる理由である。しかし、なぜうまく行かないか、これらと身体平衡の本態との関係が正確には明らかにされていない。身体平衡の本態の不明なのがその原因である。

身体平衡の本態を理解するには、先ず平衡とは何かを知る必要がある。平衡は力学的には物体の安静状態乃至静止状態をさしている。そして、その状態は第1図のように三つの種類に分けられている。安定性平衡、不安定性平衡、中性平衡の三種である。物体平衡の条件は物体の重心がその支持面の上に落ちることであり、その支持面が広いと安定で、狭いと不安定であることが示されている。また、物体平衡の条件として、身体のように頭、胴、脚などいくつかの部分が結合して一つの物体をなすいわゆる剛体では更に独特の条件がある。すなわち、各部分の上位の部の重心がその下の部との結合面に落ちることである。

地球はあらゆるものに一様に引力を及ぼし、人間の身体も地球にとっては一つの物体に過ぎない。平衡の条件は人間においてもまた同じである。その平衡は横臥するとき安定性であり、立つと不安定性となる。横臥位で身体の筋肉に触れるとすべて緩んでおり、筋肉が休息状態にあることが考えられる。その上、同じように身体を構成する頭や胴、脚など各部の結合が緩んでいるのも認められる。ところが、臥位から立位になるとき筋肉は休息状態から活動状態に変り、頭、胴、脚などの結合が固くなり1個の剛体ができ

Das dingliche Gleichgewicht des Köpers.

Takatoshi Hasegawa.

関西労災病院院長、大阪大学名誉教授

上る．立上る際働く筋肉の主役を演じるのは伸筋で，項部から臀部まで背中についている体幹直立筋と呼ばれる多数の筋群や脚を伸ばす臀筋，二頭股筋，四頭股筋のほか，足を伸ばしこれを土台にして身体を固定する下腿の前脛骨筋と長趾および長母趾伸筋などである．しかし，立上って，身体が楽な姿勢と呼ばれている自然な姿勢をとると，多くの筋肉の働きが休止する．筋肉の働きが僅かで疲労が少なく長続きできるので楽な姿勢と呼ばれているのである．この際地面に垂直の身体の軸柱となる骨格は，脊柱と名づける7個の頸椎骨，12個の胸椎骨，5個の腰椎骨と骨盤帯の寛骨と脚の大腿（股）部の大腿骨，下腿部の並行する脛骨および腓骨などであり，それぞれ上下の関節で接合され靱帯で固定されている．そして体軸の上端には環椎後頭関節を介して頭が乗っており，軸柱の下端には距腿（上踝）関節を介して支持台となる足に乗っている（第2図）．ところで，身体は地面に垂直に立つが，その軸柱は真直ぐではない．軸柱の垂直線に一致する部位を挙げると，先ず上端の第1頸椎（環骨）に始まり下方へ第6頸椎，第9胸椎，寛骨の後下端から突出する尾骨先端，両側膝関節および両側上踝関節を結ぶ線の間である．そして脊柱の頸部は前彎，胸部は後彎，腰部は前彎を示し，大腿骨は稍前方に傾いている．

さて，この楽な姿勢では筋肉の働きが僅かですむのは，身体の重心が支持面に落ちるからである（第3図）．第2図に示すように，身体の重心は両側股関節を結ぶいわゆる腰線の中心から少しく後上方にあり，楽な姿勢で垂直線のやや前方に位置する．すなわち，身体は無意識に立つ時軸柱が独特の形に固定されて，物体としての身体の重心を安定の位置におくようになり，Alverdes¹⁾による

第2図 楽な姿勢

X 頭の重心	⊗ 身体の重心
C ₁ 第1頸椎	C ₆ 第6頸椎
Th ₉ 第9胸椎	S ₃ 第3腰椎
Co 尾骨先端	Ag 膝関節
Atc 上踝関節	

第3図 立位の支持面×重心の落ち点

第4図 重心を保つ筋肉

1	大腿骨
2	膝関節
3	脛側顆
4	前脛骨筋
	長趾伸筋
	長母趾伸筋
5	下腿横靱帯
6	内果
7	外果
8	下腿十字靱帯

とほとんどすべての筋肉が休止状態に移行する。そして重心を安定位に置き平衡を維持するために、下腿伸筋と総称されている前脛骨筋と長趾および長母趾伸筋だけが働いて、軸柱の下端が支持台をなす足の後端に立っているため下腿を前方へひっぱり、足趾を地面に接着させている(第4図)。

この姿勢で、下腿伸筋のほかにもう一種の筋肉が常時活動している。それは剛体としての平衡条件の欠陥を補うため働く筋肉である。立位でのこの欠陥は頭の位置であって、頭の重心が蝶形骨のトルコ鞍にあり、頭と頸の結合面(大後頭孔)より前方に位置することである(第5図)。頭の重さが身体の軸柱の上端を前方へ引く力を発生し、これに対抗して平衡を保つために筋肉が備えられているのである。その筋肉の働きによって、頸部脊柱を前彎させ、頭部を後へひっぱり支える。それは上下隣接する椎骨と椎骨の間に張られた筋肉で、椎骨間筋と呼ばれる。椎骨間筋には2種あり、椎骨後面に突き出た棘突起間に張られた棘間筋と椎骨側面に出ている横突起の後面に張られた横突間筋に分けられる(第6図)。前彎は主として棘間筋の働きによるものであり、この筋肉は前彎を示す頭部と腰部に存在し、特に頸部において強く発育している。そして、後彎を呈する胸部ではこの筋肉を欠いている。横突間筋は脊柱を主として側方に傾ける筋肉で、頸部と腰部では強く発育し、胸部ではその発育が弱い。

楽な姿勢で立ち易く、長続きのできるのは、大多数の筋肉が休止状態にあり、特定の筋肉だけが身体という物体の平衡の維持に働いているに過ぎないからである。この姿勢は自然に無意識に作られるものであり、この際筋肉は脳の司令のもとに働いていない。身体平衡の基礎を作るこれら筋肉の働かしは後に述べるように延髄以下の神経系により営まれている。いうまでもなく、人間は意識のもとに種々な姿勢を意のままに作り出すことができる。しかし、これら姿勢を僅かの間しか維持できず、また姿勢によっては一定の訓練をした人だけしかできないものもある。これは、物体平衡の条件を無視し、静力学的法則に反する無理を敢行するため、働かされる筋肉の負担が大きいからである。これらの姿勢は、楽な姿勢に対して無理な姿勢あるいは異常な姿勢と呼ぶべきもの

第5図 頭蓋底

第6図 椎骨間筋
1 棘突起 2 横突起

であろう。楽な姿勢は、物体平衡の原理に生物として備えられた適応性に基く姿勢であり、異常な姿勢はこれに反して、生物の持つ反抗力を示す姿勢といえるのである。それにしても、これら異常な姿勢が短い間とはいえ、とにかく身体が地上に静止安定されるのである。身体平衡といえば従来この反抗的な一過性の安定もその中に含まれていた。しかし、この姿勢は生物学的に正確に言えば、身体平衡ではなく、身体平衡破壊の救援乃至調節の姿勢といわねばならない。

従来、迷路や視覚、圧覚などの諸感覚あるいは小脳その他が身体平衡に関与するといわれている。しかし、視覚や小脳などは身体平衡破壊の救援乃至調節に働らくものであって、迷路のように身体を平衡に維持する筋肉と直接関係するものに比べると全く異質であり、区別される必要がある。具体的に例を挙げると、頭を横にあるいは前後に強く傾けて立つ場合の視覚がそれを物語っている。この際、眼を閉じるとすぐ倒れるが、眼を開けていると比較的容易に立つことができる。また臨床上では迷路障害の患者に閉眼、開眼を行なわせ、平衡破壊の症候観察に役立てるのもその例である。すなわち、起立が困難な事や歩くと一方へかたよる事が、閉眼でははっきりするが、開眼ではわかりにくくなる。いわば、平衡障害が視覚によって矯正されるのである。小脳の働らきもまた同様である。その働らきは静止時でなく意識的な行動時に発揮されるので、その検査は行動を命じて行なわれる。この部に障害があると、足尖を揃えて立たせたり、歩かせる際身体が動揺してうまく行かない。小脳性運動失調といわれる行動障害である。小脳や視覚はこのように身体平衡の生理的な作用とは関係なく、大脳司令の完遂に興ることは明らかであり、従来身体平衡の概念はこのように曖昧であり、その本態への考慮が少なかった。

地球の引力に適応して、身体を安定し静止状態におくのが身体平衡である。立つ時身体は不安定性平衡状態にあり、これを安定させるため働らいているのが前脛骨筋と長趾および長母趾伸筋である。また同時に身体は頭の位置の関係で剛体平衡の条件に反する補正が必要で、これに働らいているのが頸部椎骨間筋である。一般に身体各器官すべて環境に対する分担的な独特の働らきを受持っているが、引力に対する身体平衡の働らきはこれら筋肉に委託され、これら筋肉は身体平衡筋と名づけられてよいものである。

さて、身体の物体的平衡の根本的保持がこれら筋肉によってなされるものとしても、身体平衡はいかなる具合に演じられるのであろうか。頸と下腿にある兩種筋肉は密接な関係のもとに互いに影響しあうのであるが、それぞれ異なる別種の働らきにたずさわっている。すなわち、下腿のそれは地面の傾く際に、頭のそれは身体が傾く時にその役割を発揮する。いずれにしても結局、これらの働らきによって身体の物体的平衡が維持されることとなり、その理論と実際について説明するのが本文の目的である。

II 身体平衡に関する歴史

今から約百年前1873年にフランスの Marey²⁾ が身体の中に平衡保持の能力のあることを述べている。実験的観察に基づいたもので、背位で動物を空中から落す時に、動物の頭がすぐ正常位をとり次いで胴もまわって正常の腹位となり地上に着く事実を映画におさめて、これを説いている。どうしてこの能力が発揮されるか、それが説明されたのはそれから半世紀後で、1924

年オランダの Magnus³⁾ が Körperstellung (姿勢) という本を書いて、これが迷路の働らきによることを実験的に証明し、彼のいわゆる Labyrinthreflex (迷路反射) によって起される現象であると説明している。第7図は Marey の映画の模写であるが、この反射現象が極めて速やかに且正確に現れ、迷路を除去された動物では起ってこないことが証明されたのである。

第7図 猫の落下時回転
(Marey 映画の描写)

ところで面白いことに、Marey がその考えを発表した翌年1874年にチェッコの Mach⁴⁾ とオーストリーの Breuer⁵⁾ が従来不明であった迷路の働きについてそれぞれ別に同じ見解を発表している。すなわち、迷路が位置変化や運動を感覚する感覚器であるというのである。迷路が顕微鏡で検査されるようになって、その立体構造が大体わかり、力学的変化の感覚に適することが直感されたのであった。このプラーグの物理学者とウインの医学者の説は Mach-Breuer の仮説として一般に知られているが、やはり Magnus によって立証されている。そして同様に Körperstellung に記述され、Marey の平衡保持の能力を現す迷路反射がこの力学的変化の感覚に起因することが説明されているの

である。

Magnus の迷路反射は眼筋や四肢筋に誘発され、種々に分類されている。そのうち身体平衡の根本的作用に関与するのが、Labyrinthstellungreflex auf den Kopf (頭位反射) と呼ばれているものである。身体が傾く時すぐ頭を元の正常位置に戻す反射である。たとえば、正常動物と予め迷路を破壊しておいた動物との腰部脊柱を左右両手に握り、これを持ち上げて側位に保つと、正常動物ではこの反射が現れて、その頭部が正常位置に戻る。これに反し迷路破壊動物では頭も胴もぶらりと垂れ下る (第8図、Rademaker⁶⁾ の撮影写真を描写)。また両動物の脊柱を垂直にして頭を下あるいは上に向けて支持する時も同様に、正常動物はその頭部を正常に維持し、迷路破壊動物では腹側にあるいは背側に頭が垂れ下る (第9図、Magnus の撮影写真を描写)。

背位で落下された Marey の動物が先ず正常頭位をとるのはこの迷路反射に基づく Magnus は書いている。そして次に胴が正常腹位に戻り姿勢の正されるのは彼の名づけた Halsreflex (頸反射) によるのであり、これは頭が胴に対して捻れるのが原因であることを述べている。とにかく、異常な頭位が迷路に位置刺激

第8図 側位に支持されている動物
A 正常動物 B 迷路破壊動物

正 常 動 物 迷路破壊動物
第 9 図 垂直位に支持されている動物

を起し、迷路反射の誘発される事実が Magnus によって明らかとなったのである。すなわち、身体の平衡保持の上に迷路の関与する機構を証明できたのである。

単に迷路が身体平衡に関与する事実については、ずっと古く1830年にフランスの比較解剖学者 Flourens⁷⁾ によって初めて観察報告されている。鳩で実験を行ない、迷路は内耳の中にあるから従来聴覚に関与するところと考えていたので、これを傷つけると忽ち長い頸が捻れ立てなくなるのに驚ろいている。しかし、なぜこのような平衡障害が起るのか、何も意見が述べられていない。それから半世紀余りの後1892年ドイツの生理学者 Ewald⁸⁾ は動物の迷路を1側だけ破壊すると、蛙も兎も動物の種類を問わずその平衡障害の状況は皆同じであるのに気付き、迷路が一定の筋肉に緊張を送ることを直観している。すなわち1側迷路が破壊されると、たと

第10図 左側迷路摘出蛙

えば第10図に示すように左側迷路が破壊されると、動物の頭部は左側にひかれ、左側を腹側に向け捻れる。四肢は、左側が屈曲、内転し、右側が伸展、外転する。Ewald はこの状態を見て、この左右不均斉な筋作用は迷路性筋緊張の存否に関係し、1側迷路は反対側の頸筋に緊張を与え、四肢では同側の伸筋と外転筋ならびに反対側の屈筋と内転筋に緊張を送っていると考えた。そして、Flourens の報告した迷路性平衡障害の原因をなすものは迷路から筋肉に送られている緊張の異常にあることを説明し、一般に知られる迷路性筋緊張説が樹立された。

1909年耳科学の始祖ドイツの Wittmaack⁹⁾ は廻転運動に対する迷路の感覚部を組織学的に検討しようと、高速の遠心廻転器でモルモットを廻転し、耳石膜が平衡斑からちぎれ落ちるのを発見した。これは Mach や Breuer によって考え得られなかった事実であった。力学的変化の起りやすい迷路の立体的な構造を図式化す

1. 水平面 2. 矢状面 3. 前額面
u. 卵形囊 S. 球形囊 o. 耳石膜
C. 半規管 a. 膨大枝

第11図 迷路(左側)図解

ると、第11図のように三つの半円形の管と二つの囊からなり、これらが互いにつながって複雑な構造をなしているので迷路と呼ばれたのである。力学的変化はこの立体的構造の上に内部に淋巴液をたたえ満ちして、内壁にある神経終末装置と淋巴液の対峙が行なわれていることに基因する。神経終末装置は、半円形の管すなわち半規管では、その一端が膨れた膨大に、衝立のように突き出ているので膨大稜と呼ばれている。卵形囊および球形囊と呼ばれる二つの囊では、その神経終末装置は座蒲団のような扁平な膨らみで平衡斑と呼ばれ、平坦に並んだ神経細胞層の表面に、無数の微小な炭酸カルシウムの結晶を容れて稍重い耳石膜を付けている。迷路の立体的な特徴は、三つの半規管が互いに直角をなし水平面、矢状面、前額面に位置し、二つの囊の平衡斑も互いに直角をなし、卵形囊のそれは水平面に、球形囊のものは矢状面に位置することである。この構造から、Mach, Breuerは廻転運動時に淋巴流動が半規管に発生して膨大稜を刺激し、直線運動時に慣性に基づく耳石膜の滑れが平衡斑を刺激し、位置変化に際しては平衡斑において耳石膜の荷重の方向が変化し、これが刺激となることを報告した。更にWittmaackの実験によって廻転運動の際に遠心力も迷路に大きな刺激となることが立証された。そして1926年 Wittmaack¹⁰⁾はこれら刺激に対して神経終末装置がいかに興奮するか、多くの臨床的ならびに実験的研究の結果トームス説を樹立している。トームスとは平衡斑や膨大稜の持つ自発的弾力性に対し名づけられたもので、力学的変化に際しこれに増減の発生するのが興奮の根源となると説いている。神経終末装置の特徴とするこの自発的弾力性の証明として、動物の心臓より高調ならびに低調溶液の灌流を行ない、液体の滲透圧に対し神経終末装置が極めて強く反応して、著明な膨張、収縮の起ることを組織学的に立証した。そして強い力学

的变化が誘発される場合に、神経終末装置が膨張、収縮によってこれに応ずることも証明されている。

身体平衡の場である立つことについては、イギリスの Sherrington¹¹⁾ が19世紀の末から20世紀の始めにかけてその根本的な研究を行ない、1906年これをまとめて報告している。身体を支える筋肉の緊張が、支える（緊張する）ことによってその筋肉にそなえられた感覚装置（筋紡錘）を興奮させ、その刺激が求心性の知覚神経線維を介して脊髄に入り、その部中枢から同じ筋肉に向う遠心性の運動神経を刺激し、これが帰着してその緊張を持続させる。いわゆる固有反射（自己反射）が筋緊張の土台を作る。しかし、立つことは脊髄神経の活動だけでは不可能で、脊髄と延髄との活動がなければなりたたない。哺乳動物の脳幹を小脳天幕の面で切断すると、筋に向う脳中枢からの抑制作用が中断され、身体を支える筋肉（伸筋）が強く緊張して、四肢の伸展が強くなり頭部が強く背側へ引き上げられ、動物は立位を続ける。一般にシェリントンの除脳硬直として知られ、立つに必要な中枢領域が示された。

立つ姿勢については、古く1885年ドイツでBraune および Fischer¹²⁾ が精しい報告を行なっている。すなわち、屍体を凍結させて、各部分に切断してそれぞれの部の重心を検討し、頭部では蝶形骨のトルコ鞍にあることや、全身の重心が両側股関節を結ぶ腰線の中心上方 4.5 cm にあることを述べ、環椎後頭関節および両側の股関節、膝関節、上踝関節の midpoint が一直線をなし、身体の重心がその線上にある時の姿勢を標準姿勢と呼んでいる。しかし、この姿勢では楽な姿勢と異なり不安定である。楽な姿勢については、その解剖学的関係を1956年東ドイツの Alverdes がその著書 *Grundlagen der Anatomie* において簡明にこれを書いている。

III 身体平衡の生理

身体の平衡はその重心を安定位置に置く働きによって行なわれる。腰線の中心の少しく後上方にある重心が両足のなす支持面に落ちるように身体を維持する下腿の伸筋すなわち前脛骨筋、長趾および長母趾伸筋の働きにかかっている。ところが、身体には体軸の上端に前方へ荷重となる頭を乗せているので、これを後に引張り剛体としての身体固有の安定も無くてはならない。これに働いているのは頸部椎骨間筋である。これら下腿の筋肉と頸部の筋肉の働きによって、身体は物体平衡の法則に従うことができ、無意識に立てるのである。従って身体平衡の生理は兩種筋肉がいかにしてこの働きを演じるかの糾明にかかっている。

下腿の筋肉の立位での働きは、体重のかかる足趾の接地に関係し、地面の傾く時は頭位を変えて平衡維持に寄与するものである。また頸の筋肉の立位の働きは、下腿筋に足の地面固定と下腿の前方牽引を行なわせるものであり、その働きの起源は迷路にあり、迷路性筋緊張に基づくものである。これらの平衡作用については、理解の都合上、先ず高度に分化した迷路の働きを説明し、次いで比較的簡単な足の影響を述べることにする。

1. 迷路なしには無意識に立てない

立つことは骨格、関節、靱帯、筋肉などの協力のもとになされるが、このうち積極的に働くのは筋肉である。もちろんその働きは中枢神経系統の働きの下に行なわれるのである。しかし中枢神経系の最も末梢部に当る脊髄と筋肉の連結だけでは立つことができない。その上の延髄と脊髄、筋肉の連結があって初めて立つことのできるのが Sherrington らの研究で明らかとなった。筋活動の基礎をなす緊張は自己反射と呼ばれて脊髄灰白質の中枢のもとに成立するのであるが、立つことになるとそのほかに延髄にある中枢も必要なわけである。延髄にある自律神経機能に関係の深い舌咽神経や迷走神

経の核など関係はなく、問題は脚の筋肉に関係するものであり、迷路から侵入する第8神経の前庭神経核だけが独特の関係をもっている。迷路と筋肉の関係については、夙に Ewald が迷路性筋緊張を考えて、迷路から骨格筋に緊張が送られていると述べ、後に Magnus は位置変化や運動に際して迷路が筋肉に規則正しく反射作用をあらわし、これを迷路反射と称えているのである。

迷路がないと無意識的に立てないことは実験的に観察することができる。Ewald も用いているように、蛙は試験動物として筋生理の実験に適しているが、両側迷路を破壊した蛙はこの事実を物語るものである。一側迷路を破壊するとその側から送られる迷路筋緊張が脱落して左右筋肉の緊張が不均斉となり、頸は捻れ、四肢では1側が屈曲、内転し、他側が伸展、外転する。そして残りの迷路も更に破壊して両側迷路がなくなると、左右の筋肉の緊張が均斉となり、異常な姿勢が消えて普通の姿に戻る。しかし、正常動物と比較すると明らかに違っている(第12図)。すなわち、頭を下げて蹲まっている。しかし、これは平静時の姿であって、その身体に触れて刺激すると、蛙は興奮して忽ち頭を上げ脚を伸ばし、正常と変らない姿を示す。ところが興奮が去ると、すぐ図のような元の姿に戻ってしまう。いうまでもなく、意識的に大脳の司令で一度は立ち上ったのであり、無意識になると自然に元に戻ってしまうのである。迷路がないと無意識には立てないことを示している。そして頭を持ち上げることが立つことに大切な条件であり、これが迷路の働きに関係していることを考えさせる。

この実験を更に進めて、両側迷路を破壊した蛙の大脳、間脳、視葉、小脳など脳を除去すると、第13図のように蛙の頭は極めて強く下り、地面すれすれになる。これによって注目すべきは、脳が迷路破壊で下る頭を持ち上げるように

第12図 地上の蛙

- a 正常虹
b 迷路破壊蛙

第13図 迷路破壊蛙

- a 脳存在
b 脳除去

第14図 両側迷路破壊兎（時田氏写真描写）

働らき続けていることである。この迷路除去で下った頭を持ち上げる脳の作用は、蛙と異なり頭の充分長い哺乳動物に於て著明に現れる。第14図のように、この作用は兎の両側迷路を破壊すると極端に現れ、鼻を上に向け頭部を後屈させる¹⁸⁾。

この兎の頭位は、内耳感覚終末装置の發育不全のものにも同様に観察される。あるとき、動物屋から持って来た実験兎の中に不思議な兎がいるということで、私の所へまわされて来た。その兎は、自由に歩く場合には普通のものと変りなく動作にも姿勢にも異常を見ないが、静止すると必らず鼻を上に向け頭部を後屈させる(第15図)。両側迷路を破壊した兎と全く同じ静止時の姿である。第16図はレントゲン写真で骨格の状態を捕えたものであり、脊柱頸部は強く後へ傾いている。

剖見すると肉眼的には脳や延髄、脊髓に異常は認められず、内耳の組織検査で著明な感覚終末装置の發育不全を発見した。前庭の平衡斑、膨大稜のみならず蝸牛のコルチ器に於ても感覚毛細胞が欠損しているのである。前庭の感覚終末部では基底細胞のみが並び、蝸牛のコルチ器では柱細胞とヘンゼンおよびクラウジウスの支

静止時

運動時

第15図 内耳感覚細胞發育不全兎

第16図 内耳感覚細胞發育不全兎
(静止時レントゲン像)

持細胞が認められるだけである。要するに内耳の働きを欠き、迷路性筋緊張の成立を見ないのが原因であって、両側迷路破壊動物と同様の状態を呈したのである。この静止時姿勢では頭部重心が下部の軀幹の上に位置し、剛体としての平衡上の弱点が消失して全く安定しているのが面白いことである。

それにしても、この際取り上げなければならない問題は Sherrington の除脳強直である。延髄以下の神経系のもとに、動物は伸筋緊張により立つことはできるが、脳を備えた動物と違って伸筋緊張が無闇に強く、脚をつっぱり頭を後屈させていわゆる弓なり緊張 (Opisthotonus)

を起すことである。これは、伸筋の受ける迷路性筋緊張が強く、脳からの抑制作用なしには正常の起立ができず強直状態にある起立を示している。これは、前述の迷路破壊で下る頭を脳が持ち上げる筋肉の緊張上昇作用と逆であり、一見矛盾を感じさせる。しかし、その矛盾にこそ調整機能という脳作用の独特の特徴が示されている。この調整作用というまでもなく筋緊張の中枢に宿るものであり、その中枢は Rademaker によると中脳にある赤核を考えることができる。

とにかく、迷路なしには立つことができない。この際迷路によって頭を持ち上げることが、立つことの大切な条件である。

2. 立つ時脚の筋肉は頸の筋肉を介して迷路性筋緊張を受ける

迷路がないと無意識に立てない。これは迷路が頸の筋肉に働き頭を持ち上げないからである。迷路と筋肉の関係については古く Ewald により注目され、迷路から筋肉へいわゆる迷路性筋緊張が来ているという説がたてられた。それは一側迷路を破壊した蛙の姿から得られた直観に基づくものである。頸は捻れ、脚の左右全く逆の不均衡な状態を見て、一方の迷路の除去

a 地上

b 水中

第17図 左側迷路破壊蛙

でその迷路から送られる筋緊張が消失し、他方の迷路から送られる筋緊張が存在するので起る状態と考え、一側迷路は反対側頸筋に緊張を与え、脚では同側の伸筋と外転筋ならびに反対側の屈筋と内転筋に緊張を送ると述べている。しかし、脚の筋肉については、その後知られた脊髄反射の接続作用を考慮したり、また伸筋が起立の主役をなすことから、Ewald の表現を訂正すれば、一側迷路は脚の同側伸筋に緊張を与え、それが接続によって同側外転筋と反対側屈筋および内転筋を緊張させると改めることもできよう。

それは兎に角、Ewald が考えたように迷路性筋緊張は直接四肢筋には来ていない。一側迷路を破壊して頸が捻れ不均齊な四肢の状態を示す蛙を容れたガラス容器に、ある時偶然水を注ぎ入れたのである。この時蛙の体は容器の底から浮かび上り、その姿が私の注目を引いた。四肢の異常な状態が消えて、それが左右均齊に保持されている。しかし、頸の捻れは変わらず、依然として続いている（第17図）¹⁴⁾。そこで試みに、蛙の背の皮膚を鉗子で挟み、空中につるして見た。その際四肢の異常は同様に認められなくなり、頸の捻れは相変わらず残る。試獣を変えて兎で実験し、一側迷路を破壊したものの軀幹

地上

水中

第18図 左側迷路破壊蛙

を保持して空中で観察すると、四肢の異常は消退し、頸の捻れはかえって強くなる。所見は兎も蛙と同じである。蛙が地上と水中において示す四肢の角度を計ると第18図のようになる。この事実は、四肢の異常が地上で体を支える時に起る二次的現象であることを物語っている。すなわち、迷路から四肢の筋肉へ直接に緊張を送っているとは考えられないのである。

ところが、迷路と姿勢の研究開拓者 Magnus も四肢の筋肉が迷路から直接に緊張を受けていることを、四肢の緊張性迷路反射と自ら名づけた現象を報告し、説明している。この迷路反射は、動物の頭、頸、胸部を固定板にギブス固定して頸の動きを無くし、頸筋緊張の変化が四肢筋の緊張に影響するのを避け、頭位変化の際に自由にしたままの四肢に規則正しく起る緊張の

第19図 四肢の緊張性迷路反射

変化である。これが予め迷路を破壊しておいた動物では起らない実験結果がもとで、名づけられたものであった。規則正しい緊張変化というのは、背位で口裂が水平面と 45° の角度で上方に向く時(図の $+45^\circ$)緊張は最大で四肢は強く伸展し、それより 180° 回転した位置(図の -135°)が最小で四肢は屈曲し、四肢筋の緊張はこの両位置に近づく程増加と減少を示すことである(第19図)。しかし、この実験は妥当とはいえず、迷路から直接に四肢筋には緊張が送られていない。動物の頭部を軀幹に対し背側へ、あるいは腹側へ、あるいは左右に向け曲げると四肢は伸展、屈曲、内転、外転する。この

頸筋緊張変化が四肢筋の緊張を変える現象を頸反射と名づけた Magnus は、頭の動きの排除だけで、同時に起る迷路性の頸筋緊張変化の排除に配慮を欠いたのである。頸筋の働らきに興る第1～4頸部脊髄反射弓の後根をあらかじめ切断しておいた動物で同じ実験を行なうと頭位変化に際して四肢筋の緊張は変化しない¹⁵⁾。四肢の緊張性迷路反射は第20図のような伝達経路で頸筋を介して二次的にもたらされる。

一側迷路を破壊すると頸は捻れ、四肢の不均斉がいつも規則正しく現れる。そして Ewald によって迷路性筋緊張説が樹立されたが、しかし迷路は頸の筋肉にも四肢の筋肉にも同じように緊張を送っているわけではない。頸の捻れは地上、空中を問わず常に变りなく現れるが、四肢の不均斉は水中や空中では現れず、地上で脚が身体を支える時にだけ現れる。迷路と頸の筋肉との直結関係は考えられるが、迷路と脚の筋肉との関係はこれと違い、身体を支えるという条件がないと成立しないのである。

身体を支えるとは、立って伸筋が活動することであり、筋伸展が筋の紡錘を刺激して自己反射を現し、脊髄系全域の筋が脊髄反射のもとに協調、相互の関係が結ばれるのはこの時である。そして頸の筋肉と脚の筋肉との関係がこの時始めて発生する。これによって、頸筋の迷路

第20図 四肢筋への迷路反射伝達経路

性筋緊張が四肢筋に波及するのである。

以上のように迷路と脚の筋肉との関係は直結的ではなく二次的なもので、頸筋の迷路性筋緊張が立つと初めて脚の筋肉に働きかける。

3. 身体の物體的平衡に奉仕する迷路性筋緊張

頭の重心が頭と頸の結合面より前方に位置するため、体軸上端を前方に引く力が発生し、これが剛体としての物體的平衡の条件に違反する。従って、身体はその平衡を保つ上でこの力に対抗できる力を発揮せねばならない。そのため奉仕しているのが迷路であり、ここから頸の筋肉に送られる迷路性筋緊張がその力となっているのである。

一側迷路を破壊した蛙では Ewald の記しているように頸が捻れ、四肢の不均斉が起るが、それは地上の場合であり、水中や空中では四肢の不均斉は消失するので、Ewald の迷路性筋緊張が四肢の筋肉では立つと初めて成立することを述べた。この四肢の筋肉と違って、頸の捻れが地上、水中、空中を問わず常に存在することから、頸の筋肉ではこの迷路性筋緊張が絶えず成立しているといわねばならない。Ewald

によると一側迷路が反対側の頸筋に緊張を与えると記されている。しかし、反対側の頸筋全部ではなく、深部の短い筋肉で椎骨と椎骨との間に張られた椎骨間筋だけが緊張を受け、上層の太い長いすべての筋肉はこの緊張を受けていない。大川内¹⁶⁾は、頸が長くて捻れの観察に適した鶏を選び、一側迷路破壊後に角度計で頭部の傾斜を前方、側方、上方から計って頸の捻れを記録し、この捻れがどの筋肉を切断する時矯正されるか、表層から深層へと順次に頸筋の切断を行ない、傾斜角度を計測した。切断は迷路の破壊されていない正常側から始めたが、やはり、その側ではどの筋肉を切断しても、矯正に影響がなかった。次いで迷路破壊側の頸筋切断を行なったが、上部の太い筋肉はどれを切断しても影響がない。深層の最も深い部に至り、上下椎骨の間に張られた短い筋に達し、これを切断すると頑固な頸の捻れに初めて影響し、その矯正を認めることができた。人間の頸部椎骨間筋は棘間筋と横突間筋の二種であるが、鶏ではこの二筋のほか関節間筋と横斜筋がある。この実験から上部にある大きい筋肉は積極的に頭を動かせ、椎骨に付着した椎骨間筋が頭を固定する

a 正常側

b 除去側

第21図 一側迷路破壊蛙の横突間筋

筋肉であることが考えられる。そして迷路が頭を固定するこの筋肉に対し、反対側のものに緊張を送っているのである。この事実は組織学的にも蛙の頸筋において肯定することができた。蛙の脊柱をなす椎骨は全部で9個に過ぎないが、第1、第2椎骨に付着した椎骨間筋において迷路破壊の反対側に変化が認められる。第21図は中島¹⁷⁾の観察した一側迷路破壊蛙の所見である。脊柱に垂直の横断連続切片での左右横突間筋の像で、除去側においては異常の所見を見ず、正常側では筋の弛緩を思わせる筋線維および筋原線維の膨化不明瞭が認められる。このように、迷路が頸部の椎骨間筋のみに緊張を送る事実は、いうまでもなく頭を後へ引きつけ固定する独特の働きを示唆するものである。換言すると、迷路が頭を後へ引き脊柱に固定して、剛体としての身体の物的平衡上の欠陥を補う働きに与ることを物語っている。そして、迷路性筋緊張は身体の物的平衡に奉仕する原動力といえる。

面白いことに、この迷路性筋緊張の発生は物体平衡を左右する地球の引力と密接な関連を持ち、迷路の働きは実に地球の引力にかかっているのである。そして、その根本は迷路の構造の中に保有されているといえる。Wittmaack¹⁸⁾は迷路の構造に注目し、これを *Der humorale Aufbau* (液体構造)と呼んで、他の器官がすべて細胞組織よりなるのに反し、迷路の大部分は淋巴液の充満した空間で、その周壁の所々に細胞組織の感覚終末装置があるに過ぎないところに、独特の働きが由来することを強調した。この構造は、液体充満といういわば引力に支配される外界が内蔵されて感覚装置と対立していることを示し、Wittmaack は液体の圧作用すなわち静水圧が感覚装置の持つ自発的弾力性すなわちトーンスに働きかけ、常に迷路が一定の興奮状態にあると考えている。そして、頸部の椎骨間筋の受ける筋緊張は、次の実験が示すように、このトーンスの働きかけに基づ

くものであって、実に迷路性筋緊張は地球の引力と密接に繋がっているのである。

蛙の一側迷路を破壊すると、頸が捻れ四肢の左右不均斉ないわゆる Ewald の蛙が出現する。たとえば、左側迷路を破壊すると蛙の頭部は左側に引かれてその側を腹側に向け捻れる。そして左側の脚は屈曲、内転し、右側の脚は伸展、外転する。この蛙の頭部を切り取り、組織固定して、脱灰操作後連続切片を作り、染色して検鏡すると、右側の正常な迷路ではその平衡斑において型の如く上層部には原形質に富んだ感覚細胞が並び、基底部には支持細胞の核の整列が見られ、平衡斑の表面は耳石膜で蓋われている。左側の破壊側を見ると、その平衡斑の耳石膜は除かれ、感覚細胞も支持細胞も崩壊しており、生活力を失ない、トーンスを無くしていることが容易に想像される。すなわち、この蛙では破壊操作が成功していて、典型的な Ewald の蛙である(第22図)。しかし時には、蛙の口蓋軟骨を除去して同じように迷路腔を小鋭匙で搔爬し、破壊操作を行なったにもかかわらず、頸の捻れや四肢の不均斉の状態が全く逆になることがある。すなわち左側迷路の破壊操作後、頸は右に捻れ左側の脚は伸展、外転し、右側の脚は屈曲、内転する。これは、破壊操作が不十分で、逆にその側のトーンスを上げることが組織学的に認められるのである(第23図)。いわば迷路破壊失敗蛙であって、破壊操作は嚢内に及ばず、平衡斑は反応性充血に基因すると思われる膨張像を呈し、Wittmaack によるトーンス上昇が考えられる。すなわち破壊操作によってトーンスを消退できなかったのみならず、反対に上昇させて右側椎骨間筋の緊張を増加し、頸は右に引かれて捻れ、右側の脚を屈曲、内転し、左側の脚を伸展、外転するのである。以上のような実験結果から、迷路トーンスの昇降が椎骨間筋の緊張増減に直結するものであり、従って迷路性筋緊張が淋巴静水圧に起因し地球の引力と密接に関連することを理解でき

術側

正常側

第22図 迷路破壊成功蛙

術側

正常側

第23図 迷路破壊失敗蛙

る。

迷路と頸部椎骨間筋のこの関係のもとに、頭部が傾くと迷路性筋緊張が変化するわけであって、頭位反射こそその現れである。精しくいうと、身体が傾いても頭が正常に保持されるのはこの関係によるのである。例えば、身体が前方に傾くとき、平衡斑は囊の前の部分に位置しているので(第11図参照)、平衡斑に働かされるリンパの静水圧が高くなり、身体が後方に傾くと逆に静水圧は低くなり、静水圧に反応する感覚終末装置の自発的弾力性すなわちトーンスが前方に傾く時は上昇し、後方に傾く時は下降する。その結果、脊柱背面に付いている椎骨間筋の緊張は前方に傾く時増加して頭を後方に引き上げ、後方に傾く時減少して頭を前方に垂れ下げて、頭は正常位に戻る。身体が前後に傾く際には両側迷路は共に同様にトーンスを変化するが、身体が側方に傾く時は左右トーンスは逆方向に変化し、一方は上昇し他方は下降する。第24図で示すように、迷路腔は前庭、蝸牛兩導水管で脳脊髄腔と連結しており左右迷路のリンパ液は脳脊髄液を介して静力学的連繋を持っている。従って側位では下位迷路の静水圧は上位側より高くなり、正常位の場合に比べると上位側は減少し、下位側は増加する。そのため、例えば右に傾くと右迷路のトーンスが上り、左迷路のトーンスが下って、その結果左側の椎骨間筋の緊張が増加し、右側のそれは減少して頸部は忽ち左に捻れて正常位に戻るのである。このように、身体が傾くと迷路のトーンスが変化して

反射的に頭位が正常となり、頭位反射が現れるのである。

しかし、頭位反射の発見者 Magnus は、この反射の起るのが身体の傾きに伴う迷路の平衡斑の傾斜に基づく耳石膜の感覚細胞牽引を原因と考えている。この考えは、古く Mach や Breuer が位置の感覚を感覚細胞に働らく耳石膜の重さに帰していることや自らの動物実験に基づくものであった。実験は、Wittmaack の遠心廻転法でモルモットの耳石膜をちぎり落して、迷路反射の現れ方を観察検討したものである。その結果持たされたものは、耳石膜がないと位置反射が現れないことであつた。ところが、1931年 Wittmaack 研究室で行なつた私の実験はこれと反対の結果となり、耳石膜は位置反射に対してほとんど意味を持たないのである¹⁹⁾。45匹のモルモットを遠心廻転し、その前後において迷路反射を観察しことに位置反射の状況を計測記録して、約2万枚の迷路連続切片を作り、反射と組織所見との検討を行なつた。廻転時の頭位のいかにによって耳石膜のちぎれ方が様々であるが、中には位置反射が不充分でかなり侵されたものも見られる。耳石膜のちぎれ方とは無関係で、耳石膜が完全にちぎり落された場合もこの反射はなおよく現れ、正常と区別がつかない。従って、この反射誘発の原因はリンパの静水圧に基づく迷路トーンスの変化にあると考えた。その後 Magnus の協同研究者 de Kleyn²⁰⁾ もこの知見を肯定し、耳石膜なしにも位置反射の現れる事実が確認された。

このような原理のもとに現れる頭位反射は、人間の日常生活においてよく見られる。それは第25図のように椅子にかけて後にあるいは横に凭れる時必ず起る現象である。体軸が斜めに保持されており、頭は無意識に正常位をとっている。また特種な運動競技の一瞬間にもよく見かける(第26図、27図)。これらの場合には、いずれにも共通した注目すべき特徴が指摘されるのである。それは、身体が脚で支えられてい

第24図 迷路静水圧関係図

第25図 椅子に凭れる

第26図 砲丸投

第27図 棒高跳

ないことである。椅子にかけて支えられていたり、身体が宙に浮いているのである。立つと事情が変わり、身体支持という新しい機構のもとに筋作用が統制される。

Ewald の蛙が、地上において頸は捻れ、四肢の不均衡を示すが、水中や空中では頸の捻れが依然として認められるのに反し四肢の不均衡は全く消失する。このことから、迷路性筋緊張が

脚で身体を支え脊髄反射が成立するに伴い四肢筋に伝授される事実を知った。この原理に従って、人間も立つと脚の筋肉に迷路性筋緊張が伝わって来る。正確にいうと、立って、身体を支える筋肉に迷路性筋緊張が来る。解剖学者 Alverdes は、序説で述べたようにこの筋肉として前脛骨筋と長趾および長母趾伸筋とのいわゆる下腿伸筋と呼ばれるものを挙げており、その実際は実験的にも肯定できる(第28図参照)。正常頭位で立つ楽な姿勢では、身体は物理的平衡状態にあり、安定した不動の状態にある。しかし、同じように立ち、頭を傾けると、この平衡状態を失い、一方へ倒れる衝動が発生する。そして倒れる方向は規則正しく、例えば頭を右に傾けると左へ、左に傾けると右へ、そして前へ傾けると前へ、後へ傾けると後へ倒れる衝動乃至傾向が発生する。この現象は、ことに外耳道へ、イルリガートルに入れた冷水をY字管を介して両側同時に注入し、両側迷路を同様に刺

第28図 両耳に冷水注入後に立って頭を傾ける

激した際に、顕著である。刺激直後、正常頭位で立たせると物体的平衡状態下にある姿勢はもちろん安定して不動であるが、頭を右に傾けると図のように忽ち激しく左へ倒れる。その際軀幹や腕がほとんど垂直であるのに反し、下腿が強く左に傾いているのに注目させられる。その上よく見ると身体は前方へも引かれている。なぜ、このような状況が起されるか、私は次のように考えている。

その原因は、物体的平衡に興る迷路の状態変化、すなわちトーンスの変化に基づくものである。右に頭を傾けると左右迷路の均質なトーン스에差を生じ、右迷路は静水圧上昇に伴うトーンスの増強、左迷路は逆にトーンスの減弱の状態となって左の頭の頸部椎骨間筋緊張の増加と右の頸部椎骨間筋の緊張減少を来す。その影響で身体の物体的平衡の上で Synergist (協力筋) の下腿伸筋に脊髄反射の接続作用で左側に筋緊張増加、右側に減少を起し、図の如く左前方へ著明に下腿傾斜を現すのである。

この頸部椎骨間筋と下腿伸筋の協力関係は、立って爪先を合せ、足の支持面を小さくして平衡の安定性を減少し、眼を閉じて頭を傾ける時には自覚的に感じることもできる。すなわち、この際たとえば頭を右に傾けると下腿伸筋の位置する下腿前面では左側に筋肉の凝縮感を覚え、また同じ側の左足に Supination (回外) を感じ、そして体は左前方に倒れて行く。足の内縁が上り外縁の下る回外は、足の背面屈曲と共に前脛骨筋の固有の働らきとして知られている。また頭を左に傾けると、右の下腿伸筋に収縮を感じ、右足の回外を自覚すると共に体は右前方に倒れるわけである。なお、Alverdes の解剖学では、前脛骨筋は上記の固有の働らきを持ち、長趾および長母趾伸筋は4趾および母趾の伸展と足の背面屈曲を固有の働らきとするが、ほかに立つと新たに体を前方に引いて固定する働らきを現すことが記載されている。この新しい働らきというまでもなく、立つと初めて

頸部椎骨間筋を介して二次的に迷路性筋緊張がこれら筋肉につたわることに基因しているのである。

そして頭を前後に傾ける場合に倒れるのは、両側迷路の静水圧が同様に上昇あるいは下降してトーンスの増減を起し、迷路性筋緊張の変化が頸部椎骨間筋を介してつたわり、両側下腿伸筋の緊張が増減するためである。たとえば、頭を後に傾けると両側迷路のトーンスは静水圧下降に伴って減少し、これが頸部椎骨間筋の緊張を減弱し二次的に両側下腿伸筋の緊張を低めて体が強く後方に引かれて後へ倒れる。頭を前に傾ける場合はその逆で、静水圧増加によるトーンスの上昇で、頸部椎骨間筋の緊張は強くなり、二次的に下腿伸筋の緊張が上るので体は前へ倒れる。

かくて、無意識に演ぜられる楽な姿勢は身体の物体的平衡の状態にあり、この状態維持に働らく筋肉は頸部椎骨間筋と下腿伸筋であることや、その働らきの原動力をなすものは迷路であることが理解される。更に迷路を働らかせる機構は地球引力の反映する迷路淋巴の静水圧とこれに対抗する迷路の活力トーンスとの不断の関連にあることも確認できたのである。従って迷路は筋緊張によって物体的平衡に奉仕するため身体に備えられた器官であると定義されるのである。

4. 物体的平衡に与る迷路性筋緊張は平衡斑より起る

迷路は三半規管と前庭とに分けられており、一般に知られているのは三半規管と眼筋の関係である。たとえば、廻転の時に半規管に淋巴流動が起り、眼筋に影響して眼球振盪の現れることが常識になっている。前庭は Mach, Breuer 以来位置変化の感覚に与ることが考えられているだけで、三半規管のように決った筋肉との特別の関係が未だ明瞭でない。しかし、下記の観察から身体の物体的平衡の原動力ともいふべき迷路性頸筋緊張は実に前庭の平衡斑から発生

し、前庭と頸部椎骨間筋とは特別な関係にある。

まず、一側外耳道に冷水を注ぎ、迷路に冷刺激を与えて、その際現れる眼球振盪と顛倒との二つの現象を対比観察すれば、両現象はそれぞれその誘発部を異にして、前者は三半規管、後者は前庭であることが明瞭に区別される。たとえば、右外耳道に冷水を入れて右迷路を刺激した時、第29図のように立たせると被検者は忽ち右へ倒れる。そして腰を曲げ頭を下げさせると、方向は同じ右の方へ非常に強く倒れる。なぜ倒れるか。いうまでもなく外耳道から迷路が冷されたためであり、換言すると冷い温度が伝わったからである。問題はこの際迷路にどんな現象が起きるにかにかかっている。凡そ物体が冷されると収縮するが、そのほかに液体であれば対流が起される。内耳の大部分は淋巴液の液体で占められており、Wittmaack によれば液体構造であって、迷路の働らきに淋巴が大きな役を演じている。とにかく、淋巴液の収縮と対流が迷路腔に起り得るとすれば、これらが働らきかけて刺激となり感覚終末部に影響するはずである。Bárány²¹⁾ が外耳道に冷、温水を注入して起る熱眼振を発見、研究して、対流が半規管の内淋巴流動を起し膨大稜を刺激すると論述して

いる。そして、その説明に、冷刺激による眼振と温刺激による眼振の方向が逆なのは、この際起っている対流が全く反対の方向に向っているからだと書かれている。正常頭位では、外耳道に最も近い外半規管の位置が水平面に対して30度傾き、膨大が半規管脚より高い位置にあり、温水注入の際対流は上方に向い向膨大性 (ampullopetal) の内淋巴流動となり、冷水注入の際対流は下方に向い背膨大性 (ampullofugal) の内淋巴流動となるからである。更にこの熱眼振の特徴として、頭位が眼振方向と密接な関係を持ち、眼振の方向は頭位の影響を受けて変化する。第30図は頭位と外半規管の位置を示すもので、正常位では膨大を高くして水平面に30度の傾きをなす半規管が、頭を強く前に傾ける時には逆に半規管の方が膨大よりも高い位置を取る。従ってたとえば冷刺激の際、正常頭位では背膨大性の淋巴流動を起していた対流が、頭を強く前に傾けた時に向膨大性の淋巴流動に変化して、眼振の方向が逆転する。また、頭を30度前に傾けた頭位では対流は半規管の面に直角をなし、淋巴流動が起らないので眼振を認め難い。そして、頭を後へ傾けるととき半規管の傾斜の方向は正常頭位の際と同じであるが、傾斜の度が強くなり顕著な眼振が認められる。これらの事実によって、Bárány は対流による熱眼振の原理を樹立し、迷路機能研究の進歩に寄与した。

ところで、外耳道に冷水を注いで迷路を刺激すると、眼振と顛倒とが起る。この際顛倒是決定的にいつも冷水を注いだ側に向って起り、頭

a 直 立 b 腰を曲げ頭を下げて立つ

第29図 右耳に冷水注入後立たせる

第30図 頭位と外半規管

位が変ってもその方向に変化はない。これに反して眼振はその方向を変化したり、頭を30度前に傾けると現れなくなったりする。同じ冷水刺激によって起される二つの現象を対比すると、本質的に明らかな相違点を持っている。すなわち、眼と脚との顕現部位の相違と頭位に関する現象の相違である。その原因は当然迷路内に起る刺激因子の相違と刺激部位の相違に求められなければならない。そして、刺激因子の問題としては、熱によって起る迷路淋巴液の容積変化と対流が考えられ、刺激部位の問題としては、前庭と三半規管がうかび上る。眼振については上記のように Bárány はその刺激因子を対流となし、刺激部位として三半規管を選んで論証し、一般の定説となっている。これを対象に顛倒を考察すると、その刺激因子として淋巴の容積変化、刺激部位として前庭が挙げられる。

身体の物体的平衡の原動力をなす迷路性筋緊張は迷路トーンズに基因するところである。迷路の熱刺激で倒れるとすれば、トーンズの異常に原因することはいうまでもない。それで実験的に迷路に熱を働かせてその状況を組織学的に観察したが、前庭平衡斑では著明にその変化を示し、これに反して半規管の膨大稜ではその変化がはっきりしない。蛙を断頭し、頭部を正中面で左右に切断して、一方を $0^{\circ}\sim 1^{\circ}\text{C}$ の孵卵器内の生理的食塩水に入れ、他方を $36^{\circ}\sim 49^{\circ}\text{C}$ の孵卵器内の生理的食塩水に入れて1～30分間放置する。次いで両者を $22^{\circ}\sim 24^{\circ}\text{C}$ の室温で型

の如く顕微鏡標本を作成すると、第31図のように冷作用を受けた迷路の卵形囊平衡斑では感覚終末装置の膨張像、温作用を受けた平衡斑では収縮像が認められる。この膨張収縮は一見熱作用の物理学的法則に反している。しかし、これは迷路の意義すなわち自発的弾力性を示し、トーンズの存在を認めるものである。たとえば、冷作用で無生物の淋巴液が法則に従って収縮するもので、これに反応して平衡斑は自発的弾力性により膨張し、内圧すなわちトーンズの下ることが示されている。なお、冷作用を受けると耳石の固定染色が困難であり、形態は不明瞭となっている。そして、平衡斑と異なり半規管膨大稜の変化は表1のようにほとんど認められない。計測は、感覚終末装置の基底から平衡斑では耳石膜下面、膨大ではクプラ下面の隔りを対象に行なわれ、後頭蓋窩に平行の連続切片を用いたので、この際垂直切断される卵形囊平衡斑と後膨大稜の数値が選ばれている。すなわち、熱作用は主として平衡斑トーンズのみに影響するものといえる。

従って、右外耳道に冷水を注入すると右へ倒れるのは、右迷路の平衡斑トーンズが下って左頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張の下降が原因となるのである。左迷路から受ける筋緊張によって右頸部椎骨間筋が頭部を右後方に引き、第30図のように倒れる被検者が右後から支えられているのである。しかし、倒れるのは頭が引かれるばかりでなく、同時に脚が強く右に傾斜させら

a. 冷作用

b. 温作用

第31図 蛙の卵形囊平衡斑

表 1

動物番号	作用時間 (分)	温 度 (℃)	卵形囊 平衡斑 (μ)	後膨大稜 (μ)
1	1	0	9.75	・
		36	9.04	・
2	1	0	9.75	・
		40	8.33	・
3	1	10	13.09	8.66
		40	9.76	7.99
4	10	7	10.95	7.99
		40	7.61	8.66
5	10	7	10.46	7.66
		45	7.37	7.00
6	30	5	8.33	7.00
		49	5.94	6.66
7	30	1	11.65	・
		44	10.47	・
平 均	1～30	0～7	10.58	7.83
		36～49	8.36	7.10

熱作用下の蛙迷路感覚終末装置の容積

れることが大きな原因である（第29図b参照）。これは、迷路性筋緊張が頸部椎骨間筋を介して下腿伸筋に作用する結果であり、右足が背側屈曲し、回外するのが原因である。要するに、この際身体の物理的平衡の破壊が頸からも脚からも同時に現れるのである。なお、この際腰を曲げ頭を下げさせると、より強く倒れるのは熱刺激されない反対側の正常な平衡斑が静水圧の増加に反応してトーススを上昇させ、左右頸部椎骨間筋の差を高めるためである。前述のように平衡斑は囊の前の部に位置し、頭を下げるとこれに作用する静水圧は高くなる。

ところで、倒れるということは、静止、安静を破壊することにほかならない。外耳に水を注ぐなどは、日常生活で思いもよらぬ非生理的なことであって、この際迷路に異常を生じ、安静維持が損われて倒れるのも当然と思えるであろう。ところが、面白いことに、Mach, Breuer以来迷路は廻転を感覚し、廻転は迷路固有の日

a 右廻転 b 左廻転

第32図 自動廻転と顛倒

常の生理的刺激と見做されているが、この廻転もぐるぐる廻るような場合に顛倒という異常がもたらされるのである。たとえば、第32図のように立ってぐるぐる廻ると、身体が傾いてきて、決して廻転と同じ方向に倒れる。すなわち、図のaのように右廻転であれば右へ倒れ、bのように左廻転であれば左へ倒れる。

なぜこのように規則正しく倒れるのであろうか。この廻転性の顛倒も、熱刺激で述べたように迷路性筋緊張の左右不均衡に基づき、身体の物理的平衡を司る筋肉の働きの規則正しく左右不均衡となるからである。すなわち、倒れる方向は、迷路性筋緊張の源泉である平衡斑のトーススの左右差に基づき、常にトーススの強い側の反対側の方へ倒れる。すなわち、右廻転の際には左の平衡斑トーススが強くなるため反対側の右へ倒れ、左廻転の時は右の平衡斑トーススが強くなるので反対側の左へ倒れる。そして顛倒は、頭が一方へ引かれると共に脚が同じ側に向って引かれるのが特徴であるから、このことを第32図のことにaでよく観察できる。右廻転の場合で、頭は右後に引かれ、右脚は足の回外のもとに右に引かれている。

ところで、たとえば右廻転の時なぜ左の平衡斑トーススが強くなるかが問題となる。それに

第33図 人間の平衡斑表面 (右側)

は、まず廻転と平衡斑トーンスの関係を理解し、次いで右廻転の際に左の平衡斑のトーンスが強くなることを説明する必要がある。廻転の刺激は主として半規管の淋巴流動であることは一般の常識となっているが、Wittmaackの遠心廻転の実験が示すように廻転の際遠心力が耳石膜を介して大きく働かせるのである。迷路は、廻転の際三半規管ばかりでなく、前庭からも刺激を受けるので、それが顛倒を起す原因となる。この際その刺激は、直線運動時に慣性に基づく耳石膜のずれをMach, Breuerが考えたように、遠心力による耳石膜のずれが起るはずである。耳石膜のずれが起ると、耳石膜と細胞層との間の耳石膜下腔の容積が狭められて内圧が上り、Wittmaackに従えばトーンスが上昇する。

次に、右廻転の際なぜ左の平衡斑トーンスが高くなるのか。それは平衡斑の形態に関係している。平衡斑は座蒲団のように平坦であるが、その線は一部曲り変をなしている。精しくいうと、卵形囊の平衡斑ではその前縁と内縁が上方に曲り、球形囊の平衡斑では前縁と上縁が外方へ曲っている(第33図)。くだけていうと平衡斑は全体として平面であるが、卵形囊では水平平面の前と内側に堤防があり、球形囊では垂直平面の前と上に堤防がある。そのため卵形囊では前方と内方に向って耳石膜のずれが起り難く、球形囊では前方と上方へのずれが起り難い。第34図は前額面垂直切断で見られる卵形囊

第34図 兎の卵形囊平衡斑

平衡斑の組織像で、このことを示唆している。

このような解剖的所見に基づいて、遠心力による耳石膜のずれを考えると、自動廻転の際発生する遠心力の方向はもちろん水平面であり、水平位をとる卵形囊でずれが起る。そして右廻転の際には、右平衡斑では遠心力が外側から内側に向って働かかけ、左平衡斑では内側から外側に向って働かかける。ところが、耳石のずれを考えると、ずれを制止する堤防が前内方にある関係から、右平衡斑の耳石のずれは制止され、左平衡斑の耳石のずれは制止されない。従って、右廻転では右平衡斑のトーンスに変化はなく、左平衡斑ではトーンスが上昇する。左廻転ではこの逆となり、これによって倒れる方向も左右廻転で逆になる。

身体の物体的平衡の根元をなすのは迷路性筋緊張であって、これが平衡斑のトーンスに基づくことは、以上のように迷路の熱刺激および廻転刺激の実験で明瞭に理解できる。ところで、

迷路はその大部分を淋巴液によって占められ、その静水圧の絶えざる働らきかけによって感覚終末装置のトーンヌスが活動して、身体の物理的平衡を維持するのが迷路の働らきである。迷路は身体の安静を維持するために備えられた静の器官であるのに、なぜ運動という全く逆の状態の感覚乃至対応に関与するのであろうか。静と動とは物の表と裏のように脊中を合せて連繋する存在とはいえ、本質的に違い、両者が同じ場所で受入れられることが問題である。しかし、この問題は受入れの機序を考えるとよく理解される。迷路の働らきはその根元をトーンヌスにおくものであり、静の現象も動の現象もこれに基づくことを観察した。ところで、この二つの現象の現れ方、すなわち発生機序は本質的に全く違っている。静の場合は、静水圧に対する自発的弾力性の発揮に基づいており、動の場合たとえば廻転運動では、耳石膜に及ぼす遠心力が自発的弾力性に干渉することに基づいている。いわば、トーンヌスの変化は静の場合アクティブであり動の場合パッシブである。

それはともかく、動は静の破壊であり、自動廻転の実験で観察したように、身体の物理的平衡の安静が廻転のため破壊されて顛倒が起る。これでは、廻転が生理的狀態を無くすことになり、廻転の働らきかけを受入れる迷路の生理的意識に疑問が起る。しかし、倒れるのはぐるぐる廻るからである。その働らきかけの大き過ぎることを注目せねばならない。身体の物理的平衡に与る迷路淋巴液の静水圧作用には限度があり、その働らきかけは常に生理的範囲に止るが、廻転の際遠心力の働らきかけには限度がない。いうまでもなく、倒れるのはその生理的範囲を越えるからである。日常生活で働らきかける廻転は、ぐるぐる廻るような大きな廻転ではなく、頭を左右へ最大90度程度に廻す小さい廻転で、もちろんこれによって倒れることはない。また廻転の感覚も起らないが、この際理論的にはこの廻転刺激が有意義な役を演じてい

る。たとえば、右を見ようとする時に大脳司令が頸の太い長い筋肉を働らかせてその目的をはたすが、その廻転で迷路が刺激され、右の頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張が増加して頸椎を右に廻し、顔を右に向けやすくする。このように、日常迷路に働らきかける廻転刺激は生理的なのである。

同じことが半規管から起る眼振についてもいえる。迷路機能検査と呼ばれ、廻転椅子でぐるぐる廻す検査では、廻転中も廻転後も強い眼振が起り、眼を開けていられない強い「めまい」が起る。これは限度を越えた非生理的な刺激であるが、日常生活で頭を左右に向ける生理的な廻転刺激ではその際2〜3回眼振が現れ、もちろん廻転後では起らず、「めまい」も感じない。迷路性の眼振はいわゆる Rücknystagmus (復帰眼振) と呼ばれるもので、眼球が先ず一方へ緩やかに動き、次いで速やかに元に戻る運動である。これは、顔を側方に向けるとき迷路が眼に移動する対象を追わせて観察を行なわせ、急いで正常位に戻る運動であるということができ、生理的なものである。位置変化と異なり、廻転には限度のあることを考慮せねばならない。

この際直線運動について、身体の物理的平衡との関係を考えてと同様の意義が認められる。Mach, Breuer が述べているように、直線運動の刺激が耳石膜のずれによることを私は遠心廻転の実験によって立証することができた。モルモットの体軸を廻転軸に平行に固定して遠心廻転する場合、腹側を廻転軸に向けておくと解剖学的関係から卵形囊も球形囊も全部の耳石膜がちぎれ落ち、背側をに向けておくと球形囊耳石膜が両側共にちぎれるのに反し卵形囊耳石膜が両側共に残存する。また側面をに向けておくと卵形囊では両側共耳石膜がちぎれ、球形囊では廻転軸に向けた側の耳石膜が残存し、他の側のものがちぎれ落ちる。ところで、直線運動の際に動物は Magnus の迷路反射を現し、体軸方向の

前進運動ではいわゆる Sprungbereitschaft (跳躍準備), Zehenspreizen (趾伸展) を、背腹軸の方向ではいわゆる Liftreaktion (昇降器反応) を示すが、全耳石膜のちぎれ落ちたモルモットを検査するとこれらの迷路反射がいずれも全然現れず、卵形囊耳石膜だけ残存するものでは背腹軸方向の迷路反射が起らず体軸方向の迷路反射だけが正常に起り、一側球形囊耳石膜だけ残存したものでは体軸方向の迷路反射が起らず背腹方向の迷路反射だけ稍不十分ながら現れる。これは、直線運動の方向が平衡斑の面に平行であり、耳石膜がずれるとき迷路反射の現れることを示唆しており、水平方向の前進運動には卵形囊、垂直方向の運動には球形囊の平衡斑が応ずることを指示している。

さて、人間で直線運動反射が身体の物體的平衡とどんな関係を持つか。日常生活での生理的な直線運動は前へ歩く場合に行なわれる。横や後へ歩くことが必ずしも不可能ではないが生理的ではない。前へ歩くのは水平面の運動で、水平位をとる卵形囊耳石膜がずれてこれに応ずるわけである。面白いことに、卵形囊平衡斑はこの生理的運動に対して両側同時に都合よく反応できる構造になっている。すなわち、平衡斑の前縁と内縁の堤防で後進や側進の際ずれ難いが、特に前進に適してずれるようになっている。ずれが起るとトーンスが上り、頸部の椎骨間筋の緊張が増加して、頭部を頸に強く固定する。そして、運動の慣性で起る頭部の動揺に対抗し、その効果を発揮するのである。

5. 斜面に立つと下腿伸筋は迷路性筋緊張を制御する

迷路性筋緊張は頸部の椎骨間筋だけに送られており、地面で脚が身体を支える時に二次的に四肢筋に迷路性筋緊張が伝えられる。人間の迷路に廻転刺激や熱刺激を与えると、うまく立つことができず倒れる。この現象を検討して、楽な姿勢で立つとき下腿伸筋が特に迷路性筋緊張を受けている事実を認めることができた。この

ことから考えを進めると、下腿伸筋がなぜ楽な姿勢に役立つか、その原理を理解することができる。下腿伸筋は、足の背側屈曲と回外の両作用を行ない、足の運動時に役立つものであるが、立って足が身体を支える支点となると、その作用は身体の地面固定になくてはならないものとなる。すなわち、立つ時足の支点は足円蓋の土台をなす足前縁と足外縁であり、この際足の背側屈曲が下腿を前縁に、回外が外縁に引きつけるからである。立つと迷路性筋緊張が下腿伸筋に絶えず送られるのは、足の固定を行なわせるものといえよう。

しかし、これは水平面上のことである。地面が傾くと、体軸が支持面に斜めとなり、物體的平衡が破れて倒れる筈である。ところが、身体にはこれにうまく対応できる反射機構が備えられているので、倒れないのである。それは、足を地面に固定している下腿伸筋からの反射である。地面が傾くと、その上のにっている足も傾き、下腿伸筋の伸縮が起り、その筋緊張が変化する。これが、迷路性筋緊張の伸介筋である頸部椎骨間筋に影響して、頭部重心を力学上合理的に移動させ、身体の物體的平衡を維持する反射を起す。第35図および第36図はその実際を示している。第35図は地面が前後に傾く場合で、前に傾くときには体軸の上で頭は後に傾き、頭の重心を後方に向い移動させ、逆に地面が後に傾くときに頭は前に傾き、身体が斜面での物體的平衡の条件を満たすのである。第36図は地面が右へ横に傾く場合で、この際体軸上の頭は左に傾き、同様に頭の重心を体軸の左に向い移動して、身体の物體的平衡が維持される。

楽な姿勢で立つのを直立ともいうように、立つ時体軸が地球の引力の方向に一致し、水平の地面では支持面に垂直になっている。しかし、斜面の直立では体軸はその支持面に対して当然垂直ではなくなる。この際、下腿と足のなす角は正常の直角から、前傾では鈍角へ、後傾では鋭角へ移行し、また横に傾く時は角度変化が左

a. 前傾 b. 水平 c. 後傾

第35図 斜面（前後に傾く）に立つ

a. 水平 b. 右傾

第36図 斜面（横に傾く）に立つ

右方向となり、右傾では右足の回外、左足の回内が行なわれる。この状況は第35図および第36図の示すところである。いうまでもなくこの角度変化は、前後傾斜の場合は上踝関節（距腿関節）、左右傾斜の場合は下腿関節（距踵舟関節）を介して行なわれ、これによって足を地面に固定し直立を維持する下腿伸筋の伸縮が起される。そして、斜面における身体の物的平衡維持作用の原点をなすのである。

それにしても、地面が傾くとなぜ自然に頭が

傾くのであろうか。もちろん、被検者は意識的に頭を傾けているのではない。倒れず立てるようと、この姿勢が反射的に作られるのである。この反射は、嘗て行なった蛙の実験をもとにして考えると、下腿伸筋の緊張変化により起ることが想像される。蛙の一侧迷路を破壊すると、頸は捻れ、四肢の不均衡が起る。たとえば、右側迷路を破壊すると、頭部は右に引かれ右側を腹側に向けて、頸が捻れ、四肢は右側が屈曲、内転し、左側が伸展、外転する。この蛙の後肢を握り、体を空中に持上げるとき、第37図のように、右後肢を握る場合と、左後肢を握る場合とで顕著な相違が認められる。すなわち、左後肢を伸ばして握り体を持上げても頸の捻れは回復しないが、右後肢を同じようにして持上げると、これに反して頸の捻れは回復し、頭は正常位をとる。この際後肢は脛部と踵部を掌中におさめて握るので、下腿伸筋は特に強く引き伸ばされて、その緊張が高度に上昇する。これが頸の捻れに影響するものと思うのである。頸の捻れは、迷路性筋緊張が左の頸部椎骨間筋になく、右にだけあるため不均斉を持たらしているわけで、右の頸部椎骨間筋に存在する迷路性緊張が抑制されると、頭位が正常となるはずである。このような理屈から、実験蛙で後

a. 右後肢を握り持上げる

b. 左後肢を握り持上げる

第37図 右側迷路破壊蛙

肢を持上げる場合を推理すると、左後肢を握っても捻れはとれず、右後肢を握るとその捻れがとれて正常頭位となるのは、右下腿伸筋の緊張上昇が右の頸部椎骨間筋の緊張を下降させる結果であるといえる。

ところで、斜面に段つ被検者の足位と頭位の関係を検討すると、この考えの妥当性が証明できるのである。斜面に立って、下腿伸筋の緊張上昇が起るのは後傾の場合(第35図c)である。その足位を見ると、足は背側屈曲を行ない、下腿伸筋はその作用の上昇を示し、筋緊張の増加が起っており、そして、その頭位を見ると、頭は前に傾いて、頸部椎骨間筋の緊張減少を示している。すなわち、下腿伸筋に迷路性筋緊張を仲介する頸部椎骨間筋が、後傾の斜面で発生する下腿伸筋の緊張増加に影響されその緊張を減少したといえる。蛙の実験で考えられた下腿伸筋の緊張上昇に基づく頸部椎骨間筋の緊張低下が斜面に立つ被検者の実際において観察できるのである。前傾の場合(第35図a)は後傾の場合と全く逆である。その足位を見ると、足は蹠側屈曲位をとっており、頭位を見ると、頭を後へ傾けた位置になっている。後傾の場合

と同様の理論に従えば、下腿伸筋におこる緊張減少がその作用を低下し、頸部椎骨間筋の緊張増加を来すものと推定される。このように考えてくると、結局斜面に立つ場合には、原則として足位が頭位を決定するといえることとなる。

地面が横に傾くときも、同じようにこの原則を示し、足位が頭位を決定することを認める。第36図に示す右傾の場合、その足位を見ると、右足は回外位、左足は回内位をとり、右下腿伸筋はその作用の上昇のもとに緊張の増加、左下腿伸筋はその作用の下降のもとに緊張の減少を考えさせる。ところで、前後傾斜の場合には、下腿伸筋の緊張が増加すると頸部椎骨間筋の緊張は減少し、逆に下腿伸筋の緊張が減少すると頸部椎骨間筋の緊張は増加した。このような兩種筋肉の間の緊張関係を当てはめると、右傾の際の頸部椎骨間筋の緊張が右側では減少し、左側では増加する筈である。実際、第36図を見ると、頭は左へ傾き、右側の頸部椎骨間筋の緊張減少、左側のその緊張増加を物語っており、足位が頭位を決定するという原則が肯定される。

さて、人間が楽な姿勢で水平面に立つとき、

第38図 斜面の物体

迷路性筋緊張が頸部椎骨間筋を介して下腿伸筋に伝わる。この緊張を受けて下腿伸筋が足を地面に固着させ、脚を前方にひっぱって身体の重心を両足の間の支持面上に維持して、身体の物理的平衡の役を演じる。ところが、斜面に立つと下腿伸筋が自然に自身の緊張を変化させ、頸部椎骨間筋の緊張に影響して、規則正しく頭位を変化させる。これによって、斜面で物体を支える力が身体に与えられることとなり、物理的平衡が維持されるのである。第38図は斜面の物体の力学的関係を示すもので、 θ なる角の斜面に、質量 m なる物体があり、接触が滑かであるとすれば、重さ mg を面に直角および面に沿う方向に分解するとき、面に直角方向の力には斜面が反作用してくれるゆえ、面に沿う方向の力すなわち $mg \sin \theta$ に等しい力を斜面の上位方向に働かせると物体が支え得られる。斜面に立つとき頭の傾くのは、身体にこの力を賦与するものであり、頭の傾く方向は常に上位方向に一致している。前傾斜面では上位方向が後方で、この際頭が後方に傾き、力を上位方向に向わせる。後傾斜面では逆に頭が前方へ傾き、力は斜面の上位方向である前方に向って働く。また、右傾斜面では、斜面の上位方向は左方であり、この際頭が左方に傾くので、上位方向へ働く力が発生する。これは、身体が地球上の一物体として、引力という環境に適応できるよう備えられた能力であって、いうまでもなくその能力を発揮するのが下腿伸筋である。

一般に、筋の働かしは関節に及ぼす槓杆作用によって発揮されるが、下腿伸筋の踝関節に及ぼす作用には特異性のあることが知られている。それは、足が地面で体を支えている場合と

第39図 踝関節の槓杆関係

- A. 単臂槓杆 I. 支点
B. 両臂槓杆 II. 重点(可動部重心)
III. 力点

地面を離れている場合と槓杆作用を異にした独自の作用を発揮することである。すなわち、第39図のように立っているときには単臂槓杆の作用、足が地面を離れる場合には両臂槓杆の作用を発揮する。単臂槓杆では支点の一侧に重点と力点があり、そして重点が遠くにあるのが普通である。物を持ち上げる際の上膊筋と肘関節との関係のように、一般の筋作用は単臂槓杆作用である。下腿伸筋は二重の働かしをなすわけで、足が地面を離れるとき重点すなわち可動部の重心が爪先にあって、歩く際のように足は背側屈曲して上方に引き上げられる。立つときには重点は身体の重心に移行して、足を地面に固定し、脚を前方に引き、身体の重心が足の支持面に落ちるようになるので身体の物理的平衡が維持される。

以上のように、立つときには身体の物理的平衡に欠くことのできないのは下腿伸筋の働かしである。そして、その働かしの本質を二つに分けることができる。一つは水平面に立つ場合の働かしであり、他は斜面に立つ場合の働かしである。水平面においては足を地面に固定し、体軸を前方へ引く働かしであって、これは迷路性

筋緊張のもとに行なわれる受動的なものである。これに反し、斜面における働らきは自働的なものであって、自らの形態的变化に基づく筋緊張変化が頸部椎骨間筋に影響して、頭位を変

化する積極的な働らきである。この頭位変化は、頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張の増減によって起され、斜面に立つと下腿伸筋は迷路性筋緊張を制御するといえるのである。

IV 結 語

平衡は物理学的に物体の安静乃至静止状態であるから、身体を地球上の一物体と見做して、身体平衡は身体の安静、静止状態であるということが出来る。しかし、これには身体の物理的平衡と断る必要がある。この物理的平衡が身体で行なわれるため、生物学的に特に備えられている器官は迷路と脚である。いうまでもなく、物理的平衡において直接に演技を演ずる組織は筋肉であり、骨格や関節はその道具に使われている。しかし、身体の中の数ある筋肉のうちでも、特別に物理的平衡にたずさわっているのは僅かに二種類の筋肉に過ぎないのである。それは、頸の椎骨間筋と脚の下腿伸筋とであるといえる。この考えは、今日やっと自分だけで納得できるところまで来たもので、かなり長い間の実験や思索の後、ようやくに到達した考えである。思えば1930年の秋 Hamburg 大学 Wittmaack 先生の研究室で初めてこの方面の仕事にたずさわって以来45年の歳月がこの考えをもたらしたのである。気掛りなのは、主として自らの経験に則して推考した結果であり、その論旨の材料になったのはほとんど自身の観察成績であって、いわば自分勝手な議論と思えることである。

人間の身体はいろいろな方向に曲ったり伸びたり、かなり自由に動けるように、いくつかの部分に大きく分かれ、更に各部が小さく分かれて、物理的には一つの剛体を造っている。立つ場合にはその上端が頭で、下端が足であり、その間に頸、胴、大腿、下腿などが存在する。これらの部分は皮膚で覆われて外からはその界がはっきりしないが、中には支柱をなす固有の骨格があり、その相互の間に関節があってそれぞれの界をはっきりさせている。そして、この剛体の各部が自由に曲ったり伸びたりするのは、界の関節を跨いで相互の骨格の間に張られた筋肉による槓杆作用に基づくのである。

人間の立ち姿にはいろいろあるが、無意識に自然に立つ時の姿を楽な姿勢と呼んでいる。これは生理的な姿勢ともいえるもので、筋肉の働らきが最も少なく、僅かな疲労で、長続きできる姿勢である。この際、多くの筋肉がその働らきを休止しており積極的に働らいているのは頸部の椎骨間筋と下腿伸筋だけである。これは、身体の平衡がこの姿勢で維持され易く、僅かに頸部と下腿の筋肉の働らきだけで充分なことを示している。物体の平衡はその重心が支持面上に位置することにより保たれ、物体が剛体の場合には各部の重心が接続する下部との結合面上に位置することによりその平衡が保たれる。身体が楽な姿勢をとるとき、この物体平衡の原理にそむいているのは頭部の位置である。この姿勢では頭の重心が頸との結合面上になく少しく前方に位置し、これによって体軸の上端を前方に引く力が発生し平衡を破ることになる。身体はこれに対抗する力を発揮せねばならず、その役目を演じているのは実に頸部椎骨間筋なのである。その働らきが頸部脊柱を前彎させ、頭を後方へ引いてその上に固定している。また、下腿伸筋の働らくのは、身体全体の重心の位置を支持面上に固定して、平衡の役を演じるものである。すなわち、足を地面に固定すると共に、下腿を前方に引きつけ、支持台をなす足の後端に立っている身体を物体平衡の原則（重心の支持面上保持）に従わせる。これら筋肉の働らきは無意識下に行なわれる反射作用であり、反射の源泉をなすものは迷路である。迷路が筋肉と密接な関係を持ち、迷路から筋肉へ緊張が送られているという迷

路性筋緊張説が Ewald 以来知られているが、私の検討によると、数ある筋肉のうちで直接迷路性緊張を受けているのは頸部椎骨間筋だけであり、肢で身体を支えるとき頸部椎骨間筋を介して二次的緊張が初めて下腿伸筋にやってくる。それで、人間が楽な姿勢で立てるのは迷路があるからだといえる。

それにしても、この迷路性筋緊張の源泉をなすものは何であろうか。これは、その構造が示すように、迷路は Wittmaack のいわゆる液体構造をなしており、その大部分は淋巴液の充満した空間で占められて、僅かにその周壁の所々に感覚終末装置の細胞組織があるに過ぎないことに関している。その特異性はいうまでもなく液体充満であって、液圧すなわち静水圧が絶えず感覚終末装置の細胞組織の持つ膨圧に影響し、この部を緊張させている。この緊張を Wittmaack は Der Tonus der Sinnesendstelle (感覚終末部トーン)と呼んでいる。このトーンこそ迷路性筋緊張の源泉をなすものであって、その事実については、蛙の迷路破壊操作が平衡斑に与える影響いかんで頸の捻れ方が左右されることから認めることができる。そして、頸部椎骨間筋の受ける迷路性筋緊張の誘発部が平衡斑であることは、廻転性顛倒の実験所見からも推定できた。なお、廻転性顛倒の起るのは、平衡斑の構造上の関係から、遠心力が一方の卵形囊にだけ働らきかけ、他方のものに働らきかけないためである。すなわち、廻転の際に卵形囊平衡斑のトーンが一方だけ上昇し他方では変りがないからであり、このことが頸部椎骨間筋に影響して、筋緊張が一方だけ増加し、続いて二次的にその側の下腿伸筋の緊張を増加することとなり、顛倒が起るものと考えられる。

楽な姿勢で無意識に立てるのは、平衡斑から頸部椎骨間筋と下腿伸筋に送られている迷路性筋緊張によるのであるが、これは感覚終末装置への淋巴液静水圧の働らきかけに基づいている。また、身体が傾くとき頭が直ちに正常位に戻されるのも、この静水圧の働らきかけに原因している。身体が傾くと、感覚終末装置に働らきかける淋巴液静水圧が変化し、迷路トーンの影響で、頭を支える頸部椎骨間筋が自然と頭位を正常にするようになる。その原理は、平衡斑が迷路液腔の前の部分に位置する解剖的關係と迷路が左右に存在することに由来する。すなわち、身体が前に傾くと、平衡斑は液腔の底となり、後に傾くとその天井となって、その部の静水圧はそれぞれ上昇と下降を来す。その結果、前に傾くと頸部椎骨間筋の緊張が増加して頭が後へ引き上げられ、後に傾くと逆に筋緊張が減少して頭が前へ垂れ下って、正常頭位がもたらされる。また、身体が横へ傾くときは、一方の迷路が上位となり他方が下位となるのがその原因である。すなわち、両側迷路の淋巴液が前庭、蝸牛兩導水管と脳脊髄液腔を介して静力学的連繫をもつ関係から、上位迷路の静水圧下降、下位迷路の静水圧上昇が起る。たとえば、身体が左へ傾くと、右迷路の静水圧が下り、左迷路の静水圧が上るので、左頸部椎骨間筋の緊張は減少し、右頸部椎骨間筋の緊張は増加して、頭は右に捻れ、正常頭位がもたらされる。しかし、これは脚で身体を支えていないときで、椅子に腰かけたり、跳び上り身体が宙に浮く場合である。一度下腿筋に迷路性筋緊張が伝わり、身体が足で地面に固定されると、事情が全く変わってしまう。

身体の物的平衡には、身体全体の重心の位置と剛体としての頭位の問題がある。腰かけたり、身体が宙に浮くときは身体は椅子や跳躍力で地面から隔絶して保持され、この際身体の重心の位置はもはや問題ではなく、物的平衡上唯剛体としての頭位が問題となる。迷路性の正常頭位維持は実にこれに備えられた現象で、これにより傾いて支えられる身体の平衡条件が満たされる。たとえば、身体を後に傾けて腰かけるとき頭が前方へ垂れ下り、正常位となるのは、頭の重心を頸との接合面上に移行させて剛体の平衡を保つわけであり、また身体を右へ傾けて腰かけるとき、頭が左肩

の方へ傾き正常頭位となるのも、頭の重心が顎との接面上に移行して平衡を保つものである。

しかし、身体が足で地面に固定されると、身体の平衡は全身的となり、身体の各部分は総合されて一体となって、その平衡保持は全身の重心の位置を支持面上に置くこととなり、その働きの唯一は下腿伸筋の作用に委譲される。それで、身体が傾くと、支えられた身体とはちがって立位では、もしも身体の重心が支持面上を離れると、忽ち平衡保持が失われ、顛倒現象が起る。いうまでもなく、身体を傾かせる力が下腿伸筋の力の限界を越える結果であり、換言すると迷路から送られる下腿伸筋の筋緊張では支え得られない程大きい外力の働きかけによるのである。

従来下腿伸筋の働きについては、一般に歩くときの働きの注目されている。この際脚が地面を離れるわけで、下腿伸筋は踝関節に対して両臂槓杆作用をなし、足の背側屈曲で爪先を上げ、同時に足の回外も行なって足趾を内側に向けて、躓かずうまく足を上げる。ところが、この筋肉の特徴は足で地面に立つと踝関節に対して単臂槓杆作用を発揮することである。いうまでもなく、これが身体の物的平衡に役立つわけであり、ことに斜面において独自の役を演じる。斜面に立つとこの筋肉の緊張が自然に変化し、これがもつて身体がその物的平衡を維持することになる。身体の前方が低く、後方が高い斜面では、これによって頭が自然に後に引き上げられ、逆に前方が高く、後方の低い斜面では、頭が自然に前に下って、うまく立つことができる。また身体の右側が低く、左側が高い斜面では、自然に頭が左肩の方へ傾き、うまく立てる。

立つには体軸が地球の引力の方向と一致することが原則である。水平面では体軸が地面に垂直であり、下腿と足とがほぼ直角をなし、これに反して斜面では下腿と足のなす角は直角でなく、前傾の場合は鈍角となり、後傾の場合は鋭角となる。これらの場合の下腿伸筋の状態を考えると、前傾の場合は足の趾側屈曲で緊張弛緩の状態となり、後傾の場合は足の背側屈曲で緊張上昇の状態となる。斜面に立つと自然に頭位が変わるのは、この下腿伸筋の状態によって起されるものであり、蛙の実験の示すごとく、下腿伸筋が頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張を制御するようになっているからである。前傾斜面で頭が後に引き上げられるのは、下腿伸筋弛緩が頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張を上昇させ、後傾斜面で頭が前に下るのは、これを下降させるからである。また、横の斜面では回外が問題で、右傾斜面では右足の回外によって右の前脛骨筋は緊張増加状態となり、左足の回内によって左の前脛骨筋は弛緩し、右の頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張は下降し、左のそれは上昇して、左肩の方へ頭が傾斜する。そして、この際起る頭の傾きは、いずれの場合でも斜面の上位側に向っている。一般に斜面上の物体は斜面の上位側に向う力により支え得られるのであって、頭の傾きは身体にこの力を与えるようになっている。

要するに、下腿伸筋は立位で身体の物的平衡の土台を作るものである。すなわち、平面上では迷路性筋緊張を受けて受動的にその働きを行ない、斜面では自らの緊張変化によって頸部椎骨間筋の迷路性筋緊張を制御し、積極的にその働きを遂行する。とにかく、身体の物的平衡維持の機能の根元は迷路のトーンズであり、その実演の立役者は下腿伸筋であって、脇役を演じるのは頸部椎骨間筋といえるであろう。

文 献

- 1) Alverdes, K. : Grundlagen der Anatomie. Leipzig (1956)
- 2) Marey, E.J. : Des mouvements que certains animaux exécutent pour retomber sur leurs pieds lorsqu'ils sont précipités d'un lieu élevé. Cpt. rend. hebdom. des séances de l'acad. des sciences. 119 ; 714 (1894)
- 3) Magnus, R. : Körperstellung. Berlin, Springer

- Verlag (1924)
- 4) Mach, E. : Grundlinien der Lehre von der Bewegungsempfindungen. Leipzig (1875)
 - 5) Breuer, J. : Beitrag zur Lehre vom statischen Sinn. 2. Mitt. Wien. med. Jahrb. H.I. (1875)
 - 6) Rademaker, G.G.J. : Die Bedeutung der roten Kerne und des übrigen Mittelhirns für Muskeltonus, Körperstellung und Labyrinthreflexe. Berlin, Springer Verl, (1926)
 - 7) Flourens, P. : Recherches experimentales sur les propriétés et les fonctions du système nerveux. 2. ed. Paris (1842)
 - 8) Ewald, J.R. : Physiologische Untersuchungen über des Endorgan des Nervus octavus. Wiesbaden (1892)
 - 9) Wittmaack, K. : Abschleuderung der Otolithen auf der Zentrifuge. Verh. dtsh. otolog. Ges. 18 : 150 (1909)
 - 10) Wittmaack, K. : Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres I. Mitt. Arch. Chr usw. Heilk. 114 : 278 u. 115 : 1 (1926)
 - 11) Sherrington, C.S. : The integration of nervous system. Oxford (1906)
 - 12) Braune, Chr. u. Fischer, O. : Analyse der elementaren Prozesse der Muskelmechanik. Abh. Ges. Wiss. Leipzig 13 : 313 (1885)
 - 13) 時田 喬 : 起立姿勢維持における迷路の働き. 神経研究の進歩 18 : 4 ; 728 (昭49)
 - 14) Hasegawa, T. : Über den Verhältnis zwischen Labyrinth und Muskeltonus des Halses und Extremitäten. Z.f. Hals usw. Heilk. 40 ; 496 (1937)
 - 15) 長谷川高敏, 大川内政次郎, 神田悦夫 : マグナスの迷路反射批判. 日医新報 712 ; 1506 (昭11)
 - 16) 大川内政次郎 : 迷路破壊の頸筋に及ぼす影響について. 日耳鼻 43 : 1843 (昭12)
 - 17) 中島章雄 : 迷路性筋緊張に関する組織学的研究. 日耳鼻 69 : 1251 (昭41)
 - 18) Wittmaack, K. : Die Ortho- u. Pathobiologie des Labyrinths. Stuttgart, Thieme Verlag (1956)
 - 19) Hasegawa, T. : Die Veränderung der labyrinthären Reflexe bei zentrifugierten Meerschweinchen. Pflügers Arch. 229 ; 205 (1931)
 - 20) de Kleyn, A. u. Versteegh, C. : Labyrinthreflexe nach Abschleuderung der Otolithenmembranen bei Meerschweinchen. Pflügers Arch. 232 : 454 (1938)
 - 21) Bárány, R. : Deutung des Nystagmus bei thermischer Bogengansreizung. Mschr. Ohrenheilk. 40 : 191 (1905)

(原稿到着 : 昭和50年4月8日
別刷請求先 : 長谷川高敏
〒660 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
関西労災病院)