眩暈並びに嘔吐機構と薬物

まつおか いづる ちかもり よしのり や き のぶ や たかおり しゅうし
松岡 出・近森 義則・八木 伸也・高折 修二*

序 文

嘔吐反射は経口的に摂取した物質のうち、生体にとって有害なものを胃、腸管より急速に排出せしめるための自然的防禦反応である。しかしながら動揺病、メニエール氏病、妊娠亜阻、神経性嘔吐、脳圧亢進時及び放射線照射後などにみられる嘔吐は生体の体液平衡の異常を来し、その結果生体の苦痛をより一層強くする反生理的反射である。この事からも判る様に、嘔吐の機構は単純なものでなく、種々の複雑な要素を持っていると言ひ得る。日常、耳鼻科領域において取り扱う悪心、嘔吐には前庭性のものが最も多いが、その他に放射線照射後の悪心、嘔吐なども少なくない。従って制吐、制暈を中心にこの機構を解明し、制吐薬や制暈薬の作用点を明らかにすることは、これらの疾患の効果的治療並びに診断の一助となるであろう。

嘔 吐 機 構

日本語の嘔吐はしばしば嘔気と吐出の両方の意味を持つが、**Vomiting** を嘔吐と、**Retching** をむかつき、**Nausea** を悪心として、区別すべきである。即ち、**Vomiting** とは胃腸の内容を経口的に強く排出する一連の反応であり、一方、**Retching** とは嘔吐に先行するか、または嘔吐の間歇期に起る律動的、かつ痙攣的呼吸運動であり、胃内容の吐出を伴わない。一方、**Nausea** はヒトに於いてのみ確認し得る咽頭および胃部の不快な感覚であり、他覚的には計測出来ない現象である。しかしながら犬や猫にあってもこの感覚は存在するものと考えられている。

Borison 及び Wang^{3~4)} らは迷走神経孤束核 (**nucleus tractus solitarii**) とその近傍の核に対する一連の電気刺激及び破壊実験を行い、この核に嘔吐中枢の存在する事を明らかにし

た。これら網様体を含む脳幹には呼吸中枢、血管運動中枢、嘔吐中枢、消化管運動中枢、唾液分泌中枢、前庭神経核、脳幹上行性賦活系、及び抑制系、下行性促進系、及び抑制系が存在する。これらの中でも嘔吐中枢はほぼ中央部に位置し、解剖学的にも機能的にも、他の諸中枢と関連を持ち相互関係の強い部位を考えられている。

Wang²⁴⁾ らは更に第4脳室底尾側最後野 (**area postrema**) の表面のみを破壊した犬及び猫では、**apomorphine** の静脈内注射、又は脳室内注入による嘔吐は完全に抑制されるが、胃内に硫酸銅注入による末梢性嘔吐は抑制されない事を発見した。しかし外側網様体を含めさらに深部まで広範囲に破壊した場合には、末梢刺激を起す硫酸銅による嘔吐も抑制すると報告している。また、**area postrema** を損傷する事なく嘔吐中枢の局在と考えられている外

側網様体のみを破壊した時にも apomorphine による嘔吐も硫酸銅による嘔吐も共に抑制した。これらの実験結果より嘔吐中枢と別に迷走神経背側核後外側の最後野表在組織内に apomorphine 等の所謂中枢性催吐薬に選択的に感受性を振つ受容器官が存在するとし、これを Chemoreceptor Trigger Zone (以下 CTZ) として)。又、Brizze⁵⁾らは最後野の外科的切除が頑固な内因性嘔吐及び apomorphine 嘔吐を抑制すると報告している。CTZのニューロンは孤束核ニューロンとの間に密接な線維連絡を持って居り、その構造は、血圧変化に対し感受性を持つ頸動脈球の圧レプターと類似している (Brizze & Neal)⁵⁾。また、血管透過性は脳の他の部位に比較してはるかに大である (Wisniewski)²⁵⁾。CTZの神経細胞は微量の apomorphine をその表面に局所塗布する事により嘔吐を来たすばかりでなく、脳脊髄液圧の変化によっても嘔吐をひき起す事が広く知られており、妊娠悪阻、放射線照射時や脳圧亢進時の嘔吐は、この機構が関与するものとされている。めまいを訴える場合に伴う悪心及び嘔吐発現の伝達系路としては、前庭神経核より小脳の虫垂部 (Uvula)、及び小節 (Nodulus) を経て CTZ や嘔吐中核に達する系路と、前庭神経核より脳幹網様体を經由して直接 CTZ、及び嘔吐中核に連絡する系路とが考えられている。

めまいの機序

めまいの感覚の発現に対し、各種前庭反射が原因となる事は疑う余地もない。即ち、前庭眼反射が先性刺激となり、めまいを起すのであろう。また、前庭自律神経反射による種々の不快感や、前庭脊髄反射による筋トヌスの異常、ひいては深部知覚路への feed back がこれらをより一層助長するものと思われる。

前庭器と自律神経反射との関係では、先ず船酔いに関する研究を考察する必要がある。船酔いが迷路刺激に起因し、メニエール氏症候群に類似することを指摘したのは Irwin らである。20世紀に入って Bárány¹⁻²⁾らは実験的迷路

刺激が船酔いの症候と似ている事を証明した。動物及びヒトの実験において船酔い症候群は角加速度や回転加速度には直接関係がなく空間的移動により起こるものであり、迷路機能の正常な事が必要であると言う人がいる。また、視覚の役割は必ずしも必要でないが、迷路の症状を助長するとも考えられている。航空機や宇宙空間での飛行が試みられる様になり、空間における空酔い又は航空機酔いも同様と考えられている。

船酔いの症候として挙げられるものには前駆症状として気分が悪くなり、吹呻、嘔気、唾液分泌亢進、吃逆、嘔吐、めまい、発汗などがある (Cawthorne⁶⁾, Tyler)²³⁾。このような症候は数日間続き、遂には全身が疲労困憊する。主症状は消化器系の症状であるが、循環系にも異常を来し、脈拍は微弱となり、血圧は低下する。この迷路刺激性血圧反射は終脳、中脳、小脳を除去しても現われ、また Deiter's 氏核や Bech-terew 氏核の破壊によって消失しないが前庭下核 (Roller 氏核) の破壊によって消失すると言われている。

それでは船酔い、航空機酔いはすべてめまいとして説明出来るのであろうか、即ち、迷路刺激により起る症候はすべてめまいで説明出来るのであろうか。星野によればめまいは運動異常感、位置異常感、随意筋に現われる眼振、均衡阻害、偏倚現象、及び不随意筋に現われる悪心嘔吐、流汗、流涎、心悸亢進などをひき起し、これらはすべて前庭神経反射に起因すると言う¹⁰⁾¹¹⁾。これらの説明によるとめまいの症候は航空機酔い、船酔いの症候と一致し、従ってめまいの原因が末梢前庭性であれ中枢前庭性であれ、これは前庭神経系に発生した急激な神経平衡の破綻により起こる中枢神経系内での情報機構の統合異常と考えるべきであろう。

著者らは各種電気生理学的手法を用い、脳幹諸核における単一神経細胞の単位放電を記録観察し、神経薬理学及び神経生理学的なデータをもととして嘔吐や眩暈の機構および制暈、制

吐薬の作用機序を検討したので以下それについて述べる。

中枢性催吐薬と末梢性催吐薬

中枢性催吐薬として apomorphine の他, morphine 麦角 alkaloids (hydergine), 強心配糖体 (digitalis, lanatoside-C), nicotine, adrenaline 及び dihydroxyphenylamine (DOPA) などがある。これらの薬物はすべて chemoreceptor trigger zone に一次的に作用して嘔吐をひき起すと言われている。一方, 硫酸銅, emetine, 吐酒石及び sodium salicylate などの経口投与は末梢性に胃壁粘膜を刺激し, その求心性 impulse が嘔吐中枢に達して嘔吐反射をひき起す。

Veratrum alkaloids による嘔吐は両側の迷走神経節状神経節 (Nodose ganglion) を切除することによって阻止されることから, その作用部位は節状神経節乃至その近傍であると考えられる。

制吐薬及び制暈薬

外因性及び内因性嘔吐を防止する制吐薬として phenothiazine 誘導体などの tranquilizers, 抗 histamine 剤, 中枢性抗 choline 薬, 鎮静薬, 局所麻酔薬, 及び metoclopramide が応用されている。

さらに, 血管拡張剤や各種ビタミン剤などが用いられるが, ここでは前庭神経核のレベルでその作用を観察し得る薬物についてのみ報告し, 血管拡張剤や各種ビタミン剤等についてはふれない。

(1) Phenothiazine 誘導体

Major tranquillizers には phenothiazine 誘導体, butyrophenone 誘導体及び rauwolfia alkaloids が有る。それぞれ chlorpromazine, haloperidol 及び reserpine が代表薬であるが, ここでは chlorpromazine について主に述べる。

犬において chlorpromazine は apomorphine, morphine 及び hydergine による嘔吐を抑制するが veratrum alkaloids 並びに経

口的に与えた硫酸銅嘔吐を抑制しない。従って chlorpromazine は第四脳室底最後野にある CTZ を選択的に抑制すると考えられる。しかし同じく CTZ 刺激によって嘔吐を来すと言われている lanatoside-C 及び静脈内に与えた硫酸銅の作用を抑制しないことは, 催吐性物質の種類によって, CTZ における chlorpromazine の作用態度が異なるためであろう。また, chlorpromazine は CTZ に親和性を持ったある種の内因性催吐物質の作用と競合的に拮抗すると仮説するものもある。我々はネコを用いた実験において apomorphine 静注または第四脳室最後野塗布による迷走神経孤束核単一細胞放電頻度の増加を chlorpromazine が抑制する結果を得ている。これらの成績もまた chlorpromazine の制吐作用部位が CTZ であることを裏付けるものでであろう。prochlorperazine, perphenazine 及び thiethylperazine などの phenothiazine 誘導体の一次的制吐作用部位は chlorpromazine と同様に最後野の CTZ である。これらの薬物の制吐作用は chlorpromazine より強力であり, しかも静穏作用に比して制吐作用が大である。

眩暈発作時に chlorpromazine が効果がある事も良く知られており, 我々の動物実験においても前庭神経核に対する chlorpromazine の作用は, (図1) に示す如く細胞自発放電数を減少せしめ, 末梢前庭神経刺激時の誘発電位や細胞誘発スパイクを抑制する (図2)。それ故 chlorpromazine は前庭神経系に対しても選択的に抑制効果をもたらすと言う事が出来る。

(2) Benzodiazepine 誘導体

Minor tranquillizers は propandiol 誘導体と benzodiazepine 誘導体に分けられる。前者の代表は meprobamate であり, 後者のそれは dazepam である。これらの薬物は不安感, 緊張を除く作用があり, 少量でも睡眠作用の強いものがあり, また抗痙攣作用や筋弛緩作用を有している。

眩暈発作時の不安感や緊張感を除く意味が

Fig.1. Effects of chlorpromazine (1.0 mg/kg i.v.) and diazepam (1.0 mg/kg i.v.) on the distribution of spontaneous unitary discharges in the NVL. Abscissa represents the frequency/sec of the discharges and ordinate the number of units

Fig. 2. Effects of chlorpromazine (1.0 mg/kg i.v.) on the unitary discharges of the NVL neurons in the response to vestibular nerve stimulation

ら、diazepam 等の投与は効果的とされている。我々の実験において diazepam は前庭神経核細胞の自発放電数を抑制しない。しかしながら、末梢前庭神経刺激時の誘発電位や細胞誘発

スパイクを特異的に抑制する効果がある (図3)。それ故、眩暈発作時に diazepam を投与する場合には、不安、緊張を除くだけでなく、前庭系に対する直接の抑制作用も考慮されよう (Matsuoka¹⁷⁾ら)。

Fig. 3. Effects of diazepam (1.0 mg/kg i.v.) on the unitary discharges of the NVL neurons in response to vestibular nerve stimulation. Fifteen successive traces were superimposed in each record

(3) 抗 histamine 剤

dimenhydrinate, meclizine 及び cyclizine などの抗 histamine 剤は船、車、飛行機などの乗物の動揺によって起る動揺病 (motion sickness) の防止に用いられる。これらの薬物の動揺病抑制作用は各薬物の抗 histamine 効果の強さとは比例しない。

抗 histamine 剤が如何なる作用機序によって動揺病性嘔吐を抑制するかは、興味深い問題である。犬においてこれらの薬物は apomorphine 嘔吐を抑制するが、それには臨床用量の 10~40 倍を必要とする。経口的に与えられた硫酸銅嘔吐は抗 histamine 剤によって抑制されない。これらの成績は抗 histamine 剤の制吐作用部位は CTZ または、嘔吐中枢以外の部位であることを推測せしめる。動揺病の病因より考えて、抗 histamine 剤の一次的作用部位は迷路を含む前庭系、乃至小脳を經由して嘔吐中枢に達するまでの中継路と思われる。

前庭神経核において dimenhydrinate および diphenhydramine は単一神経細胞の自発

放電を減少させると共に、前庭神経電気刺激による反応性を抑制したとの報告 (Jaju¹²⁾) があり、これら抗 histamine 剤は前庭神経系に抑制作用をもつと考えられる。また、これに反対する成績 (関谷ら^{20, 21)}) もあって、なお今後の研究を要する。

(4) 中枢性抗 choline 薬

動揺病の際みられる末梢性症状は acetylcholine 投与により誘発される症状と多くの点において共通している。これ故、動揺病防止に atropine, scopolamine などの抗 choline 薬が応用されている。Freedman & Himwich⁸⁾, Wood & Graybiel²⁶⁻²⁷⁾ は急速な回転運動刺激により起る痙攣脳波や眩暈感が、抗 histamine 剤-atropine 及び scopolamine 前処置により抑制されることを報告している。しかし、これら抗 choline 薬の動揺病抑制作用は末梢性抗 choline 効果とは比例しない。Fried⁹⁾ や松岡¹⁴⁾ は前庭神経系における acetylcholine の分布状態より、前庭神経系が choline 作動性機構に關与する部位であると推定した。さらに前庭神経核細胞において choline 作動薬 (acetylcholine や eserine) が反応性を増強し拮抗薬がその効果を抑制する事を示した。

即ち、末梢前庭刺激時の誘発電位のうち、前シナプス電位や多シナプス後電位は choline 作動薬により変化しないし、また拮抗薬によっても作用を受けない。しかるに単シナプス後電位は choline 作動薬により電位が増強され、拮抗薬である scopolamine によって拮抗される (図 4)。このことは前庭神経核単位細胞の反応においてもまったく同様であり (図 5), 前庭神経核のレベルにおいて choline 作動性機構は極めて重要な役割を演ずると推測される (Matsuoka^{16, 18, 19)}, Yamamoto²⁸⁾, Jaju¹²⁾)。特に抗 choline 作用を有する薬剤のうち di-phenidol がめまいに対し有効な理由の一つとしてこの薬物が三叉神経系や視覚系の誘発電位には効果を示さず、選択的に前庭神経核に作用するという最近の Matsuoka¹⁵⁾ らの成績があ

Fig. 4. Effects of various cholinergic drugs on the amplitude of evoked nucleus vestibularis lateralis potentials elicited with single shocks to the ipsilateral vestibular nerve. Each bar height represents the mean amplitude of a specific wave as designated. Note the dramatic effects of physostigmine in facilitating the N₂ wave as well as scopolamine in reducing it. This wave was reduced following nicotine. All responses were measured 5 minutes after drug administration except after nicotine, which was measured 2 minutes after injection. * = $P < .05$, ** = $P < .01$, *** = $P < .001$.

Fig. 5. Unit responses from vestibularis lateralis to single shocks to the ipsilateral vestibular nerve. A nucleus vestibularis lateralis neuron was recorded before drug administration following single square wave pulses to the vestibular nerve (0.5msec, 1.5 V). Time and voltage calibration as shown. Note that after 25μg/kg i.v. of physostigmine, the unit is much more responsive and after 0.5mg/kg i.v. of scopolamine the unit is completely depressed.

る．さらに，抗 choline 剤の制嘔機構として迷走神経支配臓器の奏効器に働いて抗 choline 作用を現わし，平滑筋痙攣，特に幽門痙攣を緩和し，求心性催吐反射を抑制する効果も関与すると考えられる．

(5) 鎮静薬

Phenobarital, bromvalerylurea などの鎮静，催眠薬は全般的な中枢神経抑制作用を持っており，その一環として延髄の嘔吐中枢の興奮性を低下させる．また，前庭神経系に於いても末梢前庭器官の興奮性のみならず，前庭神経核の機能を抑制する結果としてめまいを抑えたと考えられている (Matsuoka¹³⁾)．

(6) Metoclopramide

Metoclopramide に強力な制吐作用と胃腸管律動調整作用のあることはいくつかの成績により示されている²²⁾．Apomorphine 嘔吐に対する metoclopramide 抑制効果の ED50は皮下注射の場合26.8 μg/kg，及び経口投与の場合42μg/kgであって，それぞれ chlorpromazine の制吐作用の19及び35倍強力である．Metoclopramide はCTZ刺激作用によって発現すると言われている hydergine 及び tetrodotoxin 嘔吐に対して拮抗する．また，末梢性に胃粘膜刺激により発現すると考えられている経口的に

与えた硫酸銅嘔吐に対しても強力な抑制作用をもっており，その効果は硫酸銅嘔吐に対し最も強力な抑制効果をもつ薬物として知られている thiethylperazine のそれに匹敵するものである．以上の成績から metoclopramide はCTZ並びに嘔吐中枢を含む末梢性乃至中枢性嘔吐反射路の両者に同時に作用することが推測される．我々は嘔吐中枢と考えられている迷走神経孤束核単一細胞の実験において，metoclopramide は apomorphine による自発性単位放電数の増加を完全に抑制する事を見出した．この拮抗は同一の単一細胞より長時間連続記録した場合にも，また 100以上の孤束核単一細胞より自発性単位放電数の分布を求めた場合にも，共に観察された (表 I)．

迷走神経孤束核が遠心性嘔吐反射の起始部に相当することは，この部位の電気的刺激が retching 及び嘔吐を誘発することにより確認されている．metoclopramide は孤束核電気的刺激による嘔吐反射を完全に抑制した．即ち，metoclopramide はCTZの機能を抑制すると同時に遠心性嘔吐反射路，おそらくは起始部である嘔吐中枢に対し抑制効果をもっと考えられる．家兎において metoclopramide は頻回刺激による眼球振盪に無効であることから前庭

(表 I) Distribution of unit discharges in the nucleus tractus solitarii.

Firing rate/sec	Control	Apomorphine 1.0 mg/kg i.v.	Metoclopramide 3.0 mg/kg i.v.	Apomorphine 1.0 mg/kg + Metoclopramide 3.0 mg/kg i.v.
0.0 — 2.5	38(25.3%)	5 (2.6%)	23(38.3%)	38(36.9%)
2.5 — 5.0	34(22.7%)	9 (4.6%)	12(20.0%)	18(17.5%)
5.0 — 10.0	38(25.3%)	53(27.0%)	14(23.4%)	27(26.2%)
10.0 — 20.0	18(12.0%)	50(25.5%)	9 (15.0%)	13(12.6%)
20.0 — 40.0	16(10.7%)	50(25.5%)	2 (3.3%)	5 (4.9%)
40.0 — 80.0	6 (4.0%)	15(7.6%)		2 (1.9%)
80.0 — 160.0		11(5.6%)		
160.0 — 320.0		3 (1.6%)		
Total	150	196	60	103
Mean firing rate	10.5/sec	31.2/sec	5.8/sec	7.0/sec

(表Ⅱ) Distribution of unit discharges in the nucleus vestibularis lateralis.

Firing rate/sec	Control	Apomorphine	Metoclopramide
		1.0 mg/kg i.v.	3.0 mg/kg i.v.
0.0 — 2.5	3 (1.5%)	2 (2.0%)	23(9.6%)
2.5 — 5.0	33(15.6%)	5 (5.1%)	29(12.1%)
5.0 — 10.0	71(33.6%)	23(23.5%)	62(25.8%)
10.0 — 20.0	83(39.3%)	25(28.6%)	70(29.2%)
20.0 — 40.0	21(10.0%)	15(15.3%)	51(21.1%)
40.0 — 80.0			5 (2.2%)
Total	221	98	240
Mean firing rate	22.9/sec	21.5/sec	14.5/sec

(表Ⅲ) Distribution of unit discharges in the nucleus sensorior nervi trigemini

Firing rate/sec	Control	Apomorphine	Metoclopramide
		1.0 mg/kg i.v.	3.0 mg/kg i.v.
0.0 — 2.5	2 (2.7%)	1 (0.9%)	2 (2.1%)
2.5 — 5.0	14(19.1%)	3 (2.6%)	5 (5.2%)
5.0 — 10.0	29(39.9%)	16(13.8%)	10(10.3%)
10.0 — 20.0	24(32.8%)	37(31.9%)	32(33.0%)
20.0 — 40.0	4 (5.5%)	46(39.6%)	45(46.3%)
40.0 — 80.0		13(11.2%)	3 (3.1%)
Total	73	116	97
Mean firing rate	20.3/sec	22.8/sec	25.4/sec

系に対して作用をもたないとの考えがある。しかし、我々は外側前庭核単一細胞の自発性放電数が metoclopramide により有意に減少する事を見出している (表Ⅱ)。metoclopramide が動揺病防止に有効であると言う臨床知見もこの意味において興味深い。

三叉神経上知覚核及び呼吸運動に同期発射する単位放電の自発性放電頻度は metoclopramide により有意に変化しない (表Ⅲ)。また、metoclopramide は大脳皮質及び海馬 自発 脳波、脳波覚醒反応並びに漸増反応の閾値をほとんど変化しない。即ち、metoclopramide は中枢鎮静作用を欠き、その作用部位は中枢神経系の内でも C T Z、嘔吐中枢及び前庭系に局限されているものと思われる。Metoclopramide の

消化管律動調整効果が迷走神経及び交感神経の節後線推末端の機能と関係しない事は多くの成績より明らかである。また、metoclopramide は消化管腺分泌に対する効果を欠いている。嘔吐中枢と消化管運動調節中枢とは解剖学的にも機能的にも極めて密接な関係がある。従って metoclopramide の効果は末梢嘔吐中枢のみならず中枢にも作用し、嘔吐の場合その原因を問わず鎮吐作用を期待し得る薬剤であると言い得る。

(7) アドレナリン作動性薬剤

この薬剤群には adrenaline, noradrenaline, isopreterenol 及び非 catecholamine 系薬物が入る。我々の前庭神経系における電気生理実験では末梢前庭神経刺激による誘発電位や単一細胞

Fig. 6. Unit and evoked responses from vestibularis lateralis to single shocks to the ipsilateral vestibular nerve. A nucleus vestibularis lateralis neuron and the evoked field potentials were recorded before and after L-dopa and following single square wave pulses (0.01msec, 1.5V) to the vestibular nerve. Time and voltage calibration as shown. Note that 8 min after the administration of L-DOPA

the unit discharge appears. About 15 min after the administration of L-DOPA the unit is much more responsive.

胞の活性は L-DOPA, noradrenaline, amphetamine 等, アドレナリン作働薬の投与により増強された (Matsuoka¹⁸⁾, 図 6). Darström & Fuxe⁷⁾ 前庭神経核ニューロンの中に catecholamine 蛍光を認めておらず, adrenaline 作働薬が前庭核細胞に直接作用することには否定的な考えが多い. しかし adrenaline 作働薬が末梢前庭系に作用することには否定的な考えが多い. しかし adrenaline 作働薬が末梢前庭系に作用する可能性や他の組織, 特に脳循環を介する作用の可能性なども推測され, アドレナリン作働薬の作用は更に研究を要する課題である.

む す び

嘔吐反射路や嘔吐機構について今日では, かなり明らかになって来ており, Chemoreceptor trigger zone (CTZ) の解剖学的及び機能的な役割も判明して来た. それ故, 嘔吐がみられる場合, その原因を正確に把握する事が必要であり, 投与する制吐剤もその原因を考えて, より適切な薬物を選択する必要がある.

Dimenhydrinate, meclizine, cyclizine などの抗 histamine 剤は, 前庭迷路, 小脳, CTZ の間の中継路に抑制的に作用するが嘔吐中枢に対する直接作用は弱いと推定される. 一方, chlorpromazine, prochlorperazine, thiethylperazine などの phenothiazine 誘導体の制吐作用は CTZ に抑制効果をまつことであり, 内因性, 外因性嘔吐に有効である. Metoclopramide は CTZ, 嘔吐中枢及び消化管運動中枢に作用することから, 前庭性を含めてすべての嘔吐を抑制する. 制暈作用について考えると末梢前庭性の眩暈には, 迷路の興奮性をおさえる薬物を選ぶ必要があるが, 動揺病などでは dimenhydrinate, meclizine や cyclizine などの抗 histamine 剤が有効である. 制吐作用の弱い diazepam などの benzodiazepine 誘導体は制暈剤としては有効である. また, 迷路興奮時には抗 choline 剤が最も効果的であり, 迷路興奮性低下時のめまいには上記の minor tranquilizers や diphenidol 等が, 前庭神経核レベルでの情報再統合に対し抑制作用をもつものとして有効と推定される.

この論文で述べなかったいくつかの制暈剤がある事は言うまでもないが, それらの多くの薬剤では作用点が今日なお不明の種も多い. 中枢作用薬と謂えども薬剤の種類によってそれぞれの作用部位, 作用機序の相違していることが最近重要視されつつある. それ故, 常に site of action について考慮しつつ薬物を使用することが必要であろう.

参 考 文 献

- 1) Bárány, R. : Physiologie und Pathologie des Bogengang Apparates beim Menschen. Leipzig und Wien, F. Deutiche, 1907.
- 2) Bárány. : Untersuchungen uber den von Vestibularapparate des Ohres reflektorische ausgelosten rhythmischen Nystagmus und seine Begleiterscheinungen. Mon. f. Ohr. 40 : 193, 1906.
- 3) Borison, H.L. and Wang, S.C. : Functional localization of central mechanism for emesis in cat. J. Neurophysiol. 12 : 305, 1949.
- 4) Borison. H.L. and Wang, S.C. : Physiology and pharmacology of vomiting. Pharmac. Rev. 5 : 193, 1950.
- 5) Brizzee, K. R. and Neal, L. M. : A re-evaluation of the cellular morphology of the area postrema in view of recent evidence for a chemoreceptor function. J. Comp. Neurol. 100 : 41, 1954.
- 6) Cawthorne, T. : Aural Vertigo. In Ellis, M. Ed. Modern Trends in Disease of the Ear, Nose and Throat. New York, Paul B. Hoeber, Inc., 1954.
- 7) Dahlström, A. and Fuxe, K. : Evidence for the existence of monoamine-containing neurons in the central nervous system. Acta Physiol. Scand. 62 : 232, 1965.
- 8) Freedman, A.M. and Hinwich, H. E. : Site of injection and variation in response. Am. J. Physiol. 156 : 125, 1949.
- 9) Fried, R. L. : Topographic brain chemistry. Academic Press, New York, 1866.
- 10) 星野貞次, 広川護 : 前庭迷路生理学的補遺. 大日耳鼻 29 : 1, 1923.
- 11) 星野貞次, 広神伊藤 : 前庭迷路生理学的補遺. 大日耳鼻 30 : 1, 1923.
- 12) Jaju, B.P., Kicking, J.H. and Wang, S. C. : Effects of Belladonna Alkaloids on the Vestibular Neuronal Activity in Cats. Federal Proceeding 29 : 251, 1970.
- 13) Matsuoka, I. : The responses of single neurons of the vestibular nuclei to caloric stimulation in the cat. Japan J. Pharmacol. 17 : 576, 1967.
- 14) 松岡出 : 前庭神経系のコリンステラーゼ. 耳鼻臨床 65 : 365, 1972.
- 15) 松岡出 : セファドールの中枢神経系に及ぼす影響について. 耳鼻臨床 65 : 179, 1972.
- 16) Matsuoka, I., Domino E.F. and Morimoto, M. : Adrenergic and cholinergic mechanisms of single vestibular neurons in the cat. Ad. in Oto-Rhino-Laryng. 19 : 163, 1973.
- 17) Matsuoka, I., Chikamori, Y., Takaori, S. and Morimoto, M. : Effects of chlorpromazine and diazepam on neuronal activities on the lateral vestibular nucleus in cats. Arch. Oto-Rhino-Laryng. 209 : 89, 1975.
- 18) Matsuoka, I., Domino, E.F. and Morimoto, M. : Effects of cholinergic agonists and antagonists on nucleus vestibularis lateralis unit discharge to vestibular nerve stimulation in the cat. Acta Otolaryng. 80 : 422, 1975.
- 19) Matsuoka, I. and Domino, E. F. : Cholinergic mechanisms in the cat vestibular system. J. Neuropharmac. 14 : 201, 1975.
- 20) 関谷透, McCabe B. F. : 前庭神経核活動電位に及ぼす薬物の影響 Equilibrium Research 31 : 8, 1972.
- 21) Sekitani, T., McCabe, B. F. and, Ryu, J. H. : Drug effects on the medial vestibular nucleus. Arch. Otolaryng. 93 : 581, 1971.
- 22) Takaori, S., Nakai, Y., Matsuoka, I., Sasa, M. and Shimamoto, K. : Pharmacological action of N-(diethylaminoethyl)-2-methoxy-4-amino-5-chlorbenzamide dihydrochloride. Curr. Clinics. 1 : 158, 1967.
- 23) Tyler, D.P. and Bard, P. : Motion sickness. Physiol. Rev. 29 : 311, 1941.
- 24) Wang, S.C. and Borison, H. L. : The vomiting center: A clinical experimental analysis. Archs. Neurol. Psychiat. Chicago, 63 : 928, 1950.
- 25) Wisniewski, H. and Obxewski, A. : Vascular permeability in the area postrema and hypothalamus ; A study using iodinated radiation albumin. Neurol. 13 : 885, 1963.

- 26) Wood, C.D. and Greybiel, A. : Evaluation of 16 antimotion sickness drugs under controlled laboratory conditions. *Aerospace Med.* 39 : 13-41, 1969.
- 27) Wood, C.D. and Greybiel, A. : A theory of motion sickness based on pharmacological reactions. *Clinical Pharmac. and Ther.* 11 : 621, 1970.
- 28) Yamamoto, C. : Pharmacologic studies of nor-epinephrine, acetylcholine and related compounds on neurons in Deiters' nucleus and cerebellum. *J. Pharmac. exp. Ther.* 156 : 39, 1967.

原稿到着 : 昭和51年3月31日
別刷請求先 : 松岡 出
〒606 京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部耳鼻咽喉科学教室