松澤 朋子

中村 洋

古賀 靖子

松浦 邦男

(九州共立大学)

(九州大学)

(九州大学)

(摂南大学)

1. はじめに

質の良い室内光環境の構成は、あらゆる天空状態の輝度分布に適合するような標準的な天空の輝度分布に基づいて行うのが望ましい。そのためには、未だCIEなどで標準化されるには到っていない、多種多様な天空の状態を含む中間天空の輝度分布の標準を開発する必要がある。

本研究では、天空状態は、晴天空から曇天空までの連続する均質な大気混濁による天空状態と、雲の出現する天空状態の重ね合わせにより表されると仮定し、それぞれの天空状態は、屋光光源の性状を良く示す天候条件の指数により表され则认为。そして、天候条件の指数として可視光に関するCloud Ratioを用い、晴天空から曇天空までの連続する均質な大気混濁による天空状態を表すことを考えた。

本報告では、天候条件の指数としての可視光に関するCloud Ratioと、それによる屋光光源モデルについて述べる。

2. 天候条件の指数としての可視光に関するCloud Ratio

可視光に関するCloud Ratio (Cv)は、屋光照度[lx]、すなわち水平面直射照度(Esh)[lx]と全天空照度(Ed)[lx]の和に対する全天空照度(Ed)[lx]の比で表される。

$$Cv = Ed / (Esh + Ed) \quad (2.1)$$

天候条件を表す指数として、大気透過率、大気の混濁因子、日照時間、Cloud Ratioなどが考えられ、実際の天空状態は複数の指数との関係を組み合わせて表すことが必要である。大気透過率は、晴天空に適用されるが、雲が出現する中間天空状態には適用されない。また、大気透過率や大気の混濁因子の値から実際の天空状態をイメージすることは困難を伴うため、これらは天空状態と対応させる指数として実用的ではな

い。

実際の天空状態は、晴天空から曇天空までの連続する均質な大気混濁による天空状態と、雲の出現する天空状態の重ね合わせである则认为。すべての天空状態を表すには、雲の種類や雲量に関する気象データが不可欠である。しかし現在のところ雲に関する適当な気象データはみあたらない。

筆者らは、まず、晴天空から曇天空までの連続する均質な大気混濁による天空状態について考え、天候条件を表す指数としてCloud Ratio(Cv)を用いることにした。

3. 可視光に関するCloud Ratioによる天空輝度分布のモデル

3. 1 3つの天空の輝度分布

晴天空、中間天空、及び曇天空の相対輝度分布としてそれぞれCIE標準晴天空^[1]、中村・沖らによる中間天空^[2]、及びCIE標準曇天空^[3]の輝度分布を用いる。この屋光光源モデルにより得られる天空輝度分布は、CIE標準晴天空と中村・沖らによる中間天空の間の輝度分布、及び中村・沖らによる中間天空とCIE標準曇天空の間の輝度分布である。

3. 2 3つの天空における可視光に関するCloud Ratio

晴天空の可視光に関するCloud Ratio (Cvcl)は次式により求められる。

$$Cvcl = Edcl / (Eshcl + Edcl) \quad (3.1)$$

但し、Eshclは水平面直射照度[lx]、Edclは晴天空の全天空照度[lx]である。水平面直射照度Eshcl[lx]は、次式で定義される。

$$Eshcl = Evo \cdot Pv^n \cdot \sin \gamma_s \quad (3.2)$$

但し、Evoは大気圏外直射日光法線照度(=134,000 [lx])、Pvは光の大気透過率[-]、 γ_s は太陽高度[rad]、 n は質量距離[-]($1/\sin \gamma_s$)である。晴天空の全天空照度

$Edcl[1x]$ は、晴天空の輝度分布 Lcl を全天空について積分することにより求められる。Fig.1に、晴天空のCloud Ratio(Cv)と太陽高度(γ_s)の関係を示す。天頂輝度値は、R.Kittlerによる式^[4]の値を用いた。

曇天空の可視光に関するCloud Ratio($Cvoc$)は常に1.0である。

中間天空における可視光に関するCloud Ratio($Cvin$)は、晴天空のCloud Ratio($Cvcl$)と曇天空のCloud Ratio($Cvoc$)の内分により、次式より求める。

$$Cvin = (1 - kin) \cdot Cvcl + kin \cdot Cvoc \quad (3.3)$$

ここで、係数 kin は、可視光に関するCloud Ratio(Cv)の測定データを集積して統計的解析より今後決定するパラメータである。

太陽高度(γ_s)に依存しない正規化されたCloud Ratio(CvN)は、次式で表される。

$$CvN = (Cv - Cvcl) / (Cvoc - Cvcl) \quad (3.4)$$

$$\text{即ち、} Cv = (1 - CvN) \cdot Cvcl + CvN \cdot Cvoc \quad (3.5)$$

3. 3 正規化されたCloud Ratioによる天空輝度分布のモデル

正規化されたCloud Ratio(CvN)と kin からFig.2に示す式によって得る重み係数(W)を求め、これによって3つの天空の輝度分布を合成し、天空の輝度分布 L を求める。 Lcl 、 Lin 、 Loc はそれぞれ晴天空、中間天空、曇天空の輝度分布である。 Wcl 、 Win 、 Woc はそれぞれ晴天空、中間天空、曇天空の重み係数である。Fig.2に、天空状態に重み係数(W)とCloud Ratio(Cv)、及び正規化されたCloud Ratio(CvN)の関係を示す。

i) $CvN \leq kin$ の場合、

$$L = Wcl \cdot Lcl + (1 - Wcl) \cdot Lin \quad (3.6)$$

$$Wcl = (kin - CvN) / kin \quad (3.7)$$

ii) $CvN > kin$ の場合、

$$L = Woc \cdot Loc + (1 - Woc) \cdot Lin \quad (3.8)$$

$$Woc = (kin - CvN) / (kin - 1) \quad (3.9)$$

3. 4 全天空照度、水平面直射日光照度
全天空照度(Ed)[lx]は、天空の輝度分布 L を全天空について積分することにより求められる。水平面直射日光照度(Esh)[lx]は、全天空照度(Ed)及び(3.5)式より得られる Cv により求められる。

$$Esh = (1 - Cv) / Cv \cdot Ed \quad (3.10)$$

4. おわりに

以上、晴天空から曇天空までの天候条件を表す指数としての可視光に関するCloud Ratioと、それによる天空輝度分布のモデルについて述べた。このモデルの実際の活用と係数 kin の決定のためには、実測データに基づくCloud Ratio(Cv)の変動実態についての検討が必要である。これについては別報で報告する。

Fig.1 晴天空のCloud Ratio($Cvcl$)と太陽高度(γ_s)の関係

Fig.2 天空の重み係数(W)とCloud Ratio Cv 、 CvN の関係

参考文献

- [1] Standardization of luminance distribution on clear skies, Pub. CIE no22 (TC-4.2), 1978.
- [2] H.Nakamura, M.Oki, Y.Hayashi "Luminance distribution of intermediate sky", Journal of Light & Visual Environment, Vol.9, No.1, pp.8-13, 1985.
- [3] Natural daylight. Official recommendation, Comte Rendu CIE 13e Session 1955, Committee (E-3.2), 1955.
- [4] CIE Division III TC308, Circular Letter No.20, 22 Jan. 1988.
- [5] 松澤朋子、中村 洋、古賀晴子、「Cloud Ratio について」、日本建築学会九州支部研究報告集、平成4年3月。