アワヨトウおよびクサシロヨトウの性フェロモン

高橋正三*・瓦谷光男*・佐藤安夫**・坂井道彦**

* 京都大学農学部農業研究施設

** 武田薬品工業農業研究所

Sex Pheromone Components of *Leucania separata* WALKER and *Leucania loreyi* DUPONCHEL. Shozo TAKAHASHI and Mitsuo KAWARADANI (Pesticide Research Institute, College of Agriculture, Kyoto University, Sakyo, Kyoto 606) and Yasuo SATO and Michihiko SAKAI (Pesticide Research Laboratories, Takeda Chemical Industries Ltd., Ichijoji, Sakyo, Kyoto 606) *Jap. J. appl. Ent. Zool.* **23**: 78-81 (1979)

From an extract of female abdominal tips of *Leucania separata* (Z)-11-hexadecenol and its acetate have been isolated as the two major components of the sex pheromone. Ratio of the acetate to the alcohol in the extract was found to be 8:1. Laboratory bioassay of the synthetic compounds in ratios of between 9:1 and 1:1 showed high pheromonal activity. Two major components of the sex pheromone of *Leucania loreyi* have been isolated from an extract of female abdominal tips. These were identified as (Z)-9-tetradecenyl acetate and (Z)-11-hexadecenyl acetate.

結 言

アワヨトウ *Leucania separata* WALKER, クサシロヨトウ *Leucania loreyi* DUPONCHEL は、畑作害虫で禾本科作物の害虫として知られている。ヤガ科のヨトウガ類の性フェロモンの研究は、*Mamestra configurata* WALKER (bertha armyworm) (CHISHOLM *et al.*, 1975), *Scotogramma trifolii* ROTT (clover cutworm) (UNDERHILL *et al.*, 1976), イネヨトウ *Sesamia inferens* WALKER (purple stem borer) (NESBITT *et al.*, 1976), ヨトウガ *Mamestra brassicae* LINNE (cabbage armyworm) (HIRAI *et al.*, 1978) について行われ、(Z)-11-hexadecenyl acetate 単独あるいは、(Z)-11-hexadecenol との組み合わせで室内生物検定、野外での誘引試験における活性が報告されている。

アワヨトウ、クサシロヨトウは、互いに近縁種であり、それらの性フェロモンと他種ヨトウガ類の性フェロモン成分との関連性に関心がもたれている。本報では、室内生物検定法に基づいてクサシロヨトウ、アワヨトウの性フェロモンを単離、同定した結果について報告する。

なお、アワヨトウの性フェロモンの同定に際し、質量

スペクトルの測定に協力いただいた四国農業試験場 若村定男氏に深く感謝致します。

材料および方法

1. 供試虫

アワヨトウおよびクサシロヨトウともに、YUSHIMA *et al.* (1974) の飼料組成にフスマを加えて改良したもの(第1表)を用いて、武田薬品工業株式会社農業研究所で累代飼育したものをを用いた。

2. フェロモン活性検定法

羽化後2日間、全照明の室内においた雄成虫を10頭

第1表 アワヨトウ、クサシロヨトウの合成飼料の組成

成 分	混 合 量
オリエンタル飼料 GC-4	12.8 g
粉末インゲン	7.5 g
フスマ	5.6 g
イースト	1.2 g
大豆粉	0.9 g
アスコルビン酸ソーダ	0.3 g
p-ヒドロキシ安息香酸メチル	0.3 g
寒 天	1.1 g
フォルマリン	0.3 ml
水	70.0 ml

1978年11月1日 受領

づつ金網カゴ（直径 9 cm, 高さ 15 cm）に入れ、検定前に 5 時間暗黒条件下に置き、その後、検定試験を行った。検定は、5 W 赤色電球の照明下で行った。試料のヘキサン溶液を駒込ピペット内壁に付着させ、ヘキサンの気散後、金網カゴに向けてピペットから空気と共にフェロモンを吹きだす。フェロモンに対する反応は、アンテナの動き、ピペットへ向けての雄の移動、翅の振動、把こ握器の突出が観察された。これらの 4 つの行動を順次起させる試料を活性があると判定した。

3. フェロモンの抽出と精製

羽化後 2 日経過した雌成虫の腹部末端を切除して塩化メチレンに浸漬して抽出する。汙過後、溶媒を留去して、黄色油状の粗抽出物を得る。これをシリカゲル（ワコーゲル C200）クロマトグラフィ、ガスクロマトグラフィ（Yanaco G-80, G-180）、高速液体クロマトグラフィ（Yanaco L-2000）で精製および分析を行った。質量分析計は、JEOL JMS-D 300 を使用した。

4. フェロモン化合物の合成

フェロモン化合物は、 ω -bromoalkyl alcohol とアセチレン化合物から HENDRY *et al.* (1975) の方法に従って合成した。合成した化合物は、精製後ガスクロマトグラフィにより 90% 以上の純度があることを確認した。

結果および考察

アワヨトウ

1. フェロモンの精製と化学構造の確認

14,000 頭の雌より得た粗抽出物（6 g）をワコーゲル C-200 (350 g) に吸着し、ヘキサン、5%、10%、および 20% エーテル・ヘキサン、エーテル各 2 l で順次溶出した。これらの溶出部より得られた各画分は、最高 2 雌当量までを供試した生物検定で活性を示さなかった。そこで、各画分の組合せによる生物検定を行い、5% エーテル・ヘキサン溶出部と 20% エーテル・ヘキサン溶出部を 1:1 に混合した場合にのみ 0.5 雌当量で活性（約 50%）が認められた。

5% エーテル・ヘキサン溶出部、20% エーテル・ヘキサン溶出部をそれぞれ高速液体クロマトグラフ（カラム：Yanacogel 5510, 溶媒系：酢酸エチル・メタノール混合、圧力：90 kg/cm²）で精製分取した。前者は、20% 酢酸エチル・メタノールを溶媒とし、lauryl acetate, myristyl acetate, cetyl acetate の標準試料が分離する条件で、cetyl acetate の直前に活性部（A 画分）が溶出した。後者は 5% 酢酸エチル・メタノールを溶媒とし、lauryl alcohol, myristyl alcohol, cetyl alcohol の分離

する条件で cetyl alcohol の直前に活性部（B 画分）が溶出した。

A および B 画分をそれぞれガスクロマトグラフ（Yanaco G-80, 5% PEG 20M, 75 cm, 180°C, He 30 ml/min）で分析すると、炭素数 16 の直鎖アルコールのアセタートで二重結合を 1 個持つ化合物および炭素数 16 の直鎖アルコールで二重結合を 1 個持つ化合物に相当する保持時間（A 成分：9.0 分、B 成分：11.4 分）にピークが現われた。また、B 成分のアセチル化物のピークは、A 成分と同じ保持時間であった。

A, B 両成分をひきつづきガスクロマトグラフ直結質量分析計で分析し、標準試料の (Z)-11-hexadecenyl acetate, (Z)-11-hexadecenol のマススペクトル（アセタート：m/e 222 (M⁺-60), 194, 180, 61 アルコール：m/e 222 (M⁺-18), 123, 109) と一致した。

二重結合の位置を確認するために、A 成分、および B 成分のアセチル化物をガスクロマトグラフで分取し、約 0.05 μ g のオゾン分解生成物が 11-acetoxtyundecanal であることをガスクロマトグラフ（Yanaco G-80, 5% PEG 20M, 75 cm, 80°C→180°C 10°/min, He 0.6 kg/cm², 保持時間 11.2 分）および質量分析計（m/e 185, 61）で確認した。

二重結合の幾何構造は、キャピラリーカラム（PEG 20 M, 30 m）によるガスクロマトグラフィ（180°C, He 35 ml/min）で標準試料の (Z)-11-hexadecenyl acetate と A 成分の保持時間（Z 体：22.6 分 E 体：22.0 分）が一致したことにより決定した。同様に相当するアルコールの分析を行い B 成分は Z 体に保持時間（Z 体：30.2 分 E 体：29.4 分）が一致した。これにより、A 成分は (Z)-11-hexadecenyl acetate, B 成分は (Z)-11-hexadecenol であると同定した。

雌虫体抽出物中の A, B 両成分の存在比はガスクロマトグラフィにおけるピーク高を標準試料と比較して推定した。雌虫体 1 頭当りのフェロモン含量は、約 3 ng で A 成分と B 成分の混合比は 8:1 であった。

2. 合成フェロモン化合物の活性

合成フェロモン化合物 (Z)-11-hexadecenyl acetate および (Z)-11-hexadecenol をそれぞれ単独で生物検定を行うと、(Z)-11-hexadecenol には全く活性が認められないのに対し、(Z)-11-hexadecenyl acetate は、10⁻¹ μ g の供試量で 35% の反応率を示した。この両化合物を混合すると活性は急激に高まり、10⁻⁴ μ g の供試量でアセタートとアルコールの混合比 4:1 の時に活性はピークを示した（第 1 図）。しかしながら供試量を 10⁻⁶

第1図 フェロモン2成分の混合比とアワヨトウ雄成虫の反応率(供試量 $1 \times 10^{-4} \mu\text{g}$)。横軸は(Z)-11-ヘキサデセニルアセテート(A)と(Z)-11-ヘキサデセニルアルコール(B)の混合比。

μg にさげると混合比の如何にかかわらず活性は認められなかった。このように、室内における生物検定の結果から両化合物は、アワヨトウの性フェロモンの主要成分であることは確認されたが、混合物に対する雄の反応にあまり持続性がなく、また $10^{-4} \mu\text{g}$ 以下で活性が急速に低下した。

クサシロヨトウ

1. フェロモンの精製と化学構造の確認

クサシロヨトウ 5,255 頭の雌の腹部末端を切除して塩化メチレンに浸漬し 4.8g の粗抽出物を得た。この粗抽出物の 0.5 頭分に対する雄の反応率は 70% であった。粗抽出物はワコーゲル C-200 250g に吸着しヘキサン、1% および 2% エーテル・ヘキサン、エーテルで順次溶出し、1% エーテル・ヘキサン溶出部に活性があった(0.003 雌当量で 50% の反応率)。

つづいて、この活性部を 10% 硝酸銀処理シリカゲルのカラム(15g)で、分画を行った。2%, 5%, 7% および 10% エーテル・ヘキサン各 100 ml で溶出して、5% エーテル・ヘキサン溶出画分に活性があった。この活性部のガスクロマトグラフ(Yanaco G-180, 5%PEG 20M, 75 cm, 150°C, He 30 ml/min)では、9.6 分(A成分)と 23.0 分(B成分)に主なピークが認められた。A成分のピークは、炭素数 14 の直鎖アルコールのアセテートで二重合 1 個の化合物に相当し、マススペクトルは、9-tetradecenyl acetate と一致した。A成分のオゾン分解は、9-acetoxynonanal を与えた。また、10% 硝酸銀処理シリカゲルの薄層クロマトグラフィでベンゼンで展開すると Rf 0.4~0.5 にスポットが現われ標準品(Z体: Rf 0.50 E体: Rf 0.60)との比較から Z 体と同定した。

B成分は、オゾン分解で 11-acetoxundecanal を与え、標準品の(Z)-11-hexadecenyl acetate のオゾン分解生成物と全く同一物であることを確認した(Yanaco

第2表 フェロモン2成分の混合比とクサシロヨトウ雄成虫の反応率(供試量 $1 \mu\text{g}$)

(Z)-9-tetradecenyl acetate (A)	(Z)-11-hexadecenyl acetate (B)	%
10	0	30
9	1	60
8	2	70
6	4	60
5	5	40
0	10	0

G-180, 5%PEG 20M, 75 cm, 150°C 保持時間 20.9 分)。

虫体抽出物中のフェロモンの含量は、1 雌当り約 47 ng で、A, B成分の存在量比は、4:1 であった。

2. 合成フェロモン化合物の活性

合成した(Z)-9-tetradecenyl acetate と(Z)-11-hexadecenyl acetate のフェロモン活性は、それぞれ単独で生物検定を行うと、 $10^{-1} \mu\text{g}$ で(Z)-9-tetradecenyl acetate のみに約 30% (反応率)の活性がみられた。A, B 両化合物を混合しても、顕著な活性の増大は認められず、最も高い活性を示す 4:1 混合物においても雄の反応率は 70% にとどまった(第2表)。しかも、この混合物は、 $10^{-3} \mu\text{g}$ の供試量で活性は認められなくなった。

アワヨトウ、クサシロヨトウ共に雌成虫のフェロモン分泌腺を摘出して塩化メチレンで抽出した試料は、0.5 雌当量でそれぞれ 100%, 70% の反応率を示した。これと比較すると、性フェロモン成分として確認された化合物の混合物の活性は、決して高いとは言えない。この結果から、両種について同定した化合物は、性フェロモンの主成分と考えられるが、その他にもフェロモン活性に重要な作用をもつ未同定の副成分が存在するものと推定される。

アワヨトウおよびクサシロヨトウの両種の性フェロモン成分に(Z)-hexadecenyl acetate が含有されていることが明らかとなった。この化合物は、すでに他種ヨトウガ類のヨトウガとイネヨトウの性フェロモン成分であることが発見されたばかりでなく、これを誘引源としたトラップ試験で、ヤガ科雄成虫が誘引されることも報告されている(RoeLOFS and COMEAU, 1970; ANDO *et al.*, 1977)。このような事実から、炭素数 16 の化合物の hexadecenyl acetate, alcohol, aldehyde などがヨトウガ類の性フェロモンの主要成分のひとつであろうと推定される。今回、アワヨトウ、クサシロヨトウのフェロモン成分中に(Z)-hexadecenyl acetate, alcohol が確認されたことも、それを裏付けている。

摘 要

アワヨトウ性フェロモン成分の精製を室内生物検定法に基づいて行い, (Z)-11-hexadecenyl acetate と (Z)-11-hexadecenol が 8:1 の割合で含有されていることを確認した。

クサシロヨトウも同様な生物検定に基づいて性フェロモン成分の検索を行い, (Z)-9-tetradecenyl acetate と (Z)-11-hexadecenyl acetate が 4:1 の混合比で含有されていることが確認された。

引 用 文 献

- ANDO, T., S. YOSHIDA, S. TATSUKI and N. TAKAHASHI (1977) Sex attractants for male Lepidoptera. Agric. biol. Chem., Tokyo **41**: 1485—1492.
- CHISHOLM, M. D., W. F. STECK, A. P. ARTHUR and E. W. UNDERHILL (1975) Evidence for *cis*-11-hexadecen-1-ol acetate as a major component of the sex pheromone of the bertha armyworm, *Mamestra configurata* (Lepidoptera: Noctuidae). Can. Ent. **107**: 361—366.
- HENDRY, L. B., S. H. KORZENIOWSKI, D. M. HINDENLANG, Z. KOSARYCH, R. O. MUMMA and J. JUGOVICH (1975) An economical synthesis of the major sex attractant of the oak leaf roller—*cis*-10-tetradecenyl acetate. J. chem. Ecol. **1**: 317—322.
- HIRAI, Y., H. KIMURA, K. KAWASAKI and Y. TAMAKI (1978) (Z)-11-hexadecenyl acetate: A sex pheromone component of the cabbage armyworm moth, *Mamestra brassicae* LINNE. Appl. Ent. Zool. **13**: 136—137.
- NESBITT, B. F., P. S. BEEVOR, D. R. HALL, R. LESTER and V. A. DYCK (1976) Identification of the female sex pheromone of the purple stem borer moth, *Sesamia inferens*. Insect Biochem. **6**: 105—107.
- ROELOFS, W. L. and A. COMEAU (1970) Lepidopterous sex attractants discovered by field screening tests. J. econ. Ent. **63**: 969—974.
- UNDERHILL, E. W., W. F. STECK and M. D. CHISHOLM (1976) Sex pheromone of the clover cutworm moth, *Scotogramma trifolii*: Isolation, identification and field studies. Environ. Ent. **5**: 307—310.
- YUSHIMA, T., Y. TAMAKI, S. KAMANO and M. OYAMA (1974) Field evaluation of a synthetic sex pheromone, “litlure”, as an attractant for males of *Spodoptera litura* (F.) (Lepidoptera: Noctuidae). Appl. Ent. Zool. **9**: 147—152.

会 報

「国際集会等派遣基金」による学術集会ならびに
それへの出席希望者募集について

国際集会等派遣基金は、国外で開催される国際的な学術集会等への本会会員の参加を援助する目的で、1976年に設立されました。

1980年に開催される学術集会とそれへの出席希望者は次の申込書(用紙はA4判の原稿用紙を用いる)に従って9月末必着で学会事務局にお申込み下さい。

なお、1979年度の援助率は航空運賃の50%(片道分)でした。

国際集会派遣基金申込書

年 月 日

日本応用動物昆虫学会会長殿

氏 名 ㊟

(年 月 日生)

所属(連絡先)

主たる専門分野

1. 出席しようとする集会の名称(欧・和併記)
開催地
期 日
2. 講演発表の有無(表題名および400字程度の内容の概要)
3. 経費概算額 計 円 (個人負担 %)
内訳: 交通費 円, 会費 円, 滞在費 円

参考事項

1. 出席勧誘状・座長依頼状などの有無(写別添)
2. 過去における国際集会への参加, 海外渡航などの有無
3. その他の参考資料
4. 必要あれば出席希望理由, それによって受ける利益または効果など。