高齢者の生活と人間工学

○村木 里志（九州大学大学院芸術工学研究院デザイン人間科学部門）

Elderly's Life and Ergonomics

Satoshi MURAKI (Kyushu University, Faculty of Design)

1. はじめに

縄文時代の平均寿命は約15歳、江戸時代でも40歳前後であり、人生50年と言われていた。しかし、現在はほとんどの者が長生きし、女性の寿命中位数は89.25歳（平成24年簡易生命表）に達した。人間の寿命の限界は120歳前後と言われており、人生100年になる時代も遠くはない。このような長寿社会は人類史上初めてであり、人類は高齢期をどのように生きるか、どのような社会を形成すればよいのかを問われている。

また、長寿の社会は介護が必要な人も増やす。平均寿命と健康寿命の差は介護期間になり、その平均は日本の場合、男性では約9年、女性では約13年である。この期間が長くなると、社会への負担が増す。平均寿命は今後も延びると予測されており、健康寿命、すなわち自立して生活できる年齢もそれ以上に伸ばさないと、問題がさらに深刻になる。

一方、人類は他の生物と比べ、生殖期以降の寿命、すなわち後生殖期が長い特長をもつ。その理由として、人類は文化の継承ができ、高齢期になっても、例えば孫の面倒をみる、次世代を教育するなど、人類の繁栄に貢献できるからだと考えられる。そのためには高齢者の社会参加を支える社会の形成が欠かせない。

以上のことを考えると、高齢期はできる限り自立して生活し、社会に参加することが大事と言える。高齢者を対象とした人間工学は、後述する心身機能低下を補うことを中心に考えるが、その先の「自立」や「社会参加」につながるかをより強く意識する必要がある。

2. 心身機能の低下

人間の心身機能のほとんどが出生後20歳前後まで成長し、その後は維持もしくはゆるやかに低下していく。そして60歳前後になると機能低下の速度がより速くなり、80歳前後になるとさら加速する。また、疾病や事故（転倒など）により心身機能が低下することも多い。高齢者の生活に関わる

人間工学はこの心身機能の低下や事故予防に目が向けられることが多い¹⁾。

ただし、全ての心身機能が同じように衰えるわけではない。例えば、高齢になると起立や階段昇降が困難になるケースが多く、それを補助する用具・生活環境の設計や基準には人間工学が関わることが多い。それらの動作の動力源となるのは膝関節の伸展筋力である。著者らは高齢者の大腿部の筋横断面積の加齢変化を検討したところ、膝関節伸筋群の筋横断面積は大きく低下し、膝関節屈筋群はほとんど低下していなかった。このように高齢になって著しく衰える機能を把握し、重点的に補う取り組みが求められる。また、高齢になっても衰えにくい能力があり、それは結晶性能力と呼ばれる。その能力には言語能力、総合的判断力などが含まれる。これらの能力を活かす対策を人間工学の面から考えることも有効である。

3. 人間工学の役割と課題

(i) 自立支援

高齢者の生活を対象とする人間工学は、心身機能の低下を補うことを考える場合が多い。ただし、その目的は「楽にさせる」ことでなく、「自立支援」や「本人自身で行える」ことである。

高齢になると様々な心身機能が衰える。それを補う生活用具として、例えば「箸→スプーン」、「布団→ベッド」、「かぶり式上衣→前あき式上衣」のような代替品がある。これらは手指の巧緻性、下肢の筋力、肩関節の柔軟性の低下が相当に衰えた者には有効であり自立支援につながる。しかし、まだ十分な能力がある者が使用すると、それまで使っていた能力を使わなくなり、その能力は衰えていく。代替品の開発も重要ではあるが、一方でそれまで使用してきたモノを長く使えるようにし、心身機能を維持する試みも人間工学の役割である（図1）。

(ii) 安全と心身機能の向上の両立

高齢者の場合、転倒などの怪我は寝たきりを招く場合が多く、その安全対策は重要である。転倒

図1 かぶり式上衣を使用できる年齢の延長

の場合、直接的原因となる外的要因（段差、滑りやすい床、暗い照明など）を解消する対策、すなわちバリアフリーが行われることが多い。しかし一方で転倒しにくい心身を維持することも重要である。特に高齢者は住居にいる時間が長く、住環境の心身機能への影響は大きい。著者らの研究では住居のバリアフリーには生活動作能力を高める因子と、下げる因子がみられた³⁾。安全と心身機能の両面を高める生活環境の検討が求められる。

(ii) 自覚しない衰えの探索と設計への応用

高齢になると心身機能は衰えるが、それには高齢者が自覚する衰えとそうでない衰えがある。例えば筋力の衰えは自覚しやすい。高齢者に障害物をまたがせる実験を行うと、高齢者は下肢の筋力の衰えを自覚しているためか、若年者より高く足を挙げる。しかし、障害物を繰り返してまたがせると、高齢者は足の高さのばらつきが大きかった。それは特に低い障害物の場合に起こる⁴⁾。そしてこの現象は自覚されにくい。高齢者の生活において自覚されにくい機能の衰えを探索し、生活環境の設計や指針につなげる研究も大事である。

(iii) 高齢者向けの主観評価手法

高齢者に主観評価を行わせると、そのデータの解釈が難しいケースが少なくない。図2には高齢者と若年者が異なる蹴上げ・踏み面寸法の階段を登った場合の主観評価結果を示している⁵⁾。高齢者は階段を登るための身体能力が衰えており、主観評価得点が低くなると予想されるが、高齢者の方がどの蹴上げ条件においても、総合評価得点が高く、登りやすいと回答した。高齢者の場合、多少不便や負担があっても成功すれば評価が大きく上がるという傾向がみられる。この現象の理由には感受性の低下、国民性、高齢者の自尊心など様々な理由が考えられる。高齢者のよりよい生活を考える場合、心身両面からの検討は欠かせず、今後、高齢者の主観を適切に評価する手法の検討が望まれる。

図2 階段登り時の主観評価³⁾

4. 今後の展望

科学技術の発展により、高齢者の身の回りには一層、情報機器が溢れ、また近年盛んに研究・開発されているアシスト機器やロボットが身近になると予想される。つまり将来の高齢者はさらに機器と関わる場面が増える。高齢者の機器に対するアダプタビリティを考え、高齢者の自立や自尊心を高めながら、社会に参加できる仕組みを考える必要がある。

謝辞

本研究はJSPS 科研費 17657083, 21700694, 23300255の助成を受けたものです。

引用文献

- 1) 村木里志：高齢者に配慮した実環境のデザイン事例，人間環境デザインハンドブック（編集：栃原 裕），丸善，428-434，2007
- 2) 谷水香奈美，村木里志：高齢女性のかぶり式半袖上衣の脱衣動作における肩関節の動き．日本衣服学会誌 56(2)：81-89，2013
- 3) Mori T, Muraki S, et al. : The effects of barrier-free housing on the physical fitness and incidence of falls among healthy middle-aged and elderly people. Proceeding of 17th World Congress on Ergonomics (CD-ROM), 2009
- 4) 齋藤誠二，村木里志：高齢者の障害物またぎ動作における足の軌跡と位置知覚に関する研究．人間工学 46(2)：172-179，2010
- 5) 森 智昭，村木里志，他：階段寸法（蹴上げ・踏み面）の違いが昇降動作に及ぼす影響．バイオメカニズム学会誌 35(3)：201-207，2011