日常生活におけるバーチャルリアリティ体験が心拍変動におよぼす影響

○河合 隆史（早稲田大学 基幹理工学部）

Effects of virtual reality experience in daily life on heart rate variability

Takashi KAWAI (Waseda University, School of Fundamental Science and Engineering)

1. はじめに

2016年の「バーチャルリアリティ（VR）元年」以降、ヘッドセットの小型化や軽量化、高解像度化が進み、コンシューマ向けの製品も低価格で市販されるようになった。現状、VRヘッドセットは、PCやゲームコンソール、スマートフォンなど身近な情報通信機器と組み合わせて使用するものがほとんどであるが、今後は単体で動作するスタンドアロン型の増加が予想されており、これに伴い日常生活におけるVR体験が容易になることが期待されている。これまでVR体験は、主に実験室での短期的かつ直接的な影響として、評価・検討されてきた。そのため今後は、日常生活行動の一つとしてのVR体験の位置づけや、その他の行動との相互作用に関する取り組みも重要になると考える。

2. 目的

日常生活におけるVR体験に関する基礎的な知見を得ることを目的として、日課に設定した条件下での生理指標を用いた実験的な検討を行った。

3. 方法

VRコンテンツの呈示には、PlayStation VR

（Sony Interactive Entertainment）を使用した。VRコンテンツは、バリエーションの観点から、サマーレッスン（バンダイナムコエンターテインメント）、Rez Infinite（Enhance Games）、INVASION!（Baobab Studios）およびAllumette（Penrose Studios）の4種類を選択した。サマーレッスンはVR空間でキャラクターとコミュニケーションをとるゲームであり、Rez Infiniteはシューティングゲームである。INVASION!とAllumetteは、いずれも360°の視界を有した短編のCGアニメーションである。

生理指標として心拍変動を選択し、Lifestyle Assessment（Firstbeat）を用いた心拍の24時間の連続測定を、3日間、実施した。参加者は、20才台の男性10例であり、事前に趣旨を説明し同意を得た。3日間の実験期間中、参加者には、自由な生活行動およびその記録と同時に、都合の良い時間帯に1日30分間のVR体験を求めた。コンテンツは、1日目がサマーレッスン、2日目がRez Infinite、3日目がINVASION!およびAllumetteであった。なお、生活行動の記録は、Lifestyle Assessmentであらかじめ設定された14種類のエンタリから選択する形式とした。

図1 VR体験中および前後における各指標の変化

図2 Rez Infinite体験中のストレス反応強度の変化

4. 結果

Lifestyle Assessmentでは、心拍数からストレスとリラクスの反応強度を示す指標値が、独自のアルゴリズムによって算出される。先行事例として、これらの指標を用いた日常生活行動の記録・分析にかかる報告がなされており¹⁾、本研究においても、これらを解析の対象とした。

まず、VR体験中（VR）および前後30分間（PRE, POST）の心拍数、ストレスとリラクスの反応強度の平均を図1に示した。分散分析の結果から、測定時期の主効果に有意差が認められた（ $p < .05$ ）。具体的に、VR体験中は心拍数およびストレス反応強度は低下し、リラクス反応強度は上昇する傾向がみられた。

次に、VR体験中のストレス反応強度が低下する傾向はコンテンツ間で共通していたが、体験中の変化にはコンテンツ間で顕著な差異がみられた。図2にRez Infinite体験中のストレス反応強度の変化と、その多項式近似曲線によるスムージングの結果を示す。サマーレッスンにおいても変位量は小さいがVR体験中の一時的な上昇がみられたのに対し、INVASION!およびAllumetteでは低下した反応強度が持続する傾向がみられた。

さらに、VRコンテンツ毎の体験中および体験前後のストレス反応強度を、図3に示した。VR体験中は、いずれのコンテンツでもストレス反応強度の低下がみられるが、体験後の変化にはコンテンツ間で差があることが分かる。

5. 考察

VR体験中と前後での各指標の変化から、日常生活におけるVR体験がストレス反応を低下させる影響源となり得ると考えられた。また、ストレス反応強度の変化において、VRコンテンツ間で差異がみられたことから、各コンテンツの特徴が反映されたと考えられた。本実験で選択したVRコンテンツでは、体験中のインタラクションの能動性が影響したと推察された。

今後は、その他の行動との比較やVRコンテンツの特徴との連関について詳細に検討していくことで、日常生活におけるVR体験の位置づけと利活用のあり方を探っていく。

謝辞

本研究の推進にあたり、早稲田大学大学院 基幹理工学研究科 表現工学専攻 修了生の塚田将太氏による多大な助力をいただいた。また、本研究の一部は、早稲田大学 特定課題研究助成費（2017B-148）を得て実施した。ここに感謝の意を表します。

参考文献

- 1) M. Pantzar, M. Ruckenstein, V. Mustonen: “Social rhythms of the heart”, Health Sociology Review, Vol.26, No.1, pp.22-37, 2017.

図3 VR体験中および前後におけるストレス反応強度の変化
(左：サマーレッスン, 中：Rez Infinite, 右：INVASION!およびAllumette)