小集団での議論のパフォーマンスとメンバーの体動の同調性との関係

－同調傾向の高いグループに着目して－

○松井 裕子 ((株) 原子力安全システム研究所)

彦野 賢 ((株) 原子力安全システム研究所)

Relationship between performance and physical synchrony of the members in small group discussion

-Focusing on the high-synchrony groups-

Yuko MATSUI (Institute of Nuclear Safety System, Inc.),

Masaru HIKONO (Institute of Nuclear Safety System, Inc.)

1. はじめに

コミュニケーションについては古くから研究されており、課題中の行動や発話の分析が行われてきた。しかし、行動観察や発話の分析は多くの時間や労力を必要とし、例えば、短期間でのフィードバックを要する訓練などでの活用には多くの困難を伴う。一方で、近年は情報技術の発達によって、より詳細に作業中の非言語情報の取得が可能になっており、そのような技術を用いて議論の質をとらえようとする試みも行われている¹⁾。

本研究では、このような情報技術の一つである椅子型の測定ツールSenseChair¹⁾に着目した。このツールは、椅子に内蔵された圧力センサで重心・重量の時系列的な変化を計測し、複数台用いると議論の参加者の体動の同調性を算出することができる。椅子型ツールの特徴である非装着、非侵襲、簡易な設置方法は、様々な制約のある産業場面における業務中の行動測定にも適していると考えられる。SenseChairを用いた先行研究では、ブレインストーミングのような発散型思考を要する議論において、同調傾向値と主観的な盛り上がり²⁾、あるいは提出されたアイデア数³⁾との関連が見出されている。

以上を踏まえ、本研究では、小集団での議論の成績とメンバーの体動の同調性の関係性について、探索的に調べることを目的とする。

2. 方法

(1) 実験参加者

人材派遣会社を通じて募集した20～40代の男性6名 × 15グループ (計90名)。

(2) 手続き

① 初期化したSenseChairを設置した椅子に着座を求め、実験の概要説明を行った。参加者にはSenseChairによる重心位置と重量の測定、および

録画と録音を行うことを知らせた。承諾書記入後に記録を開始した (図1)。

② 実験参加者同士で積木式自己紹介を行った。

③ 先行研究^{1)~3)}にならない、代替用途課題⁴⁾を行った。参加者には、15分間で「レンガ1個の使い方」をできるだけ多く挙げるように求めた。進行役を1名決めること、議論中に立ち上がらないこと、メモをとらなくてよいことの3点以外は自由に議論を進めるように伝えた。

④ 発散型議論を伴う代替用途課題とは異なる、断片的な情報を集約しグループで1つの解答を導く課題を実施した。

⑤ 課題終了後に、議論の盛り上がりなどに関する質問紙への回答を求めた。

(3) 記録用機材

SenseChair (ミニタイプ) は、2枚の透明なアクリル板の間の四隅に圧力センサが設置され、座面にかかる重量と重心位置座標を取得する。6台のデータはそれぞれBluetoothによってPCに送信され、時刻データとともに記録される。本体のサイズは300×300×47mmであった。あまり目立たないように薄い布製のクッションカバーで覆って回転しない椅子の座面に設置した。データのサンプリング頻度は20Hzであった。

録画には360度カメラ (Kodak PIXPRO SP360 4K)、録音にはICレコーダー (SONY ICD-TX800) を2台ずつ用いた。

図1 実験の様子

3. 結果

SenseChairの設定に不備のあった2グループを除く13グループの代替用途課題の成績と重心位置座標・重量データを分析対象とした。

<課題成績>

アイデア数とカテゴリ数を課題成績とした。各グループのアイデア数の平均値は33.9個 (SD=9.14) であった。カテゴリは、実験者2名が議論しながら全グループのアイデアを事後的に分類した。その結果、複数のアイデアを含むカテゴリが32個、どのカテゴリにも当てはまらない単独のアイデアが9個となった。平均カテゴリ数は18.4個 (SD=3.75) であった。アイデア数とカテゴリ数の相関係数が $\rho=0.85$ と高かったため、以後の分析ではアイデア数のみを対象とした。

<同調傾向値>

SenseChairで記録された重心位置座標 (X, Y) と重量 (W) の時系列データを用いて先行研究¹⁾と同様の方法で、時系列同調傾向値を算出した。さらに15分間の平均値を6名のメンバーの同調傾向値とした。全メンバーに同時に身体的な揺動が生じると同調傾向値は高くなる。全グループの平均同調傾向値は0.11 (SD=.044) であった。

<課題成績と同調傾向値との関係>

同調傾向値と課題成績の散布図を図2に示す ($\rho=.165$, $p>.1$)。図2から、同程度に高い同調傾向値でも、課題成績に差のあるグループがあることがわかった。そこで、同調傾向値も課題成績も高いグループDと同調傾向値は高いが課題成績は低いグループFに着目して、時系列同調傾向値が0.2以上となるピーク数を計数したところ、それぞれ32個、33個であり、特に高い同調傾向を示した回数は同程度であった。次に、メンバー2名ずつの同調傾向値を算出したところ、全組み合わせの平均同調傾向値はFの方が有意に高かった (D:1.00 (SD=.140) ; F:1.18 (SD=.190) ; $t(28)=2.98$, $p<.01$)。各組み合わせについて、時系列同調傾向値のピーク数 (0.2以上) を計数したところ、グループFの方が有意に多かった (D: 33.3個 (SD=16.53) ; F:84.5個 (SD=22.77) ; $t(10)=4.45$, $p<.005$)。グループFは6名全員の同調傾向はグループDと同程度であったが、二者間の同調傾向はDより強かったといえる。

録画データからは、グループDでは、進行役が課題開始時や進行中に「他の人のアイデアにのっ

て」「具体的に」などアイデア創出を促したり、積極的にアイデアを提出する様子が見られた。グループFでは、アイデアが出ると進行役が場を盛り上げて笑いが多く起きるが、次のアイデア創出を促す内容ではないように見受けられた。

図2 同調傾向値と課題成績の散布図

4. まとめ

重心位置と重量データから算出された6名のメンバー間の身体的な同調傾向と課題成績との関係は明らかにならなかった。同調傾向は高いが課題成績の低いグループは、同程度の同調傾向で成績の高いグループと比べて二者間の強い同調傾向が高頻度で見られた。録画データから、二者間の高い同調傾向は、アイデア創出につながらない話題で盛り上がる傾向を反映したと考えられた。課題成績に比して適切な同調傾向値のピーク数が明らかになれば、発散型議論のパフォーマンスを把握する指標になり得るのではないかと考える。

参考文献

- 1) 宮崎 陽平他: “SenseChairによる会話者間の同調傾向検出”, 情報処理学会インタラクション2015, pp. 47-53, 2015
- 2) 津田 高宏他: “SenseChairを用いたグループ会話の活性度計測に関する一検討”, 電子情報通信学会総合大会講演論文集 基礎・境界, p. 167, 2014
- 3) 續 毅海他: “SenseChairによる会話者間の同調傾向検出手法と会話の質評価”, ヒューマンインタフェース学会論文誌, Vol. 19 No. 2, pp. 151-162, 2017
- 4) Guilford, J. P. The nature of human intelligence. NewYork, McGraw-Hill, 1967

謝辞: 大阪大学大学院情報科学研究科 伊藤雄一先生、増山昌樹氏にご指導頂いたことを記して感謝致します。