疲労を伴う静的肘関節屈曲における 協同筋の動態

○大箸 純也 (九州芸術工科大学・人間工学)

Relations of synergists during fatiguing sustained elbow flexions.
J. Ohashi (Kyushu Institute for Design Research, Ergonomics)

〔目的〕 前回の報告では、肘関節屈曲による疲労性の静的筋作業を繰り返した場合の主観的疲労感と上腕二頭筋の表面筋電図の関係について述べた。結果としては、同一自覚症状に対する筋電図振幅(AEMG)は作業の繰り返しに伴い増加し、自覚症状の不確定さを考慮しても筋疲労とAEMGの関係は再現性の無いものであった。この結果の原因としては協同筋の関与によるAEMGの変化が考えられる。本研究はこの協同筋の動態をほぼ同様な条件で調べるために行った。

〔方法〕 作業は、倚坐位、肘関節角度90度、前腕は水平での手首にかけた重りの保持である。重りは前腕の重さを考慮した上で、最大随意筋力の約13%とした。肘後方に肘当てを設け、肩関節の伸展は生じない様にした。自覚症状を作業中自由に申告してもらった。作業は5分間の休憩を入れて5回繰り返した(作業を最初の方からW1, W2, W3, W4, W5と記す)。W1は、自覚症状として「明確にだるい」、「非常にだるい」、「きつい」等の発生後1分間以内に終了させた。W2-W4の終了もW1と同じであるが、最長で5分間とした。W5は自覚症状として疲憊に至るか全作業の合計時間が45分となるまで行った。W5はW3かW4の短い方の作業時間が経過するまでをW5a、それ以後をW5bに分けた。各作業の開始時と終了時の疲労感を前回の作業またはW1と比較してもらった。表面筋電図は双極誘導で記録し、その筋(略号)は長橈側手根伸筋(ECRL)、円回内筋(PT)、腕橈骨筋(BRR)、上腕筋(BR)、上腕二頭筋の短頭(BBB)と長頭(BBL)であった。筋電図は10

24Hzでサンプリングし、平均振幅(AEMG)と20Hz以下の相対パワー(RPLF)を求めた。被験者は男性の大学生及び大学院生の6名(A-F)であった。統計的検定は対応のあるt検定と相関係数によって行い、危険率は5%とした。

〔結果〕 W1の作業時間は、被験者A-Fについて各々11、11、9、10、21、8分であった。主観的な疲労感は、作業終了時のものとしては被験者Eを除いてW1よりもW2の方が楽であるが、W2からW4になるにつれて疲労感は増し、W3又はW4ではW1よりも疲労感は強くなった。作業開始時の疲労感は被験者Eを除いて作業を繰り返すにつれて強くなり、作業開始時からかなりのだるさを申告した例もあった。

表1にW1の作業開始時と終了時のAEMGの筋間の相対値を示す。AEMGはW1とW5bでは大体の例において作業に伴い増加した。W2-W5eでも作業中のAEMGは増加したが、変動はするが全体的なレベルでは変化しなかったり、作業開始時にのみ増加し、その後はほとんど変化しない例も多かった。作業開始の1分間及びそれ以後の作業の残りでのAEMGと時間の相関関係が正で有意となったのは、144条件中各々59例と41例であった。各作業の平均的レベルは全体的には作業の繰り返しに伴い増加する例が多いが、低下を示す例もあり、同一被験者でも筋により異なった変化をした。各筋間の変化の相関をみるために各筋間でAEMGの相関係数を求めた。比較的細かな変化に対するものとしてW2-W5aの各作業での値の平均と、全体的な変化に対するものとして全作

Table 1. Rates of AEMG between muscles for first and last 1 min of W1.

subj	First 1 min						Last 1 min					
	ECRL	PT	BRR	BR	BBB	BBL	ECRL	PT	BRR	BR	BBB	BBL
A	23	39	46	85	100	82	21	30	36	68	100	69
B	10	21	24	27	45	100	53	27	43	33	37	100
C	19	23	64	100	34	24	20	28	65	100	57	33
D	33	20	100	60	16	95	48	24	77	53	26	100
E	11	34	64	41	93	100	17	28	60	41	87	100
F	14	14	76	100	21	43	18	19	89	100	46	70
mean	25	34	84	93	69	100	38	33	78	83	75	100

Table 2. Significances of correlation between AEMG and RPLF Whole work W2 - W5a

subj	Whole work						W2 - W5a					
	ECRL	PT	BRR	BR	BBB	BBL	ECRL	PT	BRR	BR	BBB	BBL
A	=	H	H	H	H	H	H	+	-	+	H	H
B	=	H	H	-	H	H	=	H	H	-	H	H
C	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
D	=	+	H	H	=	H	-	-	=	+	=	+
E	=	H	H	H	H	H	=	H	=	H	=	+
F	H	+	H	H	=	H	H	+	=	-	=	+

H ($p < 0.05$), + ($p > 0.05$); positive correlation
= ("), - ("); negative correlation

業における値を求めた。値が0.9以上になったか、各被験者の最高値となった条件で2例以上あったのは、前者ではPT-BRRが2例、BRR-BRが4例、後者ではPT-BRRが3例、BBB-BBLが2例であった。AEMGの変化は全体的に増加傾向にあったため、明確に負の相関を示す例はなかった。主観的疲労感において作業終了時はW1よりW2の方が楽であった例について、W1とW2の最後の1分間のAEMGを比較した。被験者Cにおいて全部の筋でW2よりもW1が小さい値だった。作業の繰り返しに伴う各筋の変化の違いを見るために、W1の平均値に対するW4-W5aの各平均値の比を求め、筋間で比較した(図)。BBBとBBLは他の筋よりも作業の繰り返しに伴う増加が大きかった。W1の最初と最後の各1/5の値の比も筋間で比較したが、有意な差はなかった。

RPLFは全体的な傾向としては作業中増加する例が多かった。AEMGと同様のw2-w5aの各作業の最初の1分間とその残りの部分のRPLFと時間の相関で、正で有意となったのは144条件中各々53例と61例であった。AEMGの増加に伴いRPLFが低下する例があったので、AEMGとRPLFの相関をW2-W5aと全作業のデータについて求めた(表2)。

【考察】 被験者CのW1とW2の終了付近での主観的疲労感とAEMGによる疲労の推定に食い違いが見られた。しかし被験者Cの場合、W2-W4は同

一時間長であり、作業を繰り返すことにより疲労感が増し、W4終了時ではW1終了時よりも疲労感が強いであろうと申告した。従ってW1の方がW2よりも作業終了時に生理的な疲労の程度が主観と同様に重いとは断定できない。筋によっては作業開始時のAEMGが前回の作業終了時の値よりも大きい例があったが、全部の筋がそうなる例はなかった。又、作業の繰り返しに伴い平均的なAEMGの増減が各筋で異なった。W1に対するW2-W5aの各作業の平均AEMGの増加率も筋間で異なった。これらのことから、作業の一時的な中断により各筋の負担配分が変化することが判る。

AEMGの増加にともないRPLFが減少する例が見られたが、この現象は筋の収縮強度の増加のための運動単位の動員や活動頻度の増加によるものであろう。このRPLFと筋収縮強度の関係は筋の収縮強度の弱い場合に明確であるとされ、全作業のデータにおけるAEMGとRPLFの相関が負で有意となった例でのAEMGは、W1開始時の各筋の比では小さかった。又、これらの筋は作業開始時の負担が軽かったため、作業に伴い他の筋の疲労による筋力低下を補償するために活動の増加が大きかったり、疲労の程度が軽かったとも考えられる。RPLFとAEMGの相関が負となった例はECRLが多かったが、疲労がかなり重い状態では無意識に手を握るため、それによるAEMGの増加の影響が強かったのだろう。筋の負担が軽くないと考えられる状態でもW2-W5aにおけるAEMGとRPLFの相関が負となる例があった(被験者DのBRR等)。これはW2-W5eのAEMGの変化には、筋疲労による自らの筋力低下の補償によるもの以外に、筋間での負担配分の変動によるものが多く含まれているためだろう。