症例報告

右胃大網動脈グラフトによる冠動脈バイパス術後の肝切除術の経験

浅野 史雄¹⁾ 野尻 和典¹⁾ 武田 和永¹⁾ 松山 隆生¹⁾
 谷口 浩一¹⁾ 熊本 宜文¹⁾ 秋山 浩利¹⁾ 田中 邦哉¹⁾
 益田 宗孝²⁾ 遠藤 格¹⁾

¹⁾横浜市立大学消化器・腫瘍外科学

²⁾横浜市立大学外科治療学

冠動脈バイパス術 (coronary artery bypass grafting ; 以下, CABG と略記) において, 右胃大網動脈 (right gastroepiploic artery ; 以下, RGEA と略記) はしばしばグラフトとして使用される. RGEA を使用した CABG 後の上腹部手術では, グラフト損傷を引き起こす可能性があり, 術前のグラフト走行の把握と慎重な手術手技が必要である. 我々は, RGEA グラフトによる CABG 後に肝細胞癌を発症した症例を経験した. 症例は 75 歳の女性で, 4 年前に心筋梗塞に対し RGEA を用いて CABG を施行され, 腹部超音波検査で肝外側区域に原発性肝癌を認めた. グラフトは腫瘍前面を走行しており, 損傷に注意しながら肝外側区域部分切除術を施行した. 周術期の合併症発生はなかった. 心機能やグラフトの術前評価に multidetector row CT と心筋シンチグラフィが有用であり報告する.

キーワード: 肝切除術, 冠動脈バイパス術, 右胃大網動脈

はじめに

冠動脈バイパス術 (coronary artery bypass grafting ; 以下, CABG と略記) において, 右胃大網動脈 (right gastroepiploic artery ; 以下, RGEA と略記) はしばしばグラフトとして使用される¹⁾. RGEA を使用した CABG 後の上腹部手術では, 術式によってはグラフト損傷を引き起こす可能性があり, 術前のグラフト走行の把握と術中の慎重な手術手技が必要である²⁾. 今回, 我々は RGEA グラフトによる CABG 後に発見された肝細胞癌に対し, 肝外側区域部分切除術を施行した症例を経験したので報告する.

症 例

患者: 75 歳, 女性

主訴: 特になし.

既往歴: 60 歳時から糖尿病, 高血圧症を治療中である. 14 歳時 虫垂切除術, 40 歳時 子宮筋腫で開腹手術歴あり. 71 歳時 心筋梗塞に対して CABG 3 枝 (左内胸動脈—左前下行枝, 大伏在静脈—鈍縁枝, RGEA—後下行枝) を施行した.

家族歴: 特記事項なし.

現病歴: 2010 年 9 月 腰痛に対して他院通院中, 腹部超音波検査で肝外側区域に径 3 cm の腫瘍を認め, 肝細胞癌と診断され, 当院へ紹介された.

Fig. 1 Abdominal CT with contrast enhancement shows a 3-cm tumor (arrowheads) at the surface of the left lateral division of liver, with early enhancement in artery phase (a), wash out in portal phase (b). Enhanced RGEA (arrow) is located in front of the tumor.

嗜好歴：喫煙・飲酒なし。

輸血歴：なし。

入院時現症：身長 148 cm，体重 58 kg。前胸部正中，下腹部に手術痕あり。

血液検査所見：Hb 9.9 g/dl，血小板 $5.7 \times 10^4/\mu\text{l}$ ，PT-INR 1.19，alb 3.0 g/dl，T-Bil 1.8 mg/dl，D-Bil 0.5 mg/dl，HbA1c 6.5%，ICGR₁₅=35.36%，liver damage B，Child-Pugh B（7 点），HBsAg（-），HBsAb（-），HBcAb（-），HBeAg（-），HBeAb（-），HCVAb（-）。

肝ダイナミック CT 所見：肝外側区域に，早期相で濃染され，遅延相で wash out される，径 3 cm の腫瘍を認め，肝細胞癌と診断した（Fig. 1）。

心筋シンチグラフィ所見：下壁～後壁，中隔前壁に梗塞の所見を認めたが，CABG 術後の所見と変わりなく，薬剤負荷でも新たな虚血の所見はなかった。

3DCT 所見：肝外側区域の表面を通り縦隔内へ走行する RGEA を認め，狭窄は認めなかった（Fig. 2）。

以上より，単発 3 cm の外側区域辺縁の肝細胞癌に対し，RGEA グラフトを温存した肝外側区域部分切除術を予定した。

心機能は超音波検査で左室駆出率 64%と良好であったが，RGEA 吻合先の後下行枝の中核側は完全に閉塞しており，グラフト損傷時には心筋梗塞や徐脈性ショックを来す可能性が高いと判断した。

手術所見：グラフト損傷による不整脈・急性心筋梗塞に備え，一時的ペースメーカーを挿入し，左大腿動脈からカニューレションし，大動脈内バルーンパンピング（intraaortic balloon pumping；以下，IABP と略記）の準備を行った。上腹部正中切開で開腹した。開腹創直下にグラフトが存在し，尾側から頭側に向かって，グラフトを直視下に確認しながら開腹を進めたところ，肝外側区域の表面を通り縦隔内へ走行する RGEA が確認された。グラフトは skeltonize 法で採取されており，周囲組織との癒着はなく，横隔膜が切開された状態で心臓下壁に到達していた（Fig. 3）。グラフトに極力触れないように，肝臓を授動・牽引する形で視野展開をしながら肝外側区域部分切除を施行した（Fig. 4）。周術期にはニコランジルを使用した。

切除標本所見：被膜を伴い灰白色の断面を有する，3×2.5 cm 大の充実性腫瘍を認めた。

病理組織学的検査所見：moderately differentiated hepatocellular carcinoma，26×25×32 mm，Eg，Fc（+），Fc-Inf（+），Sf（+），S0，Vp0，Vv0，Va0，B0，SM（-），LC，F4，pT2，N0，M0，pStage II であった。

経過：術中，術後合併症は認めず，経過良好で 10 日目に退院した。

Fig. 2 3D-CT angiography shows RGEA (arrows) running in front of the tumor (thick arrow) to the heart. RGEA is considered patent.

Fig. 3 Operative findings of the RGEA (arrow). Skeltonized RGEA graft is easily recognized on the left lobe of the liver. The dotted circle indicates the tumor location.

Fig. 4 Operative findings after tumor resection. The arrow indicates the RGEA, which was just left of the site of resection.

考 察

CABG において、RGEA は開存度が優れていることからグラフトとしてしばしば使用され¹⁾、須磨³⁾の報告では、吻合先は、右冠動脈が 70%、回旋枝が 18%、前下行枝 10%、対角枝が 1%であった。

RGEA グラフトを使用した CABG 後の上腹部手術について、1983 年から 2010 年に「冠動脈バイパス術」、「右胃大網動脈」をキーワードとして医学中央雑誌を検索したところ、会議録を除き 185 件の報告を認め、このうち上腹部手術症例は 53 例であった。原疾患は胃癌 43 例、食道癌 2 例、胆嚢結石・急性胆嚢炎 4 例、総胆管結石 2 例で、膵頭部癌、膵胆管合流異常症、転移性肝癌、横行結腸癌を 1 例ずつ認めた。術式は、幽門側胃切除術 33 例、胃全摘術 5 例、胆嚢摘出術 4 例、噴門側胃切除術 3 例、胃部分切除術 2 例、食道切除術 2 例、総胆管切石術 2 例、分流手術、横行結腸切除術、幽門輪温存膵頭十二指腸切除術、肝外側区域切除術が 1 例ずつであった。すなわち肝胆膵領域の手術症例は計 9 例認め^{4)~8)}、このうち肝切除症例は本

Table 1 Cases of abdominal surgery accompanied by cardiovascular complications

No.	Author	Year	Age	Sex	Reason for CABG	Diagnosis	Abdominal surgery	Signs of ischemia	Timing	Therapy
1	Tanaka ⁵⁾	1994	62	M	AP*	Acute cholecystitis	Cholecystectomy	ST depression	Intraoperative, PD3	Catecholamine and nitroglycerin after operation
2	Sato ⁸⁾	1998	63	M	AP	PBMJ***	Biliary diversion	chest discomfort, ST elevation in II IIIaVf, elevation of CKMB	8.5 hours after operation	—
3	Naruse ¹⁸⁾	2008	64	M	AP	Gastric cancer	Distal gastrectomy	bradycardia, block	After operation	Dobutamine
4	Naruse ¹⁸⁾	2008	76	M	AMI**	Gastric cancer	Distal gastrectomy	bradycardia	Induction of anesthesia, POD3	Transcutaneous pacing, nicorandil, IABP, DC, ICD
5	Ko ¹⁹⁾	2011	74	M	AI	Gastric cancer	Total gastrectomy	ST depression in II	Intraoperative	Nitroglycerin spray, isosorbide

AP*: angina pectoris, AMI**: acute myocardial infarction, PBMJ***: pancreaticobiliary maljunction

症例を含めて2例のみ⁴⁾であった。既報の肝切除の1例は、S状結腸癌の肝転移に対する外側区域切除であるが、RGEA グラフトの走行は切離ラインに一致し、肝表面に強固に癒着していたため慎重な剥離を要したが、合併症なく切除可能であったと報告されている。

術前の注意点として心機能・グラフト評価がある。その方法は、冠動脈造影（coronary arteriography；以下、CAGと略記）が一般的で、34例に施行されており、造影CTでの評価は2例のみであった。近年では多列検出器コンピュータ断層撮影（multidetector row CT；以下、MDCTと略記）の有用性が報告されており⁹⁾¹⁰⁾、CAGに取って代わる検査となりつつある。CAGの合併症を考慮すると、MDCTは患者への負担が少なく安全性の高い検査であり、64列MDCTを用いたグラフト狭窄の診断精度について、Ropersら¹¹⁾は、sensitivity 100%, specificity 94%, 陰性的中率 100%, 陽性的中率 92%と報告している。臼田ら¹²⁾は、胃癌術前にMDCTによりグラフトの開存・走行部位を確認しており、手術の安全性の面で有用であったと述べている。その一方で、MDCTのみでは、冠動脈やグラフトの内腔の状態はわかるが、心筋虚血の有無に関する情報は得られないため、心筋シンチグラフィも術前評価に重要な検査である¹³⁾。本症例では、血行再建の必要性はなかったため、心筋シンチグラフィとMDCTのみで評価しCAGは行わなかった。本症例のような上腹部手術において、グラフトに攣縮や損傷が生じた場合の心筋梗塞の発生リスクをMDCTで予知できるか否かに関する報告はない。本症例では、グラフト損傷による不整脈・急性心筋梗塞に備え、一時的ペースメーカーを挿入し、左大腿動脈からのカニューレションでIABPの準備を行った。心筋梗塞の発生リスクはRGEA吻合先の冠動脈やその他冠動脈の開存度、RGEAの灌流域などから個々の症例において推測せざるをえなく、循環器科と術前に十分に検討する必要があると思われる。

術中の注意点として、RGEAの施行方法により、さまざまなケースが考えられる。CABGの際のRGEA挙上方法は、肝前面あるいは背側を通す2方法がある¹⁴⁾。多くはCABG時のグラフト周囲からの出血同定の容易さなどから肝前面の挙上を選択している。RGEA処理の方法もskeltonize法、pedicle法の2方法ある。血管周囲に脂肪組織を伴ったpedicle法ではグラフトが術中同定できず、腸間膜血管の処理の際に損傷を来したとの報告がある¹⁴⁾。グラフトが腹壁や肝鎌状間膜、肝表面に強固に癒着している場合もあり、開腹時の損傷予防を目的として横切開で開腹した症例^{15)~17)}もある。そのうち1例は腹壁への癒着のために損傷を来しており¹⁵⁾、横切開でも開腹時の損傷を完全に回避できるわけではなかった。

上腹部手術53例中、循環器合併症を生じたものは5例（9%）で⁵⁾⁸⁾¹⁸⁾¹⁹⁾、術中発生が3例⁵⁾¹⁸⁾¹⁹⁾、術後発生が4例であった⁵⁾⁸⁾¹⁸⁾（Table 1）。心電図でのST変化が3例、徐脈が2例、心室頻拍が1例で、対処法は、ST低下では血管拡張薬投与、徐脈ではカテコラミン投与やペーシング、心室頻拍では除細動を行ったと報告されていた。合併症予防のために、ほとんどの症例でニコランジルやニトログリセリン投与、パパ

ペリン撒布が行われていた。動脈グラフトは機械的刺激や低温刺激により攣縮を生じやすく、術中に急性心筋梗塞や徐脈性不整脈を発症し、心源性ショックにいたる恐れがある。予防方法としては、血管拡張薬投与やペーシング挿入を行い、さらに循環器合併症のリスクが高い場合には、大腿動脈から perfusion catheter による冠動脈還流を準備することが、合併症発生時に迅速に対応するためにも適切である²⁰⁾。本症例も周術期にはニコランジルを併用し、さらに術中はなるべくグラフトに触れないよう、肝臓を十分に授動し牽引して肝切除を行った。

RGEA を使用した CABG 後の肝外側区域部分切除術において、RGEA の走行部位・開存度、心筋虚血の有無について MDCT および 3D 画像、心筋シンチグラフィで術前に評価し、安全に手術を施行できたため、報告した。

利益相反：なし

文献

- 1) Pym J, Brown P, Pearson M, Parker J. Right gastroepiploic-to-coronary artery bypass. The first decade of use. *Circulation*. 1995;92(9 suppl):45-9.
- 2) Perrault LP, Rheault MJ, Carrier M. Total gastrectomy in a patient with an in situ right gastroepiploic artery graft. *Ann Thorac Surg*. 1994;57(3):751-2.
- 3) 須磨 久善. 虚血性心疾患における治療の選択 多枝冠動脈バイパス手術の適応と成績—各種動脈グラフトの使用経験—. *日本外科学会雑誌*. 1996;97(3):220-6.
- 4) 青葉 太郎, 長谷川 洋, 坂本 英至, 小松 俊一郎, 久留宮 康浩, 法水 信治. 右胃大網動脈を使用した冠動脈バイパス術後に肝外側区域切除術を施行した S 状結腸癌肝転移の 1 例. *日本臨床外科学会雑誌*. 2008;69(1):140-4.
- 5) 田中 真人, 寺田 康, 坂本 昌義, 久保 琢自, 丸山 雄二, 須磨 久善, ほか. 右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後に発症した急性胆嚢炎手術の問題点. *外科*. 1994;56(3):302-4.
- 6) 梶 理史, 原田 信比古, 小池 伸定, 鈴木 修司, 鈴木 衛, 羽生 富士夫. 右胃大網動脈グラフトによる冠動脈バイパス術後の幽門輪温存膵頭十二指腸切除術の経験. *日本消化器外科学会雑誌*. 2010;43(8):822-7.
- 7) 新原 亮, 山根 修治, 松本 富夫, 福馬 寿幸, 真田 修. 右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後に対する胃切除の 2 例. *手術*. 2000;54(7):993-8.
- 8) 佐藤 公淑, 久場 良也. 右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後の上腹部開腹術 2 例の麻酔経験. *臨床麻酔*. 1998;22(2):177-80.
- 9) 山本 真人, 木村 文子, 田中 功, 上原 恵子, 竹内 靖夫. CABG 術前術後の MDCT の有用性 心臓血管外科医の立場から. *臨床放射線*. 2006;51(1):45-54.
- 10) 添田 雅生, 畑 博明, 飯田 充, 木村 玄, 翠川 隆, 川野 太郎, ほか. 冠動脈バイパス術後グラフト評価における 64 列 MDCT の有用性と問題点. *日大医学雑誌*. 2009;68(3):187-91.
- 11) Ropers D, Pohle FK, Kuettner A, Pflederer T, Anders K, Daniel WG, et al. Diagnostic accuracy of noninvasive coronary angiography in patients after bypass surgery using 64-slice spiral computed tomography with 330-ms gantry rotation. *Circulation*. 2006;114(22):2334-41.
- 12) 白田 敦子, 勝部 隆男, 久原 浩太郎, 村山 実, 今野 宗一, 小川 健治. 右胃大網動脈による冠動脈バイパス術後 CT angiography が有用であった胃癌の 1 例. *日本臨床外科学会雑誌*. 2006;67(12):2838-41.
- 13) 松尾 信郎, 中嶋 憲一, 絹谷 清剛. 冠動脈バイパス術後および虚血性心疾患疑い患者に対する心筋血流 SPECT と CT 冠動脈造影の融合画像診断の有用性. *臨床放射線*. 2011;56(1):77-85.
- 14) 湖東 慶樹, 深原 一見, 上山 克史, 三崎 拓郎. 冠動脈バイパス術後遠隔期の上腹部開腹手術を考慮した右胃大網動脈の採取方法 胃大網動脈 skeletonize 法の有用性. *胸部外科*. 2003;56(7):545-7.
- 15) 片岡 浩海, 梶木 等, 内藤 光三, 柚木 純二, 上野 陽介. 右胃大網動脈を使用した冠動脈バイパス術後に胃切除術を施行した 1 例. *日本心臓外科学会雑誌*. 2006;35(2):106-8.
- 16) Shimizu J, Hirano Y, Kinoshita S, Tatsuzawa Y, Kawaura Y, Takahashi S. Gastric cancer occurred after coronary artery bypass grafting using the right gastroepiploic artery. *Ann Thorac Cardiovasc Surg*. 2004 Aug;10(4):255-8.
- 17) 鈴木 和志, 小林 陽一郎, 宮田 完志, 米山 文彦. 右胃大網動脈を使用した冠動脈バイパス術後の進行胃癌の 1 例. *日本臨床外科学会雑誌*. 2004;65(7):1832-5.
- 18) 成瀬 智, 足立 裕史, 高田 浩太郎, 佐野 秀樹, 鈴木 かつみ, 小幡 由佳子, ほか. 右胃大網動脈冠動脈バイパス術後の胃切除に際し術後に重篤な不整脈を生じた 2 症例. *麻酔*. 2008;57(9):1147-9.
- 19) 高 賢樹, 内藤 敬嗣, 山田 成寿, 三毛 牧夫, 草薙 洋, 加納 宣康. 胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後に胃全摘を施行した 1 例. *手術*. 2011;65(4):513-6.
- 20) 高橋 知秀, 近藤 俊彦, 重松 千普, 須田 久雄. 右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後の進行胃癌に対し血行再建を伴った幽門側胃切除, D2 郭清を行った 1 手術例. *日本消化器外科学会雑誌*. 2006;39(5):550-5.

CASE REPORT

Partial Lateral Segmentectomy of the Hepatocellular Carcinoma Preserving the Right Gastroepiploic Artery Graft for Coronary Bypass

Fumio Asano¹⁾, Kazunori Nojiri¹⁾, Kazuhisa Takeda¹⁾, Ryusei Matsuyama¹⁾,
Koichi Taniguchi¹⁾, Takafumi Kumamoto¹⁾, Hirotoshi Akiyama¹⁾, Kuniya Tanaka¹⁾,
Munetaka Masuda²⁾ and Itaru Endo¹⁾

¹⁾Department of Gastroenterological Surgery, Yokohama City University Hospital

²⁾Department of Surgery, Yokohama City University Hospital

Ischemic heart disease is often treated by coronary artery bypass grafting (CABG) using the right gastroepiploic artery (RGEA), but careful epigastric manipulation is required to avoid RGEA injury. We report a case of a 75-year-old woman with a history of CABG using RGEA, 4 years before hepatectomy. She was given a diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC) in the lateral segment by screening abdominal ultrasonography. During hepatectomy, RGEA was running in front of the tumor in the lateral segment of the liver to the mediastinum. Partial resection of the lateral segment was performed while preserving the RGEA graft. Intraoperative and postoperative complications did not occur. Multidetector row CT and scintigraphy were very helpful for the preoperative evaluation and careful intraoperative management.

Key Words: hepatic resection, coronary artery bypass grafting, right gastroepiploic artery

[Jpn J Gastroenterol Surg. 2013;46(3):183-188]

Reprint requests: Fumio Asano Department of Surgery, Yokosuka City Hospital
1-3-2, Nagasaka, Yokosuka, 240-0195 JAPAN

Accepted: October 31, 2012