膵癌に対する拡大手術の評価

東京女子医科大学消化器外科

中迫 利明 羽生富士夫 今泉 俊秀 鈴木 衛
原田信比古 羽鳥 隆 新井 俊男 広瀬 哲也
福田 晃 宗像 茂

通常型膵癌切除例284例を対象に、拡大群、対照群の2群にわけ拡大手術の評価を行った。

拡大手術後の合併症、手術死亡はおのおの膵頭部癌で19%、4%、膵体尾部癌で29%、0%と拡大手術は安全に行われていた。拡大手術の治癒切除率は膵頭部癌で49%、膵体尾部癌で71%と向上がみられ、膵頭部癌では拡大手術で9例の5年生存が、膵体尾部癌では拡大手術で50%生存期間の延長がえられており拡大手術の意義が認められた。組織学的進行度は拡大群、対照群間で差はなく、stage III+IVは膵頭部癌で85%、膵体尾部癌で95%以上と大多数が進行癌であり、膵前方浸潤、膵後方浸潤、リンパ節転移も高率に認め、ほとんどすべてに拡大手術を適応すべきと考えられた。しかしながら、臨床病期IV期では拡大手術後の治癒切除は0%、1生率は8%、2生率は0%と拡大手術の適応外と考えられた。また、拡大手術によっても高率に認める後腹膜再発、肝転移に対しては集学的治療法を確立することが急務と考えられた。

Key words: pancreatic cancer, extended radical operation, recurrence

はじめに

膵癌に対する外科治療については、1935年 Whipple による膵頭十二指腸切除の成功例に始まり、1940年 Priestley の膵全摘から Fortner の regional pancreatectomy に代表される拡大手術へと多くの努力がなされてきた^{1)~3)}。しかしながら、米国では拡大手術はむしろ延命効果がないことや quality of life の点からほとんどの施設で行われなくなっているのが現状である⁴⁾⁵⁾。

そこで今回われわれは、膵癌に対する拡大手術の評価に関する検討を行い、拡大手術の意義を認めることができたので、文献的考察を加え報告する。

対象と方法

今回われわれは拡大手術の意義を明らかにする目的で、1991年12月までに教室で切除された通常型の膵頭部癌240例、膵体尾部癌44例、計284例を対象に、1. 手

術成績、2. 組織学的進展様式、3. 再発様式の3点から検討を行った。

今回の検討では、拡大手術を門脈系主要血管の合併切除、神経叢の徹底郭清、R₂以上のリンパ節郭清を行ったもの、さらに膵体尾部癌では胃全摘、大小網、左半結腸切除、(左腎)を含めた左上腹部内臓全摘を行ったものと規定し、それ以外を対照手術とし2群にわけた。拡大群、対照群、おのおのの内訳は、膵頭部癌で179例、61例、膵体尾部癌で7例、37例であった。組織学的記載は膵癌取り扱い規約⁶⁾に従い、組織学的進行度は肉眼的進行度に準じた。手術成績の検討では computed tomography と selective angiography で術前進展度診断を行い、Rp 因子、PV 因子、A 因子の3因子から規定される臨床病期 (clinical stage) I 期からIV期を独自に設定し⁷⁾、組織学的治癒切除率との関連、累積生存率との関連を検討した (Table 1)。組織学的進展様式の検討では、膵外進展を膵前方被膜浸潤、膵後方組織浸潤、リンパ節転移のいずれか1つ以上を認めるものと規定した。また、再発様式の検討では、剖検、画像診断で再発が確認された104例で検討した。また、頻度、平均値の統計学的検定は、おのおの、 χ^2 検定、student-t 検定で、累積生存率曲線は Kaplan-

* 第40回日消外会総会シンポ1・再発形式からみた肝・胆・膵癌に対する拡大・縮小手術の評価：長期生存の条件

<1992年12月9日受理>別刷請求先：中迫 利明
〒162 新宿区河田町8-1 東京女子医科大学消化器外科

Table 1 Clinical stage (CS) of the pancreatic cancer

Clinical stage	Retroperitoneal invasion	Portal invasion	Invasion to the main artery *
CS I	Rp0	PV0	A(-)
CS II	Rp1	PV1	A(-)
CS III	Rp2	PV2	A(-)
CS IV	Rp3	PV3	A(+)

*celiac artery or superior mesenteric artery

Meier 法で求め、統計学的検定は一般化 Wilcoxon 検定で行い、危険率 5% 未満で有意差ありとした。

成績

1. 手術成績

膵頭部癌における術後合併症、手術死亡は、おのおの、拡大群で 19%, 4%, 対照群で 10%, 11% と差はなく、拡大手術は安全に行われていた。また、治癒切除率は拡大群 49%, 対照群 26% と拡大群で有意の向上が認められた ($p < 0.05$)。一方、膵体尾部癌における術後合併症、手術死亡は、おのおの、拡大群で 29%, 0%, 対照群で 27%, 3% と、膵頭部癌同様、拡大手術は安全に行われていた。また、治癒切除率は拡大群で 71%, 対照群で 22% と拡大手術により飛躍的に向上していた ($p < 0.05$) (Fig. 1)。

膵頭部癌における 50% 生存期間は、拡大群で 11 か月、対照群で 10 か月であり、(1, 3, 5 生率) は、拡大群で (49%, 11%, 11%), 対照群で (36%, 8%, 0%) と、有意差はないものの、5 生以上の長期生存は拡大群の中から 9 例得られていた (Fig. 2)。一方、膵体尾部癌における 50% 生存期間は拡大群で 11 か月、対照群で 6 か月と、有意差はないものの、拡大群で 50% 生存期間の延長が認められた。また、(1, 3 生率) は拡大群で (17, 0%), 対照群で (11, 0%) と、拡大群、対照群いずれにおいても 3 年以上の生存例は得られていなかった (Fig. 3)。

また、臨床病期 (clinical stage, 以下 CS) と組織学的治癒切除率との関連をみると、CS I 期症例では治癒切除率 100%, CS II 期症例では 86%, CS III 期症例では 55%, CS IV 期症例では 0% であり、CS I, II 期症例の大多数は拡大手術により治癒切除となっていたが、CS III 期症例では半数近くが、CS IV 期症例では全例で非治癒切除となっていた (Table 2)。また、累積生存率を (1, 3, 5 生率) でみると、CS I 期症例で (100%, 59%, 59%), CS II 期症例で (69%, 23%, 23%), CS III 期症例で (41%, 0%, 0%), CS IV 期症例で (8%, 0%, 0%) と、CS IV 期症例の成

Fig. 1 Morbidity, mortality and curability of the pancreatic cancer **Fig. 2** Survival curve of the carcinoma of the head of the pancreas—Extended radical operation and control—

1968, 1 ~ 1991, 12 (Kaplan-Meier)

Fig. 3 Survival curve of the carcinoma of the body of the pancreas—Extended radical operation and control—

1968, 1 ~ 1991, 12 (Kaplan-Meier)

績は惨憺たるものであった (Fig. 4)。

2. 組織学的進展様式

膵頭部癌では、stage III+IV は拡大群 85%, 対照群 85%, 膵前方被膜浸潤は拡大群 42%, 対照群 57%, 膵

Table 2 Clinical stage and curability of the carcinoma of the head of the pancreas following extended radical operation (<n=64>

Clinical stage(CS)	Curability
CS I n= 6	100%
CS II n=14	86%
CS III n=31	55%
CS IV n=13	0%

Fig. 4 Survival curves of the carcinoma of the head of the pancreas following extended radical operations—Clinical stage (CS)—

1968, 1 ~ 1991, 12 (Kaplan-Meier)

後方組織浸潤は拡大群76%, 対照群72%, リンパ節転移は拡大群83%, 対照群77%, 膵外神経叢浸潤は拡大群57%, 対照群56%, 門脈浸潤は拡大群で43%であり, 膵外進展は拡大群93%, 対照群92%と, 拡大群, 対照群いずれの群でも, 大多数が膵前方あるいは膵後方への直接浸潤, リンパ節転移を高率に認める進行癌であった。また, 膵体尾部癌でも, stage III+IV は拡大群100%, 対照群95%, 膵前方被膜浸潤は拡大群57%, 対照群63%, 膵後方組織浸潤は拡大群100%, 対照群95%, リンパ節転移は拡大群で57%, 67%, 膵外神経叢浸潤は拡大群57%, 対照群58%, 門脈浸潤は拡大群で86%, 対照群で69%, 膵外進展は拡大群100%, 対照群100%と, 膵頭部癌同様, 拡大群, 対照群いずれの群でも, 大多数が膵前方あるいは膵後方への直接浸潤, リンパ節転移を高率に認める進行癌であった (Fig. 5)。

3. 再発様式

膵頭部癌において剖検および画像診断で確認された後腹膜再発, 肝転移再発は, おおの, 拡大群で63%, 46%, 対照群で47%, 40%と, 拡大群と対照群で差はなく, 拡大手術でさえも後腹膜再発, 肝転移を高率に認めた。また, 膵体尾部癌の後腹膜再発および肝転移

Fig. 5 Histological findings of the pancreatic cancer

Fig. 6 Region of recurrence (<n=104>

は, 拡大群で 0%, 100%, 対照群で17%, 33%と, 有意差はないものの, 現在まで拡大群での後腹膜再発は認めていない (Fig. 6)。

考 察

外科治療の対象となる膵癌の大多数は stage III, IV の進行癌であり, 遠隔成績向上のため, 本邦では1970年代後半より拡大手術が積極的に行われ, 切除率, 治癒切除率の向上が得られてきた^{8)~12)}。今回の検討でも, 膵頭部癌の治癒切除率は拡大群49%, 対照群26%, 膵体尾部癌では拡大群71%, 対照群22%であり, 拡大群で向上が認められており, 治癒切除率の向上という点では拡大手術の意義が認められた。

しかしながら, 膵癌切除例の遠隔成績を5生率でみると, 全国集計で16.6%¹³⁾, 多数例を有する施設でも7.5%から17%と^{7)14)~16)}, 実りが少ないのが現状である。今回の検討でも, 膵頭部癌の5生率は, 拡大群で13%, 対照群で0%と, 5年以上の長期生存は拡大手術を施行した症例の中から9例えられているものの, 遠隔成績は不良といわざるをえない。さらに, 教室で独自に設定している術前進展度診断に基づいて決定される臨床病期 (clinical stage, 以下 CS)⁷⁾と治癒切除

率、累積生存率との関連をみると、CS I 期症例では治癒切除率100%、5生率は59%、CS II 期症例でも治癒切除率86%、5生率23%であり、早期に診断された症例の遠隔成績は比較的良好であり、CS I 期、II 期症例に対しては米国のように悲観的な結論を下すことには慎重にならざるをえない。また、CS III 期症例では治癒切除率は55%で、1生率41%、2生率10%、3生率0%と3年以上の長期生存はえられていないものの、遠隔成績は全国集計の非切除例¹³⁾より良好であることより、CS III 期症例に対しては拡大手術の意義をさらに追及する価値があると考えられた。一方、CS IV 期症例では治癒切除率0%、1生率8%、2生率0%と、この時期の症例では、もはや拡大手術を行っても治癒切除を得ることはできず、遠隔成績も全国集計の非切除例¹³⁾と同程度の成績しか得られていないことより、CS IV 期症例は拡大手術の適応外と考えられた。したがって、現在、CS III 期以下の臨床病期の膵癌にこそ拡大手術を適応すべきであるとの考えに至っている。

また、膵体尾部癌の今回の検討では、50%生存期間は拡大群11か月、対照群6か月と、拡大群で50%生存期間の延長が認められるものの、いずれにおいても3年生存はえられていないが、教室では左上腹部内臓全摘を膵体尾部癌に対する極限的な拡大手術と考え、現在、症例を重ねている段階である。

一方、今回の検討では、拡大手術後の術後合併症発生率は、膵頭部癌で19%、膵体尾部癌で29%と、対照群と差はなく、手術死亡も、おのおの、4%、0%と拡大手術は安全に行われていた。川原田ら¹⁷⁾も拡大手術導入後の術後合併症は11%、手術死亡は4%と標準手術よりもかえって減少していると報告しており、また、尾形ら¹⁸⁾は血管合併切除をとる拡大手術を85例に施行し、術後合併症は19%、手術死亡は5%と報告しており、標準手術との比較で拡大手術のriskが問題とされることはきわめて少なくなっているものと考えられる。

また、膵癌の外科治療成績が不良である原因は、大半の症例の組織学的進展が進行し、膵の解剖学的特徴により隣接臓器に高率に浸潤するためである^{10)~12)14)~19)}。今回の検討でも、拡大群、対照群のいずれにおいても膵頭部癌、膵体尾部癌の大多数が、膵前方あるいは膵後方組織への直接浸潤、リンパ節転移を高率に認める進行癌であった。これらの結果と、前述したごとく治癒切除率が膵頭部癌、膵体尾部癌いずれにおいても拡大群で有意に高いこと、また、臨床病期

IV期の手術成績が不良であることを考えあわせると、臨床病期III以下のすべてに拡大手術を選択すべきであると考えられた。

しかしながら、拡大手術を行ったにもかかわらず、高率に認める後腹膜再発、肝転移再発は膵癌外科治療上の大きな問題点である²⁰⁾²¹⁾。今回の検討でも、膵頭部癌では拡大手術を行っても後腹膜再発は63%、肝転移は46%と高率に認められた。一方、膵体尾部癌に対して教室で行っている極限的な拡大手術である左上腹部内臓全摘は、少ない症例の中での検討であるが、現在まで後腹膜再発は経験しておらず、局所制御という点では成果を認めているものの、肝転移は100%と高率であった。したがって、膵癌の外科治療は拡大手術を軸に、高率に認める後腹膜再発、肝転移に対しては放射線療法、化学療法、免疫療法などを組み合わせた集学的治療法を確立することが急務であると考えられた^{22)~24)}。

文 献

- 1) Whipple AO, Parson WB, Mullius CR: Treatment of carcinoma of ampulla of Vater. Ann Surg 102: 763-779, 1935
- 2) Priestley JT, Comfort MW, Radlitz J Jr: Total pancreatectomy for hyperinsulinism due to an islet-cell adenoma: Survival and cure at sixteen months after operation: Presentation of metabolic studies. Ann Surg 119: 211-221, 1944
- 3) Fortner JG: Regional resection of cancer of the pancreas: A new surgical approach. Surgery 73: 307-320, 1973
- 4) Fortner JG: The rationale technique and results of treating pancreatic and peripancreatic cancer by regional pancreatectomy. Acta Gastroenterol Belg 40: 121-127, 1987
- 5) Gudjonsson B: Cancer of the pancreas 50 years of surgery. Cancer 60: 2284-2303, 1987
- 6) 日本膵臓学会編: 膵癌取り扱い規約. 第3版. 金原出版, 東京, 1986
- 7) 羽生富士夫, 中迫利明, 今泉俊秀ほか: 膵癌. 臨消内科 7: 967-975, 1992
- 8) 羽生富士夫, 中村光司, 高田忠敬ほか: 膵頭部領域癌の外科的治療. 日外会誌 80: 978-982, 1979
- 9) 今泉俊秀, 羽生富士夫, 中村光司: 膵頭部癌拡大手術の検討—とくに門脈系血管合併切除に関して—. 日消外会誌 17: 615-623, 1984
- 10) 宮崎逸夫, 三輪晃一, 米村 豊: 膵癌の根治手術. 消外 2: 187-193, 1979
- 11) 尾形佳郎, 大山康平, 雨宮 哲ほか: 膵全摘術の間

- 題点—理論的根拠, 適応の面から—, 胆と膵 2: 335—341, 1981
- 12) 二村雄次, 鈴木雄彦, 早川直和ほか: 膵頭部癌に対する外科治療上の問題点—主に膵癌の神経叢浸潤と膵全摘術の意義について—, 日外会誌 83: 1055—1058, 1982
 - 13) 斉藤洋一: 全国膵癌登録調査報告; 1990年度症例および10年度分総集計, 日本膵臓学会膵癌登録委員会, 神戸, 1991
 - 14) 神谷順一, 二村雄次, 早川直和ほか: 膵頭部癌3年生存例の検討, 胆と膵 8: 1657—1659, 1987
 - 15) 小倉嘉文, 伊佐地秀司, 谷川寛自ほか: 膵癌の進展様式と外科的治療法の選択—とくに膵頭部癌について—, 臨消内科 6: 825—835, 1991
 - 16) 高橋 伸, 尾形佳郎, 森 光生ほか: 遠隔成績からみた膵癌治療の問題点と対策, 日消外会誌 21: 1183—1186, 1988
 - 17) 川原田嘉文, 喜多豊志: 拡大手術の問題点, 胆と膵 9: 651—657, 1988
 - 18) 尾形佳郎, 高橋 伸, 相原浩一ほか: 膵癌に対する血管合併切除術の評価, 外科 53: 1409—1418, 1991
 - 19) 今泉俊秀, 羽生富士夫, 鈴木 衛ほか: 膵頭部癌に対する拡大手術の意義, 日外会誌 91: 1249—1251, 1990
 - 20) 土屋涼一, 原田 昇, 山口 孝ほか: 膵癌切除例の再発様式に関する検討, 土屋涼一, 原田 昇編, 膵癌の診断と治療の進歩, 医学図書出版, 東京, 1989, p100—102
 - 21) 水本龍二, 喜多豊志: 膵頭部癌治療切除後再発例の検討, 土屋涼一, 原田 昇編, 膵癌の診断と治療の進歩, 医学図書出版, 東京, 1989, p108—112
 - 22) 羽生富士夫, 中村光司, 今泉俊秀: 膵癌の外科治療および集学的治療に関する研究, 井口 潔, 長与健夫編, がん治療のあゆみ, 癌と化学療法社, 東京, 1988, p135—144
 - 23) 平岡武久, 木下 平, 小菅智夫ほか: 膵臓癌, 根治術における補助療法, 臨科学 25: 577—584, 1989
 - 24) 中迫利明, 羽生富士夫, 今泉俊秀ほか: 膵頭部癌切除例に対する術中照射の検討, 日臨外医会誌 53: 549—556, 1992

Evaluation of the Extended Radical Operation for Pancreatic Cancer

Toshiaki Nakasako, Fujio Hanyu, Toshihide Imaizumi, Mamoru Suzuki, Nobuhiko Harada,
Takashi Hatori, Toshio Arai, Tetsuya Hirose, Akira Fukuda and Shigeru Munakata
Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical College

Two hundred eighty-four patients who had extended radical operation for ductal adenocarcinoma of the pancreas were studied to evaluate the effectiveness of the extended radical operation. They were divided into two groups, with or without an extended radical operation. Morbidity after the extended radical operation in the patients with carcinoma of the head and the body of the pancreas were 19% and 29%, respectively. Mortality after extended radical operations was 4% and 0%, respectively. Thus the extended radical operation was performed safely. Curability in the patients with carcinoma of the head and the body of the pancreas was 49% and 71%, respectively. Nine patients who had the extended radical operation for the carcinoma of the head of the pancreas survived longer than 5 years postoperatively. The mean survival time was prolonged in the patients who had the extended radical operation for carcinoma of the body of the pancreas. No histological difference was noted between the two groups. Stage III or IV tumors in the patients who had the extended radical operation for carcinoma of the head and the body of the pancreas were found in 85% and 95% or more, respectively. As the majority of the patients with pancreatic carcinoma showed serious invasion, retroperitoneal invasion and lymphnode involvement, the extended radical operation is indicated. And however, as curability was 0% and the survival rate was 8% at 1 year and 0% at 2 years in the patients who had clinical stage IV tumors, in those patients an extended radical operation is not be indicated. Retroperitoneal recurrence and liver metastasis occurred at a high incidence even after extended radical operations. Multidisciplinary therapy is indicated for those patients.

Reprint requests: Toshiaki Nakasako Department of Surgery, Institute of Gastroenterology, Tokyo Women's Medical College
8-1 Kawada-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162 JAPAN