混合型肝癌の2切除例

大阪市立大学第1外科

竹内 一浩	西野 裕二	大平 雅一	池原 照幸
山本 嘉治	池田 光慶	有本 裕一	新田 敦範
山田 靖哉	繁澤 晃	西村 重彦	柳川 憲一
澤田 隆吾	曾和 融生		

混合型肝癌は肝細胞癌と胆管細胞癌の両者の性格を有するため悪性度が高い。そのため発見時には高度進行例が多く、切除例が少ない。今回比較的良好な混合型肝癌の2切除例を経験したので報告する。症例1は41歳の男性で、肝右葉前下区域に5cm大の腫瘤を認め、右三区域切除を施行した。症例2は56歳の男性で、肝右葉後下区域に3cm大の腫瘤を認め、部分切除を施行した。病理組織検査の結果、いずれも規約上はmixed typeの混合型肝癌と診断されたが症例1では肝細胞癌と胆管細胞癌が密に混在しており、症例2では両腫瘍成分の境界が明瞭であることから両者の発生様式に違いがあると思われた。自験例では肝切除に加え、肝門部リンパ節郭清を施行し、それぞれ42か月、16か月の無再発生存を得ており、術前診断あるいは術中病理診断にて混合型肝癌が疑われた場合はリンパ節郭清を付加することが賢明であると思われた。

Key words: mixed hepatocellular and cholangiocellular carcinoma, hepatectomy

緒言

原発性肝癌のうち混合型肝癌は比較的良好で、全国原発性肝癌追跡調査報告¹⁾によると、全体の約0.7%と報告されている。今回我々は混合型肝癌の2切除例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。

症例

患者1: 41歳, 男性

主訴: 全身倦怠感

家族歴: 特記事項なし。

既往歴: 30歳時より強直性脊椎炎にて治療中。輸血歴なし。

現病歴: 全身倦怠感にて近医受診した際、腹部超音波検査にて肝臓にSOLを指摘され、精査加療目的にて1991年2月14日当科入院となった。飲酒歴、日本酒3合/日、20年以上。

入院時現症: 体格、栄養良好。貧血、黄疸なく、表在リンパ節は触知しなかった。腹部は平坦で軟、心窩部で肝臓を2横指触知した。

入院時検査成績: 一般検血、肝機能に異常は認めず、腫瘍マーカーの上昇もなかった。HBV、HCVは共に

陰性であった。

画像診断所見: 腹部超音波ではS4を中心に約5cmのSOLを認め、内部はモザイク状でやや高エコーを呈し、haloは伴わなかった。CTではS4, 5にかけて不整形でlow densityの腫瘍を認めた。血管造影ではA4, 5を栄養血管とする不整形の腫瘍濃染を認めた(Fig. 1)。

以上より肝細胞癌の診断にて1991年3月12日肝右三区域切除を施行した。術中胆管細胞癌も疑われ、肝門部リンパ節郭清を追加した。

切除標本所見: 腫瘍径は6.5×5.5×3.0cm、被膜を有さず、不整形で黄白色、弾性軟の充実性腫瘍で(Fig. 2)、肝内転移も認めた。TMN分類ではT₄M₀N₀でStage IVAであった。

病理組織学的所見: 腫瘍の大部分は繊維化しており、癌巣部分では索状を示す中分化肝細胞癌と管状構造を示す中分化胆管細胞癌が密接に混在していた(Fig. 3)。胆管細胞癌ではPASおよびムチカルミン陽性であった。肝内転移巣は肝細胞癌であった。腫瘍細胞の分布はFig. 2のごとくmixed typeの混合型肝癌と診断された。

患者2: 56歳, 男性

主訴: 肝腫瘍精査加療目的

<1995年4月5日受理>別刷請求先: 竹内 一浩

〒545 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 大阪市立大学医学部第1外科

Fig. 1 Computed tomography (Upper) : Plain CT showed an irregular low density mass in S4-S5 of the liver. Angiography (Lower) : An irregular tumor stain feedered from A4, A5 was recognized from the early arterial phase.

Fig. 2 Resected specimen (upper), Intrahepatic distribution of carcinoma cells (lower)

Fig. 3 Histological findings : A part of hepatocellular carcinoma and a part of cholangiocellular carcinoma were closely mixed.

家族歴：特記事項なし。

既往歴：50歳よりアルコール性肝炎，54歳より糖尿病を指摘されている。輸血歴なし。

現病歴：慢性肝炎，糖尿病にて近医通院中に超音波検査で肝臓に SOL を指摘された。肝生検の結果，胆管癌あるいは混合型肝癌と診断され，精査目的にて1993年5月17日当科入院となった。飲酒歴，ビール3本/30年以上。

入院時現症：体格，栄養中等度。貧血，黄疸なく，表在リンパ節は触知しなかった。腹部は平坦で軟，右季肋部で肝2横指触知した。

入院時検査成績：止血凝固系では血小板およびヘパラスチンテストの低下を認め，肝機能ではAST，ALT およびLAP， γ -GTPの軽度上昇を認めた。腫瘍マーカーではCEAのみ20.7ng/mlと高値を示した。HBV，HCVは共に陰性であった。

画像診断所見：腹部超音波検査ではS6を約2.5cmのSOLを認め，内部エコーは不均一で低エコーを呈し，辺縁不明瞭，きわめて不整形の腫瘍であった。血管造影では濃染部と淡染部が混在する不整形のtumor stainとして描出された(Fig. 4)。MRIでは腫瘍はT1強調画像でlow intensity，T2強調画像でhigh intensityに描出された(Fig. 5)。

以上より胆管癌あるいは混合型肝癌の診断にて1993年6月29日肝S6部分切除を施行した。

切除標本所見：腫瘍の大きさは2.4×2.3×1.2cm，被膜を有さず，黄白色，弾性軟の充実性腫瘍であった(Fig. 6)。

病理組織学的所見：腫瘍の多くは管状構造を示す高

Fig. 4 Ultrasonography (Upper): US showed a hypoechoic mass with irregular inner pattern about 2.5cm in S6 of the liver, and its border was unclear. Angiography (Lower): AAG showed an irregular tumor stain mixed hyper and normovascular area.

Fig. 5 Magnetic resonance imaging: The tumor has low signal intensity on T1 weighted imaging and high signal intensity on T2 weighted imaging.

Fig. 6 Resected specimen (upper), Intrahepatic distribution of carcinoma cells (lower)

分化から中分化の胆管細胞癌成分で、その中に索状構造を示す中分化の肝細胞癌成分が島状に混在していた。肝細胞癌と胆管細胞癌の境界は明瞭であった(Fig. 7)。また胆管細胞癌の一部はケラチン染色にて陽性を示した。腫瘍の分布は Fig. 6 のごとくで mixed type の混合型肝癌と診断された。TMN 分類では T₂M₀N₀ で Stage II であった。

考 察

混合型肝癌は Wells²⁾の報告以来、Mixed tumor³⁾, duplex type⁴⁾, intermediate type⁵⁾などの名称で報告されている。その頻度は原発性肝癌のうち Allen⁶⁾ 14.2%, Goodman⁷⁾ 2.4%, 中原⁸⁾ 2.5% また全国原発性肝癌追跡調査報告¹⁾では 0.7% と報告され、比較的多く切除例の本邦報告は 8 例を数えるのみである。

Fig. 7 Histological findings: A border of both components were relatively clear.

また年齢、性別をみると年齢は比較的広く分布するが、ピークは50～60歳で男女比は4:1と男性に多い。

原発性肝癌取扱い規約⁹⁾では混合型肝癌はAllenの分類に準じ、3型に分けられる。

1) 肝細胞癌と胆管細胞癌が同一肝臓において異なる部位から別々に発生し、それぞれは単一の細胞型からなるもの (double cancer)

2) 肝細胞癌と胆管細胞癌が隣接し、それぞれは別個の細胞型からなるが発育するにつれて両者が混じりあったもの (combined type)

3) 単一腫瘍で組織学的に肝細胞と胆管細胞癌の両者が密接に組み合わせたり、それぞれが同一部位から発生したもの (mixed type)

この分類によれば、本症例は2例ともmixed typeに属すると考えられるが、症例1では肝細胞癌と胆管細胞癌が密に混在し、両腫瘍成分の境界は不明瞭であるのに対し、症例2では両腫瘍成分の境界が明瞭であることから両者の発生様式の違いが考えられる。植草ら¹⁰⁾はケラチン染色を用いた混合型肝癌の組織化学的検索において、mixed typeは、1) 肝細胞癌と胆管細胞癌が別々に発生する場合、2) 肝細胞癌から胆管細胞癌へと変化する場合、3) 多分化能を有する細胞が肝細胞癌と胆管細胞癌へと分化し混在する場合の3種類の発生様式が考えられると述べており、これから考えると症例1は3)の発生様式、症例2は1)の発生様式によるものと思われた。

混合型肝癌の術前確定診断は容易ではなく、過去の報告においても術前に確定診断された症例はほとんどない。腫瘍マーカーではAFPは肝細胞癌に類似し陽性を示す割合が多く、CEAの陽性率は諸家の報告によ

ると88%⁸⁾、66.7%¹¹⁾と高率に陽性を示し、胆管細胞癌に近いとされている。またCA19-9の上昇を示した症例も報告されている¹²⁾¹³⁾。本症例では症例2がCEA 20.7ng/mlと上昇を認め、AFPは2例とも陰性であった。腫瘍マーカーは腫瘍の大きさ、腫瘍構成成分の割合などにより様々な動態を示すと思われるが、中原⁸⁾が述べるようにCEAが陽性でAFPが比較的低値の場合、混合型肝癌を念頭におくべきであると思われる。画像診断では混合型肝癌に特徴的な所見はないが、肝細胞癌と胆管細胞癌の両者の特徴を有する。肝細胞癌部ではdynamic CTでearly enhancementを示し、血管造影ではhypervascularに描出される。また胆管細胞癌部ではdynamic CTでdelayed enhancementを示し、血管造影ではhypovascularに描出される¹⁴⁾。自験例ではCT、US上は典型的な肝細胞癌の像を呈さず、特に症例2の血管造影では腫瘍構成を考えると肝細胞癌成分の多い部分が濃染されており、混合型肝癌を疑わせる所見であった。また腫瘍の描出にはMRIが有用であった。

混合型肝癌はその転移形式においても肝細胞癌と胆管細胞癌の両者の性格を有する。血行性転移は肺に多く(75.0%)、肝細胞癌成分が主体を占めている。リンパ節転移は87.5%と肝細胞癌(47.4%)に比べ頻度が高く、胆管細胞癌(79.6%)のそれに近く、転移巣では胆管細胞癌が優位を占める¹⁾。自験例では症例1で肝細胞癌成分の肝内転移を認めたが、遠隔転移は認めなかった。このように混合型肝癌では転移を高率に認めるため予後は不良で、切除例も少なく、切除例でも2年生存率は約15%程度である¹⁾。自験例では肝切除に加え、肝門部リンパ節郭清を施行し、症例1では術後42か月、症例2では術後16か月無再発生存を得ている。自験例では幸いリンパ節転移は認めなかったが、リンパ節転移の頻度を考慮すると術前診断あるいは術中病理診断にて混合型肝癌が疑われた場合は肝内胆管癌に準じてリンパ節郭清(1群+α)を付加することが賢明であると思われた。

文 献

- 1) 日本肝癌研究会編：原発肝癌に対する追跡調査—第10報—。肝臓 34: 805—813, 1993
- 2) Wells HG: Primary carcinoma of the liver. Am J Med Sci 126: 403—417, 1903
- 3) L'Esperance E: Atypical hemorrhagic malignant hepatoma. J Med Res 32: 225—249, 1915
- 4) Koster H, Kasman LP: Primary duplex liver carcinoma. Am J Surg 17: 237—241, 1932

- 5) Bonne C: Cancer and human race. *Am J Cancer* 30: 435—454, 1937
- 6) Allen RA, Lisa JL: Combined liver cell and bile duct carcinoma. *Am J Pathol* 25: 647—655, 1949
- 7) Goodman ZD, Ishak KG, Langloss JM et al: Combined hepatocellular-cholangioma. Histological and immunohistological study. *Cancer* 55: 124—135, 1985
- 8) 中原俊尚: 混合型肝癌の臨床病理学的研究. 肝臓 27: 1431—1438, 1986
- 9) 日本肝癌研究会編: 臨床・病理. 原発性肝癌取扱い規約. 第2版. 金原出版, 東京, 1987
- 10) 植草利公: 混合型肝癌の組織科学的研究. 肝臓 28: 343—353, 1987
- 11) 植草利公, 松本俊治, 福田芳郎: 肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型. 病理と臨 6: 284—289, 1988
- 12) 奥平剛史, 森 正也, 安井英明ほか: CA19-9 高値を示した混合型肝癌が疑われた1切除例. *Ther Res* 13: 3823—3827, 1992
- 13) 村田哲也, 渡辺省三, 三浦 悟ほか: 混合型肝細胞癌・胆管細胞癌の1切除例. 肝臓 29: 1649—1653, 1988
- 14) 広瀬仁一, 松井 修, 高島 力: 混合型肝癌の画像診断. 画像診断 8: 88—92, 1988

Two Resected Cases of Mixed Hepatocellular and Cholangiocellular Carcinoma

Kazuhiro Takeuchi, Hiroji Nishino, Masaichi Ohira, Teruyuki Ikehara, Yoshiharu Yamamoto, Teruyoshi Ikeda, Yuichi Arimoto, Atsunori Niita, Nobuya Yamada, Akira Shigesawa, Shigehiko Nishimura, Kenichi Yanagawa, Ryugo Sawada and Michio Sowa
The First Department of Surgery, Osaka City University of Medical School

Generally mixed hepatocellular and cholangiocellular carcinoma (MHCC) shows high malignancy as it has both the characteristics of hepatocellular carcinoma (HCC) and cholangiocellular carcinoma (CCC). Many cases of MHCC already have metastatic regions in the lung or lymph nodes when they are found clinically. Here we report two rare cases of MHCC resected curatively. Case 1: The patient was a 41-year-old man. US showed an abnormal tumor about 5 cm in diameter at the antero-inferior segment of the liver, and right trisegmentectomy was performed. Case 2: The patient was a 56-year-old man. US showed a tumor about 3 cm in diameter at the postero-inferior segment of the liver, and partial resection was performed. Histological findings in both cases showed the mixed type of MHCC according to Allen's classification. Histologically, the HCC component and CCC component were mixed closely in Case 1, but the border of the two components was clear in Case 2. These findings may suggest that the origins were different in two cases. Hepatectomy associated with lymph node dissection of the hepatoduodenal ligament was performed in both cases, and the patients survived 42 and 16 months without recurrence. This may suggest that if MHCC is suspected at pre- or intraoperative examination, it is important to add lymph node dissection.

Reprint requests: Kazuhiro Takeuchi First Department of Surgery, Osaka City University of Medical School
1-5-7 Asahi-machi, Abeno-ku, Osaka City, 545 JAPAN