幽門輪保存胃全摘術後 6 か月目に発症した ビタミン B₁₂ 欠乏による脚気ニューロパチーの 1 例

りんくう総合医療センター市立泉佐野病院外科¹⁾, 同 神経内科²⁾, 大阪大学大学院機能制御外科³⁾

岩瀬 和裕¹⁾ 桧垣 淳¹⁾ 三方 彰喜¹⁾ 田中 靖士¹⁾
吉川 正人¹⁾ 岸本 朋乃¹⁾ 鳥飼 慶¹⁾ 豊岡 圭子²⁾
弓場 健義³⁾ 上池 渉¹⁾

幽門輪保存胃全摘術後 6 か月目にビタミン B₁₂ 欠乏による脚気ニューロパチーを発症した 1 例を報告した。症例は 32 歳の男性で、胃癌に対して幽門輪保存胃全摘術を行い噴門形成を付加した近位側空腸パウチ間置法にて再建した。退院後飲酒せず食事内容に偏食は認められなかったが、術後 3 か月目の腹部 CT 検査では間置空腸の著明な拡張が認められた。術後 4 か月目頃より経口摂取は順調に進んだが、術後 6 か月目に靴下型知覚障害ならびに下肢遠位筋優位の筋力低下が認められた。神経生理学的検査では腓腹神経の感覚神経活動電位消失が認められ、血中ビタミン B₁₂ 値は 11 (正常値 20 ~ 50) ng/ml と低値であった。ビタミン B₁₂ の投与により症状は軽快した。胃切除術後に上部消化管内容のうっ滞を併発した場合には、ビタミン B₁₂ 欠乏の可能性をも念頭に置く必要があると考えられた。

はじめに

胃切除術後のビタミンの吸収障害としてビタミン B₁₂、ビタミン D の吸収障害がよく知られているが、ビタミン B₁₂ の異常に関する報告は少ない¹⁾。しかし、欧米では肥満に対する胃形成術や胃空腸吻合術後にビタミン B₁₂ 欠乏症の発生が報告されており^{2)~4)}、最近、本邦においても各種胃切除術後のビタミン B₁₂ 欠乏症発生の報告が散見される^{5)~11)}。本邦における周術期高カロリー輸液の関与が否定的な胃手術後ビタミン B₁₂ 欠乏症の過去報告例 9 例はいずれも術後 1 年 3 か月以上を経て発症しているが^{6)~11)}、欧米における肥満に対する手術では術後 6 か月以内にビタミン B₁₂ 欠乏症を発症した例も報告されている^{2)~4)}。我々は幽門輪保存胃全摘術後 6 か月目に発症したビタミン B₁₂ 欠乏による脚気ニューロパチーの 1 例を経験したので報告する。

症 例

症例：32 歳，男性

主訴：タール便

既往歴：特記すべき事なし。通常ビール 1 本を週に 1 ~ 2 回程度飲用し、特に偏食はない。

現病歴：2 週間程前からのタール便を主訴に受診、胃内視鏡検査にて胃体上部小弯に出血性潰瘍性病変が認められ、潰瘍底に露出血管が認められた。血液検査にてヘモグロビン値 10.5g/dl と貧血が認められたため入院となった。10 日間の絶食および保存的治療により潰瘍性病変ならびに貧血は軽快傾向を示し、29 日目に退院となった。入院期間中、末梢静脈より 10% 糖添加維持輸液を中心に補液をうけたが、ビタミン製剤は添加されなかった。退院後 3 週間目の前回の病変と同一部位の胃内視鏡下生検にて一部 signet ring cell carcinoma が強く疑われる低分化型腺癌と診断されたため手術目的にて再入院となった。

入院時現症：身長 177cm，体重 66kg，全身および腹部に異常所見は認められなかった。

入院時検査所見：血液検査では、ヘモグロビン値 10.9g/dl と貧血を認める以外に異常所見は認められなかった。手術前の胃内視鏡検査では前回の胃内視鏡検査時に異常が指摘されたのと同一部位である胃体上部小弯に IIb 型病変が認められた。胸部単純 X 線検査、腹部 CT 検査ならびに腹部超音波検査では異常所見は認められなかった。以上より胃癌根治術を施行した。術式の選択に際して本症例の病変が粘膜内にとどまるものか否かが問題となったが、初発症状出現時の胃内視鏡では潰瘍性病変が粘膜下層まで直接浸潤していた

< 1999 年 9 月 22 日受理 > 別刷請求先：岩瀬 和裕
〒598 8577 泉佐野市りんくう往来北 23 りんく
う総合医療センター市立泉佐野病院外科

Fig. 1 Abdominal computed tomography 3 months after operation revealed dilatation of interposed jejunum.

可能性を否定し得なかったため、以下の術式を選択した。

手術所見：通常開腹にて幽門輪保存胃全摘術¹²⁾¹³⁾を行い、噴門形成を付加した近位側空腸パウチ間置法にて再建した¹⁴⁾。脾尾側脾動脈操作を併施し、取扱い規約上1, 2, 5, 7, 10, 11番リンパ節の術中迅速組織診にて転移のないことを確認した。6番リンパ節に関しては、右胃大網動脈根部周囲を露出して十分に検索したが、リンパ節腫大は認められなかった。切除標本の病理組織所見では、非充実型低分化型腺癌 (por 2), sm1, INFβ, ly0, v0, PM 18mm, DM 65mm, pN0であった。

術後経過：術後1日目より17日目までビタミン B₁ 5 mg/日を含むビタミン製剤を連日併用する高カロリー輸液を施行した。術後7日目より経口摂取を開始したが、術後15日目頃より5分粥6回食摂取に際して食後の嘔吐が認められた。その後徐々に経口摂取量が増加し、術後38日目に普通食6分割摂取の状態にて退院した。上記以外の術後合併症はなく、術後肝機能障害も認められなかった。退院後の体重は63kgであった。

退院後経過：退院後は全く飲酒せず、食事内容に偏食は認められなかった。退院後は複合消化酵素製剤ならびにドキシフルリジン (5 DFUR) 800mg/日を連日投与した。食後の上腹部膨満感は持続し、術後3か月目の腹部 CT 検査では間置空腸の著明な拡張ならびに食物残渣のうっ滞が認められた (Fig. 1)。しかし、術後4か月頃より経口摂取は順調に進み、術後5か月目には体重は術前値の66kgに復した。その後、異常なく経過していたが、術後6か月目に靴下型知覚障害なら

びに下肢遠位筋優位の筋力低下が認められた。生化学的血液検査では異常は認められず、5 DFUR を休業したが症状は軽快せず、5 DFUR 中止後2週間目には軽度の下腿浮腫ならびアキレス腱反射の低下も認められた。末梢神経の神経生理学的検査では、上肢はほぼ正常であった。下肢の知覚神経である腓腹神経においては感覚神経活動電位が導出されなかった。運動神経である後脛骨神経においては複合運動活動電位の振幅が0.8/0.5mV (遠位刺激/近位刺激) と著明に低下していた。

以上の所見から下肢優位の軸索変性が強く示唆されたため、脚気ニューロパチーを疑い血中ビタミン B₁ 値を測定したところ、11ng/ml (正常値20~50) と低値を示した。胸部 X 線写真では心陰影拡大などの異常所見は認められず、脳 MRI 検査でも異常所見は認められなかった。血中ビタミン B₁₂, D, E 値は正常であった。経静脈的にビタミン B₁ 100mg を投与し、経口的にビタミン B₁ 75mg/日の投与を開始したところ症状は軽快し、ビタミン B₁ 投与開始後2か月目にはごく軽度の下腿の異常感覚が残存するものの日常生活には影響しない状態となった。神経生理学的検査においても後脛骨神経における複合運動活動電位の振幅は4.0/3.8 mV に改善した。

考 察

ビタミン B₁ は腸管、主として上部空腸から吸収されるが、腸管から吸収されるビタミン B₁ 量には限界があり、一時に大量の B₁ が経口投与されても吸収率は極めて悪い¹⁵⁾。一方、ビタミン B₁ の体内貯蔵量は成人で30 mg 程度と他のビタミンに比べて少なく¹⁶⁾、成人の1日所要量が2~5mg であることから食餌中のビタミン B₁ 量が少ないと容易に欠乏状態に陥る危険性がある¹⁵⁾。健常人の中にも有症状患者と同程度の血中ビタミン B₁ 値を呈する場合があります、潜在性ビタミン B₁ 欠乏状態の可能性も報告されている¹⁶⁾。ビタミン B₁ 欠乏症の顕性化症状として、中枢神経系では Wernicke 脳症、末梢神経系では感覚優位の多発神経炎、いわゆる脚気ニューロパチーがよく知られており、特に前者では診断、治療が遅れた場合には不可逆的变化を招来する場合もあるため注意を要する^{9)~11)}。

ビタミン B₁ の代謝異常に関与する機序として、1. 摂取不足、2. 吸収障害、3. 運動、発熱、妊娠などに伴うエネルギー代謝増大や高カロリー輸液、アルコール過飲などに伴うビタミン B₁ の消費増大による代謝異常、4. 肝障害、内分泌疾患や transketolase 異常を呈

Table 1 Reported cases with neurological disorders due to vitamin B1 deficiency after gastrectomy in Japan.

	Case	Operation	Duration from operation to neurological disorders	Author, Year
Peripheral neuropathy	39yo, F	Pancreatoduodenectomy	1year 3months	Takenaga, et al ⁶⁾ 1992
	63yo, F	Distal Gastrectomy (Billroth II)	3years	Hanaoka, et al ¹¹⁾ 1996
	38yo, F	Total Gastrectomy (Jejunal interposition)	6years 6months	Fujimura, et al ⁵⁾ 1996
Wernicke's encephalopathy	63yo, F	Gastrojejunostomy	28years	Okino, et al ⁸⁾ 1993
	49yo, M	Distal Gastrectomy (Billroth II)	13years	Ochiai, et al ⁹⁾ 1996
	56yo, M	Total Gastrectomy (Jejunal interposition)	3years 6months	Fujimura, et al ⁵⁾ 1996
	48yo, M	Total Gastrectomy (Jejunal interposition)	5years	Arai, et al ⁷⁾ 1997
	56yo, M	Total Gastrectomy (Jejunal interposition)	4years	Arai, et al ⁷⁾ 1997
	58yo, M	Distal Gastrectomy (Billroth II)	4years	Okada, et al ¹⁰⁾ 1998

A case with gastrojejunostomy is also presented. Cases due to perioperative intravenous hyperalimentation^{18)~20)} were excluded.

する遺伝的異常などによる利用障害, が考えられる^{1),5),7)}。この内, 今回の症例では特に偏食傾向は認められなかったこと, 発症時期は社会復帰はしていたもののいまだ積極的な運動はしていなかったこと, 胃切除後は全くアルコールを摂取していなかったこと, 重篤な肝障害や内分泌疾患の併存は認められなかったこと, ならびにビタミン B₁投与により容易に回復したことから, 胃切除再建術後状態の特異性に起因する軽度の摂取吸収障害が主たる原因であったと考えられる。最近, 周術期の適切なビタミン B₁を投与されない高カロリー輸液に際してのビタミン B₁欠乏性代謝性アシドーシス発生の報告も散見される^{18)~20)}。今回の症例も周術期に高カロリー輸液を施行したが, 高カロリー輸液中は十分なビタミン B₁の経静脈的投与が併施されており, 代謝性アシドーシスを疑わせる所見も認められなかった。術後早期に経口摂取量が不十分であったが, むしろ1日の経口摂取量が増加し, 社会復帰を果たした後に脚気ニューロパチーを発症している点から, 周術期高カロリー輸液の影響は少ないと考えられる。

胃切除術あるいは胃空腸吻合術後のビタミン B₁吸収不全の機序として, 胃切除による減酸効果あるいは残胃や間置空腸内の食物貯留により上部消化管内がよりビタミン B₁が分解されやすいアルカリ環境下に維持されること, 残胃や間置空腸内でのチアミン分解酵素産生菌の発生増殖による吸収不全, さらに上部空腸による pouch 作成を伴う再建術式後においてはビタミン B₁吸収の主座たる上部空腸の pouch への転用による生理的状态での吸収領域の減少, などが推察されている^{1),5),7)}。しかし, 上記の内単一の原因だけでは脚

気ニューロパチーあるいは Wernicke 脳症の症状を発現してくることは殆どないと考えられ, 胃手術後にビタミン B₁欠乏症を併発したと報告されている例は過去本邦において9例にすぎない^{5)~11)}。これらの過去報告例は胃手術後最短でも1年3か月, 最長28年, 平均7.6年を経て発症している (Table 1)。胃手術後の再建術式に起因する軽度のビタミン B₁吸収障害のための潜在性ビタミン B₁欠乏状態あるいはその準備状態に加えて多少の偏食による摂取不足やエネルギー代謝増加などによる代謝異常が加味されて発症したか, あるいは軽度の吸収障害が長期に及んだために発症したものではないかと考えられる。一方, 欧米での肥満に対する手術後においては術後6か月以内に発症した報告もあり^{2)~4)}, 胃手術による特異的なビタミン B₁吸収動態の変化にダイエットなどによる摂取不足など他の原因も付加された場合には, より短期間でのビタミン B₁欠乏症の危険性があると考えられる。今回の症例では, pouch 作成を伴う空腸間置法で再建された胃全摘術後状態であった点に加えて, 術後早期より幽門輪以下への胃内容排泄障害を併発していた点が, 偏食, アルコール飲用や運動量増大などの因子がなかったにも関わらず過去報告例に比べてより術後短期間でビタミン B₁欠乏症を発症した原因ではないかと考えられた。

幽門輪保存胃全摘術に際して pouch を作成する空腸間置法で再建した場合の幽門輪以下への食物排出動態はいまだ十分検討されていない。しかし, 術後に食後のつかえ感, 膨満感などの愁訴が強く出現する症例が存在するとの報告もある²¹⁾。かかる症例においては, 術後数か月以内であっても潜在性ビタミン B₁欠乏状態を併発している可能性を否定しえず, 脚気ニュー

ロパチーや Wernicke 脳症を疑わせる症状が出現した場合には迅速に血中ビタミンB₁濃度を検索することが肝要であると考えられた。

文 献

- 1) 藤村 隆, 三輪晃一: 消化器外科手術後長期遠隔時におけるビタミン欠乏症. 輸液栄ジャーナル 20: 227-232, 1998
- 2) Kramer LD, Locke GE: Wernicke's encephalopathy. J Clin Gastroenterol 9: 549-552, 1987
- 3) Abarbanel JM, Berginer VM, Osimani A et al: Neurologic complications after gastric restriction surgery for morbid obesity. Neurology 37: 196-200, 1987
- 4) Christodoulakis M, Maris T, Plaitakis A et al: Wernicke's encephalopathy after vertical banded gastroplasty for morbid obesity. Eur J Surg 163: 473-474, 1997
- 5) 藤村 隆, 三輪晃一, 木南伸一ほか: 胃切除後長期経過後に発症したビタミンB₁欠乏症の2例. 外科と代謝・栄 30: 405-411, 1996
- 6) 竹永 智, 久保田竜二, 吉嶺厚生ほか: 診断に苦慮したビタミンB₁欠乏性末梢神経障害(脚気)の1例. 国療沖縄医誌 13: 93-95, 1992
- 7) 荒井元美, 奈良健司, 栗津 望: 胃全摘の数年後に亜急性発症した Wernicke 脳症の2例. 臨神経 37: 1027-1029, 1997
- 8) 沖野惣一, 坂尻顕一, 福島功二ほか: 胃空腸吻合術が誘因と考えられた Wernicke-Korsakoff syndrome の1例. 臨神経 33: 530-534, 1993
- 9) 落合 淳, 茂木禧昌, 新畑 豊ほか: 頭部 MRI で小脳病変を呈し, 胃切除後13年後に発症した Wernicke 脳症. 神経内科 45: 65-67, 1996
- 10) 岡田真一, 中里道子, 井上 博ほか: 胃切除4年後に発症したウェルニッケ脳症の1例. 精神医 40: 311-314, 1998
- 11) 花岡直子, 羽生憲直, 田丸冬彦ほか: 胃空腸吻合術後に発症し慢性再発性の経込をとった脚気ニューロパチー. 神経内科 45: 406-410, 1996
- 12) Yumiba T, Ito T, Inoue Y et al: Pylorus preserving total gastrectomy reconstructed by jejunal pouch interposition with a fundic-like plication and its evaluation for esophageal reflux. Edited by Kim JP, Min JS, Mok YJ. 3rd International Gastric Cancer Congress. Monduzzi Editore, Bologna, 1999, p703-708
- 13) 白鳥常男, 中谷勝紀: 幽門保存胃亜全摘兼有茎空腸移植術. 外科治療 51: 727-735, 1984
- 14) 弓場健義, 伊藤寿記, 井上善文ほか: 胃全摘後の食道逆流に対する噴門形成付加空腸パウチ間置再建の有用性. 日外科系連会誌 24: 27-32, 1999
- 15) 花岡直子: ビタミンB₁欠乏の原因と病型. 後藤文男, 高倉公明, 木下真男ほか編. Annual Review 神経. 中外医学社, 東京, 1998, p220-227
- 16) 糸川嘉則: ビタミンB₁. Pharma Medica 10: 29-34, 1992
- 17) Blass JP, Gibson GE: Abnormality of a thiamine-requiring enzyme in patients with Wernicke-Korsakoff syndrome. N Eng J Med 297: 1367-1370, 1977
- 18) 村井克昌, 宮崎眞佐男, 鈴木賢治ほか: 胃切除後, 経静脈栄養下で発症した Wernicke 脳症の1例. 神経内科 43: 65-68, 1995
- 19) 三宅康史, 坂本哲也, 前田正之ほか: 高カロリー輸液中の代謝性アシドーシス 臨床例とビタミン欠乏実験モデルについて. 外科と代謝・栄 29: 135-142, 1995
- 20) 及川昌也, 鈴木正徳, 海野倫明ほか: 肝切除時に発症したビタミンB₁欠乏性代謝性アシドーシスの1例. 外科と代謝・栄 32: 351-355, 1998
- 21) 中根恭司, 明平圭司, 中川宏之ほか: 胃全摘後の逆流性食道炎を防ぐ工夫. 手術 51: 1319-1324, 1997

Peripheral Neuropathy due to Vitamin B₁ Deficiency Developed 6 Months
after Pylorus-preserving Total Gastrectomy : Report of a Case

Kazuhiro Iwase¹⁾, Jun Higaki¹⁾, Shoki Mikata¹⁾, Yasushi Tanaka¹⁾,
Masato Yoshikawa¹⁾, Tomono Kishimoto¹⁾, Kei Torikai¹⁾, Keiko Toyooka²⁾,
Takeyoshi Yumiba³⁾ and Wataru Kamiike¹⁾

Department of Surgery, Rinku General Medical Center, Izumisano Municipal Hospital¹⁾

Department of Neurology, Rinku General Medical Center, Izumisano Municipal Hospital²⁾

Division of General and Gastroenterological Surgery, Department of Surgery,
Osaka University Graduate School of Medicine³⁾

A case of peripheral neuropathy due to vitamin B₁ deficiency developed 6 months after pylorus-preserving subtotal gastrectomy is reported. Pylorus-preserving total gastrectomy and reconstruction by jejunal pouch interposition with fundoplication was performed for gastric cancer in a 32-year-old man. He had a balanced diet and no alcohol postoperatively. Abdominal computed tomography 3 months after operation revealed marked dilatation of the interposed jejunum. The quantity of daily oral intake had been sufficient since 4 months after operation; however, the patient complained of dysesthesia and muscle weakness in the distal parts of the lower extremities 6 months after operation. The sensory action potential of the sural nerve was not evoked during electrophysiologic examination. The blood level of vitamin B₁ was decreased as 11 ng/ml (normal range : 20-50). Symptoms gradually improved following vitamin B₁ administration. Caution should be paid to the possibility of vitamin B₁ deficiency in cases with passage disorder of the upper alimentary tract following gastrectomy.

Key words : Vitamin B₁, neuropathy, gastrectomy

[Jpn J Gastroenterol Surg 33 : 191-195, 2000]

Reprint requests : Kazuhiro Iwase, Department of Surgery, Rinku General Medical Center, Izumisano Municipal Hospital
2-23 Rinkuohrai-kita, Izumisano, 598-8577 JAPAN