切除しえた転移性腭腫瘍の3例

名古屋大学第2外科

石樽 清	川瀬 義久	金住 直人	大島 健司
小竹 克博	粕谷 英樹	澤田 憲朗	野浪 敏明
原田 明生	中尾 昭公		

症例1は55歳の男性。頭蓋内の hemangiopericytic meningioma を手術された後、頭蓋内、肝、肺、頸椎に再発を繰り返したがすべて切除されてきた。初回術後18年目に腭体部に転移を認め、腭分節切除術を施行した。2年6か月後に全身への多発転移で死亡した。症例2は79歳の男性。11年前に直腸癌で直腸切除術、8年後に肺転移にて右肺中葉切除術を施行されていた。今回 CEA の上昇を機に腭体部に転移が見つかり腭体尾部切除術を施行した。術後1年2か月、癌性腹膜炎で死亡した。症例3は39歳の男性。背部の leiomyosarcoma を切除して2年後に上腹部痛が出現し、腹部CTで腭頭部に転移を認めた。腭頭十二指腸切除術を施行し、術後11か月の現在肺再発があるが生存中である。転移性腭腫瘍の診断、治療にあたっては、原発巣の特徴を考慮に入れてすすめることが重要である。

はじめに

他臓器に発生した悪性腫瘍の腭への転移はこれまで剖検例ではしばしばみられたが、臨床的に診断され切除の対象になることは少なかった¹⁾。しかし、近年画像診断の発達に伴い主に腎癌腭転移の切除報告例が散見されるようになってきた^{2)~5)}。今回我々は、腎以外を原発とする比較的まれな転移性腭腫瘍を3例経験し、外科的切除を施行しえたので文献的考察を加えて報告する。

症 例

症例1：55歳、男性

主訴：特になし。

既往歴：1977年、頭蓋内の hemangiopericytoma にて脳外科で手術。以後、頭蓋内再発、肝転移、肺転移、頸椎転移と再発を繰り返したが計6回の手術ですべて切除されてきた。

現病歴：95年5月、腹部 computed tomography(以下、CT と略)で腭体部に腫瘍を認め入院となった。

入院時検査データ：特に異常なし。

画像診断：腹部超音波検査(以下、US と略)では腭体部に低エコーを呈する腫瘍を認め、腹部CTではやや低吸収、dynamic CT では腫瘍辺縁からよく造影された。これらUSやCTの所見は前回の肝転移巣の特

徴に類似していた。内視鏡的逆行性腭管造影(以下、ERP と略)では腭体部で主腭管の狭窄を認めた。

以上の画像所見と臨床経過から hemangiopericytoma の腭転移と診断し、95年10月23日、腭横断切除術を行った。切除標本において腫瘍径は3×2.5cmで、断面は黄白色平滑で境界明瞭であった。病理組織学的には細胞密度が高い紡錘状の腫瘍を認め、鍍銀染色陽性で hemangiopericytoma の所見に一致した(Fig. 1)。

術後経過良好であったが2年6か月後の98年4月26日、両肺の多発転移による呼吸不全で死亡した。病理解剖の結果、頭蓋内、両側肺、肝、両側腎、両側副腎、残脾、大動脈周囲リンパ節に多発性の転移を認めた。

症例2：79歳、男性

主訴：特になし。

既往歴：1985年、直腸癌穿孔のため緊急手術で直腸切除術、93年に肺転移のため右肺上葉切除を受けていた。

現病歴：96年9月、外来フォローアップ中 carcinoembryonic antigen(以下、CEA と略)が上昇し精査目的に入院となった。

入院時検査データ：CEA が51.4ng/dl と上昇を認めたが、CA19-9など他のデータは異常なかった。

画像診断：腹部USでは腭体部に辺縁不整な低エコー腫瘍と尾側腭管の拡張を認めた。腹部CTで低吸収を呈する腫瘍は、造影すると辺縁部より濃染した。ERPでは腭体部で主腭管は狭窄をきたすことなく突

<2000年6月28日受理> 別刷請求先：石樽 清
〒466 8550 名古屋市昭和区鶴舞町65 名古屋大学医学部第2外科

Fig. 1 The resected specimen of the case 1 showed a smooth and round tumor 3 × 2.5 cm in size. Microscopically the tumor was consisted of round or spindle-shaped cells (HE, × 400). Reticulin studies indicated a dense reticulin meshwork (reticulin stain, × 400).

然途絶していた。

直腸癌手術と肺転移の既往, CEAの上昇, 腫瘍辺縁の造影効果, 主膵管の途絶形態から通常原発性膵癌よりむしろ直腸癌の膵転移を疑い, 96年10月11日膵体尾部切除術を行った。

切除標本では腫瘍の大きさは4 × 3.5 cmで間質増生を伴って固く, 内部不均一で境界不整であった。標本造影では主膵管は原発性膵癌のようなrat tail状の狭窄像は呈さず, 腫瘍による圧迫のみでわずかに開存していた (Fig. 2)。病理組織学的には中分化型の腺癌で3年前の肺転移の組織型と一致しており, 膵管に沿った進展や主要血管, 後腹膜への浸潤, 膵周囲リンパ節への転移は認めなかった。

術後いったんは元気に退院したが, 1年2か月後に癌

Fig. 2 The resected specimen of the case 2 showed a solid tumor with necrotic change in the body of the pancreas. Pancreatography of the resected specimen showed the pancreatic duct severely compressed, but not obstructed (arrow)。

性腹膜炎のため死亡した。

症例3: 39歳, 男性

既往歴: 1996年2月, 他院にて背部の平滑筋肉腫を切除した。

現病歴: 98年1月, 上腹部痛が出現し精査したところ, 膵頭部に腫瘍を認め入院となった。

入院時検査データ: GOT, GPT, ALP, γGTPの軽度上昇を認めるのみでCEAやCA19-9は正常であった。

画像診断: 腹部CTでは膵頭部に辺縁明瞭な3 cm大の腫瘍を認め, 造影CTでは腫瘍全体が濃染した。ERPでは膵体部で主膵管の途絶と末梢側膵管の拡張を認め, さらに造影圧をかけると腫瘍内に造影剤の漏出を認めた。

臨床経過と辺縁明瞭でhypervascularな腫瘍であることから平滑筋肉腫の膵転移を疑い, 98年3月27日, 膵頭十二指腸切除術を行った。

切除標本では腫瘍の大きさは2.5 × 2.5 cmで周囲膵組

Fig. 3 The resected specimen of the case 3 showed a well-defined tumor with hemorrhage. Microscopic findings of the tumor showed the proliferation of the spindle like cells (HE, $\times 100$). The tumor cells were stained by smooth muscle studies (α -sm actin stain, $\times 100$).

組織との境界は明瞭で内部に出血を伴っていた。病理組織学的には2年前の背部平滑筋肉腫の組織型と一致し、紡錘形の腫瘍細胞が束状に増殖し、免疫組織染色では α 平滑筋アクチン陽性であった (Fig. 3)。

術後11か月の現在、右肺に転移を認めるが生存中である。

考 察

他臓器に発生した悪性腫瘍の脾転移は剖検上5.1～21.7%と報告¹⁹⁾されており、その頻度は決してまれではないが、転移経路の多くは隣接臓器からの連続的波及や脾周囲リンパ節へのリンパ行性転移を経て脾に浸潤したものであり血行性転移は少ないとされる¹⁾。

本邦における転移性脾腫瘍の切除報告例は1981年のYazakiら²⁾の報告に始まり、これまでに多くの腎癌脾

転移の切除例が報告されてきた^{3)～5)}。一方、腎癌以外を原発巣とする脾転移切除例については報告が少なく、医学中央雑誌で検索する限りにおいて直腸癌2例^{6,7)}、肺癌2例^{8,9)}、乳腺葉状嚢胞肉腫¹⁰⁾、軟骨肉腫¹¹⁾、形質細胞腫¹²⁾、骨肉腫¹³⁾、滑膜肉腫¹⁴⁾、甲状腺乳頭癌¹⁵⁾各1例のみであり、我々の経験したhemangiopericytoma¹⁶⁾や直腸癌¹⁷⁾、平滑筋肉腫の脾転移はいずれも極めてまれな症例であった (Table 1)。自験例を含めた13例の転移時期は12例が異時性であり、この場合原発巣切除から脾転移までの平均期間は6.4年と比較的長期間であった。腫瘍の占居部位は頭部(5例, 38%)より体尾部(8例, 62%)に多い傾向があり、脾転移巣数は1例を除いて単発であった。脾に限局した転移は2例のみで、他の11例は肺、肝、骨、脳などの他臓器遠隔転移を伴っており、特に肺転移は7例にみられ高率であった。一般に体循環を介する血行性転移の場合には全身、特に肺への転移が高率に合併すると推測されるが、転移性脾腫瘍の診断には肺転移を中心とした他臓器遠隔転移の検索が重要であると確認された。

転移性脾腫瘍の診断は臨床症状が少ないことに加え、CTやUS、ERPでも特異的な画像所見に乏しいことから、早期発見が困難で原発性脾癌との鑑別も困難なことが多い^{18)～21)}。しかし、悪性腫瘍の既往歴があったり脾内に多発腫瘍を認める場合は、転移性脾腫瘍を疑う重要な手掛かりとなる^{18,19)}。我々の経験した症例1は頻回の再発と切除をくり返してきた臨床経過から、症例3は画像上の造影所見から転移性脾腫瘍の診断は比較的容易であった。症例2では原発性脾癌との鑑別に難渋したが、3年前の肺転移の既往が転移性脾腫瘍を積極的に疑うきっかけになった。

一般に外科的切除の適応は原発巣をはじめとする脾以外の病巣が根治されている場合とされる¹⁸⁾。症例1や症例2では脾以外にも再発を認めたが、前回までの手術で脾以外の病巣は十分コントロールされていたこと、初回手術から再発までの期間が長く生物学的悪性度が比較的低いと推測されたこと、切除以外に有効な治療手段がなかったことの3点から手術を選択した。

脾への転移が血行性経路の場合、脾周囲リンパ節への転移は少なく原発性脾癌のような広範リンパ節郭清は必要ないとされる^{5,13)}。我々が経験した3例でも、リンパ節転移や脾管に沿った進展、脾頭神経叢など周囲組織への浸潤はみられなかった。こうした臨床病理学的特徴を鑑みると、脾への転移が血行性の場合には症

Table 1 Reported cases of pancreatic metastasis treated by resection

Case	Year	Author	Age	Sex	Primary site	Other organ metastases	Until metastasis	Site of metastasis	Number of metastasis	Performed operation	Prognosis
1	1985	Negi ⁶⁾	56	M	Rectal carcinoma	Liver	2 yrs	Head	Solitary	PD	Died(12 mos)
2	1986	Nakahara ¹⁰⁾	35	F	Cystosarcoma phyllodes	Lung	11 mos	Body, tail	Solitary	DP	Died(5 mos)
3	1988	Masaoka ¹¹⁾	30	F	Mesenchymal chondrosarcoma	None	2 yrs	Tail	Solitary	DP	Alive(24 mos)
4	1988	Morisaki ⁸⁾	41	M	Pulmonary carcinoma	Brain, SVC, LN	Simultaneous	Head	Solitary	PD	Died(4 mos)
5	1990	Kainuma ¹²⁾	52	M	Plasma cell myeloma	None	9 yrs	Body, tail	Solitary	DP	Alive(9 mos)
6	1990	Yuasa ⁷⁾	57	M	Rectal carcinoma	Pelvic	1 yr 6 mos	Head	Solitary	PD	Alive(5 mos)
7	1992	Kawabe ¹³⁾	29	M	Osteosarcoma	Lung, testis	3 yrs	Body, tail	Multiple	DP, PP	Alive(41 mos)
8	1994	Yoshitomi ¹⁴⁾	40	F	Synovial sarcoma	Lung	12 yrs	Head	Solitary	PpPD	Alive(13 mos)
9	1995	Gondoh ⁹⁾	67	F	Pulmonary carcinoma	LN	4 yrs 7 mos	Body	Solitary	DP	Died(27 mos)
10	1997	Ohtawa ¹⁵⁾	47	F	Thyroid carcinoma	Lung, kidney, LN	10 yrs	Body	Solitary	DP	Alive(1 mo)
11	1999	Author 1 ¹⁶⁾	55	M	Hemangiopericytoma	Lung, liver, brain, bone	18 yrs	Body	Solitary	PP	Died(30 mos)
12	1999	Author 2 ¹⁷⁾	79	M	Rectal carcinoma	Lung	12 yrs	Body	Solitary	DP	Died(14 mos)
13	1999	Author 3	39	M	Leiomyosarcoma	Lung	2 yrs	Head	Solitary	PD	Alive(11 mos)

PD : pancreatoduodenectomy, PpPD : pylorus-preserving pancreatoduodenectomy, DP : distal pancreatectomy, PP : partial pancreatectomy, SVC : superior vena cava, LN : lymph nodes

例 1 における膵横断切除術など術後の残膵機能温存を考慮した術式選択も有用と考えられた。

転移性膵腫瘍の予後は一般に不良で平均8.7か月²¹⁾という報告もあるが、膵の孤立性転移で根治切除されたものは長期生存例もみられる^{13, 22)}。転移性膵腫瘍の診断治療にあたっては、原発巣の特徴や他臓器転移の有無、再発までの期間などを考慮したうえで、外科的切除も治療選択の一つとして積極的に検討すべきである。

文 献

- 1) 小塚貞夫, 坪根幹夫, 滝 正 : 転移性膵癌の病理学的研究 . 胆と膵 1 : 1531-1535, 1980
- 2) Yazaki T, Ishikawa S, Ogawa Y et al : Pancreatic metastasis from renal cell carcinoma diagnosed at arteriography. Acta Urol Jpn 27 : 1517-1521, 1981
- 3) 岩川和秀, 松本康志, 渡辺常太ほか : 腎細胞癌の多発性膵転移に対し膵全摘術を施行した 1 例 . 日消外会誌 29 : 2175-2179, 1996
- 4) 馬場秀文, 菅 重尚, 鈴木文雄ほか : 腎細胞癌の異時性膵転移に対して膵全摘術を施行した 2 例 . 本邦報告40例の文献的考察 . 胆と膵 19 : 163-168, 1998
- 5) Hashimoto M, Watanabe G, Matsuda M et al :

Management of the pancreatic metastases from renal cell carcinoma : report of four resected cases. Hepatogastroenterology 45 : 1150-1154, 1998

- 6) 根木逸郎, 浜中裕一郎, 大石秀三ほか : 膵および肝転移をきたした直腸粘液癌の症例 . 日消外会誌 18 : 1747-1749, 1985
- 7) 湯浅典博, 二村雄次, 早川直和ほか : 直腸癌切除後の転移性膵頭部癌の 1 切除例 . 日消外会誌 23 : 1191-1195, 1990
- 8) 森崎善久, 杉浦芳章, 島 伸吾ほか : 転移性膵腫瘍の 1 切除例 . 胆と膵 9 : 115-121
- 9) 権藤守男, 加藤 洋 : 転移性膵腫瘍11例の超音波所見の検討 . 胆と膵 16 : 777-781, 1995
- 10) 中原鍊三, 福嶋久夫, 鈴木勝一ほか : 膵および肺に転移した乳腺葉状嚢胞肉腫の 1 例 . 臨外 41 : 1709-1713, 1986
- 11) 正岡一良, 田尻久雄, 吉森正喜ほか : 転移性膵腫瘍の 2 例 . 膵転移の臨床的検討 . Oncologia 21 : 112-117, 1988
- 12) 貝沼 修, 石川達雄, 小林弘忠ほか : 膵に転移した形質細胞腫の 1 例 . 胆と膵 11 : 417-421, 1990
- 13) 河邊統一, 竜 崇正, 藤田昌宏ほか : 転移性膵腫瘍の 1 治験例 . 膵臓 8 : 39-46, 1993
- 14) 吉富秀幸, 山本 宏, 藤田昌宏ほか : 滑膜肉腫膵転

- 移の1切除例 日臨外医会誌 55 : 2157 2161, 1994
- 15) 大多和孝博, 青山俊子, 吉川啓一ほか : 甲状腺乳頭癌の膵転移の1切除例 本邦切除例の検討 . 胆と膵 18 : 199 203, 1997
- 16) Koyama H, Harada A, Nakao A et al : Intracranial hemangiopericytoma with metastasis to the pancreas. J Clin Gastroenterol 25 : 706 708, 1997
- 17) Inagaki H, Nakao A, Ando N et al : A case of solitary metastatic pancreatic cancer from rectal carcinoma : a case report. Hepatogastroenterology 45 : 2413 2417, 1998
- 18) Rumancik WM, Megibow AJ, Bosniak MA et al : Metastatic disease to the pancreas : evaluation by computed tomography. J Comput Assist Tomogr 8 : 829 834, 1984
- 19) Wernecke K, Peters PE, Galanski M : Pancreatic metastases : US evaluation. Radiology 160 : 399 402, 1986
- 20) Swensen T, Osnes M, Serck-Hanssen A : Endoscopic retrograde cholangio-pancreatography in primary and secondary tumours of the pancreas. Br J Radiol 53 : 760 764, 1980
- 21) Roland CF, Heerden JA : Nonpancreatic primary tumors with metastasis to the pancreas. Surg Gynecol Obstet 168 : 345 347, 1989
- 22) Azzarelli A, Clemente C, Quagliuolo V et al : A case of pancreatoduodenectomy as resolute treatment for a solitary metastasis of breast cancer. Tumori 68 : 331 335, 1982

Report of Three Resected Cases of Pancreatic Metastatic Tumors

Kiyoshi Ishigure, Yoshihisa Kawase, Naohito Kanazumi, Kenji Ohshima,
Katsuhiro Kotake, Hideki Kasuya, Kenrou Sawada, Toshiaki Nonami,
Akio Harada and Akimasa Nakao

Department of Surgery II, Nagoya University School of Medicine

Case 1 : A 55-year-old man who had undergone removal of an intracranial hemangiopericytic meningioma, together with metastases in the brain, liver, lung, and cervical vertebra, was shown to have metastasis in the body of the pancreas 18 years after his first operation. Therefore, segmental pancreatectomy was performed. He died of multiple systemic metastases 2 years and 6 months after the pancreatectomy. Case 2 : A 79-year-old man was shown to have metastasis in the body of the pancreas by the elevation of serum CEA level. He had a history of rectal resection for rectal carcinoma 11 years before and right middle lobectomy for lung metastasis 8 years later. He underwent distal pancreatectomy, but died of peritonitis carcinomatosa 1 year and 2 months, postoperatively. Case 3 : A 39-year-old man underwent extirpation of a leiomyosarcoma located on his back. Two years later, he complained of epigastralgia, and computed tomography revealed a tumor in the head of the pancreas. Pancreatoduodenectomy was performed. He has been alive with lung recurrence 11 months postoperatively. Pancreatic metastasis should be diagnosed and treated taking into account the features of the original tumor.

Key words : metastatic tumor in pancreas

[Jpn J Gastroenterol Surg 33 : 1686 1690, 2000]

Reprint requests : Kiyoshi Ishigure Department of Surgery II, Nagoya University School of Medicine
Tsurumai-cho 65 Showa-ku, Nagoya, 466 JAPAN