陰部神経伝導時間の遅延程度からみた J 型回腸囊肛門吻合術後における soiling の病態生理学的検討

日本大学第 1 外科¹⁾, 日本歯科大学外科²⁾

富田 涼一^{1,2)} 池田 太郎¹⁾ 藤崎 滋¹⁾
朴 英智¹⁾ 丹正 勝久¹⁾ 福澤 正洋¹⁾

潰瘍性大腸炎で J 型回腸囊肛門吻合術を受けた 15 症例 (回腸瘻閉鎖術後 2 年目; 男性 10 例, 女性 5 例, 22 ~ 57 歳, 平均 40.2 歳) について, 体表手術症例 16 例 (A 群) (男性 10 例, 女性 6 例, 18 ~ 50 歳, 平均 38.9 歳) を対照に用い, soiling を認めない 5 症例 (B 群), 水様便時のみ soiling を認める 5 症例 (C 群), 便性に関係無く soiling を認める 5 症例 (D 群) の 4 群に分類し, 陰部神経伝導時間値を比較検討した. その結果, 1) 陰部神経伝導時間は, 全症例において左右無く測定された. 2) D 群は A, B, C 群より有意に延長していた (それぞれ, $p < 0.01$). 3) C 群は A, B 群より有意に延長していた (それぞれ, $p < 0.05$). 4) A, B 群間に有意差は認めなかった. 以上のことより, 陰部神経伝導時間が遅延を来すほど, soiling を悪化させることが示唆された.

はじめに

潰瘍性大腸炎 (ulcerative colitis ; UC と略記) における根治性と機能維持を満たす術式として, 全結腸切除・直腸粘膜切除・回腸肛門吻合術 (colectomy, mucosal proctectomy and ileoanal anastomosis) がある¹⁾. そして, 頻便や urgency 予防に J 型, W 型, H 型, S 型などの種々の回腸囊 (新直腸) が考案²⁾⁻⁶⁾されたが, J 型回腸囊の作製が最も容易なことから多く用いられている²⁾. しかし, 術後排便機能については, 頻便の程度は改善されても, soiling や incontinence などに悩まされる症例が約 50% ほど²⁾⁻⁹⁾存在する. 今回, UC 症例に対して, II 期的手術法により J 型回腸囊肛門吻合術を施行し, 回腸瘻閉鎖術後 2 年目に陰部神経伝導時間測定を行い, soiling の程度とその伝導時間値の関連を検討したので報告する.

対象と方法

1. 研究対象

1999 年 12 月までの過去 10 年間に, 日本大学第一外科教室で II 期的手術法による J 型回腸囊肛門吻合術を受け, 回腸瘻閉鎖術後 2 年目の 15 症例 [男性 10 例, 女性 5 例, 22 ~ 57 歳, 平均 40.2 歳] における soiling の程度を, 本研究に同意してくれた排便異常を認めない体

表手術症例 16 例 (A 群) (男性 10 例 (すべて鼠径ヘルニア症例), 女性 6 例 (すべて早期乳癌症例), 18 ~ 50 歳, 平均 38.9 歳) を対照 (A 群) として用い検討した. なお, soiling は下着に粘液や便が付着し汚染するものと定義し, B 群は全く soiling を認めない 5 症例, C 群は水様便時のみに soiling を認める 5 症例, D 群は便性に関係なく soiling を認める 5 症例であり, A, B, C, D 群間の陰部神経伝導時間値について検討した.

2. 研究方法

示指に操着するゴムサックに神経刺激用電極 (2 個), 導出用電極 (2 個), およびアース用電極 (1 個) を接着したものを自作した. ゴムサックの先端から 1 cm 手前に陽極刺激用電極, 2 cm 手前に陰極刺激用電極, 3 cm 手前にアース用電極を取り付けた. そして, 陽極刺激用電極から 4 cm 手前の示指基部に導出用電極を 1 cm 間隔で 2 個取り付けた. この状態で, 刺激用電極と導出用電極がそれぞれ陰部神経, 外肛門括約筋に当たるようにした. 測定は被検者を左側臥位とした後, 示指にてこの装置を肛門内に挿入し, この状態で陰部神経の走行する座骨棘に刺激用電極が当たるようにした. 刺激条件は, 電圧: 30 ~ 50 volt (圧可変式で筋電図が得られるまで徐々に電圧をあげる), 頻度 (frequency): 1 Hz, 時間 (duration): 0.1 ms の矩計形波 square wave type として, 陰部神経を電気刺激することにより, 外肛門括約筋に当たった導出用電極で得ら

< 2001 年 6 月 26 日受理 > 別刷請求先: 富田 涼一
〒102 8158 東京都千代田区富士見 2 3 16 日本歯科大学外科学講座

れた筋電図を増幅器を経て7Tsignal processor に導き反応波形を描かせた。なお、電極については、材質は白金で直径5mmの平皿電極とした。また、測定はシールドルームで行い、室温は30℃とし、常に同一検者によって行った(方法は著者論文¹⁰⁾を参考)。

統計学的解析には、陰部神経伝導時間平均値(mean

±SD)の差の検定にはStudent t test を用い、いずれも $p < 0.05$ を持って有意とした。

成 績

水様便時のみ soiling を認めた1症例(40歳男性)における陰部神経刺激時の外肛門括約筋の反応波形(対照例の平均値+2SD以上の伝導時間遅延)を示す(Fig. 1)。横軸は刺激からの時間を示し、誘発筋電図(M波: 刺激された運動神経に直接支配されている筋から導出される筋活動電位)出現までの時間(潜時)、すなわち陰部神経伝導時間は本例では、右側4.65ms、左側3.96msと計測される。

1) 右側

A群では 2.1 ± 0.4 ms, B群では 2.4 ± 0.4 ms, C群では 2.7 ± 0.2 ms, D群では 3.7 ± 0.4 msであった(Fig. 2)。D群はA, B, C群より有意に延長していた(それぞれ, $p < 0.01$)。また, C群はA, B群より有意に延長していた(それぞれ, $p < 0.05$)。なお, A群よりB群が延長を認めたが、両者間に有意差は認めなかった。

2) 左側

A群では 2.0 ± 0.3 ms, B群では 2.3 ± 0.3 ms, C群では 2.9 ± 0.4 ms, D群では 3.8 ± 0.6 msであった(Fig. 3)。D群はA, B, C群より有意に延長していた(それぞれ, $p < 0.01$)。また, C群はA, B群より有意に延長していた(それぞれ, $p < 0.05$, $p < 0.01$)。なお, A群よりB群が延長を認めたが、両者間に有意差は認めなかった。

Fig. 1 Pudendal nerve terminal motor latency of a patient with soiling to liquid and solid stool (man, 41 years old) Right side : 4.65 ms, Left side : 3.96 ms

Fig. 2 Pudendal motor nerve terminal latency (Right side)

Conduction delay of pudendal nerve terminal motor latency in patients who experience soiling to liquid and solid stool was significantly longer than that in patients who had no soiling, patients with soiling to liquid stool, or control subjects ($p < 0.01$, respectively)

Fig. 3 Pudendal motor nerve terminal latency (left side)
Conduction delay of pudendal nerve terminal motor latency in patients who experience soiling to liquid and solid stool was significantly longer than that in patients who had no soiling, patients with soiling to liquid stool or control subjects ($p < 0.01$, respectively).

考 察

UCは大腸粘膜を完全に切除しさえすれば根治することが可能であり、大腸粘膜の完全切除と自然肛門からの排便を可能にする全結腸切除・直腸粘膜切除・回腸肛門吻合術が1947年 Ravitch ら¹⁾により初めて報告された。本邦においても、宇都宮ら²⁾が術式の研究を進め(1) prone jackknife 位における anoabdominal approach による直腸粘膜切除(2)短直腸筋筒の作成、(3)J型回腸囊造設(4)空置的回腸瘻造設を原則とした結果、術後合併症が著しく減少し、術後排便機能も改善された。しかし、術後排便状態が安定する術後1年目以降でも soiling を訴える症例が40~67%と報告^{2,7)~9)}され、術後 QOL の低下を認めている。これまで、回腸吻合術後排便機能は、直腸肛門内圧検査から検討され、soiling 例では、経肛門的粘膜剥去操作時の肛門過伸展による括約筋群への機械的損傷や UC の炎症性変化の直腸筋層への波及などにより、括約筋機能、新直腸感覚能、新直腸貯留能の低下が関与しているとされてきた^{1,6,7,11)}。しかし、陰部神経伝導時間の遅延からみた soiling の程度についての検討は認められない。そこで、我々は潰瘍性大腸炎の J 型回腸吻合術後において、排便状態が安定している2年目に、soiling の程度と陰部神経伝導時間遅延の関連を検討した。

陰部神経伝導時間については、これまで慢性便秘例

などを中心に検討がなされ、伝導時間が延長する陰部神経症(pudendal neuropathy)では、soiling や incontinence を来することが報告¹²⁾されている。陰部神経症の原因は、排便時怒責や分娩に際して骨盤底筋群が過伸展され、会陰下垂状態となり、それに伴う陰部神経の圧迫や神経自体が20%以上引き伸ばされることにより生じるという^{12,13)}。また、重症例では支配筋である外肛門括約筋の denervation による筋萎縮を来し、soiling や incontinence を生じると報告^{14,15)}されている。健康成人における陰部神経伝導時間の正常値は、報告者間にあまり差が認められず $2.1 \pm 0.2 \text{ms}$ ¹⁶⁾, $2.1 \pm 0.4 \text{ms}$ ¹⁷⁾, $2.12 \pm 0.22 \text{ms}$ ¹³⁾などと報告され、平均値 + 2SD 以上あれば異常値とするのが一般的である。そして、陰部神経症は2.5ms 以上に認め、測定値には左右差はなかった(分娩や排便時怒責では骨盤底を伸展する圧は対称的)とする報告^{18)~20)}が多い。しかし、片側のみが遅延している場合(理由は不明であるが、長い間には両側性となることが多いとされている)も報告²⁰⁾されている。なお、測定不能場合もあるが、それは陰部神経損傷が高度²⁰⁾、解剖学的位置異常や骨盤手術操作による直腸周囲の繊維化、技術の未熟さなどによる^{21,22)}。これまで、陰部神経伝導時間の遅延は soiling を来することは報告されてきたが、soiling の程度と陰部神経伝導時間の遅延の関連についての報告は認めら

れない。著者らは、本検査は常に同一の検者(富田)が施行し、技術的には問題は無く、すべての症例において測定値は左右差は認められなかった。そして、対照例ではこれまでの報告とほぼ同様の値が得られ、soiling 陰性例では、伝導時間の延長は認めるものの対照例と有意差は認めなかった。また、soiling 陽性例では伝導時間は対照例より有意に延長し、水様便時のみ認められる症例に比較して、ほぼ毎日認める症例では有意に延長していた。すなわち、陰部神経伝導時間の遅延が高度になるにつれて soiling の程度は悪化することが判明した。陰部神経伝導時間が延長する原因については、肛門側からの粘膜剥去やJ型回腸囊肛門吻合を行う手術操作の際に、Parks 肛門鉤で肛門管を過伸展したことにより、陰部神経損傷を生じたことに起因したと考えている。これまで、UC 症例では長年の排便異常に起因する、直腸肛門機能の低下症例が術前より存在することが指摘されている⁹⁾。したがって、soiling 陽性症例における、術前の陰部神経伝導時間を検討しておく必要がある。しかし、今回の対象症例では術前に陰部神経伝導時間測定がされてなく、soiling 陽性症例が術前から陰部神経伝導時間の遅延を認めていたかどうか、判定することはできなかった。よって、今後は術前にも本検査を行い、soiling との関連を詳細に検討する予定である。

以上、soiling の程度は陰部神経伝導時間の延長程度と、関連していることが明らかにされた。しかし、陰部神経伝導時間の遅延は陰部神経損傷のみでなく、外肛門括約筋反応の鈍化により認められることも考えられ、その区別に筋電図(単一電極法と針電極法)を加える必要があると考えている。また、我々は、術後平均51.6か月経過したJ型回腸囊肛門吻合術後症例について、soiling の有無から直腸肛門内圧検査成績を検討し、soiling 陽性症例では陰性症例や対象症例に比較して、明らかに内・外肛門括約筋機能、新直腸感覚能、貯留能などが低下していることを報告⁷⁾した。したがって、soiling は陰部神経損傷以外に、内・外肛門括約筋機能、新直腸感覚能、貯留能などの機能低下も関与して生じたと考えられる。今回の対象症例では、直腸肛門内圧検査は未施行であるため、今後検討を加えるつもりである。また、さらに、S₂₋₄脊髄神経伝導時間測定検査、肛門管粘膜感覚機能検査、直腸肛門筋電図検査などの成績を加え総合的に評価することが、soiling の解明に有用である²³⁾と考えている。

文 献

- 1) Ravitch MM, Sabiston DC : Anal ileostomy with preservation of the sphincter ; Aptoposed operation in patients requiring total colectomy for benign lesions. Surg Gynecol Obstet 84 : 1095 1099, 1947
- 2) 宇都宮譲二, 岩間毅夫, 今城真人ほか : 全結腸切除直腸粘膜切除回腸肛門吻合術 : 序説 . 外科診療 21 : 268 280, 1979
- 3) Parks AG, Nicholls RJ, Belliveau P : Proctocolectomy with ileal reservoir and anal anastomosis. Br J Surg 67 : 533 538, 1980
- 4) Nicholls RJ, Pezim ME : Restorative proctocolectomy with ileal reservoir for ulcerative colitis and familial adenomatous polyposis : a comparison of three reservoir designs. Br J Surg 72 : 470 474, 1985
- 5) Hatakeyama K, Shimamura K, Muto T et al : Defecating function after ileal W pouch-anal anastomosis for restorative proctocolectomy : an evaluation by age. Acta Med Biol 39 : 181 184, 1991
- 6) 馬場正三, 中井勝彦, 倉橋隆之 : 大腸全摘後の J-pouch による回腸肛門吻合術 . 臨外 48 : 193 200, 1993
- 7) 富田涼一, 黒須康彦, 五十棲優ほか : 内圧検査からみた回腸肛門吻合術後 soiling 症例についての病態生理学的検討 . 日消外会誌 27 : 2551 2556, 1994
- 8) 荒井勝彦, 杉田 昭, 山内 毅ほか : 潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘, J型回腸囊肛門吻合術と肛門管吻合術後の排便機能 . 日消外会誌 28 : 1814 1818, 1995
- 9) Neilly P, Neill ME, Hill G : Restorative proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis in 203 patients. Aust N Z J Surg 69 : 22 27, 1999
- 10) Tomita R, Kurosu Y, Munakata K : Electrophysiologic assessments in pudendal and sacral motor nerves after ileal J pouch-anal anastomosis for patients with ulcerative colitis and adenomatous coli. Dis Colon Rectum 39 : 410 415, 1996
- 11) Marcio J, Jorge N, Wexner SD et al : Recovery of anal sphincter function after the ileoanal reservoir procedure in patients over the age of fifty. Dis Colon Rectum 37 : 1002 1005, 1994
- 12) Kiff ES, Swash M : Slowed conduction in the pudendal nerves in idiopathic(neurogenic) faecal incontinence. Br J Surg 71 : 614 616, 1984
- 13) Ho YH, Goh HS : The neurophysiological significance of peritoneal descent. Int J Colorectal Dis 10 : 107 111, 1995
- 14) Snooks SJ, Barnes PRH, Swash M : Damage to the innervation of the voluntary anal and perineur-

- thral sphincter musculature in incontinence : an electrophysiological study. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 47 : 1269-1273, 1984
- 15) Rieger NA, Sarre RG, Saccone GT et al : Correlation of pudendal nerve terminal motor latency with the results of anal manometry. *Int Colorectal Dis* 12 : 303-307, 1997
- 16) Pfeifer J, Salanga VD, Agachan F et al : Variation in pudendal nerve terminal motor latency according to disease. *Dis Colon Rectum* 40 : 79-83, 1997
- 17) Kafka NJ, Barrett RC, Murray JJ et al : Pudendal neuropathy is the only parameter differentiating leakage form solid stool incontinence. *Dis Colon Rectum* 40 : 1220-1227, 1997
- 18) Leroi AM, Dorival MP, Lecouturier MF et al : Pudendal neuropathy and severity of incontinence but not presence of an anal sphincter defect may determine the response to biofeedback therapy in fecal incontinence. *Dis Colon Rectum* 42 : 762-769, 1999
- 19) Voyvodic F, Schlothe AC, Wattchow DA et al : Delayed pudendal nerve conduction and endosonographic appearance of the anal sphincter complex. *Dis Colon Rectum* 43 : 1689-1694, 2000
- 20) Sangwan YP, Collier JA, Robert PL et al : Unilateral pudendal neuropathy. *Dis Colon Rectum* 39 : 249-251, 1996
- 21) Teitzschner T, Sorensen M, Jonsson L et al : Delivery and pudendal nerve function. *Acta Obstet Gynecol Scand* 76 : 324-331, 1997
- 22) Rasmussen O, Christiansen J, Teitzschner T et al : Pudendal nerve function in idiopathic fecal incontinence. *Dis Colon Rectum* 43 : 633-637, 2000
- 23) Williams : Faecal incontinence. Edited by Kumar D, David J, Waldron DJ et al : Clinical measurement in coloproctology. First edition. Springer-Verlag, London, 1991, p109-115

Pathophysiological Study on Terminal Motor Latency in the Pudendal Nerve for Ulcerative Colitis after Ileal J Pouch-Anal Anastomosis with or without Soiling

Ryouichi Tomita^{1,2}, Tarou Ikeda¹, Shigeru Fujisaki¹, Eichi Park¹,
Katuhisa Tanjoh¹ and Masahiro Fukuzawa¹

¹First Department of Surgery, Nihon University School of Medicine

²Department of Surgery, Nippon Dental University

Fifteen patients with ulcerative colitis after total colectomy, mucosal proctectomy, and ileal J pouch-anal anastomosis were neurophysiologically studied and compared with 16 healthy controls (A group ; 10 men and 6 women, aged 18 ~ 50 years with a mean age of 38.9 years) All of 15 patients (10 men and 5 women, aged 22 ~ 57 years with a mean age of 40.2 years) were divided into 3 groups (Group B ; 5 patients without soiling, Group C ; 5 patients with soiling at watery diarrhea, Group D ; 5 patients with soiling every day). The latency of response in the external anal sphincter muscle following digitally directed transrectal pudendal nerves (pudendal nerve terminal motor latency ; PNTML) was measured. Following results were obtained. 1) The conduction delay of bilateral PNTML was significantly longer in group D than that in group A, B, and C ($p < 0.01$, respectively) 2) The conduction delay of bilateral PNTML was significantly longer in group C than that in group A and B ($p < 0.05$, respectively) 3) The conduction delay of bilateral PNTML in group B was longer than that in group A. But there was no significant difference between the group A and B. These findings support the hypothesis that the conduction delay of PNTML in the patients with UC may be caused by surgical damage to pudendal nerves. The degree of the conduction delay of bilateral PNTML correlated well with the symptom of soiling.

Key words : ulcerative colitis, ileal J pouch-anal anastomosis, pudendal nerve motor terminal latency, soiling, pathophysiology

[*Jpn J Gastroenterol Surg* 34 : 1582-1586, 2001]

Reprint requests : Ryouichi Tomita Department of Surgery, Nippon Dental University
2-3-16 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8158, JAPAN