腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の1例

千本病院外科, 大阪市立大学大学院腫瘍外科学講座*

須浪 毅 金村 洙行 大平 雅一* 楊 大鵬

症例は67歳の女性。主訴は腹部膨満感。腹部CT, 腹部USにて多量の腹水を認め, 精査目的にて入院となる。腹水穿刺にて血性腹水を認め, 細胞診にてclass V(異型腺細胞を認める)であった。腫瘍マーカーではCA125が高値であった。精査にて上部・下部消化管, 卵巣, 子宮に異常を認めず。微小卵巣癌による癌性腹膜炎あるいは腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の術前診断にて開腹手術を施行した。多量の血性腹水と腹膜・腸間膜に多数の小結節を認め, 大網は硬い腫瘍塊を形成していた。卵巣は正常大であった。大網および両側子宮付属器切除術を施行した。腫瘍は大網の表面および内部に広範に認められ, 組織学的所見は卵巣漿液性乳頭状腺癌に酷似した所見を呈しているものの, 卵巣には表層に癌浸潤を認めるのみであった。以上より, 腹膜原発漿液性乳頭状腺癌と診断された。術後5か月後の現在も外来にてcarboplatin, paclitaxel 併用による化学療法を施行中である。

はじめに

腹膜原発の表在性漿液性乳頭状腺癌は, 卵巣の漿液性乳頭状腺癌に類似した組織像を示すものの, 卵巣には原発巣と思われる腫瘍を認めず, 腹膜表面の播種性病変が目立つ予後不良な疾患である。今回我々は, この比較のまれな腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の1例を経験したので, 若干の文献的考察を加えて報告する。

症 例

患者: 67歳, 女性

主訴: 腹部膨満

既往歴: 特記すべきことなし。

現病歴: 2002年6月下旬より腹部膨満感を自覚。当院内科を受診し腹部CT, 腹部USにて腹水を指摘され, 精査目的にて7月8日入院となった。入院時現症: 身長146cm, 体重43kg。栄養状態やや不良。貧血, 黄疸認めず。体表リンパ節を触知せず。胸部には異常認めず。腹部は膨満し波動を認めたが, 肝・脾および腫瘤を触知しなかった。また, 直腸診にて異常認めなかった。

Fig. 1 Abdominal CT showed massive ascites and enhanced swelling of the omentum (arrow)

入院後検査成績

血液検査: 一般検血, 肝機能, 腎機能に異常を認めなかった。

腹部超音波検査: 大量の腹水を認めた。肝臓に1cm大の嚢胞を数個認めたが, その他の臓器に異常認めず。両側卵巣および子宮にも異常を認めなかった。

腹部CT検査: 大量の腹水を認めた。肝臓に嚢胞を数個認めた。大網は肥厚し, 造影CTにて造影効果が認められた。卵巣, 子宮には異常を認めな

Fig. 2 Intraoperative findings. The omentum was swollen and massed.

かった (Fig. 1)。

腹水細胞診：腹水は淡血性，漿液性であった。細胞診にて多数の異型腺細胞が認められ，class V との診断であった。異形細胞はPAS染色陽性，アルシアンブルー染色陽性かつヒアルロニダーゼ処理にても染色性の減弱を認めなかった。また，CEA 陽性であった。

上部消化管造影・内視鏡検査，ならびに注腸造影検査にて異常は認めなかった。

腫瘍マーカー：CA125 4,800U/ml (正常値<35)と高値を認めた。その後，手術までの約1か月間に13,750U/mlまで上昇した。CEA，CA19-9は正常範囲内であった。

また，婦人科を受診するも，子宮および卵巣に異常は指摘されなかった。

CA125の上昇を伴い，腹水の細胞診にて腺癌を認め，消化管および卵巣，子宮に異常を認めないことから，微小卵巣癌による癌性腹膜炎あるいは腹膜原発の表在性漿液性乳頭状腺癌の術前診断にて8月20日手術を施行した。

手術所見：腹部正中切開にて開腹。約1,000mlの淡血性の漿液性腹水を認めた。腹膜および腸管膜全体に白色砂粒大の結節が散在しており，Douglas窩，右横隔膜下には小豆大の不整形な腫

瘍形成を認めた。大網は横行結腸間膜上に硬く不整な，一塊の腫瘍として認められた (Fig. 2)。子宮，両側卵巣は正常大で，その表層にのみ白色の播種状結節が散在して認められた。以上より大網切除術および，子宮付属器摘除術を施行した。

病理組織検査：癌細胞が大網表面および内部に広範に充実性あるいは乳頭状に増生しており，腺管構造も認められた。腫瘍間質には砂粒体 (psammoma body) も多数存在し，卵巣漿液性乳頭状腺癌に酷似した所見を呈していた (Fig. 3)。卵巣には同様の組織像を示す腫瘍細胞が，主にその表面に認められるほか，わずかに卵巣実質にも腫瘍細胞の浸潤が認められるのみであった。免疫組織染色では上皮系マーカーである keratin, Ber-EP4 が共に強陽性，間葉系マーカーである vimentin, HBME-1 ともに陰性であった (Fig. 4)。

腹水細胞診の結果も考慮して，最終的に腹膜原発漿液性乳頭状腺癌と診断した。

術後経過：手術後，腹水は認めず，腫瘍マーカーはCA125 455U/mlに低下した。術後10日目よりcarboplatin 5AUC (300mg/body)，paclitaxel 175 mg/m²による化学療法を施行。1クール終了時にはCA125 37U/mlと更に低下を認めた。術後5か月の現在も外来にて化学療法を継続中である。

考 察

腹膜原発の漿液性乳頭状腺癌は，卵巣の漿液性乳頭状腺癌に類似した組織像を示すものの，卵巣には原発巣と思われる腫瘍を認めず，腹膜表面の播種性病変が目立つ予後不良な疾患である。本邦では，1985年以降現在までに，論文として報告されているのは，60例あまりと比較的まれな疾患である。

現在，その発生起源については2つの説が唱えられている。ひとつは，腹膜のMüller管上皮への化生性変化に基づいて腫瘍が発生するとの説である¹⁾。もうひとつは，本疾患が生物学的，組織学的に卵巣癌に類似していることから，骨盤内，腹腔内，後腹膜などでまれに認められる多卵巣を母地として腫瘍が発生するとの説であるが²⁾，前者の説が有力とされている。

悪性中皮腫が男性に多いのに対し，本疾患の本

Fig. 3 Low power view of tumor showing papillary (a) and tubular structure, and some psammoma bodies (b)(H.E. $\times 100$)

Fig. 4 Immunohistochemical staining. Tumor cells stained positive for (a) Ber-EP4, (b) keratin, and negative for (c) vimentin, (d) HBME-1.($\times 100$)

邦報告例はすべてが女性である．特に閉経期以降に好発するとされており，平均年齢は 60 歳前後との報告が多い．症状は腹水貯留による腹部膨満感が最も多い³⁾．

画像所見では，腹水が約 70% の症例で認められるほか，Douglas 窩，腸骨窩，付属器周辺などに高低の density の混在した像や，石灰化をともなう

腫瘍像が認められる場合もある．また，癌性腹膜炎の状態を反映して，自験例の様に大網の肥厚や density の上昇が認められることもある⁴⁾．

腹水細胞診は癌性腹膜炎の診断には有用であるが，反応性中皮細胞，悪性中皮腫細胞，腺癌細胞を細胞診によって鑑別することはしばしば困難であり，組織診断と同様に免疫組織学的診断が試み

られている⁵⁾。自験例では、細胞診にて多数の異型腺細胞が認められ、PAS 染色陽性、アルシアンブルー染色陽性かつヒアルロニダーゼ処理にても染色性の減弱を認めなかったことから、術前に中皮腫の可能性を否定することができた。

血清腫瘍マーカーは、卵巣癌と同様に CA125 や CA72-4 の陽性率が高く、本疾患の診断、治療、経過観察に有用であるとされている^{3,4)}。自験例でも CA125 が高値であり、手術および化学療法による治療効果をよく反映していた。

診断基準については 1993 年に Gynecologic Oncology Group が次のように定めている。すなわち、両側卵巣は正常大～良性腫大であり、卵巣外の浸潤部位は卵巣表面の浸潤より大きく、組織学的に卵巣の浸潤は表層上皮に限局するか、5×5 mm 以下の髄質浸潤であり、主に漿液性であるか卵巣漿液性乳頭状腺癌に類似していること、とされている⁶⁾。自験例はこの診断基準を満たすものであった。

確定診断には一般に試験開腹にて組織を採取し、組織学的に十分検討する必要がある。近年は、中皮腫においてではあるが、腹腔鏡下に針生検や切除生検を行い確定診断されたとの報告も認められ^{7,8)}、有用であると思われる。組織像は卵巣の漿液性腺癌と基本的に同様であり、著明な核異型を示す小型の腫瘍細胞が狭細な間質を伴う乳頭状構造を呈する。また部分的に、乳頭状構造が著明でなく充実性に増殖する低分化の部分がしばしば混在し、腫瘍間質には砂粒体 (psammoma body) が高頻度に認められる⁹⁾。

鑑別診断上、特に問題となるのは、上皮型のびまん性悪性中皮腫である。従来、本疾患の診断は、砂粒体が多く認められること、PAS 染色陽性の中性粘液の存在、ヒアルロン酸産生能の欠如のほか、電顕所見などから総合的になされてきた¹⁰⁾。最近はこのに加え、腺癌の多くで陽性となる Leu-M1、CEA、Ber-EP4 などの上皮系マーカーと、逆に中皮種で陽性となる vimentin、calretinin、HBME-1 などのマーカーによる免疫組織化学的所見を組み合わせることで診断されることが多い^{11)~13)}。特に Ber-EP4 と vimentin あるいは calretinin との組

み合わせが鑑別に有用であるとの報告が見られる^{11)~14)}。自験例では腹水細胞診の所見、光顕所見に加え、免疫組織化学染色にて keratin 強陽性、Ber-EP4 強陽性、vimentin 陰性、HBME-1 陰性であったことから、最終的に腹膜原発漿液性乳頭状腺癌と診断した。Ber-EP4、vimentin の組み合わせは自験例でも鑑別に有用であった。

治療は卵巣癌に準じて、cytoreduction surgery の後 platinum-based chemotherapy が行われている⁹⁾。この場合の cytoreduction surgery とは腫瘍の浸潤・転移巣は積極的に臓器合併切除を行い、残存腫瘍の縮小を目指すものであり、癌性腹膜炎の状態に施行される術式としては卵巣型の腫瘍に特異的と言える¹⁵⁾。その背景には、手術後の残存腫瘍量が重要な予後因子であると考えられている点があり、術後の残存腫瘍径が 2cm 以下の群は 2 cm 以上の群よりも予後が良好であるとした報告が散見される^{16,17)}。原ら⁴⁾は、腹膜原発漿液性乳頭状腺癌 8 例について検討し、その骨盤・傍大動脈リンパ節転移所見から、卵巣癌に類似した進展形式を有しているとして、子宮全摘術および両側付臓器摘出術と骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術が必要であると述べている。今回我々は、子宮に異常を認めず、骨盤・傍大動脈リンパ節にも腫大を認めなかったことから、大網腫瘍切除と両側子宮付属器切除のみを施行したが、2cm 以上の残存腫瘍は認めず、optimal cytoreduction surgery がなされたものとする。また、近年の化学療法の進歩に伴い、neoadjuvant chemotherapy の有用性が認められるようになってきている^{18,19)}。しかし、確定診断が得られていることが前提であり、前述の腹腔鏡下生検が今後ますます有用となってくるものと思われる。

予後は III 期以上の卵巣漿液性腺癌と同様に、概して不良との報告が多いが^{20,21)}、長期生存例も存在しており³⁾、適切な治療がなされれば予後が改善できる余地のある疾患であると思われる。そのためにも、原発巣不明の癌性腹膜炎の患者を認めた場合、本症も念頭におく必要があるとおもわれた。

文 献

- 1) August CZ, Murad TM, Newton M : Multiple focal extraovarian serous carcinoma. *Int J Gynecol Pathol* 4 : 11 23, 1985
- 2) Gooneratne S, Sassone, M Blaustein LM et al : Serous surface papillary carcinoma of the ovary : A clinicopathologic study of 16 cases. *Int J Gynecol Pathol* 1 : 258 269, 1982
- 3) 神谷 諭, 寺崎正起, 岡本恭和ほか : 腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の1例 . 日臨外会誌 61 : 1309 1314, 2000
- 4) 原 洋子, 晴山仁志, 酒井慶一郎ほか : 腹膜原発の表在性漿液性乳頭状腺癌の臨床的検討 . 日産婦会誌 52 : 626 630, 2000
- 5) Motoyama T, Watanabe T, Okazaki E et al : Immunohistochemical properties of malignant mesothelioma cells in histologic and cytologic specimens. *Acta Cytol* 39 : 164 170, 1995
- 6) Bloss J D, Liao S-Y, Buller R E et al : Extraovarian peritoneal serous papillary carcinoma ; A case-control retrospective comparison to papillary adenocarcinoma of the ovary. *Gynecol Oncol* 50 : 347 351, 1993
- 7) 小関治美, 佐藤重信, 大滝隆子ほか : 腹腔鏡下細胞診にて診断しえた腹膜原発の悪性中皮腫の1例 . 消内視鏡の進歩 31 : 401 404, 1987
- 8) 小谷泰一, 世小田健, 斉藤公正ほか : 悪性腹膜中皮腫の1例 . 三重医 38 : 297 299, 1995
- 9) 土岐利彦, 小西郁生 : 腹膜の悪性腫瘍 . 薬師寺道明編 . 新女性医学大系 . 36 巻 . 中山書店 , 東京 , 1999, p347 357
- 10) 成松昭夫, 岡田 理 : Pseudo-Meigs 症候群をともなった腹膜原発漿液性乳頭状腺癌の1例 . 日産婦会誌 51 : 1179 1183, 1999
- 11) 山崎輝行, 波多野久昭, 鈴木章彦ほか : Normal-sized ovary carcinoma syndrome, 14 例の病理組織学的解析 . 日産婦会誌 47 : 27 34, 1995
- 12) Sheibani K, Shin S S, Kezirian J et al : Ber-EP4 antibody as adiscriminant in the differential disgnosis of malignant mesothelioma versus adenocarcinoma. *Am J Surg Pathol* 15 : 779 784, 1992
- 13) Philip B C, Robert H Y, Robert E S et al : Malignant mesotheliomas presenting as ovarian masses ; A report of nine cases, including two primary ovarian mesotheliomas. *Am J Surg Pathol* 20 : 1067 1080, 1996
- 14) Claudio D, Angelo PDT, Licia L et al : Calretinin : A novel immunocytochemical marker for mesothelioma. *Am J Surg Pathol* 20 : 1037 1046, 1996
- 15) 磯西成治 : 婦人科がん診療の Latest Information ; 卵巣癌治療の最新情報 . 癌と化療 29 : 1351 1357, 2002
- 16) Taus P, Petru E, Gucer F et al : Primary serous papillary carcinoma of peritoneum : a report of 18 patients. *Eur J Gynaecol Oncol* 18 : 171 172, 1997
- 17) Ben-Baruch G, Sivan E, Moran O et al : primary peritoneal serous papillary carcinoma : a study of 25 cases and comparison with stage III-IV ovarian papillary serous carcinoma. *Gynecol Oncol* 60 : 393 396, 1996
- 18) Mayer AR, Chambers SK, Graves E et al : Ovarian cancer staging : Does it require a gynecologic oncologist? *Gynecol Oncol* 47 : 223 227, 1992
- 19) 豊田進司, 平野佳成, 谷川拓男ほか : CDDP が著効した表面漿液性腹膜腺癌 (SSPC) の1症例 . 産婦の進歩 49 : 116 119, 1997
- 20) 小西光長, 吉田益美, 越山雅文ほか : 原発性腹膜腺癌と考えられる6例の初回治療に関する臨床的考察 . 産婦の進歩 50 : 195 200, 1998
- 21) Millis SE, Andersen WA, Fechner RE et al : Serous surface papillary carcinoma ; A clinicopathologic study of 10 cases and comparison with stage III-IV ovarian serous carcinoma. *Am J Surg Pathol* 12 : 827 834, 1988

A Case of Peritoneal Serous Papillary Carcinoma

Takeshi Sunami, Mizuyuki Kanemura, Masaichi Ohira* and Yang Ta-peng

Department of Surgery, Senbon Hospital

Department of Surgical Oncology, Osaka City University Graduate School of Medicine*

A 67-year-old woman reporting abdominal fullness was found in abdominal ultrasonography (US) and computed tomography (CT) to have massive ascites. She was admitted for further examination. Ascites were serobloody and the result of cytology was class V (atypical adenocytes) . Serum CA125 was elevated. Abnormal findings were not seen in the gastrointestinal tract, uterus, or ovaries. Surgery was done under a diagnosis of peritoneal carcinomatosis of ovarian cancer, or peritoneal serous papillary carcinoma. We found gross ascites, many disseminated nodules on the peritoneum and mesenterium, and a hard tumor on the omentum. Bilateral ovaries were normal in size and shape. We conducted omentectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. Histological examination showed cancer cells extensively on the surface and inside the omentum, with findings resembling typical ovarian serous carcinoma, but the tumor invaded only the surface of the ovaries. The final diagnosis was peritoneal serous papillary carcinoma. After surgery, she underwent a combination chemotherapy of carboplatin and paclitaxel.

Key words : peritoneal serous papillary carcinoma, peritoneal carcinomatosis, CA125

[Jpn J Gastroenterol Surg 36 : 1321 1326, 2003]

Reprint requests : Takeshi Sunami Department of Surgery, Senbon Hospital

1 1 31 Matsu, Nishinari-ku, Osaka, 557 0034 JAPAN