症例報告

膵 macrocystic serous cystadenoma の1例

郡上市民病院外科, 岐阜赤十字病院外科*, 岐阜大学医学部高度先進外科**

二村 直樹 鬼束 惇義* 山田 卓也** 関野 考史**
松尾 浩** 宮原 利行** 木山 茂**

単房性嚢胞の形態をした macrocystic serous cystadenoma (以下, MSCA) の1例を経験したので報告する. 患者は26歳の女性で腹部腫瘤を主訴に受診し, 左季肋下に径約5cm大の腫瘤を触知した. 膵炎や腹部外傷の既往はなく, 血液検査では異常を認めなかった. 腹部超音波検査, CT, MRI では膵尾部に径約5cm大の単房性嚢胞状腫瘤を認めた. ERP では主膵管と嚢胞の交通は認めなかった. 腹部血管造影検査では脾動脈が頭側へ圧排されていた. 膵粘液性嚢胞腺腫を疑って手術を行った. 膵尾部に手拳大の嚢胞状腫瘤を認め, 膵尾部切除を行った. 摘出標本では60×55×45mm大の単房性嚢胞を認め, 内容は黄色透明な漿液であった. 病理組織検査では単房性の嚢胞で, 嚢胞壁には異型のない1層の立方上皮がみられた. 立方上皮は periodic acid-shift 染色が陽性で, ジアスターゼによって消化された. 以上の所見から, MSCA と診断した.

はじめに

膵臓の漿液性嚢胞腺腫 (以下, SCA) の典型例は小さな嚢胞の集簇から成る蜂巣状腫瘤であり, 嚢胞径は2cmまでである¹⁾. 比較的大きな嚢胞が目立つ非典型的な SCA は macrocystic serous cystadenoma²⁾ (以下, MSCA) とされているが, まれである.

今回, 単房性嚢胞の形態をした MSCA の1例を経験したので報告する.

症 例

患者: 26歳, 女性

主訴: 腹部腫瘤

家族歴: 特記すべきことなし.

既往歴: 特記すべきことなし. 膵炎や腹部外傷の既往はない.

現病歴: 1997年6月に腹部腫瘤に気づき, 近医を受診した. 腹部超音波検査, 腹部CTで膵臓の嚢胞性腫瘤を疑われ, 当院に紹介された.

入院時現症: 左季肋下に径約5cmで表面平滑,

弾性硬の腫瘤を触知した.

血液検査: 末梢血液検査, 生化学検査, 腫瘍マーカー (CEA, CA19-9) に異常を認めなかった.

腹部超音波検査: 膵尾部に径約5cm, 球形の腫瘤を認めた. 内部は無エコーで後方エコーの増強を認めた. 内部に隔壁や隆起を認めなかった (Fig. 1).

CT: 膵尾部に5.0cm大の内部均一な腫瘤を認めた (Fig. 2). 造影CTで嚢胞壁は造影されなかった.

MRI: 膵尾部に径約5cm大の内部均一な腫瘤を認めた. T1強調画像で low intensity, T2強調画像で high intensity であった (Fig. 3).

ERP: 主膵管は膵尾部で圧排による屈曲を認めた. 嚢胞との交通は認められなかった.

腹部血管造影検査: 腹腔動脈造影検査で脾動脈が頭側へ圧排されていた. 血管の増生, encasementなどを認めなかった.

鑑別診断として膵粘液性嚢胞腺腫, 仮性嚢胞, 真性嚢胞などが考えられた. 膵炎や外傷のない若年女性に発生し, 膵管との交通を認めない膵尾部単房性嚢胞のため, 膵粘液性嚢胞腺腫を疑って手

<2006年1月25日受理>別刷請求先: 二村 直樹
〒501-4222 郡上市八幡町島谷1264 郡上市民病院外科

Fig. 1 Abdominal ultrasonography showed a 5.0-cm, unilocular cystic mass in the tail of the pancreas.

Fig. 2 Abdominal computed tomography showed a 5.0-cm, unilocular cystic mass in the tail of the pancreas.

術を行った。

手術所見：嚢胞部以外の膵臓は軟らかく、周囲との癒着も認めなかった。脾臓は温存して膵尾部切除を行った。

摘出標本：60×55×45mm大の嚢胞を認め (Fig. 4A)，内容は肉眼的に黄色透明な漿液であった。剖面では壁の薄い単房性嚢胞で嚢胞内に隔壁や隆起性病変を認めなかった (Fig. 4B)。嚢胞液の検査ではアミラーゼ 121IU/l，リパーゼ 31U/l，CEA0.1 以下ng/ml，CA19-9 173U/mlであった。

病理組織学的検査所見：単房性の嚢胞で、嚢胞壁には異型のない1層の立方上皮がみられた。嚢胞周囲にのみ線維化がみられたが、その他の膵臓

Fig. 3 Abdominal magnetic resonance imaging. A : T1-weighted image showed a low-intensity, unilocular cystic mass in the tail of the pancreas. B : T2-weighted image showed a high-intensity, unilocular cystic mass.

には炎症所見はみられなかった。立方上皮は periodic acid-shiff (以下、PAS) 染色が陽性でジアスターゼによって消化された (Fig. 5)。これらの所見から macrocystic serous cystadenoma と診断した。

術後経過は良好で、術後第 15 病日に退院した。

考 察

1992 年に Lewandrowski ら²⁾は、SCA において 径 2cm 以上の嚢胞を macrocyst と考え、macro-cyst が主体の非典型的な SCA を MSCA として報告した。

「macrocystic」をキーワードとして医学中央雑誌、PubMed を用いて 1992 年～2004 年までの検索を行った。そこで得られた MSCA の論文とそれらの論文の文献から MSCA の本邦報告例を集計した。報告例には最も大きな嚢胞の径が 2cm 未満の症例でも MSCA として報告されていたため、今回の集計では Lewandrowski ら²⁾の報告に従っ

Fig. 4 Resected specimen. A : The resected tumor was a 6.0×5.5×4.5 cm sized cystic mass. B : Cut section of the resected specimen revealed a unilocular cyst with a thin wall.

て、2cm以上の大きな嚢胞が主体のSCAをMSCAとして集計した。MSCAの本邦報告例は自験例を含めて16例であった^{3)~17)}。性別は男性6例、女性10例で、年齢は26~71歳、平均55.1歳であった。部位は頭部5例、体部8例、尾部3例であった。病変部の大きさは2.7~7cm、平均4.7cmであった。画像所見では単房性が2例、多房性が12例であり、画像検査所見で単房性の1例は標本の肉眼検査所見、病理組織検査で多房性であった。病理組織検査では単房性1例、多房性13例であり、ほとんどの症例で大きな嚢胞の周囲に微小

Fig. 5 Microscopic examination of the specimen. A : The cyst was lined with a single layer of cuboidal epithelium (HE, ×200). B : PAS staining was positive in the cytoplasm of the epithelium (×200).

嚢胞の集簇を認めた。単房性であったのは本例のみであった。病理組織検査では全例に嚢胞壁に立方上皮がみられ、11例に細胞質にglycogenが豊富であることが記載されている。単房性や比較的大きな嚢胞の集簇であるため、術前診断では粘液性嚢胞腫瘍が最も疑われており、漿液性嚢胞腺腫と診断した症例は4例⁵⁾⁸⁾¹³⁾¹⁴⁾であった。画像診断には超音波内視鏡検査によって微小嚢胞の集簇を検出することが有用と報告されている¹³⁾¹⁴⁾。Cohen-Scaliら¹⁸⁾は単房性嚢胞におけるMSCAと仮性嚢胞・粘液嚢胞腺腫のCT上の鑑別点について、1) 臍頭部に存在すること、2) 分葉状の形状、3) 嚢胞壁が造影されないこと、4) 嚢胞壁が薄いこと(2mm以下)の4点を挙げ、1), 2), 3)はMSCAに特異性の高い所見であった。4点中2点を認める症例はMSCAの83%、仮性嚢胞・粘液嚢胞腺腫の14%であり、4点中3点以上を認める症例は

100% で MSCA であったと報告している。本例は囊胞壁が造影されないこと、囊胞壁が薄いことの2点を認めた。

本症例は若年女性で、膵炎や外傷の既往がなく、膵尾部に発生した単房性囊胞であり、膵管との交通も認められなかった。これらの所見から術前には膵粘液性囊胞腺腫を疑った。標本の肉眼検査所見では単房性囊胞で、内容は黄色透明な漿液であった。病理組織検査では単房性囊胞で単層の立方上皮がみられ、MSCA や solitary true cyst (以下、STC) を疑った。腫瘍細胞の細胞質に豊富なグリコーゲンが証明されたため、MSCA と診断した。

成人の STC は、2001 年に Takahashi ら¹⁹⁾が自験例 1 例と英語文献から合計 12 例を集計している。STC はまれな疾患と考えられるが、膵臓の単房性囊胞は経過観察されている可能性も考えられる。STC は単房性の囊胞で、病理組織検査では囊胞壁に立方上皮がみられる。立方上皮は PAS 染色が陰性であり、この点で MSCA と鑑別される。成人の STC の報告例で PAS 染色が行われているのは 4 例と少なく¹⁹⁾、STC として報告された症例に MSCA が含まれる可能性が示唆される。

Macrocystic SCA はまれな疾患であり、画像診断で MCN が疑われる症例においても本疾患を念頭におくことが重要である。画像診断や病理組織検査で微小囊胞が確認されれば本疾患を強く疑うことが可能である。単房性の場合、本疾患を疑うことは困難であるが、単房性膵囊胞の鑑別診断でも念頭におく必要があると考えられた。

文 献

- Compagno J, Oertel JE : Microcystic adenomas of the pancreas (glycogen-rich cystadenomas). A clinicopathologic study of 34 cases. *Am J Clin Pathol* **69** : 289—298, 1978
- Lewandowski K, Warshaw A, Compton C : Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas. A morphologic variant differing from microcystic adenoma. *Hum Pathol* **23** : 871—875, 1992
- Mori K, Takeyama S, Hirose H et al : A case of macrocystic serous cystadenoma of the pancreas. *Int J Pancreatol* **17** : 91—93, 1995
- 山名大吾, 南部一郎, 大竹正一郎ほか : Macrocystic type の膵漿液性囊胞腺腫の 1 例. *臨放線* **40** : 625—627, 1995
- 伊藤史人, 世古口努, 松本英一ほか : Macrocystic な形態を示した膵漿液性囊胞腺腫の 1 例. *胆と膵* **17** : 403—408, 1996
- 松能久雄, 佐々木恵子, 小西二三男ほか : 膵漿液性囊胞腺腫の大細胞亜型の 1 例. *病理と臨* **14** : 523—527, 1996
- Kamisawa T, Egawa N, Ishiwata J et al : Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas. *Dig Endosc* **9** : 296—299, 1997
- 伴 雅彦, 堀口祐爾, 今井英夫ほか : 非典型的な画像所見を呈した膵漿液性囊胞腺腫の 1 例. *膵臓* **12** : 39—45, 1997
- 高畑俊一, 井上重隆, 山口幸二ほか : macrocystic な形態を呈した膵 serous cystadenoma. *胆と膵* **18** : 1082—1083, 1997
- Inoue S, Yamaguchi K, Shimizu S et al : Serous cystadenoma of the pancreas with atypical imaging features : a new variant of serous cystadenoma of the pancreas. *Pancreas* **16** : 102—106, 1998
- 蒲地紀之, 村中 光, 安森弘太郎ほか : 非典型的な MRI 所見を呈した Macrocystic type の膵漿液性囊胞腺腫の 1 例. *胆と膵* **20** : 711—715, 1999
- Fujiwara H, Ajiki T, Fukuoka K et al : Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* **7** : 92—96, 2000
- Kaneto H, Endo T, Ozeki I et al : Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas : importance of co-existent tiny cysts depicted by EUS. *J Gastroenterol* **35** : 472—475, 2000
- 若林時夫, 高橋志郎, 川浦幸光ほか : Macrocystic な形態を呈した漿液性膵囊胞腺腫の 1 例. *消画像* **2** : 5—7, 2000
- 中村雄太, 乾 和郎, 芳野純治ほか : 漿液性囊胞腺腫 (Macrocystic type) の 1 例. *胆と膵* **21** : 766—767, 2000
- Kobayashi T, Kawabe A, Uenoyama S et al : Macrocystic serous cystadenoma of the pancreas : case report. *Abdom Imaging* **26** : 69—71, 2001
- Hashimoto M, Watanabe G, Miura Y et al : Macrocystic type of serous cystadenoma with a communication between the cyst and pancreatic duct. *J Gastroenterol Hepatol* **16** : 836—838, 2001
- Cohen-Scali F, Vilgrain V, Blancatelli C et al : Discrimination of unilocular macrocystic serous cystadenoma from pancreatic pseudocyst and mucinous cystadenoma with CT : initial observations. *Radiology* **228** : 727—733, 2003
- Takahashi O, Kondo S, Hirano S et al : Solitary true cyst of the pancreas in an adult. *Int J Gastrointest Cancer* **30** : 165—170, 2001

A Case of Macrocystic Serous Cystadenoma of the Pancreas

Naoki Futamura, Atsuyoshi Onitsuka*, Takuya Yamada**, Takashi Sekino**,
Hiroshi Matsuo**, Toshiyuki Miyahara** and Shigeru Kiyama**

Department of Surgery, Gujo City Hospital

Department of Surgery, Gifu Red Cross Hospital*

Department of Advanced Surgery, Gifu University School of Medicine**

We report a case of macrocystic serous cystadenoma (MSCA) presenting as a unilocular cyst. A 26 year-old woman with a fist-sized mass in the left hypochondrium had no past history of pancreatitis or abdominal trauma. Laboratory data showed no significant abnormalities. Abdominal US, CT, and MRI showed a 5.0-cm, unilocular cystic mass in the tail of the pancreas. Endoscopic retrograde pancreatography showed no communication between the main pancreatic duct and the cyst. Abdominal arteriography showed displacement of the splenic artery. Surgery conducted under a diagnosis of mucinous cystadenoma of the pancreas and showed a fist-sized cystic tumor in the tail of the pancreas, necessitating resection of the tail of the pancreas. The resected 6.0×5.5×4.5cm sized unilocular cystic mass contained yellow serous fluid. On microscopic examination, the cyst was lined with a single layer of cuboidal epithelium. Periodic acid-Shiff staining, with and without diastase digestion, showed abundant glycogen within epithelial cells, yielding a definitive diagnosis of MSCA.

Key words : serous cystadenoma, macrocystic, pancreatic cyst

[Jpn J Gastroenterol Surg 39 : 1403—1407, 2006]

Reprint requests : Naoki Futamura Department of Surgery, Gujo City Hospital
1264 Shimatani, Hachiman-cho, Gujo, 501-4222 JAPAN

Accepted : January 25, 2006