論 説

景 観 と 生 態

——植物地理学と人文地理学についての考察(1)——

野 間 三 郎

この前に私は「地域計画の理念と景観」(立命館文学, 第87号, 昭和27年8月)なる題目で、植物地理学の方法の変化と人文地理学の進展の間に密接な関連のあることを指摘した。もともとこの両者の間に深い関連のあることは誰の目にも明かなことであり、特にブラーシュが人文地理学の健全な進歩の為に植物地理学の方法に顧みるところがなければならぬことを力説していることは忘れることの出来ぬものがある (La Géographie humaine, les rapports de la géographie humaine avec la géographie de la vie. Revue de Synthèse historique, 1903)。我が飯塚教授はこれをブラーシュ, 人文地理学原理 (上下二巻, 岩波文庫, 昭和15年) の巻末に附録として訳載されたので、「人文地理学——それと生物地理学との関係」という貴重な一文を自由に読むことの出来る幸福を我々に恵まれた。のみならず、教授は多くの機会にこのことを述べられて、地理学史の黄金時代の解釈に一つの確実な拠所を与えられ、近くはこれが一つとなって「人文地理学説史」(昭和24年, 日本評論社刊), 「地理学批判」(昭和22年, 帝国書院) 中に収められてある。

又辻村博士は絶えざる努力と偏頗ない注意によって海外における地理学の足跡をその時々丹念に記録して下さっているから、博士の多くの著書論文並に地理学評論を飾った多くの新刊紹介の中に、この様な両者の関聯を探るべき拠所を与えて下さっている。

けれども我々には尙多く明にすべき問題が残されている様に思われる。飯塚教授のなされた所は、これからも私の文中に屢々現われるだろうが、ラツェル, ブラーシュにおける人文地理学の生物地理学との関連を地理学史上の問題として取上げられ、そうして今日の問題としては、生態学の地理学における進出に注目して、地理学の今後の進路としてその性格規定を試みられた。これは必ずしも正確な表現ではないか

も知れないが、先ずその様なものと考えられる。

近年アメリカを中心として「人類の生態学としての地理学」が唱えられるに至った。これは明白にその素性が植物地理学（一般に生態学）にあることをその名に於て明にしている。

然しブラーシュ（彼が論及した植物地理学者はシンパー）と人類生態学をつなぐ間の期間は果してどうであろうか。この両者の間をつなぐ期間に於る景観地理学は如何なる地位を占めるものであろうか。私は前の論文に於て景観地理学が、従来指摘されたことは先ずないと管見の私には思われるのだが、植物地理学の人文地理学への一種の適用であることを述べたつもりである。唯私が植物地理学と景観地理学の双方に対して充分な知識を所有していない為に、明白な、積極的な表現を差控えたけれども、意図はそこにあった。そうして又、必ずしも地理学の領域にとちこめられるべきではないけれども、T.V.A., 自然改造計画などの巨大なる建設事業も、植物地理学に関連して生じた問題であることを考えたのであった。

然し翻って考えてみると、地理学は常に植物地理を中心として展開して来ている。少くとも私はそう考える。人文地理学の植物地理学（生物地理学、或は生物学）との関連はラッツェル、ブラーシュ或は人類生態学に限るものではない。極言すれば、テオフラストスの昔からそうであったと言うべきであろう。

一体テオフラストスは師アリストテレスの陰にかくれてしまっているけれども、哲学史上にも、科学史上にも近年次第にその意義が高く評価され来りつつある様に思われる。植物地理学の祖としての彼は、環境を論じたものとして、最初に地理学の中心問題に接近したものとして採上げらるべきだと思われる。その意味に於てテオフラストスを逸して述べられた地理学史には私は常に遺憾を感じている。環境と人類の問題、植物地理学と人文地理学の関連、これは人文地理学の発達史において重要な骨格を形成し来っていると思われる。その様なものとして、テオフラストスを採上げ、地理学史全体を組織づけることは、私には次の機会がまたれるのである。こゝでは私は、植物生態学と20世紀の地理学に見出される関連について述べるに止る。

もともと生態学 (ecology) なる学問は成立が新しい。その概念も方法も急速に進歩しつつあるし、その関係分野も甚だしく拡大しつつある。従ってこゝには大きな変化が既に今日迄にある。故に私は景観地理学や人類生態学、或は生態学としての人文

地理学の歴史的意義乃至はそれ等と一般に植物地理学との関連を明にする為に、こゝに生態学自身における変化と進展を追ってみたいと思う。これは私が更に次の問題に進む為の一つの前提であり、私自身に対する一つの覚書である。

I

生態学 (Ökologie, ecology) が生物学の内に一個の部門として現われて来るのは凡そ19世紀以来のことである。勿論それらの萌芽の形では古くからあったけれども、やゝ明確な形を帯びるのはこの名称を与えたヘッケル Haeckel, Ernst (1834~1919) に始まるとしてよいであろう。彼は “Generelle Morphologie” 1866, 及び “Natürliche Schöpfungsgeschichte” 1867 に於て有機体の外界との関係を取扱う部門をエコロジ^{エコロジスト}と名付けたとされている。

この学問の進歩発展に於ては植物生態学が主として道を切りひらき、動物生態学がこのあとを追ったことは、観察、実験の便宜から仮に考えとしても容易に理解出来ることであろう。然し植物生態学の進歩の過程においても、もともとそれが諸種の傾向を含んでいることから、ヘッケルにつゞく指標を建てた人及びその著作は多岐にわたるのであるが、これを極く概観するとすれば、ウォーミングとシンパーであろう。シンガーの生物学史 (Charles Singer; A history of Biolog. rev. ed. 1951 p. 279) はこの兩人について次の如く説明を与えている。「生態学者が取扱うべき外界は二つの部門に分たれる。

(a) 自然的条件, 光, 熱, 湿度, 土地

(b) 他の多くの種^{スปีーシーズ}

デンマーク人 E. Warming (1841~1924) の「植物の生態学」(1895) は主として前の問題を取扱った。スイス人 A.F.W. Schimper (1856~1901) の「生理学的基礎に立てる植物地理学」(1898) は後者である。この二つの重要な著作はこの主題を軌道に乗せたものである。——(シンガーが挙げている書名は英訳で不正確であるから、こゝに原書名を示してをくと、ウォーミングの著書は *Plantensamfund, Grundtraek of den økologiske plantegeografi*, 1895 であり、その Knoblauch による独訳は *Lehrbuch der ökologische Pflanzengeographie*, 1896. シンパーの著書は *Pflanzengeographie, auf physiologischer Grundlage*, 1898 である)。

シンガーのこの文は極端に圧縮した形で兩人の地位を示しているが、ブラーシュが

このうちシンパーのみを特に論及するのはかなり興味あるところであろう。八木、野村共編生態学概説、養賢堂 1952は植物生態学の今日に至る発展に於る複雑な現象を巧みに三つの系統に分けて記述している。(同書 7—8 頁)。

それによれば、「まず近代に於る植物生態学の起原をたどってみると、我々は地理学的、自然誌的、生理学的の三つの流れを別々にさかのぼることになる。即ち植物生態学は互に関係を持つことの少い三つの源流を持つのである。」

こうして(1)としては

「昔から温帯から熱帯へ、多雨地から砂漠へと、地球上の種々の異なる環境の地方を旅行してみると、そこに特徴ある相観 (physiognomy) を具えた植物群集を見ることが学者の関心をひき、A.V. Humboldt (1805), Griesbach (1838), Drude (1890) らによって植物生態地理学の道が開かれ、それは遂に Warming (1895), Schimper (1898) らの偉大な業績として大成された。次いで、植物群集と環境との関係の研究に志す群集生態学がこの様な植物生態地理学の業績によって育てられ、それらが中欧に於る Zürich-Montpellier 学派や、Upsala 学派、更に英国及び米国の後継者となったことを記している。そして「このように、群集の地球上に於る分布の研究のあとに、群集そのものの解析的研究が続いたのが第一の流れである」としている。

第(2)のものとしては

「一方 Koelreuter (1761) や Sprengel (1795) の花部生態学 (Blütenbiologie) に流れを發し、古くから Biologie といわれて続いて来た分野がある。これは Wiesner (1899) の Pflanzenbiologie, Nager (1913) の Bionomie などにより受けつがれるもので、自然誌又は博物学 (natural history) として知られ適応の考えが強く入っており、目的論的な傾向を持つことも多かった。Darwin の種の起原の出たあと、Haeckel が Ökologie と命名した学問には多分にこの線に近いものがあつた。

第(3)のものとして

「生理学的な流れとして、Pfeffer (1882) や Fitting (1917) らの植物生理学者によりつくり出された“野外の生理学”の立場は Lundegardh (1925) の実験生態学となって大成し、環境と植物の生活を論ずる個生態学の中心部を形造つた。」

これは驚くべく明快な把握であるが、実際は互に他の要素を微妙に含みあっていることは当然考えられる。

私は以上の引用によって植物生態学の含む所が多様であり、変化の過程においても多様な形態をとることを示したかった。同時に、景観地理学が相観 (physiognomy) にもとづくものであることをほぼ確であるとするならば、それがやがて生態学に進展するものであることを示すことが出来ればよいのである。

景観地理学が相観 (physiognomy) もしくは一般に植物地理学と有する関連については、私は前の論文において不十分ながら指摘したつもりである。

然し景観なる日本語は植物学においても用いられるが、physiognomy (相観) のみならず Vegetation や Formation などにもその時に応じて用いられ一定の術語でない様な取扱を受けていると思われる。景観という文字は三好博士を通じて植物学より受けたということを辻村博士が述べておられるが (景観地理講話) これは植物学上の術語の何れを指すものであろうか。私の貧弱な現在の知識では植物地理学には Landschaft なる術語は存しない様に思われ、景観地理学と植物地理学の関係を論ずるに当って些か困惑しているところで、この機会に辻村博士の御高教を仰ぐことを得れば甚だ幸である。

三好学博士は同じく (植物) 生態学なる訳語を本邦に於て始められたという (三好学; 欧洲植物学晩近の進歩, 1895)。但しその際、これは Pflanzenbiologie の訳として与えられたのであり、広義の生態にはちがいないけれども今日の Ecology に対してはなかったといわれる (八木, 野村共編; 生態学概説. p. 1)。

もしもそうだとすると景観の文字も恐らくは同様に Physiognomie 或は Ansichten に与えられたのではないかと想像することが一層不自然でなく思えるのである。

II

フムボルト百年記念論文集中に収められたエングラの「植物地理学の発達」 (A. Engler; Die Entwicklung der Pflanzengeographie, in den letzten hundert Jahren und weitere Aufgaben derselben. Sonderabdruck aus der Humboldt-Centenar Schrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1899) は恐らくは19世紀の植物地理学の発達を取扱って最も精緻なものであろう。彼自身偉大な植物生態学者であったエングラが、この学問の生成の時代に生きて、その学問の発展を歴史として把握したこの書物の中から我々は多くの示唆を汲取ることが出来る。それは今日になされたもの、例えば前引の八木, 野村氏の如く明快な歴史的把握を不可能とす

る、時代的・近接の立場に立つものであった。けだし時間と共に消滅し去った様な多くの生態学上の傾向、従って又術語定義が尙残りなく捉えられいるからである。

今日では植物生態学は次第に整理統合されて次の如き三類に分たれるのが普通の様である。即ち

- (1) 個生態学 (autecology), 実験生態学 (experimental ecology)
- (2) 群生態学 (synecology), 植物社会学 (plant ecology)
- (3) 植物生態地理学 (ecological plant geography)

であり、(1) は生理学と最も密接に結びついてをり、(2) の群生態学は群集と環境との関係をも問題にし、植物社会学は植物相互の関係を比較的重視する。(3) は群集の分布を研究する(八木、野村、前掲 p. 4)。

この様に厳密に区分をつけることは一応出来るけれども、実験生態学は個生態学的であるべきだが、群生態学と区別しがたいし、植物社会学と植物生態学の間には必ずしも区別し難いところがあり、更には植物地理学と植物生態学との間にすら必ずしも混交がないとはいへぬ。更に又群生態学が主流を占めんとしつつあるが、この多様な生態学に共通の地盤を与えるものは個生態学である。而もこれら全体を覆う名称としては植物地理学の名が用いられることも多いのである。

さて19世紀の終らんとする当時に植物地理学或は植物生態学はどのような状態にあったであろうか。私は地理学における方法の展開をみその方法の淵源について理解をひき出す為にその必要を感じるのである。

リンネの植物の体系は結局その地上における分布を取扱う場合にせよ種とか属とかに従って個体が取上げられるにすぎない。一定の拡がりをもった地域における植物の集団、フローラを支配している法則は、その様な植物学にとっては手の届かぬ世界である。A.V. Humboldt (*De distributione plantarum secundum Coeli temperiem et altitudinem montium*, 1815) を中心とする多くの著作。これについては拙稿; フムボルト覚書、京都大学文学部地理学研究報告、第2冊昭和14年) によって切開かれた道は Wahlenberg (*Floralapponica*, 1812 etc.) Brown (*General remarks, geographical and systematical on the botany of Terra Australis*, 1814) 等植物学者の手によって新しい展開の道がひらかれた。Humboldt の仕事がちろちろと云えば気候及び植生によって特性づけられ地域を設定することにあつたとすれば、Brown のそ

れは当然植物より出発する方法であつた。一定地域の植物集団が他地域のそれと比較してその有す類似の特質をどこまでも持っているかその地域的拮かりを決するものであつた。

この様にしてエングラーは19世紀の植物地理学の歩みを三つの方向に分類している。(Engler, a. a. O. s. 12) 即ち一つは区系的植物地理学 (Floristische Pflanzengeographie) であり、これは或る地方の Flora を明にし、これを Bezirk や Region 更に群系 Formation に分つものである。第2に生理学的植物地理学であり、これは Flora を形成している植物を、現在の環境よりしてその出現と特質を把握せんとするものである。第3は発展史的植物地理学であり、これは或地域の植物をフローラ及び個体の歴史から理解しようとするものである。

エングラーは19世紀の植物地理学をこの様に把握したが、これを今日の地理学と照し合せてみるとどうであろうか。1は所謂植物地理学、2は植物生態学、3は植物生態学中の群生態学中で特に採上げられている問題とすることが出来るであろう。エングラーの云う第2のもの、生理学的植物地理学が漸次有力となり、分化して今日の如く個生態学及び群生態学となり、植物地理学の主流を形成するに至つたのである。

勿論彼は当時既にこの生理学的植物学の内に含まれた多くの要素を更に明確に規定することが出来た。(Engler, a. a. O. s. 159)

即ち彼はこれを (1) 自然的生理学的 (Physikalisch-physiologisch) (2) 生物体的生理学的 (bionto-physiologisch) (3) 生態的植物地理学 (ökologische Pflanzengeographie) (4) 生理学的植物群系論 (physiologische Pflanzenformationlehre) の四つに分つている。即ち今日言う個生態学乃至は実験生態学が(1)であり、群生態学乃至は植物社会学は(2)である。生態的植物地理学(3)は今日のそれと同じ方向のものであろうが、(4)は群系の成立、その持続と変化の原因を明にするものであり、これは恐らくは群生態学中に今日位置を定める遷移論となるであろう。

我々が古い時代の植物地理学者の特質を把握する為には、或意味においてはこのような古い分類乃至は概念規定にたよることが有利な場合を見出すであろう。

この様な考え方によれば、ヘッケルに次いで生態学を確立するに至つた2人の内、Schimper は自然的生理学的(1)に含まれるものであり、Warming は生態的植物地理学(3) (エングラーはこれを別の場所では生態的生理学的 ökologisch-physiologisch と

呼ぶ)の下に分類さるべき特色を有しているのである。勿論この様に単純な定義で、Schimper を覆うことは不可能である。Warming についても勿論このことは同じである。然し Schimper のかの大著のみについていえばその構成上一応エングラのこの分類に異を称えることが出来ぬと思われる。——シンパーの植物地理学は主要次の如き章節をもっている。第1部要素(水、熱、空気、土地、動物)第2部群系と
ゲノツセンシヤフト 社 ゾーシ 会 第3部 帯と地域——

III

いずれにせよ、景観地理学に於ける地域計測の方法が群集或は群落の構造測定の諸方法の援用であること、これは非常に顕著であることから、景観地理学が広義の植物地理学と結合するものであることは明である。それは所謂 floristische Pflanzengeographie であろうが、又 ecological plant geography ともあり得る所のものであった。このことは、この論文の他の個所に於て、別の観点から指摘したし、私の前論文に於ても論及したところである。その際景観地理学と人類生態地理学とが親近性を有するものであることを述べたのはこの意味である。即ち両者いずれも植物地理学に範をとり、いずれも生態学に方法を学んでいることである。

唯生態学は発展の歴史が浅く、その内に含む性質が多種である。従って景観地理学と人類生態地理学がとつてもつて 拠所とした所は同じ生態学の内にあつても部面が異なる。これは又生態学(植物地理学)の歴史に於て、古い部面を景観地理学が、新しい部面を人類生態学がとつたとも言ふことが出来ると考えられる。一見全くの別種の如く考えられるこの二つの地理学(景観地理学と人類生態地理学)が実は親近であり或意味で連続であり、又並存の性質を有するものであることはこれらによつても知られるであろう。

植物生態学においても、今日では次第に群生態学乃至は植物社会学が中心となり、分布を中心とする狭義の植物地理学乃至は植物生態地理学は異質のものとして植物生態学よりはみ出さんとする傾きもある。地理学における景観と人類生態地理学の与える印象は全く生態学におけるこの両分野の關係に等しいのである。

もともと分布論と環境論は別種のものである。従ってヘッケルが生物とその外囲との關係を追求するものとして Ecology なる学問の設定を要求したとき、Ecology は plant geography とは異なる性質をもつものであった。然し植物分布の記載が更に科学

として一步前進を求め、その実験的方法を採上げたときに所謂環境学(狹義の生態学)が生じたのである。

一方、群落即ち植物社会を取上げる群落学も又、各地における特有の群落の特性を把握する分析に進んできた。然も群落の特性を把握する為には環境学的考察を必要とし、そこに又群(集)生態学(synecology)が生れてくる。

然も環境の中心は個生態学(autecology)乃至は実験生態学(experimental ecology)としてあり、それは植物地理学を支点として成立している。

然も一方では分布を中心とするもの(狹義の植物地理学)と社会、集団を中心とするもの(群生態学)の対立があると共に、その両者の性質を採入れた如き植物生態地理学が結局群集の分布を研究するものとして、環境学との対立を呼起してをる。

かくの如く生態学は甚だ矛盾にみち互に他を排斥すべき諸分野を包含し、而もその各部門は今日では互に他部門の特質を自らの内に導入し、併存を続けている。この併存は論理上の矛盾を意味しながらも、實際上、歴史上併存を要請される性質を有しているのである。

もしそうだとすれば、私はさきに景觀地理学と人類生態学としての地理学との親近を解明したが、更に之の両者は新旧の関係乃至は優劣の関係にあるのではなくして、互に他を補うものとして、併存の性質を有することを主張せねばなるまい。

このことは又地理学における環境論と地域学との問題にも一つの示唆を投げかけるものであろう。そうして又人文地理学において生態学の方法の進歩に歩調を合せつゝある側面を有しながら、環境論においては生態学におけるその進歩に顧りみない矛盾が感じられる。然しそれはいずれ後に論及の機会を得ることであろうから、こゝでは触れない。

以上において私は「人類生態学としての地理学」(例えば Geography; an introduction to human ecology. by White, C.L. & G.T. Renner. 1936. これは後に単に Human geogr. として1951に第2版を出す)と生態学の関係を述べることをしなかった。それはこのアメリカにおける新しい地理学がその名称の上で生態学との結びつきを明に示している故に今のこの論述においては必要としなかった為である。もし、その性質を吟味するとなれば又自ら別問題を生むけれども、アメリカにおける生態学の歴史と共に改めて考察を試みたい。

(立命館大学教授)

English Abstracts

Landscape and Ecology

by Saburo Noma

The Method of Human Geography has close relation to that of Plant Geography. Far from that when Plant Geography had been built up by the botanists, the splendid method has been originated and making the rapid progress.

It was V. de la Brache who took this problem up consciously. Prof. Iizuka emphasised this when he introduced Vidal de la Brache into our country.

The method of Plant Geography is included into that of Human Geography, of which we have not been aware. Since "Geography as Human Ecology" had appeared in America this has been made clear. A current of geography after Plant Geography did not consider this view, and so yet we have many problems about it. Social method and ecological method have been introduced into our geography these years. But it is necessary to understand this tendency with a system of the 20th centuries-geography, I think. The report is a memorandum in relation to this view, which is one of the continuous reports of my "Idea and Landscape of the Areal Plan." (RITSUMEIKAN BUNGAKE, Aug. 1950) I am intending to point out that Landscape Geography and Human Geography do not deny mutually, but are in the same current.

Twice Crops of Rice a Year in Kochi Prefecture

by Osamu Yamazaki

Twice crops of rice a year appeared in the middle of the Edo era now.