副損傷回避のために

頸部郭清術：胸管

神戸大学医学部耳鼻咽喉科教室

毛利 光宏 天津 睦郎

論文要旨

頸部郭清術後、胸管損傷によって生じる乳糜漏はその治療にしばしば難渋する。当科で行っている胸管損傷防止法を、その手術術式を中心に報告した。

胸管をその静脈流入部で確認し、胸管の走行を明らかにすることで胸管の損傷を防ぐものである。まず第一段階は静脈系を静脈角を中心として広範囲に露出することであり、これは頸動脈鞘を開放して内頸静脈に沿って下方に剥離することで達成される。第2段階は胸管を確認し、周囲から胸管に流入するリンパ管を結紮切断しながら弓状をなす胸管の頂上までその走行を明らかにする。

この方法では胸管の走行を明視することで、胸管ぎりぎりまで郭清が可能となること、胸管の保存が可能となること、が特徴である。欠点としては多少時間がかかることだが許容範囲内と考えている。

Key words: 頸部郭清術 (Radical neck dissection), 胸管 (Thoracic duct), 乳糜漏 (Chylous leak), 静脈角 (Venous confluence), リンパ本幹 (Great lymphatic trunks)

1. はじめに

胸管の損傷による乳糜漏は、一旦生じると治療に手間がかかり、低栄養や創傷治癒遅延を招いて稀には不幸な転帰をとることもある重篤な合併症である。頭頸部外科医は左頸部郭清術後にしばしばこれに悩まされる。本合併症については、これまでもその予防法や取扱い法が様々に取り上げられてきた¹⁻⁸⁾。胸管処理の態度としては胸管近くを無理に触らない、あるいは胸管が術野に出てきた場合には結紮をするというものが多くいようである。

本報告では当科で行っている胸管損傷の防止法について、その手術手技を中心に述べたい。

2. 胸管の解剖

胸管は全身のリンパや乳糜を集めて循環血液系に戻す役割を担っている。胸管は第2腰椎のレベルで *cisterna chyli* として始まる。横隔膜の大動脈裂孔を通過した後、後縦郭で大動脈と奇静脈の間を上行する。途中で椎骨を前方を横切って左側に移動し、最終的に左頸部に達して静脈に注ぐ⁹⁾。

頸部では胸管は上方および外側に弓状をなして走行し、椎骨動脈や甲状頸動脈の前方、頸動脈鞘の後方を通過して静脈角に流入する、とされている (図1)。その

途中で頸部リンパ本幹をはじめとする太いリンパ管が多数胸管に流入する (図2)。胸管そのものを損傷しなくてもこのような太いリンパ管を損傷すれば乳糜漏をきたしうる。

頸部における胸管の走行は固体差が大きいとされている¹⁰⁾。曲田等は頸部郭清術野における胸管の分岐は2本が60.8%と最も多いと報告しているが、3本あるいは叢状のものもそれぞれ20%と報告している¹¹⁾。また流入する静脈も内頸静脈、鎖骨下静脈、外頸静脈と多岐にわたるが、Van Pernis によればほとんどすべてが静脈角から1 cm 以内に流入するとされている¹²⁾。

図1 頸部における胸管走行 (The lymphatics in cancer, Haagensen, 1972⁹⁾ より一部改変引用)

別刷請求先:

〒650 神戸市中央区楠町 7-5-2

神戸大学医学部耳鼻咽喉科

Tel 078-341-7451 Fax 078-371-6083

図2 胸管とリンパ本幹 (The lymphatics in cancer, Haagensen, 1972⁶⁾ より一部改変引用)

3. 頸部郭清術後乳糜漏の頻度

頸部郭清術における胸管損傷による術後乳糜漏の諸家の報告を表1に示す^{3,7)}。いずれも1%から2%と報告しているがこれらは右側頸部郭清術も含んでいる。左側に限るとFitz-Hughは28例中2例2.4%と報告しており³⁾、他の報告者も2~4%になるものと推定される。当科では左側に限ると149例中5例に術後乳糜漏が認められ3.4%であった。

4. 当科における乳糜漏症例の検討

過去5年間に当科で経験した5例の乳糜漏症例を表2に示す。3例で術中に胸管を確認し、その結紮を行っている。5例中、頸部の圧迫と乳糜の穿刺吸引による保存

表1 頸部郭清術における乳糜漏

(): 左

報告者	手術数	乳糜腫例	頻度 %
Fitz-Hugh (1970)	187 (82)	2 (2)	1.1 (2.4)
Crumley (1976)	1198	12 (9)	1.0
Lucente (1981)	574	6	1.0
Spiro (1990)	823	14	1.9
毛利 (1997)	(149)	(5)	(3.4)

表2 当科における乳糜漏症例

症例	術中		術後	
	胸管確認	胸管結紮	最大乳糜漏量 (ml/日)	治療
1	有	有	13	保存的治療
2	無	無	110	保存的治療
3	有	有	765	手術
4	無	無	300	再開放 保存的治療
5	有	有	15	保存的治療

保存的治療：局所圧迫＋穿刺吸引、IVH

手術：再開放し胸管を結紮

図3 当科における胸管処理法：(a) 内頸静脈，(b) 迷走神経，(c) 総頸動脈，(d) 鎖骨下静脈，(e) 外頸静脈，(f) 胸管，(g) 横隔神経，(h) 頸横動脈弓上方が頭側を示す。
 A，静脈系の露出。内頸静脈，鎖骨下静脈，外頸静脈に囲まれた静脈角（矢印）が明らかである。外頸静脈より上方では深頸筋膜層を露出している。
 B，静脈角部のリンパ管の処理。
 C，胸管走行の露出。周囲のリンパ管は結紮されている。
 D，終了図。胸管（鑷子先端で示す）ループの頂上が明らかである。胸管は保存されている。内頸静脈は結紮切断されている。

的治療で治癒したのは4例であり，残りの1例では再手術を行い，胸管からの漏出部を確認し結紮することで治癒せしめている。

5. 当科における頸部郭清術時の胸管損傷防止法

上述のように当科では左頸部郭清術において術後に乳糜漏を来す症例が3%程度あった。そこで，近年ではわれわれは郭清を十分に行いつつ胸管を損傷しないことを目標として，以下のように頸部郭清術を行っている。すなわち，まず静脈角近傍で胸管の静脈流入部を確認したうえで，胸管に流入するリンパ管をすべて結紮切断しながらループの頂上まで胸管を露出している。こうすれば胸管ぎりぎりまで郭清が行われ，かつ胸管の損傷を回避できる。

胸管処理の第一段階は静脈系の露出である。まず，頸動脈鞘を開放して内頸静脈を確認する，内頸静脈に沿って頸動脈鞘を下方へ剥離すると容易に静脈角へ到達する

ことができる。ここを手がかりとして，さらに鎖骨下静脈や外頸静脈を露出していく。十分に静脈系を露出することが重要である（図3 A）。外方で深頸筋膜層を露出しておくとい後の郭清がやりやすい。

第2段階は胸管の確認である。露出した静脈角から上方で頸動脈鞘より深部の脂肪組織を郭清していく（図3 B）。この段階で，静脈角近傍で胸管の静脈流入部を探索し確認する。静脈角近傍には多数のリンパ管が存在するので，これらの走行を確認しながら丹念に結紮処理していくと，容易に胸管の流入部を確認できる。次に，胸管を周囲から剥離しつつ，これに流入するリンパ本幹を順次結紮切断していく（図3 C）。この過程で頸横動脈や横隔神経を同定し，胸管との位置関係を確認しながら郭清を進める。最終的に胸管のループ頂上まで処理が進めば，胸管より上方の脂肪組織特に椎骨動脈三角を十分に郭清できることになる（図3 D）。また胸管もその走行が十分に把握され結果としてその損傷を防ぎつつ保存

しえたことになる。

6. 考 按

左頸部郭清術で胸管損傷を防ぐ方法は、大別すると2つ考えられる。まず第一はその走行部位の近傍に近づかないことであるが、それでは頸部郭清術が不十分になりやすい。十分に郭清を行いつつ損傷を防ぐには、胸管を確実に術野で確認する方法がよいと考えられる。

術後乳糜漏の防止法に関してこれまで諸家が一致して報告しているのは、胸管およびリンパ管の解剖を熟知することの重要性である。この点に関し疑問の余地はない。しかし、主に述べられているのは、術野において解剖学的関係から胸管の走行を予知し、もし胸管が出現すれば乳糜漏の有無をよく観察して結紮することを勧めていることである。

われわれも上述の方針で処理をしてきたが、既に述べた如く、過去5年間に5例3.4%の術後乳糜漏を経験した。しかも、これらの症例を検討するとほとんどの症例で術中に胸管を確認し結紮していた。このような症例で、術後に乳糜漏を来した理由を考察すると、胸管の走行全体を確認したわけではなかったことが挙げられる。すなわち、その一部だけを視認しているわけで、その部位で結紮してもその周囲たとえば、より中枢側とか、分岐したもう1本の胸管とか、太いリンパ本幹とか、を損傷している可能性がある。特に術中乳糜漏を来して結紮する場合は、その処理自体で新たな損傷を招くことも考えられる。

これに対し、本報告で述べた方法は胸管の走行の全貌を明らかにするものであるから、途中のリンパ管の処理を確実にしさえすれば乳糜漏を起こす危険性は低いと考えられる。また、かりに術中に損傷をしたとしてもその結紮は容易で確実である。さらに、万一術後に乳糜漏を来したとしても、既に胸管の全貌を明らかにしているので、術野を再開放して漏出点を探索し結紮することが容

易にできるものと考えられる。

もう一つの利点は、本方法によると胸管を保存することができ点である。胸管を結紮しても側副路が形成され、障害を全く生じないとの報告がある。したがって、胸管の結紮を否定するものではないが、無理に結紮せず保存してもよいと考えている。

本方法の欠点としては、手術時間の延長が挙げられよう。確かに多少時間が長くなるが、馴れれば15分程度延長するだけであり、許容される範囲と考える。

7. ま と め

当科で行っている頸部郭清術時の胸管損傷防止法につき、その理念と実際の手術法について述べた。

参考文献

- 1) 浅井良三, 広戸幾一郎 他: 頸部郭清術における胸管損傷, 耳鼻臨床 52 : 145-149, 1959.
- 2) 久保隆一, 調 賢哉 他: 頸部郭清術における胸管損傷の問題, 気食会報 14 : 22-24, 1963.
- 3) Fitz-Hugh GS, Cowgill R. : Chylous fistula. Arch Otolaryngol 91 : 543-547, 1970.
- 4) Myers EN, Dinerman WS. : Management of chylous fistulas. Laryngoscope 85 (5) : 835-840, 1975.
- 5) Crumley RL, Smith JD. : Postoperative chylous fistula prevention and management. Laryngoscope 86 (6) : 804-813, 1976.
- 6) Lucente FE, Diktaban T. et al : Chyle fistula management. Otolaryngol Head Neck Surg 89 : 575-578, 1981.
- 7) Spiro JD, Spiro RH. et al : The management of chyle fistula. Laryngoscope 100 : 771-774, 1990.
- 8) 安田範夫: 胸管損傷と乳糜漏, JOHNS 12 : 557-560, 1996.
- 9) Haagensen CD. : The terminal collecting lymphatic trunks. Haagensen CD, The lymphatics in cancer : 32-41, 1972, W. B. Saunders Philadelphia.
- 10) 黒須正夫: 胸管の局所解剖—胸管の問題に関する発言一, 気食会報 14 : 25-27, 1963.
- 11) 曲田公光: 頸部郭清術における頸部胸管の形態に関する臨床的研究, 日耳鼻 72 : 1220-1235, 1969.
- 12) Van Pernis PA. : Variations of the thoracic duct. Surgery 26 : 806-809, 1949.

PREVENTION OF CHYLOUS FISTULA IN LEFT RADICAL NECK DISSECTION

Mitsuhiro MOHRI and Mutsuo AMATSU

Department of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery
Kobe University School of Medicine

Postoperative chylous fistula due to injury of the thoracic duct is an uncommon but significant complication of left radical neck dissection. Conventionally, the thoracic duct has been ligated when it was identified in the surgical field. In recent years, the following procedure has been performed in our department to prevent such a serious complication. The concept of our technique is not to ligate the thoracic duct but to preserve it by exposing a loop of the duct from the termination to the medial edge behind the common carotid artery.

The first step of the technique is complete exposure of the internal jugular, subclavian and external jugular veins. Identification of the termination of the thoracic duct at the venous conference is confirmed. Then, as the second step, exposure of a loop of the thoracic duct is easily accomplished by careful ligation of major lymphatic trunks and the surrounding lymphatic plexus.

In conclusion, this technique ensures that complete dissection of the supraclavicular fossa can be performed without injury to the thoracic duct.