頭頸部外科における microvascular surgery

京都大学医学部脳神経外科

宮 本 享 佐 藤 徹 山 田 圭 介
菊 田 健 一 郎 橋 本 信 夫

論文要旨

頭頸部腫瘍の治療において脳神経外科が必要とされるのは、主に頸動脈の遮断可否についての判断や微小血管吻合である。

まず、ウイリス動脈輪を介した頭蓋内側副血行路の発達を MRA で予め判定しておく。遮断の可否を正確に評価するには Balloon test occlusion (BTO) を行う。balloon catheter を用いて内頸動脈を一時遮断し臨床症状・脳波・体性感覚誘発電位・stump pressure をモニターし、脳血流測定を行う。臨床的に BTO が tolerable で脳血流低下がない場合には血行再建は不要であり、BTO が tolerable だが脳血流が低下する場合には頭皮動脈を用いた low flow bypass が、BTO が intolerable な場合には radial artery を用いた頸動脈-中大脳動脈間の high flow bypass graft が行われる。

遊離空腸移植による食道再建では遊離空腸片を採取し動脈端から heparinized saline を注入し遊離空腸片を洗浄する。遊離空腸片を食道摘出断端に部分的に吻合し、まず静脈を内頸静脈に端側吻合し次いで動脈吻合を行う。

微小血管吻合は動物実験による十分なトレーニング、見込み操作・ブラインドな操作を避けた確実な操作、出血で妨げられないドライな術野が必須であり、周到さと忍耐力が要るのは外科のどの分野とも同じである。

Key words: 微小血管吻合 (microvascular anastomosis), バイパス手術 (bypass), バルーン閉塞試験 (balloon test occlusion)

1. はじめに

頭頸部腫瘍の治療において脳神経外科医が必要とされるのは、我々の経験では主に頸動脈の遮断可否についての判断とそれに伴う脳血行再建術、そして悪性腫瘍摘出後の食道再建のために遊離空腸移植を行う際の微小血管吻合である。本稿ではこれらについて述べる。

2. 頸動脈遮断の可否について

頸動脈の遮断については遮断時間（一時遮断あるいは永久遮断）と、遮断部位（総頸動脈のみの遮断なのか、内頸動脈の遮断なのか）によって全く条件は異なってくる。

通常、遮断部位よりも遠位に閉塞性疾患が tandem に合併していなければ片側の総頸動脈のみを遮断することは多くの場合可能であると考えられる。これは外頸動脈からの逆流で内頸動脈の順行性の血行が維持されるためである。このため、最も基本的な判断材料として頸部のみならず脳血管の MRA を撮影しておくことは必須である。これにより tandem lesion の有無やウイリス

動脈輪を介した頭蓋内側副血行路の発達を判定することができる (Fig. 1)。

しかしながら、内頸動脈を遮断する場合には脳虚血合併症を来さないためにその可否を正確に評価する必要がある。脳外科では術前に Balloon test occlusion (BTO) を行う (Fig. 2)。heparinization 下に balloon catheter を用いて内頸動脈を 15 分間一時遮断し臨床症状・脳波・体性感覚誘発電位・stump pressure をモニターし、single photon emission CT (脳血流測定) を行う。内頸動脈を永久遮断する場合にはこれらの結果により脳血行再建術の適否や手術法が選択される。Fig. 3 のように臨床症候学的に BTO が tolerable (すなわち balloon による内頸動脈一時遮断が神経脱落症状を誘発しない) で脳血流量低下がない場合には血行再建は不要である。これに対して症候学的に BTO が tolerable だが SPECT では脳血流量低下を呈する Fig. 4 のような場合には頭皮動脈を用いた low flow bypass (浅側頸動脈-中大脳動脈吻合術) が行われる (Fig. 5)。一方、balloon による一時遮断と共に片麻痺や意識障害など神経脱落症状を呈する場合には BTO の結果を intolerable と判定し、より口径の太い radial artery (RA) graft を用いた頸部外頸動脈-中大脳動脈間の high flow bypass graft を行う (Fig. 6)。

別刷請求先: 〒606-8507

京都市左京区聖護院川原町 54

京都大学医学部脳神経外科

宮本 享

Fig. 1 (左) ウィリス動脈輪の模式図。(右) MRA.

ACA: 前大脳動脈, ACoA: 前交通動脈, MCA: 中大脳動脈, ICA: 内頸動脈,
PCA: 後大脳動脈, PCoA: 後交通動脈, BA: 脳底動脈

Fig. 2 (左) 頸動脈分岐部の血管撮影。CCA: 総頸動脈, ICA: 内頸動脈,
ECA: 外頸動脈

(右) 頸動脈閉塞試験 (BTO) 中の血管撮影。balloonによりICAを閉塞している。

Fig. 3 BTO (tolerable case)。左内頸動脈撮影（左），左椎骨動脈撮影（中）では Willis 動脈輪を介した十分な collateral flow あり，SPECT（右）でも血流低下を認めない。

Fig. 4 BTO (tolerable case)。右内頸動脈撮影（左），左椎骨動脈撮影（中）では Willis 動脈輪を介した collateral flow あり，試験中無症状であったが SPECT（右）では左大脳半球の血流低下を認める。

Fig. 5 Fig. 4 の case。STA-MCA 吻合術を施行後左内頸動脈をコイルにて塞栓。右内頸動脈（左）及び STA から flow（右）により左大脳半球は灌流されている。

Fig. 6 BTO (intolerable case)。radial artery graftを用いた high flow bypass を施行後、右内頸動脈をコイルにて塞栓。high flow bypass により右大脳半球は灌流されている。

Fig. 7 遊離空腸移植

3. 吻合術中の動脈一時遮断

RA graft や vein graft など で吻合操作中に脳主幹動脈や頸部外頸動脈に対して graft を端側吻合する場合には血栓形成による脳塞栓を予防するため heparin を投与し Activated Clotting Time (ACT) を 250 秒以上に保つ。遊離空腸移植手術であっても同様に、空腸 graft の動脈を総頸動脈に端側吻合するため総頸動脈を遮断する場合には systemic heparinization を行う。脳血行と関係のない動脈吻合の場合にはそれほど微小血栓に対して神経質になる必要はない。例えば thyroc-

vical trunk や superior thyroid artery を donar artery として選択しこれらと空腸 graft の動脈とを端々吻合する場合には heparinization は用いない。

また、STA-MCA anastomosis のような脳表皮質動脈の一時遮断では、吻合に要する時間も短く collateral flow も良好なので heparinization を用いない。

4. 遊離空腸移植 (Fig. 7)

遊離空腸移植による食道再建では遊離空腸片を採取し動脈端から heparinized saline を注入し遊離空腸片の血色がなくなるまで血液を静脈端から排出させる。遊離

空腸片がぐらつかないように食道摘出断端に部分的に吻合し、まず静脈から吻合する。内頸静脈に端側吻合することが多いが、facial vein等を用いる場合は端々吻合を行う。縫合糸は7-0または8-0Prolene糸を用いてinterrupted sutureを行う。interrupted sutureの最後の糸を結紮せずにclampしたままにしておく。次に動脈吻合を行う。甲状腺動脈等太い枝があれば7-0または8-0 Prolene糸を用いて端々吻合を行う。総頸動脈に端側吻合を行う場合はheparinizationを行い血管パンチでarteriotomyを行う。この場合には総頸動脈の壁厚に応じて通常6-0 Prolene糸を用いて吻合する事が多い。吻合終了後動脈側をdeclampし遊離空腸片内の血管のair/debrisを出した後に再度遮断し、静脈吻合の最後の吻合糸を結紮する。止血を確認し内頸動脈に微小塞栓を起こさないような順で各血管のdeclampを行う。

5. 吻合手技について

吻合糸はその対象となる動脈の太さによって頸部動脈では6-0から8-0 Proleneを、脳動脈では10-0から11-0 monofilament nylonを用いる。端側吻合を行う場合にはarteriotomyの両端にstay sutureをおいてinterrupted sutureを行う。糸の結紮は片側全ての糸を通した後にそれらを結紮し対側に移る。対側の壁を縫い込んでしまった場合には皮膚縫合と同様に縫合糸を抜糸してやり直せばよい。Stay sutureは必ずしもrecipient arteryの長軸に沿った方向に2針おく必要はなく、donor arteryの長さが足らず突っ張って縫いにくい際にはrecipient arteryの短軸方向に2針をおけばよい。血管壁は外膜側から内腔に向かって針を通すよりも内腔側から血管の外に向かって針を通す方がスムーズに通しやすいので、なるべくrecipient arteryを内腔から外膜側に向かって針を通すように吻合操作を行う。このためには左右いずれの手でも針を把持できるように練習をしておく必要がある。blindな見込み操作は決して行わず、血液のないdry fieldで、こまめに顕微鏡の視野の方向や焦点の高さを合わせて必ず内膜を確認して針を通すことが何よりも重要である。糸を結紮するときには倍率を下げ、やや焦点を浅く（手前側）にするとよい。cottonoidは有用で、針置きとして用いると、針を持ち換える際に便利である。また、吻合部を見えやすく展開するためのsoft retractorにもなりうる。

吻合糸の結紮が全部終わると順次clipをはずして止血を確認する。出血を認めた場合は決して圧迫止血を行わず出血点を正確に確認し、必要であれば縫合を追加する。

縫い代については、壁の厚い血管はcomplianceが低く縫い代を大きくとり過ぎると吻合部内腔を狭くしてしまう可能性がある。血管壁の厚さや硬さのちがう血管を吻合する際には、complianceが大きい柔らかい血管の方の縫い代をやや大きめに、complianceが低い硬い壁厚の血管の方の縫い代をやや小さめにとると、吻合部の内膜が密着して綺麗に仕上がる。これは動脈よりも壁の薄い静脈をgraftとして動脈に吻合する際や、通常生体よりも硬い人工血管などを使用する際に必要なノウハウである。

微小血管吻合は動物実験による十分なトレーニング、見込み操作・ブラインドな操作を避けた確実な操作、出血で妨げられないドライな術野が必須であり、0.5mm以上の血管径があれば問題なく確実に吻合可能である。周到さと忍耐力が要るのは外科のどの分野とも同じである。

文 献

- 1) Marshall RS, Lazar RM, Mohr JP. et al: Higher cerebral function and hemispheric blood flow during awake carotid artery balloon test occlusions. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999; 66(6): 734-8
- 2) Lorberboym M, Pandit N, Machac J. et al: Brain perfusion imaging during preoperative temporary balloon occlusion of the internal carotid artery. J Nucl Med 1996; 37(3): 415-9
- 3) Okudaira Y, Arai H, Sato K. et al: Cerebral blood flow alteration by acetazolamide during balloon occlusion: parameters reflecting cerebral perfusion pressure in the acetazolamide test. Stroke 1996; 27(4): 617-21
- 4) Morishima H, Kurata A, Miyasaka Y. et al: Efficacy of the stump pressure as a guide to the safety of permanent occlusion of the internal carotid artery. Neurol Res 1998; 20(8): 732-6
- 5) Schellhammer F, Heindel W, Haupt WF. et al: Somatosensory evoked potentials: a simple neurophysiological monitoring technique in supra-aortal balloon test occlusions. Eur Radiol 1998; 8(9): 1586-9
- 6) Houkin K, Kamiyama H, Kuroda S. et al: Long-term patency of radial artery graft bypass for reconstruction of the internal carotid artery. Technical note. J Neurosurg 1999; 90(4): 786-90

MICROVASCULAR SURGERY IN HEAD AND NECK SURGERY

Susumu MIYAMOTO, Tetsu SATOW,
Keisuke YAMADA, Ken-ichiro KIKUTA,
and Nobuo HASHIMOTO

Department of Neurosurgery, Kyoto University
Graduate School of Medicine

The extracranial carotid artery should be intentionally occluded in some situations in head and neck surgery. Tolerance for intentional carotid artery occlusion can be estimated by balloon test occlusion (BTO). During BTO, cerebral blood flow (CBF), somatosensory evoked potential, electroencephalogram, and neurological findings are usually monitored. If a patient develops any neurological deficits during BTO, the patient cannot tolerate carotid artery occlusion. In such intolerant cases, a high flow graft, such as a radial artery bypass graft, is performed between the external carotid artery and the middle cerebral artery, prior to intentional carotid artery occlusion. When hemispheric CBF reduction is shown in symptomatically tolerant patients, low flow revascularization, such as superficial temporal artery to middle cerebral artery anastomosis, is performed. Without CBF reduction, bypass procedures are not required.

Microvascular anastomosis is performed in a jejunum autograft for esophageal reconstruction. It is important to cautiously confirm the luminal surface of the anastomotic site using an operative microscope. Suturing maneuver without sufficient microscopic confirmation should be avoided. Steadiness, remaining calm, and patience are all keys to success in microvascular anastomosis.