マイコトキシン中毒の病理

奥 平 雅 彦

北里大学医学部病理学教室

緒 言

カビの代謝産物のなかで、人間および温血動物に傷害作用を与える物質がマイコトキシンと総称されている¹⁾。わが国でカビ米の中毒の研究を最初に系統的に行なつた浦口²⁾によれば、榊(1891)はカビ米による中枢神経麻痺を報告し、三宅(1938)は黄変米菌を発見し脚気との関連を指摘していることなど、カビ米についてのもとの研究はわが国のそれが世界における最初のものとされている。

マイコトキシンを産生するカビに共通していることは、抗生物質探究の過程で顧みられなかつたカビであり、人間および動物の感染症の原因となることがない非感染原性のカビであるという事実である。したがつて、病理学領域におけるマイコトキシンの研究はマイコトキシン投与実験における急性および慢性の傷害像の検索が主流をなしている。とくに黄変米を中心とする研究は三宅³⁾⁴⁾、斉藤⁴⁾⁵⁾、榎本⁶⁾らにより広範かつ精力的な研究が行なわれ、しかも、菌学、薬理学、化学等の専門領域を異にする研究者の協同研究が遂行されたという瞠目すべき背景をもつて、今春の日本病理学会において斉藤⁷⁾により優れた総括がおこなわれた。

私はマイコトキシン中毒については素人にひとしいが、前演者の倉田博士および岩田教授がそれぞれ行なわれた実験の一部の材料を病理組織学的に検索する機会を与えられたので、追加の形で病理所見を簡単に紹介し、あわせて関連した1～2の問題について私見を述べてみたい。

I. 低分子マイコトキシンの生体傷害性

倉田博士らは食品中における有毒糸状菌に関する広範かつ精力的な研究を続けられている¹⁾。市販米から分離した糸状菌のうち、毒性があると判断された *Penicillium* 8 株 (*P. cyclopium* West, *P. decumbens* Thom, *P. expansum* Link 2 株, *P. islandicum* Sopp, *P. martensii* Biourge, *P. roqueforti* Thom 2 株) および *Aspergillus* 2 株

(*A. mangini* Thom & Raper, *A. versicolor* (Vuil.) Tirab.) のペプトン・グルコース液体培地、Czapek 液体培地での培養濾液 0.5ml をマウスの皮下に投与、1 週後に屠殺。また、固形培地に培養した菌のメタノール抽出物を 250mg/kg, 1,250mg/kg をマウス皮下に投与して 1 週後に屠殺。各実験群はマウス各 5 匹、コントロールを含め計 200 匹のマウスの諸臓器をホルマリンで固定。上記糸状菌代謝産物による毒性の有無を病理組織学的に検討された⁸⁾。その結果、*P. cyclopium* および *P. decumbens* は神経毒性をもつこと、*P. islandicum* および *P. martensii* は肝臓毒性を、*P. islandicum*, *P. martensii* および *P. roqueforti* は腎臓毒性を、*A. mangini* および *P. roqueforti* は胃腸管傷害性をもつことが推定された。

この病理組織学的検索に際して、すべてのマウス肝臓の肝細胞核の大小不同性が目立つという印象を受けたので、ペプトン・グルコース液体培地濾液投与マウスの肝について、各マウスの肝細胞核 100 個の容積を算出した。核容積の算出方法は Visopan を用い 400 倍率で肝細胞核の長径と短径を測定し、榎本⁹⁾ にならい次の式により算出した。

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \text{ または } \frac{4}{3}\pi ab^2$$

r : 核の半径

a : 核の長径の $\frac{1}{2}$ b : 核の短径の $\frac{1}{2}$

第 1 図は縦軸に全算出細胞に対する割合を、横軸に肝細胞核の容積を示した結果である。前述のごとく、肝臓毒性をもつと推定された *P. islandicum* および *P. martensii* は核容積が大きい方にずれている。現状ではマイコトキシンのもつ生物活性の測定法に定式化されたものがないとされているので、このような方法も一つの方法となるように思われる。

多くの研究者の努力により、マイコトキシンの生体傷害性について、すでに夥しい数の知見が集積されており、しかも、動物の種により傷害像がことなることも知られてきている。動物実験の結果を人間にあてはめる際には慎重でなければならないことは申すまでもないが、マイコトキシンの傷害性を臓器別にみてみると第 2 図のごと

Masahiko OKUDAIRA: Pathology of Mycotoxins, from the Department of Pathology, Faculty of Medicine, Kitasato University.

Measurement of the Nuclear Volume
of the Liver Cells

第1図 肝細胞核容積の測定結果

く纏められる⁹⁾。これからみると、マイコトキシンの生体傷害性は特定の臓器のみでなく多臓器に傷害性を示すものが多いことが注目される。

私の貧弱な観察眼をもつてする 僅かな経験 からすると、マイコトキシンの病理組織学的傷害像の読み取りは、病理学者が何をとらえ、何を見過すかという要因が大きいのではないかと推測される。したがって、病像の読取には各臓器についての専門家の協力によるスクリーニングが、この方面の今後の研究の進展のために必須のように思われる。そして、このような努力によつてこそマイコトキシンのスクリーニングの定式化が期待できるのではないかとと思われる。

II. 低分子マイコトキシンの発癌を指標とした慢性傷害性

従来から地理病理学的にアジア・アフリカ地域は肝癌多発地帯であることが知られている。それと共に、アジア・アフリカ地域が高温多湿でカビの発育に好適であることと、カビを利用した食品を多く摂取していることが注目され、肝癌の発生とマイコトキシンの慢性中毒との

Mycotoxin Injuries
Histopathological Type
of Injuries

第2図 マイコトキシンの生体傷害性。

本図は実験動物の種、系、年令、性、投与方法、投与量、その他の因子により傷害像が異なるものであることを承知のうえで、一応の総括を行なつたものである。

関連が注目されて来ている。

そして、1969年3月の時点で纏めてみた発癌性マイコトキシンとして第1表のごときものが知られているが、マイコトキシンの食品汚染量についての研究はまだ充分ではない。したがって、人間の肝癌の発癌因子としてのマイコトキシンの評価にはなお慎重な態度をとる必要があるように思われる。

浦口²⁾が指摘しているように、慢性毒性の実験の場合、「途中でガンができればこれは発癌物質だということでもケリがつくが、癌以外の慢性病変だと意味づけがむづかしくて結論が出しにくい」ことは銘記されねばならない。これに対する例証として、監察医務症例500例の肝を病理組織学的に検索し、急性ならびに慢性中毒性肝炎の組織学的特徴の抽出がいかに困難であるかを示した¹⁰⁾。その成績を別な観点からみると、一見健康な人が急死した場合、その死因が内因であつても外因であつてもかなり高い頻度で肝に病的所見が存在する。この事実

第1表 Carcinogenic Mycotoxins (1969. 3)

Mycotoxins	Experimental Animals	Induced Carcinomas
Patulin	Rat (Dickens, 1961)	Hepatic sarcoma
Islanditoxin	Rat (Kobayasi, 1959)	Hepatoma Hepatic sarcoma
	Mouse (Miyake, 1964)	Hepatoma Reticuloendothelioma
Luteoskyrin	Mouse (Miyake, 1964)	Hepatoma Reticuloendothelioma
Aflatoxin	Rat (Lancaster, 1961)	Hepatoma
	Rat (Carnaghan, 1967)	Hepatoma
	Trout (Halver, 1960)	"
	Ferret (Allcraft, 1969)	"
	Guinea pig (Newberne, 1969)	"
Sterigmatocystin	Rat (Dickens, 1966)	Hepatoma Cholangioma

は、長い生活歴を有する人間には、1つ1つをとつてみれば殆んど問題にならないような物質が反覆摂取され、あるいは、他の物質と同時に摂取されることによつて肝

傷害が惹起される可能性を示すものと考えられる。と同時に、ある特定のトキシンに基因する傷害像の判定には極立つた特徴を示す例外的なものを除いてみた場合、慎重さが要請されることを示すものと理解したい。それ故に、non-intentional に摂取される可能性の高いマイコトキシンによる慢性傷害性については、より深い関心と精査が必要なことは申すまでもないが、その分析の困難さも弁えておく必要があろう。

III. カビの高分子毒性物質による急性傷害

いわゆる病原真菌の毒性物質については、真菌の感染成立機序における菌側要因として感染論的観点から研究が進められてきている¹¹⁾¹²⁾。ここでは岩田教授らによるカンジトキシンの急性傷害像について略記したい。

i) カンジトキシン毒性の病理組織学的所見¹³⁾：カンジトキシンの最小致死量をマウス静脈内に注射し、特有な症状のもとに死亡した7匹が病理組織学的検索に供された。急死の表現として諸臓器のうづ血が共通して認められたが、注目すべき変化として、小腸粘膜固有層および粘膜下層の充血、水腫と細胞浸潤、脳における神経細胞の阻血性変化と毛細血管内皮の賦活化(腫脹)があげられる。

肝においては肝細胞核の大小不同、有糸分裂像がみられたが、核容積の測定では対照との間に差が認められな

Procedures and Results of Enzyme Histochemical Study

第3図 カンジトキシン毒性の組織化学的検索とその結果の概略

註 ↑ 対照に比して活性上昇を示す
↓ 対照に比して活性低下を示す
→ 対照との間に活性に差がないことを示す。

第2表 Alkali-Phosphatase and Acid Phosphatase Activity in Acute Toxicity with MLD and $1/100$ MLD of Candidoxin on Mice

Organs	Tissues (selected)	Control	Candidoxin MLD	Candidoxin $1/100$ MLD
Brain	Plexus	++(+)	+++(+)	+++(+)
	Capillaries	+(+)	++(+)	++(+)
Heart	Myocardium	—(—)	—(—)	—(—)
	Capillaries	++(+)	+++(+)	++
Thymus	Lymphatic tissue	—	—	—
	Blood vessels	—	++	+
Lung	Alveoli & bronchi	—(—)	—(—)	—(—)
Liver	Hepatic & Kupffer cells	—(++)	—(+)	—(+)
	Glomerulus	—(+)	—(+)	—(+)
Kidney	Tubuli	++(++)	+++(+)	+++()
Spleen	A. centralis	+	++	+
Pancreas	Capillaries	+	++	++
Small Intestine	Mucosal epithelia	+++()	+++()	+++()
	Tunica propria	—(++)	++(+)	—(+)
	Submucosa	—(+)	++(+)	—(+)
	Muscle	—	—	—
Large Intestine	Mucosal epithelia	—(+)	—(+)	—(+)
	Tunica propria	++(+)	++(+)	++(+)
	Submucosa	++(+)	++(+)	++(+)

Alkali-Phosphatase (Burstone's method using Naphthol AS-MX) activity is shown without ().

Acid Phosphatase (Burstone's method using Naphthol AS-BD activity is shown in ().

かつた(第1図)。この事実は、高分子であるカンジトキシンと食品衛生上問題となる低分子マイコトキシンとは肝に対する影響が異なることを示している。

ii) カンジトキシン毒性の組織化学的所見¹⁴⁾：ハツカネズミDD系、雌性4週令、体重 15 ± 1 gに精製カンジトキシン最小致死量、 $1/100$ 最小致死量を尾静脈内に注射し、注射直後、56分後、58分後および102分後に定型的症状をおこして死亡したもの各5匹および対照とした無処置の3匹が死亡しないし屠殺直後酵素組織化学的検索に供された。研究方法の詳細はすでに記載してあるので¹⁴⁾、方法と得られた結果の概略のみを示したい(第3図)。

カンジトキシンによる活性変動が認められたアルカリフォスファターゼおよび酸性フォスファターゼの諸臓器における活性は第2表のごとくである。

アルカリフォスファターゼについてみると、カンジトキシンにより、脳および心の毛細血管の活性上昇と、小

腸粘膜固有層の活性上昇が顕著である(第2表)。本酵素活性は一般に物質の吸収や透過性の旺盛な部位において強く、細胞膜の active transport に関与すると考えられており、カンジトキシンにより本酵素活性の増強がみられることは細胞の膜系に変調を来しているものとの推測が可能である。

酸性フォスファターゼについてみると、胸腺、肺、脾にみられる組織球の本酵素活性はカンジトキシンにより著明に低下しており、かつ肝では peribiliary dense body および星細胞の、小腸では粘膜固有層における本酵素活性の著明な低下が目された(第2表)。酸性フォスファターゼは細胞内での異物の処理をするといわれている lysosome に存在すると目されているが、カンジトキシンによりその活性低下がみられることは、細胞性抵抗の減弱を示唆する所見と考えたい。

以上のような事実がカンジトキシンの感染促進効果の一因となっているものと思われる。併しながら、カンジダ感染の初期において、カンジダが組織に定着、侵入する時期にはカンジトキシンの産生は極めて微量なものと推定せざるを得ない。したがって、カンジトキシンの人体感染における役割は感染成立機点よりも、感染の進展により大きな役割を演ずるものと考えたい。

高分子マイコトキシンの持続的ないし慢性傷害像に就いては、未だ明らかでないが、免疫との関連において今後検討されるべき領域であろう。また、最近ますます増加の傾向にある末期的深在性真菌感染症において、病巣内で産生される真菌代謝産物の宿主への影響に就いては、一応の関心が払われながらも未だ系統的研究が行なわれていないのが現状であろう。解析の困難さが大きいものと予測されるが、注目していくべき領域と思われる。

結 語

マイコトキシン中毒の病理について、低分子マイコトキシンと高分子マイコトキシンの急性傷害像をごく限られた一面からの観察結果を報告し、関連した解析すべき問題に就て私見をのべた。

マイコトキシンの研究は急性、慢性中毒による生体傷害のみならず、化学療剤、制癌物質などその生物活性についての研究は大きく展開しつつある¹⁵⁾。専門領域を異にする研究者による協同研究により実り多い知見の集積を期待したい。

擧筆するにあたり、本報告の機会を与えられた会長三浦祐晶教授、座長岩田和夫教授に深く感謝し、種々御教示頂いた倉田浩博士ならびに酵素組織化学的検索に御協

力頂いた東大病理の北川知行博士に深く感謝します。

文 献

- 1) 倉田 浩：糸状菌の検出状況から考察したマイコトキシンの食品衛生学的意義，食衛誌，**9**：431—441，1968.
- 2) 浦口健二：慢性毒性の成立と進展——黄変米飼育の長期化に伴う病変の散開性と生体反応のリズミックな動揺について，東京医誌，**74**：295—312，1966.
- 3) 三宅 仁：肝臓の病理——肝硬変症を中心として，日病会誌，**49**：568—632，1960.
- 4) Miyake, M. and Saito, M.: Liver injury and liver tumors induced by toxins of *Penicillium islandicum* Sopp growing on yellowed rice. Wogan, G.N. (Ed): Mycotoxins in Foodstuffs. pp. 133—146, MIT Press, Cambridge, 1965.
- 5) Saito, M.: Liver cirrhosis induced by metabolites of *Penicillium islandicum* Sopp. Acta Path. Jap., **9**, 785—790, 1959.
- 6) Enomoto, M.: Histopathological studies on adenomatous nodules of liver induced in mice by *Penicillium islandicum* Sopp. Acta Path. Jap., **9**, 189—215, 1959.
- 7) 斉藤 守：マイコトキシンの病理——障害作用を示標とした病理学的追求，日病会誌，**61**：3370，1972.
- 8) Kurata, H., Udagawa, S., Ichinoc, M., Kawasaki, Y., Tazawa, M., Tanabe, H. and Okudaira, M.: Studies on the population of toxigenic fungi in foodstuffs. VI. Histopathologic changes in mice by toxic metabolites of fungi isolated from domestic rice. J. Food. Hyg. Soc. Jap., **9**, 385—394, 1964.
- 9) 奥平雅彦：Mycotoxin に関する病理領域における研究の現状，日細会誌，**25**：422，1970.
- 10) Okudaira, M.: Toxic hepatitis, especially on the hepatic injuries caused by acute poisoning and chronic alcoholism in Medical Examiner's cases. Acta Path. Jap., in press.
- 11) 岩田和夫：病原真菌の菌体成分に関する研究，とくに感染と免疫に関連して，真菌誌，**3**：157—179，1963.
- 12) 岩田和夫：真菌毒素に関する最近の知見，とくに高分子毒素を中心として，日細会誌，**27**：563—576，1972.
- 13) 岩田和夫，内田勝久，奥平雅彦：カンジダ毒素と感染における意義，真菌誌，**10**：95—107，1969.
- 14) 岩田和夫，内田勝久，奥平雅彦：Candida albicans の新毒性物質“Candidotoxin” 8. 毒性の組織化学的検索，医学と生物学，**82**：97—101，1971.
- 15) 新井 正：Mycotoxin と制癌物質，日本臨床，**28**（増刊号）：104—113，1970.

(昭和47年12月26日受付)