原 著

爪白癬に関する研究

楠 俊 雄

日本医科大学皮膚科学教室（主任：原田誠一教授）

緒 言

1958年から1959年にかけて Williams et al¹⁾, Riehl²⁾, Blank & Roth³⁾により, はじめてグリセオフルビン (以下「グ」と略記) が人間の白癬に有効であると報告されて以来, 爪白癬は不治の疾患ではなくなった。しかしながら今日でも本症が皮膚科領域における難治性疾患であることには変わりはない。爪白癬に関しては, 本邦においても河崎⁴⁾, 中村⁵⁾, 占部⁶⁾, 阿部⁷⁾, 渡辺 (昌)・二宮⁸⁾, 秋葉⁹⁾らの研究があるが, 「グ」内服療法が定着してから, 本症の系統的研究は等閑視される傾向にある。著者は本症の実態を把握するため, 1971年6月から1974年7月まで, 日本医科大学付属病院皮膚科外来を訪れた265例の本症について, 臨床的観察にくわえ病爪周囲の菌の分布本態, 組織像, 「グ」内服療法などについて検索し, さらに動物接種実験を行い興味ある結果を得たので報告する。

I. 臨床的観察

1971年6月から1974年7月までの3年2カ月間に, 日本医科大学付属病院皮膚科外来において観察した爪白癬症例は265例である。

以下菌種名をつぎのごとく略記する。

Trichophyton rubrum: *T. rubrum*

Trichophyton mentagrophytes: *T. mentagrophytes*

Trichophyton interdigitale: *T. interdigitale*

Trichophyton asteroides: *T. asteroides*

Epidermophyton floccosum: *E. floccosum*

1. 頻度

上記の265例の爪白癬のうち, 1972年1月から1973年12月まで年間を通じ観察できた193例の爪白癬症例の汗疱状白癬症例に対する比率は平均47.0%, 白癬総計に対する比率は平均24.2%であった (表1)。

Toshio KUSUNOKI: Studies on *Tinea unguium*, from the Department of Dermatology, Nippon Medical School (Director: Prof. S. Harada), Tokyo.

表1 白癬の外来統計

期 間	1961～1970 (10年間)	1972～1973 (2年間)
(1) 爪 白 癬	285	193
(2) 汗 疱 状 白 癬	1603	411
(3) そ の 他 の 白 癬	731	193
(4) 白 癬 総 計	2619	797
(1)/(2)%	17.8%	47.0%
(1)/(4)%	10.9%	24.2%

表2 年齢, 性別

年 令	男	女	患 者 数
0～10才	2	1	3 (1.1%)
11～20才	5	10	15 (5.7%)
21～30才	15	31	46 (17.4%)
31～40才	23	36	59 (22.3%)
41～50才	17	28	45 (17.0%)
51～60才	31	18	49 (18.5%)
61～70才	26	7	33 (12.5%)
71～80才	10	5	15 (5.7%)
計	129	136	265 (100%)

2. 年齢

男子は51歳から60歳, 女子は31歳から40歳に最も多くみられた (表2)。最低年齢10カ月 (発症時年齢7カ月), 最高年齢79歳であった。

3. 性別

男子129例, 女子136例でわずかに女子に多くみられた (表2)。

4. 他部白癬合併例

著者の統計 (表3) によると, 外来受診時に他部白癬を合併している症例が爪白癬265例中233例 (87.9%)と, 圧倒的に多く, なかでも汗疱状白癬の合併が大多数をしめていた。

5. トリコフィチン反応

表3 爪白癬症例の外來受診時における
他部白癬合併例

白癬病型	症例数	爪白癬症例に対する比率	他部白癬合併症例に対する比率
汗疱状白癬	199	75.1%	85.4%
汗疱状白癬+頑癬	19	7.2%	8.2%
頑癬	13	4.9%	5.6%
斑状小水疱性白癬	1	0.4%	0.4%
白癬性毛瘡	1	0.4%	0.4%
合併症なし	32	12.1%	
計	265	100%	

表4 トリコフィチン反応

罹患部位	症例数	陽性症例数	陽性率
指爪のみ	14	3	21.4%
趾爪のみ	140	58	41.4%
指趾爪双方	21	9	42.9%
計	175	70	40.0%

使用したトリコフィチン（以下「ト」と略記）は、原田¹⁰⁾の方法に準じ、*T. asteroides* より調製したもので、培養濾液から分離した多糖体を主成分とするものである。表4に示したように「ト」反応を施行した爪白癬症例175例中70例（40.0%）が陽性であつたが、この中で指爪のみ侵されている症例だけは陽性率21.4%と低率であつた。

6. 培養成績

直接鏡検で菌を確認した265例の爪白癬について、Sabouraud ブドウ糖寒天培地で培養したところ、265例中116例（43.8%）が陽性であつた。この培養陽性症例について、趾爪と指爪で菌種を整理すると表5のようになる。このうちで *T. rubrum* と *T. interdigitale* の重複感染例4例中3例は混合感染例であり、他の1例は同時感染例であつた。*E. floccosum* と *T. rubrum* が分離された症例は Chronic mucocutaneous candidiasis に合併した趾爪白癬で、右第1趾爪から第IV趾爪まで *T. rubrum*、右V趾爪は *E. floccosum* の同時感染例である。

7. 指趾爪の罹患率

表6に示したように、爪白癬265例中指爪のみの症例は、わずか25例（9.4%）であつた。この関係を *T. rubrum* 症例と *T. interdigitale* 症例（重複感染例はのぞく）についてみると、表7のようになり、*T. interdigitale* 症例においては全例趾爪のみの感染であつた。

表5 培養成績

菌種	趾爪	指爪
<i>T. rubrum</i>	81(77.1%)	27 (100%)
<i>T. interdigitale</i>	19(18.1%)	0
<i>T. rubrum</i> + <i>interdigitale</i>	4(3.8%)	0
<i>E. floccosum</i> + <i>T. rubrum</i>	1(1.0%)	0
計	105(100%)	27 (100%)

表6 指趾爪の罹患率

罹患部位	症例数
趾爪のみ	199 (75.1%)
指爪のみ	25 (9.4%)
指趾爪双方	41 (15.8%)
計	265 (100%)

表7 *T. rubrum* 症例および *T. interdigitale* 症例における指趾爪の罹患率

罹患部位	<i>T. rubrum</i> 症例	<i>T. interdigitale</i> 症例
趾爪のみ	65 (70.7%)	19 (100%)
指爪のみ	11 (12.0%)	0
指趾爪双方	16 (17.3%)	0
計	92 (100%)	19 (100%)

8. 罹患部位

T. rubrum による指爪白癬では、第1指爪が27.3%と最も侵されやすい傾向があるほか、他の指爪の罹患率は18.1%と同じであつた。*T. rubrum* による趾爪白癬では、第1 (24.0%) > V (23.8%) > III (17.7%) > IV (17.5%) > II (16.9%)、*T. interdigitale* による趾爪白癬では、第1 (32.1%) > V (20.5%) > IV (17.9%) > II (15.4%) > III (14.1%) と、いずれも第1趾爪と第V趾爪が侵されやすく、趾爪白癬の好発部位となつている。

9. 病爪数

培養にて菌種が同定された爪白癬のうち、*T. rubrum* 症例および *T. interdigitale* 症例について述べる。*T. rubrum* による指爪白癬27例では、1本の爪しか侵されていない症例が最も多く12例（44.7%）、ついで5本の爪が侵されている症例が6例（22.2%）で、指爪においては9本または10本の爪全部が侵されている症例は認められなかつた。同じ *T. rubrum* による趾爪白癬81例では、指爪とは逆に10本の爪全部が侵されている症例が最も多く

20例 (24.7%), 以下4本の爪が侵されている症例の11例 (13.6%), 5本の爪が侵されている症例の10例 (12.3%) の順であつた。 *T. interdigitale* による趾爪白癬19例では, *T. rubrum* によるものとはかなり傾向が異なり, 4本の爪が侵されている症例が6例 (31.6%), 1本の爪のみ侵されているもの4例 (21.1%) であつた。

10. 爪白癬の臨床症状

本症の主要症状として爪甲の肥厚, 崩壊, 混濁および変形などがあげられているが, *T. rubrum* 病爪 340本, *T. interdigitale* 病爪56本について, それらの関係を表8にまとめてみた。このうちでも爪カンジダ症との鑑別点

表8 爪白癬の臨床像

臨床症状	菌種	<i>T. rubrum</i>	<i>T. interdigitale</i>
肥厚	(+)	33/340 (9.7%)	7/56 (12.5%)
	(+)	147/340 (43.2%)	17/56 (30.4%)
	(-)	160/340 (47.1%)	32/56 (57.1%)
崩壊	(+)	15/340 (4.4%)	4/56 (7.1%)
	(+)	89/340 (26.2%)	9/56 (16.1%)
	(-)	236/340 (69.4%)	43/56 (76.8%)
爪甲表面の白斑および雲母状変化		57/340 (16.8%)	17/56 (30.4%)
陥入爪		1/340 (0.3%)	0
匙形爪		1/340 (0.3%)	0
爪囲の発赤	(+)	0	0
	(+)	56/340 (16.5%)	8/56 (14.3%)
	(+)	27/340 (7.9%)	12/56 (21.4%)
	(-)	257/340 (75.6%)	36/56 (64.3%)

として重要な爪甲周囲の発赤は, 注意して観察すると意外に多く, *T. rubrum* 病爪では, 明らかに発赤を認めるもの16.5%, わずかに発赤を認めるもの7.9%であり, *T. interdigitale* 病爪では, 明らかに発赤を認めるもの14.3%, わずかに発赤を認めるもの21.4%と, 発赤を認めるものが *T. rubrum* 病爪より多かつた。

II. 病爪周囲の菌の分布状態

病爪のほか鱗屑も小水疱のない一見健康と思われる爪上皮, 内側縁, 外側縁, 指または趾先端の4カ所についても, 直接鏡検による菌の検査を施行した。なお今回調べた爪甲周囲4カ所の部位の名称を図1に示した。

1. 部位別

直接鏡検で菌を確認した指爪39本, 趾爪80本の爪甲周囲の菌の陽性率は, 表9のごとくで, 指爪周囲では内側

図1 直接鏡検を行つた爪甲周囲4カ所の部位と名称

表9 指趾病爪周囲の菌の分布状態

罹患部位	指	爪
鏡検部位		
爪 上 皮	3/39 (7.7%)	21/80 (26.3%)
内 側 縁	12/39 (30.8%)	34/80 (42.5%)
外 側 縁	7/39 (17.9%)	33/80 (41.3%)
指(趾)先 端	6/39 (15.4%)	33/80 (41.3%)
平 均	18.0%	37.9%

縁に最も多くみられ30.8%, ついで外側縁17.9%, 以下指先端15.4%, 爪上皮7.7%の順である。趾爪周囲でも内側縁が最も多く42.5%, 外側縁, 趾先端が同じく41.3%でこれにつき, 爪上皮は26.3%で最も少なかつた。病爪周囲4カ所の菌陽性率の平均をみると, 趾爪周囲では指爪周囲の2倍以上の37.9%の陽性率を示した。

2. 菌種別

T. rubrum 病爪28本, *T. interdigitale* 病爪6本の周囲の菌陽性率は, 表10のごとくで, *T. rubrum* 病爪周囲では内側縁, 外側縁で最も高率にみられ, いずれも39.3%, ついで指または趾先端の32.1%, 爪上皮は最も少なく17.9%である。*T. interdigitale* 病爪周囲でも内側縁に最も多くみられ50.0%, 以下外側縁, 趾先端, 爪上皮の3カ所は同じく33.3%であつた。以上のように部位別,

表10 *T. rubrum* 病爪および *T. interdigitale* 病爪周囲の菌の分布状態

菌種	<i>T. rubrum</i>	<i>T. interdigitale</i>
鏡検部位		
爪 上 皮	5/28 (17.9%)	2/6 (33.3%)
内 側 縁	11/28 (39.3%)	3/6 (50.0%)
外 側 縁	11/28 (39.3%)	2/6 (33.3%)
指(趾)先 端	9/28 (32.1%)	2/6 (33.3%)
平 均	32.2%	37.5%

菌種別でも、菌陽性率の順位は、内側縁が最も高く、ついで外側縁、指または趾先端、爪上皮の順であつた。

III. 爪白癬の組織像

抜爪した *T. rubrum* 病爪20本についてPAS染色を行い、組織学的に白癬菌の分布部位により病爪を5型に分類し、その組み合わせ組織分類を行つた。図2は、基本となる5型の模型図である。I型：爪甲下層にのみ菌を認める爪。II型：爪甲上層にのみ菌を認める爪。IV型：爪甲中層にのみ菌を認める爪。III型：爪甲全層にわたり菌を認める爪。V型：爪甲下角質のみ菌を認める爪を表わ

図2 爪白癬における菌分布模型図（縦断面）

表11 爪白癬の組織分類

組織分類	病爪数
I + V 型	11 (55.0%)
I + II 型	1 (5.0%)
II 型	3 (15.0%)
II + III 型	1 (5.0%)
II + V 型	2 (10.0%)
IV + V 型	1 (5.0%)
V 型	1 (5.0%)
計	20

す。20病爪の内訳は、表11のごとく、I + V型（写真1）が最も多く11本（55.0%）、ついでII型（写真2）の3本（15.0%）、II + V型（写真3）の2本（10.0%）で、I + II型（写真4）、II + III型（写真5）、IV + V型（写真6）、V型（写真7）はいずれも1本（5.0）づつ

写真1 爪白癬I + V型における菌の分布（縦断標本）爪甲下層と爪甲下角質に菌を認める。（PAS染色 150倍）

写真2 爪白癬II型における菌の分布（横断標本）爪甲上層にのみ帯状に菌を認める。（PAS染色 150倍）

写真3 爪白癬II + V型における菌の分布（横断標本）爪甲上層と爪甲下角質に菌を認める。（PAS染色 100倍）

写真4 爪白癬Ⅰ＋Ⅱ型における菌の分布（横断標本）爪甲上層と爪甲下層に菌を認める。（PAS染色 150倍）

写真5 爪白癬Ⅱ＋Ⅲ型における菌の分布（横断標本）爪甲上層と爪甲中層に菌を認める。（PAS染色75倍）

認められた。

IV. グリセオフルビン内服療法

1. 治療成績

爪白癬症例 240例に「グ」1日4錠（500mg）の連日投与を行つた。その内訳は、完治した症例17例（7.1%）、内服を中断した症例 110例（45.8%）、副作用で中止した症例12例（5.0%）、妊娠の可能性ができたため中止し

写真6 爪白癬Ⅳ＋Ⅴ型における菌の分布（縦断標本）爪甲全層および爪甲下角質に菌を認める。（PAS染色 100倍）

写真7 爪白癬Ⅴ型における菌の分布（横断標本）爪甲下角質にのみ菌を認める。（PAS染色 100倍）

た症例5例（2.1%）、内服継続中の症例96例（40.0%）である。完治症例17例について、その平均内服期間を検討した。なお完治とは、臨床症状が消失し、病爪からの直接鏡検ならびに培養で原因菌陰性のものである。指爪白癬5例（表12）の平均内服期間は 209日、趾爪白癬12例（表13）では 197日であつた。これは従来の報告とは全く反対の結果を示したことになるが、この点について

表12 完治した指爪白癬（5例）の内服日数

No.	年 令	性 別	内服日数
1	47	♂	266
2	58	♂	329
3	26	♀	189
4	25	♀	63
5	45	♂	196
平均内服日数			209

表13 完治した趾爪白癬(12例)の内服日数

No.	年 令	性 別	内服日数
1	44	♀	203
2	46	♂	217
3	52	♂	99
4	30	♀	360
5	34	♀	170
6	35	♀	189
7	48	♀	224
8	24	♀	224
9	31	♂	225
10	45	♂	140
11	39	♀	77
12	24	♂	236
平均内服日数			197

は後に検討をくわえる。つぎに「グ」内服を中断した症例についてみると、1ヵ月以上内服を中止している症例を中断とすると、実に「グ」を投与した爪白癬 240例中 110例(45.8%)が、何ら特別な理由なくして治療を中断しているのである。これら中断症例 110例の平均内服期間は77日であつた。

2. 副作用

240例中12例が副作用で内服を中止した。12例中薬疹が5例、胃腸障害が5例、白血球減少、頭痛が各々1例認められた。

V. 動物接種実験

1. 実験方法

爪白癬より分離した *T. interdigitale* 7株について、体重 300～350g のモルモット7匹を使用して行つた。接種実験はサンドペーパーを用いて接種部位を擦過する方法(サンドペーパー法)で、1匹のモルモットについて背部を左右対称に4カ所擦過し、1匹につき1株被検菌株を塗擦した。

2. 接種成績

7匹とも局所の炎症症状は軽度で、機械的刺激以外に病巣を認めず、鱗屑および毛の10日目直接鏡検では、4匹の鱗屑中に菌糸が認められたが、毛には全例陰性、20日目では全例鱗屑および毛とも直接鏡検陰性であつた。すなわち接種試験は陰性であつた。

考 案

爪白癬の頻度は、本邦において白癬総計の 7.0～8.54%⁵⁾⁷⁾⁸⁾、汗疱状白癬の 12.9～15.56%⁷⁾⁸⁾である。日本医科大学附属病院皮膚科外来における1961年から1970年の10年間の平均として白癬総計の10.9%、汗疱状白癬の

17.8%は、これらをわずかに上回る成績であつた。しかるに1971年6月から1974年7月まで、爪白癬に特別の関心を払い診療に当つたところ飛躍的な増加率を示した。すなわち年間を通じ観察できた1972年1月から1973年12月までの2年間の平均として白癬総計の24.2%、汗疱状白癬の47.0%と、実に前者で約2.6倍、後者で約2.2倍の増加である。Götz¹¹⁾および阿部¹⁷⁾によると最近の爪白癬増加の原因は、ケラチンに嗜好性を有する *T. rubrum* の増加によるとされているが、渡辺(昌)・二宮⁸⁾は一施設において2年あるいは3年後に、爪白癬が汗疱状白癬および他の白癬の増加率とかげ離れた増加率を示した事実は、単に *T. rubrum* の増加による本症の絶対数増加のみではなく、本症に関心を払つて診療したためと述べており、著者もこの考えに賛同するものである。

患者の年齢については、男子は51歳から60歳、女子は31歳から40歳に最も多くみられた。文献的には、中村⁵⁾は男子において20歳から25歳、女子においては26歳から30歳に最も多いと報告しており、男女合せた統計では、阿部⁷⁾は21歳から30歳に30.9%、31歳から40歳に20.0%、11歳から20歳に15.4%を認めているが、Götz¹¹⁾は阿部よりほぼ10歳高い年齢層に多く認めている。自験例の最低年齢は、10ヵ月男児の指爪白癬症例である。患側手掌の汗疱状白癬も合併しており、両者から *T. rubrum* を分離した。母親は来院する3ヵ月前より患児の右拇指爪の白濁に気づいており、おそらく生後7ヵ月頃の発症と思われる。なお患児の父親の両足にも汗疱状白癬を認めた。高橋(吉)ら¹²⁾は7例の小児爪白癬を観察し、そのうち4例に副甲状腺機能低下症、早期青春期症、尿崩症、自律神経障害(Feer病?)の全身性疾患を認めており、小児の爪白癬感染においては直接感染の機会が多いほかに、全身性要因の関与が重要であると推察している。著者の10歳未満の症例は、10ヵ月男児例、8歳女児例、8歳男児例の3症例である。10ヵ月男児例は前述したごとくで、8歳女児例は僧帽弁狭窄症があり、8歳男児例¹³⁾は細胞性免疫不全症、慢性副腎皮質不全症などを伴つた Chronic mucocutaneous candidiasis を合併していた。

自験例の性別では、女子が136例、男子が129例で、わずかに女子が男子を上回つていた。過去に女子が多いとする報告¹⁴⁾¹⁵⁾もあるが少数例の観察であり、大多数の報告⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾は男子が多いと述べている。外国でも同様に男子に多いとされていたが、Götz¹¹⁾は第2次世界大戦後男子より女子の爪白癬が増加しているとし、最近では Rook et al²¹⁾ の成書や English & Atkinson²²⁾ の報告も男子より女子が多い結果を示している。

爪白癬患者の外来初診時における他部白癬合併率は70.8～100%⁴⁾⁷⁾¹⁴⁾²⁰⁾²³⁾と極めて高率であり、著者の成

績もこれらと同様 265例中 233例 (87.9%) の合併率を示した。合併白癬の内訳をみると、高橋 (吉)²³⁾ は 98.2%, 阿部⁷⁾ は 86.1% に汗疱状白癬を認めており、著者の合併白癬 233例では、汗疱状白癬 199例 (85.4%), 汗疱状白癬+頑癬 19例 (8.2%), 頑癬 13例 (5.6), 斑状小水疱性白癬, 白癬性毛瘡各々 1例 (0.4%) であった。このようにいずれも圧倒的に汗疱状白癬が多いという傾向を示している。なお著者の合併他部白癬は、初診時直接鏡検菌陽性の症例のみで、既往歴としての他部白癬は除外した数値である。

爪白癬における「ト」反応の成績についての報告は少ない。著者は 175例の本症に「ト」反応を行い 70例 (40.0%) に陽性を認めた。そのうち指爪のみ侵されている症例だけは陽性率 21.4% で、趾爪白癬の $\frac{1}{2}$ の陽性率という非常に興味ある結果を得た。文献的には阿部⁷⁾ の陽性率 53.7%, 少数例の報告では岸²⁴⁾ の 28.5%, 吉住²⁵⁾ の 20.0%, 小野²⁶⁾ の 100% などがある。ちなみに汗疱状白癬では、31.0~90.5%^{24) 27) 28) 29)}, 精製多糖体「ト」を使用した例では、67.7~100%^{30) 31) 32) 33)} であった。したがって、一般には爪白癬においては、小野²⁶⁾ の 100% 陽性は例外的として、汗疱状白癬に比して低い陽性率を示している。しかしながら白癬における「ト」反応の結果が報告者により著しく異なることは、諸家が指摘するように「ト」の力価の相違や菌種特異性などの問題が十分に検討されていないためと考えられる。

本症の原因菌については、渡辺 (昌)・二宮⁸⁾ が本邦における 1963 年までの本症報告の集計を行い *T. rubrum* が約 90% をしめていることを明らかにし、外国における *T. mentagrophytes* の培養率 16.2~42.4%^{34) 35) 36) 37)} と比較し、培養菌種にかなり違いがあることを指摘している。著者の培養成績は、指爪白癬においては 100%, 趾爪白癬では 77.1% が *T. rubrum* であった。渡辺 (昌)・二宮⁸⁾ も指爪白癬では 100%, 趾爪白癬では 64.8% が *T. rubrum* であったと記載している。最近の渡辺 (進)・渡辺 (悟)³⁸⁾ や金沢大学皮膚科³⁹⁾ の報告でも *T. rubrum* が圧倒的に多く培養されている。一方近年欧米において Strauss & Kligman⁴⁰⁾ は本症 42 例中 *T. rubrum* 19例 (45.2%), *T. mentagrophytes* 22例 (52.4%), Kornblee & Villafane⁴¹⁾ は 1958 年に *T. rubrum* の急増を認め 14 例中 13 例から *T. rubrum* を培養, Zaias et al⁴²⁾ は *T. rubrum* と *T. mentagrophytes* を全く同率に分離, Gentle⁴³⁾ は 110 例中 *T. rubrum* 91 例 (82.9%), *T. mentagrophytes* 17 例 (15.5%), Walshe & English⁴⁴⁾ は 207 例中 160 例

(77.3%) に *T. rubrum*, English & Atkinson²²⁾ は 20 例中 16 例 (80%) に *T. interdigitale*, 2 例 (10%) に *T. rubrum*, 2 例に *E. floccosum* を認めている。例外的な報告では、イランの Ardehali⁴⁵⁾ は *Trichophyton schoenleinii* 63%, *T. violaceum* 15%, *T. rubrum* 10%, *T. tonsurans* 5%, *T. verrucosum* 5% と本邦および欧米の菌種とはかなり違った結果を発表している。渡辺 (昌)・二宮⁸⁾ は、著者同様指爪より全く *T. mentagrophytes* を分離できなかったことより、趾爪白癬の増加に伴い *T. mentagrophytes* の培養率も高まると述べており、ちなみに最近の報告で *T. mentagrophytes* が *T. rubrum* より多く培養されている Strauss & Kligman⁴⁰⁾, English & Atkinson²²⁾ の症例はすべて趾爪白癬であった。このように地域差もさることながら、本症においては、罹患部位により原因菌に大きな違いがみられる。

重複感染例は、白癬全体で Lewis & Hopper⁴⁶⁾ の 5.2%, 香川ら⁴⁷⁾ の 4.4%, 二宮⁴⁸⁾ の 4.0% であるが、爪白癬においては、渡辺 (昌)・二宮⁸⁾ は趾爪白癬の 2.9%, 著者は本症全体の 4.8% に認めた。

指趾爪の罹患率は報告者により全く異なるが、最近の報告では圧倒的に趾爪のみ侵されている症例が多い。^{8) 43)} 従来報告において指爪白癬が多く認められたのは、高橋 (吉)²³⁾, 渡辺 (昌)・二宮⁸⁾ にも述べているように指爪白癬は趾爪白癬より目立ちやすく、美容上気にして来院する患者が多いことが考えられる。しかしながら、実際には爪白癬の多くは汗疱状白癬を合併しており、汗疱状白癬が手より足に圧倒的に多いことから、医師が常に爪白癬を念頭において足の汗疱状白癬の診療に当たれば、多くの隠された趾爪白癬を検出するのは困難ではない。その証拠に爪白癬患者のほとんどは本症の存在さえ知らない者が多く、医師から指摘されても、外傷によるもの、あるいは先天性の爪疾患であると主張する患者さえいるのである。したがって本症に対する医師の認識が高まれば、趾爪白癬の検出率はより増加するものと思われる。

罹患部位については、指爪白癬では第 I 指爪が侵されやすい傾向があり、趾爪白癬では *T. rubrum* 症例と *T. interdigitale* 症例で若干の差はあるが、共通して第 I, 第 V 趾爪が最も高い罹患率を示した。指爪白癬において第 I 指爪が侵されやすいという報告は、ほかに高橋 (幸)¹⁴⁾, 寺井⁴⁹⁾, 占部ら⁵⁾ の記載にもみられ、指爪白癬では第 I 指爪が好発部位のようである。趾爪白癬において寺井⁴⁹⁾ および Götz¹¹⁾ も第 I 趾爪が侵されやすいと述べている

が、渡辺（昌）・二宮⁸⁾は反対に第1趾爪は少なく、第V趾爪が最も高率に侵されているとしている。他方阿部⁷⁾、高橋（吉）²³⁾は指爪および趾爪とも罹患部位に大差を認めなかつたと記載している。特に爪白癬の第V趾爪の病変について高橋（吉）⁵¹⁾⁵²⁾は詳細に検索し、非白癬病爪でも全く爪白癬同様の臨床像を示す例が多数あり、第V趾爪においては直接鏡検により白癬菌を証明する以外に正確な診断は下しえないとしており非常に興味ある点である。

つぎに1症例における病爪数は、*T. rubrum* による指爪白癬では単発例が多く、趾爪白癬では菌種により異なり、*T. rubrum* によるものは多数の爪を侵し、*T. interdigitale* によるものは少数の爪を侵す傾向がみられた。渡辺（昌）・二宮⁸⁾も同様の事実を記載している。

さて爪白癬の臨床型については諸家により分類が一定しないため、ここでは主要症状について菌種別に観察した。*T. rubrum* 病爪では爪甲肥厚、崩壊が *T. interdigitale* 病爪より多くみられ、爪甲表面の白斑および雲母状変化は、*T. interdigitale* 病爪において *T. rubrum* 病爪の約2倍多く認められた。高橋（吉）²³⁾は爪甲肥厚とは爪甲自体の肥厚ではなく、主として爪甲下における爪床上皮の表層に生じる角質増殖であると記載しており、Lewis et al⁵⁰⁾、Sagher⁵³⁾、Jillson & Piper⁵⁴⁾は爪甲下角質増殖の程度は一般に *T. rubrum* 病爪では著明で *T. interdigitale*、*T. violaceum* によるものは軽度であると述べている。爪甲表面の白斑および雲母状変化は、渡辺（昌）・二宮⁸⁾によれば圧倒的に *T. mentagrophytes* 病爪に多くみられるとし、Zaias⁵⁵⁾も Superficial white onychomycosis として爪甲表面の白斑に注目し、30例中25例から *T. mentagrophytes* を分離しており、この変化は *T. mentagrophytes* による爪白癬に特徴的と思われる。陥入爪、匙形爪などの爪甲変形は *T. rubrum* 病爪にのみ認められた。爪囲炎は、周知のごとく爪カンジダ症において高率に認められ、植田⁵⁶⁾は87.5%、高橋（伸）⁵⁷⁾は91.3%と報告しているが、今回爪白癬においても爪囲炎に注目して観察したところ *T. rubrum* 病爪で24.4%、*T. interdigitale* 病爪で35.7%と予想外に高率に認められた。しかしながらカンジダ性爪囲炎のように腫脹、圧痛、排膿などを示す高度のものはみられず、いずれも爪囲の発赤程度のものではあつた。

爪白癬の発症病理については、阿部⁷⁾、秋葉⁹⁾、Stühmer⁵⁸⁾、Jessner⁵⁹⁾らにより種々の推論がなされている。一般に爪白癬の多くは汗疱状白癬を合併しており、本研

究でも爪白癬の82.3%が汗疱状白癬の合併を認めることより、特に趾爪白癬では合併症としての汗疱状白癬からの感染が最も考えられる。しかし実際には爪甲周囲の皮膚に全く白癬病巣が認められないこともあり、他部白癬からの感染が考えがたい場合もある。これについて高橋（吉）²³⁾は、原発性の趾爪白癬が少ないとすると、連続的に爪に病変が波及した後に皮膚白癬病巣が自然に軽快することもあるのではないかと述べている。今回著者は、鱗屑や小水疱のない一見健康と思われる病爪周囲の爪上皮、内側縁、外側縁、指または趾先端の4カ所についても直接鏡検を行い指爪白癬周囲で平均18.0%、趾爪白癬周囲で平均37.9%の菌陽性を認めた。すなわち、特に趾爪白癬においては病爪周囲に白癬病巣がなく、一見健康皮膚と思われる部位でも詳細に菌の検査を行えば、かなりの率に菌が認められるのである。この事実と本症の組織学的所見より、著者の組織分類Ⅰ＋Ⅴ型、Ⅴ型においては、菌は周囲の白癬病巣より連続的に爪床上皮表層に侵入し爪甲下角質増殖をおこし、爪甲下角質または爪甲下層まで侵入すると考えられ、Ⅱ型においては、爪上皮から爪甲上層へ侵入するものと考えられる。さらにⅡ＋Ⅴ型は、これら2つの侵入経路による感染であり、他型は本症の進行程度による違いと推察される。指爪白癬周囲においては、趾爪白癬の1/2の菌陽性率であり、周囲の白癬病巣からの連続感染もさることながら、指爪という身体的部位から他部白癬を搔破することにより爪甲先端より接種性に菌が侵入しやすいことは想像に難くない。

爪白癬の組織学的研究には、Sagher⁵³⁾、Jillson & Piper⁵⁴⁾、秋葉⁹⁾などの報告がある。秋葉⁹⁾は菌の分布部位の違いにより *T. rubrum* による爪白癬を組織学的に3型に分類した。Ⅰ型：菌が主として爪甲下角質と爪甲下層を侵すもの。Ⅱ型：菌が爪甲下角質と爪甲下層のほかには爪甲上層と爪上皮をも侵し、しかも爪甲下層と上層の菌は不連続であるもの。Ⅲ型：爪甲下に角質増殖がなく、菌が爪甲全層を侵すもの。著者は *T. rubrum* 病爪20本について組織学的に検索したところ、爪甲上層にのみ菌が認められるもの、爪甲下角質にのみ菌が認められるもの、さらに角質増殖を伴い爪甲全層に菌が認められるものなどがあり、秋葉の組織分類のいずれにも該当しない爪白癬に遭遇した。そこで著者は菌の分布部位により5型に分類し、その組み合わせ組織分類を行つた。著者のⅠ＋Ⅴ型は、秋葉のⅠ型に相当し、秋葉のⅠ型は彼の報告でも49.2%で著者のⅠ＋Ⅴ型55.0%と同様全体の約半数をしめている。Sagher⁵³⁾、Jillson & Piper⁵⁴⁾、阿部⁷⁾、

渡辺(昌)・二宮⁸⁾などの従来の報告では、いずれも爪甲下層を中心として菌が分布するとされており、著者の爪甲上層のみを侵すⅡ型は、Jessner⁵⁹⁾の *Leukonychia trichophytica*, Sagher⁵³⁾の *T. violaceum* による爪白癬, Zaias⁵⁵⁾の Superficial white onychomycosis では認められているが *T. rubrum* による本症では見当らず稀なものと考えられる。爪甲下角質にのみ菌が認められるV型については、Stühmer⁵⁸⁾の *T. violaceum* による Subunguale Trichophytie にみられるが *T. rubrum* による本症では過去に報告がないようである。Ⅳ+Ⅴ型は、程度が進行すればみられても不思議はないと思われる。

「グ」内服療法については、占部⁶⁰⁾の報告によれば爪白癬の平均内服期間は、本邦では指爪で82.2～138.5日、趾爪で74.3～180.3日である。しかしながら、1962年以前の症例は粗粒子「グ」を使用しており、さらに報告者により治癒の判定基準が異なり、必ずしもこれを一律に評価することはできない。著者は臨床症状の消失、直接鏡検ならびに真菌培養陰性の3条件を満足し、しかも1症例において病爪全部が治癒した場合のみを完治症例とした。なお1カ月以上内服中止したものは中断症例とした。完治した17例の平均内服期間は指爪白癬で209日、趾爪白癬で197日と趾爪より指爪が難治という結果を示した。これは指爪白癬の第2例58歳男子例が難治で完治まで329日を要したのと、趾爪白癬の第3例と第11例がZaias⁵⁵⁾のいわゆる Superficial white onychomycosis の型で、第3例が99日、第11例が77日と短期間に治癒したためと思われる。これら例外的症例を除くと、平均内服期間は指爪で179日、趾爪で219日となり、従来通り趾爪難治の傾向を示したが、占部⁶⁰⁾の報告よりは自験例では治癒まで指趾爪とも約40日長く要した。外来初診時、爪白癬患者には十分に本疾患について説明し、次の来院日を約束しながら診察してきたが、中断症例は240例中110例(45.8%)の多数にのぼった。この中断症例の平均内服時間は77日で、これはどの型の汗疱状白癬も治癒するのに十分の日数であり、本症の多くが汗疱状白癬を合併していることにより、自覚症のある汗疱状白癬が治癒すると中断するケースが多いものと思われる。

「グ」の副作用の頻度は5～30%⁶⁰⁾と報告者によつて異なるが、自験例において副作用で中止したのは240例中12例(5.0%)である。12例中薬疹の5例はすべて光線過敏性型であつた。胃腸障害は、軽度のものまでふくめるとかなりの率に認めたが、食直後(朝夕2錠づつ)

に服用させ、種々の消化剤の投与にもかかわらず内服を継続できなかつたのは5例にすぎなかつた。白血球減少については、福代⁶¹⁾、中村ら⁶²⁾、藤沢・渡辺(昌)⁶³⁾、Prazak et al⁶⁴⁾、Lazar & Ratter⁶⁵⁾などの報告がみられるが、著者も「グ」内服後白血球6,800から2,900まで減少した1例を経験した。

T. interdigitale と *T. asteroides* は、一括して *T. mentagrophytes* として統合される傾向にあるが、爪白癬においては *T. asteroides* が分離されることは極めて稀である。著者の観察した爪白癬においても、*T. asteroides* は1例も分離されなかつた。高橋(吉)⁵¹⁾⁵²⁾は菌学的形態はもちろんのこと、免疫学的にも *T. asteroides* と *T. interdigitale* は同一種であるが、両菌の起こす臨床症状には異なるところが多く、これらを全く同一菌種として何の区別もなく記載することは臨床家の立場からは躊躇を覚えると述べている。*T. interdigitale* の動物接種については、高橋(信)⁶⁶⁾、川連⁶⁷⁾、Epstein⁶⁸⁾、Geog & Maechling⁶⁹⁾、松崎⁷⁰⁾、堀江⁷¹⁾などの報告があり菌の動物に対する態度は報告者により異なるが、一般には *T. interdigitale* は *T. asteroides* に較べて動物接種は困難であるとしている。今回爪白癬より分離した *T. interdigitale* 7例についてモルモットを使用し擦過法で接種したところ全例陰性であつた。しかるに高橋(伸)⁷²⁾の実験によれば *T. asteroides* の擦過法による接種陽性率は100%であり、*T. mentagrophytes* のうちでも、この両菌の動物に対する態度は全く異なるのである。このように、たとえ形態学および免疫学的には同一と考えられる結果がみられても、両菌の惹起する臨床症状や動物接種における相違から、著者は現在のところ *T. interdigitale* および *T. asteroides* なる菌名を存続させておく方が菌学研究上適当と考える。

結 論

I 爪白癬の臨床的観察

1. 1971年6月から1974年7月までに当科外来を訪れた爪白癬症例は265例で、年間を通して観察できた1972年1月から1973年12月までの爪白癬症例の白癬総計に対する比率は24.2%、汗疱状白癬に対する比率は47.0%であつた。

2. 年齢では男子は51歳から60歳、女子は31歳から40歳に最も多く、最低は10カ月(発症時7カ月)、最高は79歳であつた。

3. 性別は男子129例、女子136例でわずかに女子が多くみられた。

4. 他部白癬合併例は265例中233例(87.9%)にみられ、内訳は汗疱状白癬199例(85.4%),汗疱状白癬+頑癬19例(8.2%),頑癬13例(5.6%),斑状小水疱性白癬1例(0.4%),白癬性毛瘡1例(0.4%)であった。

5. 「ト」反応を施行した175例中70例(40.0%)が陽性を示した。内訳は指爪のみ侵されている症例では14例中3例(21.4%)陽性、趾爪のみ侵されているものでは140例中58例(41.4%),指趾爪双方が侵されているものでは21例中9例(42.9%)陽性と指趾爪で陽性率に著明な差異を認めた。

6. 爪白癬における培養成功率は265例中116例(43.8%)であった。

7. 原因菌としては、培養陽性の指爪白癬27例全例 *T. rubrum*, 趾爪白癬105例中81例(77.1%) *T. rubrum*, 19例(18.1%) *T. interdigitale*, 4例(18.1%) *T. rubrum* + *T. interdigitale*, 1例(1.0%) *E. floccosum* + *T. rubrum* であった。

8. 指趾爪の罹患率は265例中199例(75.1%)が趾爪のみ、25例(9.4%)が指爪のみ、41例(15.8%)が指趾爪双方が侵されていた。

9. これを菌種別にみると、*T. rubrum* 症例においては92例中65例(70.7%)が趾爪のみ、11例(12.0%)が指爪のみ、16例(17.3%)が指趾爪双方が侵されていた。*T. interdigitale* 症例においては19例全例趾爪のみと菌種により罹患部位に差異を認めた。

10. 指爪白癬では第1指爪が、趾爪白癬では第1、第V趾爪が好発部位である。

11. 病爪数については、指爪白癬では1本の爪のみ侵されている症例が44.7%と最も多く、趾爪白癬においては菌種により異なり *T. rubrum* 症例では4本以上の爪が侵されているものが78.1%, *T. interdigitale* 症例では4本以下の爪が侵されているものが63.3%をしめていた。

12. 爪甲肥厚、崩壊は *T. rubrum* 病爪に多く、爪甲表面の白斑および雲母状変化は *T. interdigitale* 病爪に多くみられた。

13. 陥入爪、匙形爪は *T. rubrum* 病爪に各々1例認められた。

14. 爪甲周囲の発赤は *T. rubrum* 病爪で24.4%, *T. interdigitale* 病爪で35.7%認められたが、カンジダ性爪囲炎のような高度の症状はみられなかった。

II 病爪周囲の菌の分布状態

1. 皮膚白癬病巣のない一見健康と思われる病爪周囲の爪上皮、内側縁、外側縁、指または趾先端の4カ所に

ついて直接鏡検を行った。

2. 指爪白癬周囲では平均18.0%, 趾爪白癬周囲では平均37.9%の菌陽性率を示した。

3. *T. rubrum* 病爪周囲では平均32.2%, *T. interdigitale* 病爪周囲では平均37.5%の菌陽性率を示した。

4. 病爪周囲の菌の陽性率の順位は、部位別、菌種別でも内側縁、外側縁、指または趾先端、爪上皮の順であった。

III 爪白癬の組織像

1. *T. rubrum* 病爪20本について菌の分布部位によりつぎの5型に分類し、その組み合わせ組織分類を行った。
I型：爪甲下層にのみ菌を認める爪。II型：爪甲上層にのみ菌を認める爪。III型：爪甲中層にのみ菌を認める爪。IV型：爪甲全層にわたり菌を認める爪。V型：爪甲下角質にのみ菌を認める爪。

2. その成績は、I+V型11本(55.0%), II型3本(15.0%), II+V型2本(10.0%), I+II型, II+III型, IV+V型およびV型は各々1本(5.0%)であった。

IV グリセオフルビン内服療法

1. 爪白癬240例に1日4錠(500mg)の「グ」を投与したところ、完治した症例17例、内服中断した症例110例、副作用で中止した症例12例、妊娠の可能性がでてきたため中止した症例5例、内服継続中の症例96例の結果を得た。

2. 完治症例の平均内服期間は、指爪白癬5例においては209日、趾爪白癬12例においては197日であった。

3. 中断症例110例の平均内服期間は77日であった。

4. 副作用で中止した12例の内訳は、薬疹5例、胃腸障害5例、白血球減少1例、頭痛1例であった。

V 動物接種実験

1. 爪白癬より分離した *T. interdigitale* 7株をモルモットに接種したが全例陰性であった。

終りにあたり恩師原田誠一教授のご懇篤なるご指導、ご校閲に深く感謝します。

本論文の要旨は、1974年9月第42回日本医科大学医学部総会で報告した。

文 献

- 1) Williams, D.I., Marten, R.H., Sarkany, I.: Oral Treatment of Ringworm with Griseofulvin, *Lancet*, II, 1212—1213, 1958.
- 2) Riehl, G.: Griseofulvin, ein per os wirksames Antimykotikum. (Demonstration.), *Wien. klin. Wschr.*, **71**, 215, 1959.

- 3) Blank, H., Roth, F.J.: The Treatment of Dermatomycoses with Orally Administered Griseofulvin, *Arch. Dermatol.*, **79**, 259—266, 1959.
- 4) 河崎可也：我国ノ爪甲白癬ニ就テ。日皮会誌, **23**, 940—964, 1923.
- 5) 中村敏郎：爪甲白癬殊ニ其原因菌中ノ1異型菌種ニ就テ。日皮会誌, **32**, 515—527, 1932.
- 6) 占部治邦：黴毛部爪甲白癬に関する研究補遺。皮と泌, **16**, 473—482, 1954.
- 7) 阿部志朗：爪白癬にかんする研究。皮と泌, **20**, 680—693, 1957.
- 8) 渡辺昌平, 二宮聖耳：爪白癬の研究。皮膚科紀要, **59**, 63—85, 1964.
- 9) 秋葉 弘：爪白癬の組織学的研究。日皮会誌, **81**, 1025—1039, 1971.
- 10) 原田誠一：白癬性疾患のワクチン療法に関する研究。日皮会誌, **61**, 55—85, 1951.
- 11) Götz, H.: Untersuchungen über die pathogenetischen Faktoren und die Behandlung der Nagelpilz Krankheit, *Arch. Derm. Syph.*, **195**, 579—616, 1953.
- 12) 高橋吉定, 高橋伸也, 三浦 隆, 福土克：小児の爪白癬ことに全身性疾患との合併について。皮膚臨床, **3**, 683—689, 1961.
- 13) 楠 俊雄, 原田誠一：Chronic mucocutaneous candidiasis, 第18回日本医真菌学会発表(千葉), 1974.
- 14) 高橋幸三：北陸地方ニ於ケル白癬菌病ニ就テ並ニ其ノ病原菌ニ関スル研究。十全会雑誌, **36**, 2382—2496, 1931.
- 15) 原 義文, 桑野泰彦：九州地方の白癬。皮と泌, **8**, 106—114, 1940.
- 16) 岸, 折茂：4)より引用
- 17) 楠 太：趾間ニ於ケル白癬ニ就テ。日皮会誌, **25**, 335—343, 1925.
- 18) 竹之内辰四郎：白癬ニ関スル研究補遺特ニ新潟地方ノ白癬性疾患ニ就テ。北越医誌, **41**, 386—462, 1926.
- 19) 高橋信吉：札幌地方ノ白癬並ニ白癬菌ニ就テ。日皮会誌, **28**, 542—550, 1928.
- 20) 尾形貞男：千葉県地方ニ於ケル白癬ノ平均。日皮会誌, **29**, 1183—1232, 1929.
- 21) Rook, A., Wilkinson, D.S., Ebling, F.J.G.: Textbook of Dermatology, 2nd Ed. Vol. 1, 720, Blackwell Publisher, London, 1972.
- 22) English, M.P., Atkinson, R.: Onychomycosis in elderly chropody patients, *Br. J. Dermatol.*, **91**, 67—72, 1974.
- 23) 高橋吉定：日本皮膚科全書X. 3, 120—144, 金原出版, 1956.
- 24) 岸 清一：白癬感作血球凝集反応について。日皮会誌, **67**, 167—197, 1967.
- 25) 吉住正子：白癬アレルギーに関する研究。真菌誌, **2**, 239—250, 1961.
- 26) 小野三男：トリコフィチン活性因子に関する研究。日医大誌, **35**, 340—354, 1968.
- 27) 河崎可也, 高橋信吉：トリコフィチン皮膚反応の診断的価値について。日皮会誌, **24**, 166—190, 1924.
- 28) 荒木正夫, 早川真澄：「トリコフィチン」皮膚反応知見補遺。臨床皮泌とその領域, **7**, 97—102, 1942.
- 29) 高橋吉定, 西田光一：汗疱状白癬におけるトリコフィチン反応。日皮会誌, **61**, 306, 1951.
- 30) 田沼 藩, 堀江徹也：多糖類トリコフィチンおよび粗製トリコフィチンによる反応の比較。日皮会誌, **64**, 344, 1954.
- 31) 池永 実：皮膚白癬症に対する精製トリコフィチン反応の特異性, 特にその診断価値について。日皮会誌, **64**, 599—612, 1954.
- 32) 渡辺昌平, 二宮聖耳：トリコフィチンに関する研究(続報)。日皮会誌, **67**, 491, 1957.
- 33) 香川三郎：皮膚真菌症に於ける真菌皮膚反応, 特に交叉反応に就て。日皮会誌, **69**, 1048—1075, 1959.
- 34) Rieth, H.: Nachweis und Einteilung der Dermatophyten unter Auswertung des krankengutes der Universitäts-Hautklinik Hamburg von 1951 bis 1955, *Dermat. Wschr.*, **133**, 633—641, 1956.
- 35) Grimmer, H.: Die Epidemiologie der Berliner Epidermophyten in den Jahren 1952—1959, *Z. Haut. Geschtskr.*, **27**, 33—44, 1959.
- 36) Haufe, F.: Die Frequenz der Dermatomykosen Ost-Mecklebung, unter besonderer Berücksichtigung der Flora der Epidermophyten in den Jahren 1958/59, *Z. Haut. Geschtskr.*, **28**, 336—341, 1960.
- 37) Schönborn, C.: Die Wandlung der Pilzflora im Gebiet Leipzig, *Dermat. Wschr.*, **144**, 1165—1175, 1961.
- 38) 渡辺 進, 渡辺 悟：倉敷地方の白癬菌相。皮膚臨床, **14**, 47—52, 1972.
- 39) 金原武司, 井上久美子, 岡田芳子, 福代良一：金沢大学皮膚科における白癬菌培養成績, 第18回日本医真菌学会発表(千葉), 1974.
- 40) Strauss, J.S., Kligman, A.M.: An Experimental Study of Tinea Pedis and Onychomycosis of the Foot, *Arch. Dermatol.*, **76**, 70—79, 1957.
- 41) Kornblee, L.V., Villafane, J.: The Changing Pattern of Superficial Fungous Infection in New York City, *Dermatologica.*, **120**, 185—190, 1960.
- 42) Zaias, N., Oertel, I., Elliott, D.F.: Fungi in the Nails, *J. Invest. Dermatol.*, **53**, 140—142, 1969.

- 43) Gentles, J.C.: Laboratory Investigation of Dermatophyte Infection of Nails, *Sabouraudia*, **9**, 149—152, 1971.
- 44) Walish, M.M., English, M.P.: Fungi in Nails, *Br. J. Dermatol.*, **78**, 198—207, 1966.
- 45) Ardehali, M.: Dermatophilic Agents of Tinea Unguim in Iran, *Inv. J. Dermatol.*, **12**, 322—323, 1973.
- 46) Lewis, G.M., Hopper, M.E.: Concurrent Combined and Consecutive Fungous Infections of the Skin, *Arch. Dermatol.*, **47**, 27—35, 1943.
- 47) 香川三郎, 高橋 久, 石川英一, 富沢尊儀, 池田真康, 北村清隆: 白癬の研究(Ⅲ)重複感染について. *日皮会誌*, **72**, 356, 1962.
- 48) 二宮聖耳: 皮膚科領域における真菌の重複感染について. *臨皮泌*, **17**, 745—748, 1963.
- 49) 寺井 武: 満蒙ニ於ケル皮膚糸状菌ニ就テ並ニ其病原菌ニ関スル研究(第4回報告). *満州医誌*, **21**, 435—464, 1944.
- 50) Lewis, G.M., Hopper, M.E., Wilson, J.W., Plunkett, O.A.: An Introduction to Medical Mycology, 4th Ed, 128, The Year Book Publishers, Chicago, 1958.
- 51) 高橋吉定: 皮膚真菌症. *日皮会誌*, **78**, 871—882, 1968.
- 52) 高橋吉定: 皮膚真菌症. *臨皮*, **2**, 1269—1300, 1968.
- 53) Sagher, F.: Histologic Examination of Fungous Infections of the Nails, *J. Invest. Dermatol.*, **28**, 137—357, 1948.
- 54) Jillson, O.T., Piper, E.L.: The Role of Saphrophytic Fungi in the Production of Eczematous Dermatitis. *J. Invest. Dermatol.*, **28**, 137—145, 1957.
- 55) Zaia, N.: Superficial White Onychomycosis, *Sabouraudia*, **5**, 99—103, 1966.
- 56) 植田時司: カンジタ性爪囲炎・爪炎に関する研究. *日医大誌*, **34**, 195—212, 1967.
- 57) 高橋伸也: 爪カンジダ症. *皮膚臨床*, **12**, 44—54, 1970.
- 58) Stühmer, A.: Subunguale Epidermophytie, Trichophytie und Favus, *Arch. Derm. Syph.*, **193**, 527—536, 1952.
- 59) Jessner, M.: Über eine neue Form von Nagelmykosen (Leukonychia Trichophytica), *Arch. Derm. Syph.*, **141**, 1—8, 1922.
- 60) 占部治邦: 内用療法. *真菌誌*, **9**, 99—103, 1968.
- 61) 福代良一: 皮膚科最近の進歩, 第Ⅲ集, 611—635, 医歯薬出版, 1960.
- 62) 中村家政, 荒尾龍喜, 坂崎善暢: グリセオフルビンによる白癬の内服ならびに局所療法. *臨皮泌*, **14**, 593—597, 1960.
- 63) 藤沢伸次, 渡辺昌平: 微粒子グリセオフルビンの皮膚糸状菌症に対する治験. *臨皮泌*, **17**, 855—859, 1963.
- 64) Prazak, C.G.: Ferguson, J.S., Comer, J.E., Mc Neil, B.S.: Treatment of Tinea Pedes with Griseofulvin, *Arch. Dermatol.*, **81**, 863—865, 1960.
- 65) Lazar, P., Rattner, H.: Griseofulvin Therapy for Superficial Fungous Infections, *Arch. Dermatol.*, **81**, 863—865, 1960.
- 66) 高橋信吉: 朝鮮ノ白癬並白癬菌ニ就テ. *日皮会誌*, **25**, 251—286, 1925.
- 67) 川連周治: *Sabouraudites interdigitale* ノ動物接種陽性成績ニツイテ. *日皮会誌*, **32**, 479, 1932.
- 68) Epstein, S.: Presentation of hypothesis that Trichophyton interdigitale is degenerated Trichophyton gypseum, *J. Invest. Dermatol.*, **1**, 141—168, 1938.
- 69) Geog, L.K., Maechling, E.H.: Trichophyton mentagrophytes (variety nodular); mutant with brilliant orange-red pigment isolated in 9 cases of ringworm of the skin and nails, *J. Invest. Dermatol.*, **13**, 339—350, 1950.
- 70) 松崎 統: 白癬とくに汗疱状白癬の治療と経過に関する研究. *皮と泌*, **21**, 435—452, 1959.
- 71) 堀江徹也: 趾間菌および星芒状菌に関する臨床的並びに菌学的研究. *日皮会誌*, **71**, 221—251, 1961.
- 72) 高橋伸也: 実験白癬の手技. *臨皮*, **22**, 1219—1127, 1968.

(昭和50年3月24日受付)