Candida albicans の産生する糖蛋白毒素に関する研究

第4報 末梢血リンパ球におよぼす影響

山 本 容 正 岩 田 和 夫

明治薬科大学微生物学教室

〔受付：9月8日，1981年〕

Candida albicans より分離した糖蛋白毒素の宿主免疫能，とくに末梢血リンパ球に対する影響を調べる目的で，*in vitro* における微量全血法での毒素添加によるリンパ球幼若化反応におよぼす影響を検討した結果，本毒素は10～20 μg の添加で PHA, Con A 刺激による幼若化反応の約50%を阻害した。この阻害活性の時間的経過を検討した結果，対照に用いた *C. albicans* マンナンと異なり，本毒素の添加時期によりほとんど影響を受けず，一定の阻害を示した。また，本毒素分離株のホルマリン死菌にも同様の幼若化阻害が認められた。さらに，ウサギの実験的カンジダ感染における末梢血リンパ球の幼若化も感染の程度にある程度平行して低下し，末梢血リンパ球数も減少した。これらの結果から，カンジダ感染によつておきる宿主免疫能の低下に本毒素が関与している可能性が示唆された。

病原真菌による感染，発症に宿主側の免疫学的基盤の重要性が以前より指摘されている。とくに細胞性免疫能の低下は，真菌の易感染性を招来すると考えられている^{3,9,10,16}。一方，真菌感染における菌側の要因としての毒素が宿主の免疫能を直接低下させ，その感染の進行に重要な役割を演ずることも示されている^{6,10}。

著者らは，*Candida albicans* の強毒株より真菌高分子蛋白毒素 Canditoxin (CT)⁷ とは化学的に異なるが，同様の急性致死活性を有する糖蛋白毒素（以下毒素）²⁰ を分離し，本毒素が動物（モルモット，ウサギ）およびヒトの補体を活性化すると同時にウサギの末梢血リンパ球の減少をきたすことを見出し²²，本毒素が CT と同様，リンパ球に対してなんらかの作用をおよぼし，感染の進展に重要な影響を与えるものと考えた。

今回，毒素のリンパ球への影響を調べるため，*in vitro* における末梢血リンパ球の幼若化反応におよぼす影響を検討し，さらに実験的カンジダ感染における本毒素の宿主免疫能に与える影響を解明することを試みた。

実験材料と方法

使用菌株と培養条件 *C. albicans* MTU 12024および MTU 12021の2株を用いた（前者は毒素分離株）。培養には PYG 培地（ペプトン1%，グルコース3%，酵母エキス0.3%，pH 5.8～6.2）を用い，37°C，24時間振盪培養した。培養後，菌体を滅菌生理食塩水（以下生食）で遠心洗浄を3回くり返し，再び生食に浮遊し，菌液を作製した。菌数は血球計算板を用いて測定した。

使用毒素とマンナン *C. albicans* MTU 12024より前報²⁰に準じて精製した糖蛋白毒素のうち Fr II-2を使用した。*Candida* マンナンは，上記毒素分離株より前報²¹に従つて作製した。これらは，いずれもリン酸緩衝食塩水（PBS, pH 7.4）に溶解した後，ミリポア濾過滅菌を行い，使用した。

感染実験 ウサギ（日本産白色種，雄性ならびに雌性，体重2.5～3.5 kg）の耳翼静脈内へ $2 \times 10^6 \sim 2 \times 10^7$ 個/0.5 ml の菌を接種し，その後，経時的に耳翼静脈より採血（抗凝固剤としてヘパリンを5単位/mlの割合に使用）し，全血法による末梢血リンパ球幼若化反応を調べた。また，同時に白血球数および血液像の観察も併せて行つた。一部の実験系においては，菌接種後5日，6

別刷請求先：山本容正

〒154 東京都世田谷区野沢1—35—23
明治薬科大学微生物学教室

日, 10日目にウサギを殺し, 腎臓の逆定量培養を行った。すなわち, 左右の腎臓の重量を別々に測り, 乳鉢にてホモジナイズした後, その一定量を GS 寒天培地平板 (グルコース 2%, ペプトン 1%, 酵母エキス 0.45%, グアノフラシン 0.05%, 寒天 1.5%, pH 5.8~6.2) に塗抹し, 37°C, 48時間培養を行い, 生じたコロニーより臓器 1 g 当たりの CFU (コロニー形成単位) を算出した。

リンパ球の幼若化反応実験 末梢血微量全血法は山田ら¹⁹⁾の方法に準じて次のごとく行つた。ウサギ耳翼静脈よりヘパリン添加注射器にて血液を採取し, RPMI 1640 培地 (日水) 0.8 ml, マイトジェン (phytohemagglutinin-P (PHA) —Difco, 30 μ g, concanavalin A (Con A) —Miles Yeda, 5 μ l, をそれぞれ RPMI 1640 培地 1 ml に溶解) 0.1 ml 添加した滅菌試験管に血液 0.1 ml を加え, 全量を 1 ml として 5% CO₂ 下で 37°C, 24時間培養した。その後, ³H チミジン (NEN) 1 μ Ci/0.1 ml を添加し, 18時間後の 5% 氷冷三塩化酢酸 (TCA) 不溶性分画への ³H チミジンとり込み量を液体シンチレーションカウンターで測定した。

単離リンパ球の幼若化反応はウサギ末梢血よりリンパ球を Ficoll-Paque (Pharmacia) にて分離し, RPMI 1640 培地にて 2 回遠心洗浄後, 10% 自己 (ウサギ) 血清含有 RPMI 1640 培地に浮遊させた。このリンパ球浮遊液を 2×10^6 個/ml に調整し, その 0.1 ml とマイトジェン (PHA 3 μ g, Con A 0.5 μ l) 0.1 ml, 10% 自己血清加 RPMI 1640 培地 0.8 ml をそれぞれ試験管に添加し, 37°C, 5% CO₂ 下で 72 時間培養した後, ³H チミジン 0.5 μ Ci/0.1 ml を添加し, さらに 18 時間培養を行つた。全血法と同様, 5% 氷冷 TCA 不溶性分画への ³H チミジンとり込みを液体シンチレーションカウンターで測定した。

多血小板血漿 および 乏血小板血漿 多血小板血漿 (platelet rich plasma, PRP) はヘパリン添加ウサギ末梢血を 800 rpm, 10 分遠心した上清より, 乏血小板血漿 (platelet poor plasma, PPP) は同じくウサギ末梢血を 4,200 rpm, 20 分遠心した上清より得た。

Stimulation index (SI) リンパ球幼若化反応による DNA 合成促進率は, 次のような SI で表現した。

$$\text{Stimulation index (SI)} = \frac{\text{マイトジェン刺激群におけるとり込み (cpm)}}{\text{非刺激群におけるとり込み (cpm)}}$$

実験結果

ウサギ末梢血リンパ球の幼若化 (全血法) におよぼす毒素の影響 幼若化阻害の時間的経過の検討は, 毒素 200 μ g および対照として *C. albicans* マンナン 200 μ g を全血法によるリンパ球幼若化反応の系に次のように種々の培養時期に添加して調べた。すなわち, マイトジェン添加 24 時間または 6 時間前に毒素, マンナンを添加する実験系と, マイトジェンと同時にまたは 3 時間後に添加する系を作製して, 毒素およびマンナンの添加時期の相違による幼若化阻害率の変化を観察した。

結果は, Fig. 1 に示すように, リンパ球の PHA 刺激に対する幼若化反応は, 毒素を添加することによつては

Fig. 1. Effects of the toxin (Fr II-2) and *C. albicans* mannan on ³H-thymidine incorporation in mitogen-stimulated lymphocytes in whole blood specimen of rabbit. Mean cpm of unstimulated cultures: 528±1

Fig. 2. Effects of toxin (Fr II-2) on ^3H -thymidine incorporation in PHA- or ConA-stimulated rabbit whole blood. Mean cpm of unstimulated cultures: 715 ± 87 .

ば80%近くの阻害がみられ、これは毒素の添加時期を変えてもその阻害率にほとんど変化は認められなかった。これに対し、マンナン添加群では、添加時期により、その阻害率に著しい変化が認められた。すなわち、PHA刺激24時間前では阻害効果はなく、PHA刺激6時間前または同時に添加した群では明らかな阻害効果が認められ、さらに、PHA刺激3時間後に添加した群は、もはやその阻害効果はみられなくなるという結果を得た。また、Con A刺激によるリンパ球幼若化反応における毒素添加の影響もPHA刺激の場合と同様80~90%近くの阻害を示したが、毒素添加時期が遅くなるに従ってその阻害の程度が若干低くなる傾向を示した。これに対し、マンナンの場合は、添加時期が遅れると、その阻害効果が著減し、マイトジェン添加3時間後にマンナンを加えた系では、もはやその幼若化阻害効果は認められなかった。

毒素によるリンパ球幼若化阻害の用量応答関係は、各種濃度の毒素溶液0.1 ml とウサギ末梢血0.1 ml, RPMI 1640培地0.7 ml を混合し、37°C, 5%CO₂ 下で6時間培養した後、マイトジェン (PHA, Con A) 0.1 ml を添加して調べた。

結果は、Fig. 2 に示すように、PHA, Con A いずれのマイトジェン刺激に対しても毒素添加による幼若化阻害は、数 μg/ml より50 μg/ml の間において用量応答

関係が認められたが、毒素微量 (0.5 μg/ml) 処置後のPHA幼若化反応では、むしろ ^3H チミジンとり込みの増加がみられた。

マイトジェン刺激幼若化反応におよぼすマンノース添加の影響 毒素の幼若化阻害活性は、その多糖部分による非特異的阻害であるという可能性を検討するために、その構成糖であるマンノースをマイトジェン刺激幼若化反応の系に添加することによって、マンノースとマイトジェンの結合による非特異的幼若化反応阻害を調べた。すなわち、毒素の代わりに各種濃度のマンノース溶液0.1 ml, マイトジェン (PHA, Con A) 0.1 ml, ウサギ末梢血0.1 ml, RPMI 1640培地0.7 ml を混合し、37°C, 5% CO₂ 下で培養して幼若化反応をおこなった。

結果は、Fig. 3 に示すように、PHA刺激においては、マンノース添加による幼若化阻害に有意の差は見出せなかったが、Con A刺激の場合は、弱いがある程度の非特異的阻害の現われる傾向が認められた。

ホルマリン死菌によるリンパ球幼若化反応の阻害 *C. albicans* ホルマリン死菌²⁰⁾の適当濃度液0.1 ml を毒素の場合と同様、ウサギ末梢血0.1 ml, RPMI 1640培地0.7 ml と混合し、37°C, 5%CO₂ 下で6時間培養した後、マイトジェン0.1 ml を添加して幼若化反応をおこなった。

Fig. 4 より、PHA刺激の場合、菌の添加量が5×

Fig. 3. Effects of mannose on lymphocyte stimulation index. Lymphocyte stimulation as performed by the whole blood culture method. Mean cpm of unstimulated cultures: 226 ± 55 .

Fig. 4. Effects of killed cells of *C. albicans* MTU 12024 on ^3H -thymidine incorporation in mitogen-stimulated rabbit whole blood. Mean cpm of unstimulated cultures: 975 ± 12 .

$10^4 \sim 5 \times 10^7$ 個の間で、 ^3H チミジンのとり込みは、菌無添加の対照に比してそれぞれ92～17%であつた。この用量応答関係は、Con A 刺激においても認められた。

単離リンパ球の幼若化反応におよぼす毒素の影響 毒素のリンパ球幼若化反応におよぼす影響をより直接的にみる目的で、単離リンパ球を用いた幼若化反応における毒素の影響を調べ、さらに血小板等のリンパ球以外の血液成分の有無が毒素の幼若化阻害活性にどのように影響

するかを検討した。

ウサギ末梢血を Ficoll-Paque を用いた密度勾配遠心法にてリンパ球を分離し、同一血液より作製した PRP または PPP を10%の割合に添加した RPMI 1640 培地0.7 ml にリンパ球浮遊液0.1 ml、毒素 (200 μg, 50 μg, 5 μg) 0.1 ml をそれぞれ混合し、37℃、5% CO_2 下で6時間培養した後、マイトジェンを添加して、その幼若化反応を調べた。

Fig. 5. Effects of the toxin (Fr II-2) on the blastoid transformation of lymphocytes isolated from peripheral blood from rabbit with the platelet-poor plasma (PPP) or the platelet-rich plasma (PRP). Mean cpm of unstimulated cultures: 546 ± 74

成績は、Fig. 5 に示すように、毒素は単離リンパ球を用いた PHA, Con A いずれの刺激による幼若化反応に対しても全血法の場合と同様、著しい幼若化阻害を示した。また、血小板などが多く含まれている PRP 存在下での毒素による幼若化阻害は、それがない系に比して著しく増強され、本毒素のリンパ球幼若化阻害にこれら血小板などの成分が促進的に作用することが示された。

毒素接種ウサギにおける末梢血リンパ球の幼若化反応
 上述のような *in vitro* における毒素のリンパ球に対する作用が *in vivo* においても認められるか否かを検討する為に、毒素 $750 \mu\text{g}/0.5 \text{ ml}$ をウサギ耳翼静脈内へ接種

し、経時的に反対側の耳翼静脈より血液を採取後、白血球数と血液像を観察し、また Con A, PHA 刺激に対する末梢血リンパ球の幼若化反応を全血法で測定した。

結果は、Table 1 に示すように、毒素接種3時間目から PHA, Con A いずれのマイトジェンに対する幼若化反応も低下を示した。末梢血白血球数は、毒素接種1時間後では増加傾向を示したが、血液像より、リンパ球は毒素接種直後より減少を示し、反面、好中球の増加がこれに対応して認められた (Fig. 6)。

ウサギの実験的カンジダ感染における末梢血リンパ球の幼若化反応 毒素のこのような末梢血リンパ球幼若化

Table 1. Influence of the toxin (Fr II-2) administration to the rabbit on the ^3H -thymidine incorporation in cultures of the peripheral blood stimulated with PHA and Con A

Addition for stimulation with	c.p.m.			
	0	Time after administration (hr)		
		1	3	6
None	826	323 (0.39) ^a	1245 (1.50)	741 (0.89)
PHA	16705	15102 (0.90)	10928 (0.65)	8480 (0.50)
Con A	23434	12332 (0.52)	10080 (0.43)	15294 (0.65)

Lymphocyte stimulation was performed by the whole blood culture method.

^a) Inhibitory index = $\frac{\text{c.p.m. of cultures from rabbit after administration}}{\text{c.p.m. of cultures from rabbit before administration}}$

Rabbit was i.v. administrated with $750 \mu\text{g}$ of Fr II-2.

Fig. 6. Influence of the administration of the toxin (Fr II-2) on the number of peripheral lymphocytes and neutrophils in rabbit.

Fig. 7. Fluctuations of the number of peripheral blood leukocytes of rabbits when infected with *C. albicans* MTU 12021 and MTU 12021. The inocula of the yeast cells were: MTU 12024 2×10^7 cells (—●—), 1×10^7 cells (—△—), 2×10^6 cells (—○—) and MTU 12021 2×10^7 cells (---■---), 1×10^7 cells (---□---).

阻害が感染の場においても演じられている可能性を求めて、ウサギ実験的カンジダ感染における末梢血リンパ球の幼若化反応を経時的に検討することを試みた。*C. albicans* MTU 12021および MTU 12024を 2×10^8 , 1×10^7 , 2×10^6 個ずつ、ウサギの耳翼静脈内に接種し、その後、経時的に感染ウサギの耳翼静脈より採血し、白血球数の測定と微量全血法によるリンパ球の幼若化反応を行い、 2×10^7 個の多量菌接種ウサギにおいては、さらに末梢血液の逆培養と、一部は菌接種5日、6日、10日目に殺し、左右腎の逆定量培養を行った。

末梢血液の逆培養の結果は菌接種後5日目に1例、血中より菌が検出された以外はすべて培養陰性であった。腎逆培養では、感染早期に比較的少量($10^5 \sim 10^7$ CFU/g)の菌が存在していたが、時間の経過とともに菌が減少す

る傾向がみられた。

末梢血白血球数は、 2×10^7 個の多量菌接種ウサギの一部において著しい減少がみられたほかは、菌接種7日目前後にむしろ白血球数の増加傾向が認められた (Fig. 7)。

末梢血リンパ球の全血法による幼若化反応では、 2×10^7 個、 1×10^7 個のいずれの菌接種群においても感染早期に幼若化反応の減弱が認められ、ことに 2×10^7 個菌接種ウサギの一部にはマイトジェン (とくに PHA) 刺激に対して全く反応を示さなくなつたものもみられた (Fig. 8)。また、2種のマイトジェンに対するリンパ球の反応性の減弱にも差があり、この感染実験においては、一般に PHA 刺激に対して反応を示すリンパ球の方がより強く阻害を受けていると思われる傾向が認められ

Fig. 8. Fluctuations of lymphocyte stimulation index in rabbits when infected with *C. albicans* MTU 12021 and MTU 12024. Lymphocyte stimulation as performed by the whole blood culture method. The inocula of the yeast cells were: MTU 12024 2×10^7 cells (—●—), 1×10^7 cells (---△---), 2×10^6 cells (—○—) and MTU 12021 2×10^7 cells (---■---), 1×10^7 cells (---□---).

た。

考 察

深在性真菌症における宿主側の先天的あるいは後天的な免疫不全が、本症の発症およびその経過にきわめて重要な役割を演じていることは、多くの研究者によつて指摘されているが^{2,3,9,10,16}、真菌感染、とくにカンジダ感染において、感染そのものが宿主の免疫能へおよぼす影響をとり上げた報告は少ない。近年、岩田ら^{6,15}は、マウス実験的カンジダ感染で脾臓のTおよびB細胞数が著明に減少し、なかでもCon Aに反応するT細胞がより大きな障害を受けていることを明らかにした。また、*C. albicans*の産生する酸性単純蛋白毒素であるCTがその単独投与によつても同様の傾向を示すことより、カンジダ感染におけるCTの役割がきわめて重要であることを指摘した。

著者らは、*C. albicans*を含む*Candida*属諸菌種の毒力

株の間にCTもしくは類似の高分子毒素が存在する可能性を求めて、CT産生株以外の毒力株より高分子毒素の分離を試みた。その結果、CTとは物理化学的性状を異にするが、CT類似の急性致死活性を示す糖蛋白毒素を単離し得た²⁰。そして、この毒素の物理化学的ならびに生物学的諸活性を明らかにし、もつて本毒素の感染における役割の一端を究明することを試みてきた^{21,22}。

本毒素は、ウサギの耳翼静脈内に接種すると末梢血リンパ球が短時間に減少するところより²²、本毒素には末梢血リンパ球に対してなんらかの作用があるのではないかと思われた。そこで、このような毒素のリンパ球に対する作用を検討する目的で、まず最初に、*in vitro*においてより生体内に近い条件と思われる末梢血微量全血法によるリンパ球幼若化反応での毒素の本反応におよぼす影響を調べた。

末梢血微量全血法によるリンパ球の幼若化は、Paty

and Hughs¹²⁾, Park and Good¹¹⁾, および山田ら¹⁹⁾によつて検討された方法で、本法の特徴は簡便さの他に、とくにリンパ球分離培養法と比較して、自己血清および顆粒球や赤血球などのリンパ球以外の細胞の存在が上げられ、より *in vivo* に近い状態でリンパ球の幼若化が測定されることにある。このような微量全血法を著者らはウサギ末梢血に応用すべく基礎実験をおこなつた結果、ほぼ上記報告と一致する良好な成績が得られた。このような全血法によるリンパ球幼若化反応の系に毒素を添加した場合、PHA, Con A いずれの刺激に対する幼若化反応も明らかに阻害され、さらに、一定の添加毒素濃度間において用量応答関係が認められた。また、毒素による幼若化阻害の時間的経過を検討した結果、マイトジェン刺激3時間後に毒素を添加した系においても、明らかな阻害がみられ、対照に用いた *C. albicans* マンナンの作用ときわだつた相違がみられた。すなわち、本毒素の幼若化阻害活性は、毒素の多糖部分がマイトジェンであるPHAやCon Aと結合したためにおきる非特異的幼若化阻害である可能性は、マイトジェン刺激後3時間目に毒素を添加しても同程度の阻害を示すことや、PHA, Con A いずれのマイトジェン刺激に対しても同程度の阻害活性が認められるところより、その可能性は少ないことが示唆された。しかし、Con A による幼若化反応では、Con A の存在が20時間まで必要であり、それ以前のCon A の除去は³H チミジンのとり込みに大きな影響があるといわれているため、本毒素の構成糖であるマンノースによる非特異的幼若化阻害実験を試みた結果、200 μ g 程度のマンノース添加では、親和性の強いCon A の系においてもその阻害は微弱であつた。Toyoshima ら¹⁴⁾は、Con A およびPHAの幼若化に対する各種糖の影響を調べているが、PHAは α Man (1 $\rightarrow$ 2) Man, α Man (1 $\rightarrow$ 6) Man のいずれによつても5 mg/ml の濃度で阻害されないが、Con A は著明な阻害を受けることを報告している。また、マンノースは、PHAによる幼若化を阻害しないが、Con A は250 μ g の添加によつてその幼若化の40%近くを阻害(³H チミジンとり込み阻害)することを報告¹³⁾している。このような文献値および著者らの実験から、毒素のPHAおよびCon A によるリンパ球の幼若化阻害は、第一にマンノースに親和性のないPHAに対しても阻害活性があり、第二に幼若化阻害のタイムコースから、添加時期によりその阻害があまり影響を受けないところから、少なくともPHA刺激によるリンパ球幼若化阻害においては、毒素の多糖(マ

ンナン)部分による非特異的阻害とは考えられず、毒素が直接、あるいは血液成分を介しての二次的作用によつてリンパ球になんらかの影響をおよぼし、幼若化阻害へと進んだものと考えられる。これに対して *C. albicans* マンナンのCon A 刺激における幼若化阻害は、その阻害の時間的経過より、Con A と結合することによつて生じた非特異的阻害と判断された。一方、PHA 刺激における幼若化阻害においては、その時間的経過は特異なパターンを示し、PHA がマンナンの α Man (1 $\rightarrow$ 6) Man に対して親和性がないことを考えるとこの阻害はどのような機作によつて生じたのか不明である。

ウサギ末梢血より分離したリンパ球を用いる幼若化反応においても、毒素は全血におけると同様、幼若化阻害を示したが、多血小板血漿の添加によつてその阻害はより強く現われるところより、本毒素の全血法での幼若化阻害活性に血小板などの成分が関与していることが示唆され、本毒素の補体活性化能や血液凝固系への作用と考え併せると興味深い。

毒素を接種したウサギの末梢血リンパ球を調べた実験では、毒素接種直後よりリンパ球数の減少が観察され、同時にPHA, Con A いずれのマイトジェンに対するリンパ球幼若化反応も減弱する傾向が認められた。しかし、このリンパ球幼若化の減弱は、全血法で調べているためリンパ球数の減少による反応性の減弱も考慮しなければならない、いずれにしても毒素接種によつて末梢血全体としてその反応性が低下していることは明らかである。このように、*in vitro* における毒素の作用がある程度 *in vivo* においても再現することができたが、同様の所見は程度の差こそあれ、ホルマリン死菌接種ウサギにおいてもみられた。また、ウサギを用いた実験的カンジダ感染で末梢血リンパ球幼若化反応の経時的推移を調べた実験では、多量菌接種の場合は短時間で末梢血リンパ球のマイトジェンに対する反応性が激減し、ついには死亡するという経過をとり、これより少ない菌量接種においてもリンパ球の反応性は一時的に減弱することが判明した。

リンパ球幼若化、とくにT細胞のそれは、抗原刺激により宿主に細胞性免疫が誘導される場合に最初にみられる変化としてとらえられており⁸⁾、マイトジェンによる幼若化反応は、リンパ球活性化機構の解析に好適なモデルを提供している。このようなリンパ球の活性化に影響をおよぼす微生物菌体成分およびその関連物質では、B細胞を活性化するものとして細菌内毒素(LPS)や

Nocardia opaca の NWSM 画分¹⁾, ブドウ球菌エンテロトキシン¹⁸⁾, 溶連菌の外毒素⁹⁾などがある。反面, コレラ毒素¹⁷⁾は PHA による幼若化を阻害し, また, *Helminthosporium dermatioideum* の代謝産物である cytochalasin B²⁰⁾は PHA によつておこる細胞膜糖蛋白の再配置阻害をおこすとされている。著者らの分離した *C. albicans* 糖蛋白毒素も比活性は弱い, PHA, Con A による T 細胞の幼若化に対して阻害的に作用し, その作用には, 毒素のリンパ球への直接的な作用の他に, 血小板などの血液成分を介しての作用も示唆されたが, その機序は今後の解明に待たなければならない。

以上のごとく, ウサギの実験的カンジダ感染症において, 末梢血リンパ球の減少とその活性の低下が認められ, このような感染経過における宿主免疫機構へおよぼす菌側の要因として本毒素は極めて重要であることが判明した。

文 献

- 1) Bona, C., Damais, C. and Chedid, L.: Blastic transformation of mouse spleen lymphocytes by a water soluble mitogen extracted from *Nocardia*. Proc. Nat. Acad. Sci., **71**: 1602—1606, 1974.
- 2) Buckley, R.H., Lucas, Z.T., Hattler, B.G., Zmitjewski, C.M. and Amos, D.B.: Defective cellular immunity associated with chronic mucocutaneous moniliasis and recurrent staphylococcal botryomycosis: Immunological reconstitution by allogenic bone marrow. Clin. Exp. Immunol., **3**: 153—169, 1968.
- 3) Canals, L., Middleas, R.D., Rouro, J.M. and South, M.A.: Immunological observations in chronic mucocutaneous candidiasis. Lancet, **13**: 567—571, 1969.
- 4) Edelman, G.M., Yahara, I. and Wang, J.L.: Receptor mobility and receptor-cytoplasmic interactions in lymphocytes. Proc. Nat. Acad. Sci., **70**: 1442—1446, 1973.
- 5) Hanna, E.E. and Watoson, D.W.: Enhanced immunosuppression by streptococcal pyrogenic exotoxin. Infect. Immun., **7**: 1009—1011, 1973.
- 6) Iwata, K. and Uchida, K.: Cellular immunity in experimental fungus infections in mice: The influence of infections and treatment with a *Candida* toxin on spleen lymphoid cells. Mykosen, Suppl. **1**: 72—81, 1978.
- 7) 岩田和夫, 内田勝久, 遠藤博子: *Candida albicans* の新毒性子質 “Candidotoxin” 1. 菌株と毒力の関係および毒性物質産生条件. 医学と生物学, **74**: 346—350, 1967.
- 8) 菊地浩吉, 橋本嘉幸: 細胞性免疫のメカニズム—その成立と発現—. 代謝, **12**: 677—694, 1975.
- 9) Kirkpatrick, C.H.: Chronic mucocutaneous candidiasis: Model-building in cellular immunity. Ann. Intern. Med., **74**: 955—978, 1971.
- 10) 名嘉真武男, 皆見紀久男: 真菌症の発症要因, とくに免疫不全と chronic mucocutaneous candidiasis. 総合臨床, **21**: 2265—2277, 1969.
- 11) Park, B.H. and Good, R.A.: A new micro method for evaluating lymphocyte responses to phytohemagglutinin: Quantitative analyses of function of thymus dependent cells. Proc. Nat. Acad. Sci., **69**: 371—373, 1972.
- 12) Paty, D.W. and Hughs, D.: Lymphocyte transformation using whole blood cultures on analyses of responses. J. Immunol. Method, **2**: 99—114, 1972.
- 13) Toyoshima, S., Akiyama, Y., Nakano, K., Tonomura, A. and Osawa, T.: A phytomitogen from *Wistaria floribunda* seeds and its interaction with human peripheral lymphocytes. Biochemistry, **10**: 4457—4463, 1971.
- 14) Toyoshima, S., Fukuda, M. and Osawa, T.: Chemical nature of the receptor site for various phytomitogens. Biochemistry, **11**: 4000—4005, 1972.
- 15) 内田勝久, 岩田和夫: 真菌症の感染成立機序とその免疫学的背景. 真菌誌, **47**: 69—74, 1976.
- 16) Valdimarsson, H., Higgs, J.M., Wells, R.S., et al.: Immune abnormalities associated with chronic mucocutaneous candidiasis. Cell. Immunol., **6**: 348—361, 1973.
- 17) Vischer, T.L. and Lospalluto, J.J.: The differential effect of cholera toxin on the lymphocyte stimulation induced by various mitogens. Immunology, **29**: 275—282, 1975.
- 18) Warren, J.R. and Metzger, J.H.: Evidence for cell-receptor activity in lymphocyte stimulation by staphylococcal enterotoxin. J. Immunol., **115**: 49—53, 1975.
- 19) 山田 尚, 溝口靖紘, 門奈丈之, 山本祐夫, 森沢成司: 微量全血培養法によるリンパ球幼若化反応の基礎的検討. 臨床免疫, **8**: 917—924, 1976.
- 20) 山本容正, 岩田和夫: *Candida albicans* の産生する糖蛋白毒素に関する研究. 第1報 分離・精製と物理化学的性状. 真菌誌, **21**: 264—273, 1980.
- 21) 山本容正, 岩田和夫: *Candida albicans* の産生する糖蛋白毒素に関する研究. 第2報 毒素および菌体マンナン. *Limulus amoebocyte lysis*

- te (LAL) のゲル化活性. 真菌誌, 21: 274—285, 1980.
- 22) 山本容正, 岩田和夫: *Candida albicans* の産生する糖蛋白毒素に関する研究. 第3報 補体および末梢血白血球に及ぼす影響. 真菌誌, 22: 223—233, 1981.
- 23) Yoshinaga, M., Yoshinaga, A. and Waksman, B.H.: Regulation of lymphocyte responses *in vitro*, potentiation and inhibition of rat lymphocyte responses to antigen and mitogens by cytochalasin B. Proc. Nat. Acad. Sci., 69: 3251—3255, 1972.

Studies on Glycoprotein Toxins Produced by a *Candida albicans* Strain

IV. The Effects on Peripheral Blood Lymphocytes

Yoshimasa Yamamoto and Kazuo Iwata

Department of Microbiology, Meiji College of Pharmacy,
Setagaya-ku, Tokyo 154, Japan

The effects of a glycoprotein toxin (Fr II-2) derived from *Candida albicans* on *in vitro* and *in vivo* transformation of rabbit peripheral lymphocytes were described. The addition of Fr II-2 into the whole blood cultivation method system resulted in the marked inhibition of lymphocyte transformation by PHA and Con A. The change of the inhibitory activity was traced at intervals of addition of the toxin and *Candida* mannan. The toxin inhibited in the same grade at each interval, whereas mannan did not inhibit when added after stimulation with those mitogens. When formol-killed and living cells of *C. albicans* were intravenously injected into rabbits, peripheral lymphocytes were decreased in population, and their responsiveness to mitogens. These results suggest that glycoprotein toxins would play an important part in impairment of host defense mechanisms involving cellular immunity by *C. albicans* infection.