風鳥類總目錄

理學博士 侯爵 黒田 長禮

風鳥（俗稱即ち外國名直譯の「極樂鳥」）の類は新幾内亞を主産地としその附近の小島並びに數種は濠洲大陸に分布するのみの鳥類で、且つ中型のものとしては最美の種類を含むことは世人によく知られてゐる。

扱て此鳥類に關する主なる文献は *Levaillant, Ois. Paradis* (1806) を始め *Gould, B. Austr.* (1837, 1838); *Wallace, Malay Archip.*, vol. ii (1869); *Elliot, Monogr. Parad.* (1873); *Sharpe, Cat. B. Brit. Mus.*, iii (1877); *Gould, B. New Guinea* (1879); *Salvadori, Orn. Papuas.*, vol. ii (1881); *Reichenow, Vög. Zool. Gärt.*, vol. ii (1884); *Sharpe, Monogr. Parad.*, vols. i-ii (1891-1898); *A. B. Meyer, Abh. Mus. Dresden*, vol. v (1895); *Rothschild, Fam. Parad., Das Tierreich* (1898); *id., Ibis*, 1911; *Mathews, B. Austr.*, xii (1926); *id., Syst. Av. Australas.*, pt. ii (1930); *Mayr, List of New Guinea Birds* (1941) 等の多くに上る外、斷片的のものは殆んど無數に近く發表せられてゐる。比較的近頃の纏つた目録としては *Mathews* (1930) があるのみで、其の後の10餘年間にも相當の數即ち32種及び亞種が記載されて居り、新幾内亞の完全に近い目録では *Mayr* (1941) がある。又一方 *Rothschild* (1911); *Menegaux* (1915); *Stresemann* (1930) 及び *Mayr* (1941) の研究によつて之迄新種と思はれた只數點或は僅かに1個丈け知られた様な珍鳥の内には雜種なりと認定せらるるもの20をさへ算ふるに至つた。以上の如き結果にて現今迄に完全の目録はない。因つて予は本篇に於て1930—1943 *迄の分を追加した總目録を編し茲に公にせんとする。

アジマヤドリ

風鳥類は大別して風鳥科 (*Paradisaeidae*) と亭鳥科 (*Ptilonorhynchidae*) の2科になり、前科に101種及び亞種、19雜種が含まれ、後科に40種及び亞種、1雜種を有する。兩科全部では57種（獨立の22種を含む）、119亞

* 1940—1942の間に多少落ちがあるかもしれぬ。それは *Zoological Record* の未着のものがある爲めである。

種（141種及び亞種）となる。是等の内1930以後に新記載のものは年代順に分けると次の様である。

1930（6種類發表），1931（6），1932（2），1934（6），1935（1），1936（4），1939（4），1940（2），1943（1），並びに Mathews（1930）の目録に落ちてゐるもの 1915（1）と1923（1）とあり計34種及亞種（但し異名を含む）に達することは如何に新幾内亞地方が未だ完全に調査されてゐないかを窺ふに足るものである。

風鳥科には所謂眞正のオホフウテウ（古名風鳥・無對鳥）・コフウテウを始め各種の著名種例へばジフニセンフウテウ・ハンナガラナガフウテウ・ヒヨクドリ（古名）・キセサウセンフウテウ等やカラス類に似て見えるカラスフウテウ類（*Manucodia*, *Lycocorax*），又一般に著名のロクサンフウテウ（古名黒風鳥）やカタカケフウテウの類も入るのである。

亭鳥科にはアヲアヅマヤドリとかニハシドリとかを主とする。

日本には標本として之迄に約41種位（雑種を除き）あるのみの様であるのは誠に淋しい。大正13年（1924）に關正獻氏が日本鳥學會に出陳されたのが新幾内亞産8種の本割製であつたので當時人目を惹いた。嘗て東京帝室博物館には10種が保存せられてゐた（今は科學博物館にある）。鷹司家に12種類、山階家に23種類、予が24種類を有する。日本に古く乾物で輸入されたのはオホフウテウ（古名風鳥）・ヒヨクドリ（比翼鳥—古名）とロクサンフウテウ（古名黒風鳥）の3種丈けらしく是等の寫生圖が現存する。その年代は大體文化、文政の頃であるが、風鳥なる名は少くとも小野蘭山（享和3年・803）の頃で同氏の本朝群禽和名分類に「フウテウ」の名が出てゐる。

歐洲には飼鳥として輸入せられ各地の動物園等に飼はれたのが Neunzig, Fremdländische Stubenvögel（1921）によると28種の多くに上つてゐることには驚かされる。その内にはオホフウテウ・コフウテウ・アカカザリ・オホフウテウ・ベニフウテウ・アヲフウテウ・ジフニセンフウテウ・キセサウセンフウテウ・ヒヨクドリ・ロクサンフウテウ等を始めシロデクヲナガフウテウ・カタカケフウテウ・其他亭鳥科の種類や濠洲のハンナガクロフウテウ・ウロコフウテウもある。我國に飼鳥として輸入のものは僅かに5種丈けの様で鷹司公爵「飼ひ鳥」によれば、オホフウテウ（大阪動物園）・コフウテウ・ベニフウテウ（アカフウテウ）・ヒヨクドリの4種を掲げられ

てゐる。元福岡市動物園長河野普氏によると大正14年5月支那船が神戸にコフウテウ*（俗稱キング）2羽とロクサンフウテウ（俗稱ルリフウテウ）4—5羽を持来り大阪動物園並びに河野氏の園長時代に熊本動物園にも飼養された由。此外予はロクサンフウテウの1雄が東京の小川飼鳥店に入つたのを實見した。

扱て以下に列挙する總目録には學名・和名・獨英名を附し、Mathews, Syst. Av. Australasianarum, pt. ii, pp. 886-894 (1930) の配列に一致せしめ、この内にある種類には Math, p... を附し、原記載書名を略した。然し Mathews 以後の追加（前記参照）の分には原記載の文獻名其他を明記し、又 Mayr, List of New Guinea Birds (1941) にあるものには Mayr, p.....を附した。其他調査に必要な文獻は註として表はして置いた。分布は成るべく加入した。Mathews 中に種又は亞種とあるもので種雄と認定せられたものは H. 1 を始め H. 20 迄各々正種に近き處に挿入して置いた。各種の番號の前に×印を附したものは本邦に標品あるを示し、C を附したものは飼鳥として本邦或は歐洲に輸入せられた種類であることを示すものである。

本目録を編するに當り貴重なる圖書を貸與せられた鷹司公爵・山階侯爵・蜂須賀侯爵に深く御禮を申上げる。

附記——本目録の和名の大部分は予が新たに附したものでそれは標本により、記載により、原色圖により又分布によつたもので隨分長い名が多くなつたが是等は新稱又は改稱と記るしてある。今後實用上不必要な名は適當に變更して風鳥類に相應しい良い名にしたいと思ふ。御協力を願ふ。但し本篇の始めに書いた様に「極樂鳥」なる名は絶対に用ひないことを主張する。

* 河野氏はオホフウテウとせられるが高島春雄氏の調査ではコフウテウの由（科學知識 xxiii, no. 6, pp. 56—58）

此ノ論文=次ノ歐文「A List of the Birds of Paradise and the Bower-Birds」ガ附屬スル。

A LIST OF THE BIRDS OF PARADISE AND THE BOWER-BIRDS.

Edited by

Marquis KURODA, D. Sc.

Family PARADISÆIDÆ.

Birds of Paradise, Paradise Birds. 風鳥科 [極樂鳥科]
Paradiesvögel.

Genus 1. *Ptiloris* Swainson (1825).

Rifle-birds.

Breitschwingenparadiesvögel.

- × C. 1. *Ptiloris paradiseus* Swainson (1825) ハシナガクロフウテウ
Rifle-bird, Australian Rifle-bird, Long-
beaked Rifle-bird, Paradise Rifle-bird,
Rifleman-bird, Queensland Rifle-bird.
Reiffelparadiesvogel.
C. Queensland: Rockhampton; C. New South
Wales: Hunter River.
Mathews, p. 867.
- × 2. *Ptiloris victoriae* Gould (1850) コハシナガクロフウテウ
Victoria Rifle-bird, Queen Victoria's Rifle-
Bird, Lesser Rifle-bird.
N. Queensland.
Math., p. 867.

Subgenus 1. *Craspedophora* Gray (1840).

- × C. 3. *Ptiloris magnifica magnifica* (Vieillot) (1819) ... ウロクロフウテウ, 鱗胸極樂
鳥 (三吉朋十氏)
Magnificent Rifle-bird, New Guinea Rifle-
bird, Scale-breasted Bird of Paradise.

C indicates that species has been imported into Europe as a cage bird.

Kragenhopf.

N. W. New Guinea.

Math., p. 867; Mayr, p. 174.

- × C. 4. *Ptiloris magnifica intercedens* Sharpe (1882)...ケバナウロコフウテウ (新稱)

Port Moresby Rifle-bird.

Schildparadiesvogel.

S. E. New Guinea: East Cape and Milne Bay.

Math., p. 868, Mayr, p. 174.

5. *Ptiloris magnifica claudia* (Mathews) (1917)...トウガウウロコフウテウ (新稱)

S. E. Queensland: Claudie River.

Math., p. 868.

- × 6. *Ptiloris magnifica yorki* (Mathews) (1922)...ミサキウロコフウテウ (新稱)

Prince Albert's Rifle-bird.

N. Queensland: Cape York.

Math., p. 868.

- H. 1. "Craspedophora mantoui Oustalet" (1892)
=*Ptiloris magnifica* × *Seleucides melano-*
leucus.

(Cf. Stresemann, Nov. Zool., 1930, p. 10;

Mayr, 1941 p. 180).

Mantou's Rifle-bird, White-vented Rifle-bird.

N. W. New Guinea: Arfak Mts. (9 specimens.)

Math., p. 868; Mayr, p. 182.

- H. 2. "Craspedophora duivenbodei Meyer" (1890)
=*Ptiloris magnifica* × *Lophorina superba*.

(Cf. Meise, Abh. Mus. Dresden, xvii, 4,
1929, p. 6; Stresem., 1930, p. 11; Mayr,
1941, p. 180.)

Fan-necked Rifle-bird, Van Duivenbode's Bird
of Paradise.

N. W. New Guinea. (2 specimens.)

Math., p. 868; Mayr, p. 182.

- H. 3. "Janthothorax bensbachi Büttikofer" (1895)

= *Paradisea minor* × *Ptiloris magnifica*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 10; Mayr, 1941,
p. 180.)

Bensbach's Bird of Paradise, Green-headed
Rifle-bird.

N. W. New Guinea: Arfak Mts. (1 specimen.)

Math., p. 869, Mayr, p. 182.

- H. 4. "Paradisea mirabilis Reichenow" (1901)

= *Paradisea minor* × *Seleucides melanoleucus*.*

(Cf. Stresem., 1930, p. 9; Mayr, 1941, p. 180
— *P. minor* × *S. ignotus*).

Long-plumed Green-headed Rifle-bird.

N. E. New Guinea: Kaiser Wilhelmshafen.

(1 specimen.)

Math., p. 869; Mayr, p. 182.

Genus 2. *Seleucides* Lesson (1835).

Twelve-wired Birds of Paradise.

Fadenhopf.

- × C 7. *Seleucides melanoleucus melanoleucus* (Dau-

din)* ジフニセンフウテウ, 十二
線極樂鳥 (飯塚松浦兩氏,
三吉朋十氏)

1800.—*Paradisea melanoleuca* Daudin,

Traite Elem. et complet d'Orn., ii, p. 278

("Waigiu" in error for Arfak Mts.).

1809.—*Paradisea nigricans* Shaw.

Twelve-wired Bird of Paradise, Purple and

Gold Bird of Paradise.

Fadenhopf.

Fig. Johnston, Marvels of the Universe, i,

1912, facing p. 496.

* Nomenclatural note—cf. Hartert, Nov. Zool., xxxvi, p. 33, footnote (1930).

N. New Guinea: Arfak Mts. and Salawati
or Salwatti.

Math., p. 869; Mayr, p. 175.

8. *Seleucidés melanoleucus auripennis* Schluter
(1911)..... コジフニセンフウテウ
(新稱)

S. E. New Guinea: Dallmanshafen.

Math., p. 869; Mayr, p. 175.

Genus 3. *Drepanornis* Sclater (1873).

Horned Birds of Paradise.

9. *Drepanornis albertisii albertisii* (Sclater) (1873)... ツノフウテウ (新稱)
D'Albertis' Bird of Paradise, Horned Bird
of Paradise.
N. W. New Guinea: Arfak Mts.
Math., p. 870; Mayr, p. 170.
10. *Drepanornis albertisii geisleri* Meyer (1892-3) ... ヒガシツノフウテウ (新
稱)
S. E. New Guinea: Sattelberg in Huon Penin.
Math., p. 870; Mayr, p. 170.
11. *Drepanornis albertisii cervinicauda* Sclater
(1883)..... ミナミツノフウテウ (新
稱)
Bennett's Bird of Paradise.
S. New Guinea: vicinity of Port Moresby,
west to Herzog Mts.
Math., p. 870; Mayr, p. 170.
12. *Drepanornis albertisii inverse* Rothschild..... ニシツノフリテウ (新稱)
1936.—*Drepanornis albertisi inverse* Roth-
schild, in Hartert & Paludan, Mitt. Zool.
Mus. Berlin, xxi, p. 188 (Weyland Berg).
W. New Guinea: Weyland Mts. to Sepik Mts.
Mayr, p. 170.

Genus 4. *Drepananax** Sharpe (1894).

Bare-eyed Birds of Paradise.

13. *Drepananax bruijni* (Oustalet) (1880)ナガキバシフウテウ (新稱)

Bare-eyed Bird of Paradise, Bruijn's Bird of Paradise.

New Guinea: north coast.

Math., p. 870; Mayr. p. 170.

Genus 5. *Epimachus*† Cuvier (1817).

Sickle-billed Birds of Paradise.

Sichelschnabelparadiesvögel.

- × 14. *Epimachus fastuosus fastuosus*‡ (Hermann) (1783).....カマバシフウテウ (改稱), ハシナガヲナガフウテウ (黒田), ヲナガフウテウ (黒田), 尾長極樂鳥 (三吉朋十氏)

Sickle-billed Bird of Paradise, Great Sickle-billed Bird of Paradise, Long-tailed Bird of Paradise, Great Epimaque.

Sichelschnabelparadiesvogel.

N. W. New Guinea: Arfak Mts.

Math., p. 870; Mayr. p. 170.

15. *Epimachus fastuosus atratus* (Rothschild & Hartert) (1911)ニシカマバシフウテウ (新稱)

W. New Guinea: Mt. Goliath (type 10c.);

Wandammen; Weyland Mt.; Gebroeders

(6,000-7,000 ft.).

* Mayr (1941) has united it with *Drepanornis*.

† Review of races—*cf.* Stresem., Arch., Naturg. Berlin, 89 A, Heft 7-8, p. 34 (1923); Rothschild, Nov. Zool., xxxvi, pp. 253, 276 (1931); id., Mitt. Zool. Mus. Berlin, xxi, p. 138 (1936).

‡ Nomenclature—*cf.* Stresem., Nov. Zool., xxvii, p. 328 (1920).

Math., p. 871; Mayr, p. 171.

16. *Epimachus fastuosus stresemanni* Hartertチュウブカマバシフウテ
ウ (新稱)

1930.—*Epimachus fastuosus stresemanni* Har-
tert, Nov. Zool., xxxvi, p. 34 (Schraderberg,
Upper Sepik).

N. E. New Guinea: Schraderberg in Sepik
region.

Mayr, p. 171.

- × C. 17. *Epimachus meyeri meyeri* Finsch (1885)チャバラカマバシフウテ
ウ (改稱), マイエル極
樂鳥 (飯塚・松浦兩氏)

Meyer's Sickie-billed Bird of Paradise.

Meyers Sichelschnabelparadiesvogel.

S. E. New Guinea: Astrolabe Mt.; Mt. Vic-
toria.

Math., p. 871; Mayr, p. 171.

18. *Epimachus meyeri albicans* (Van Oort)ニシチャバラカマバシフ
ウテウ (新稱)

1915.—*Falcinellus meyeri albicans* Van Cort,
Zool. Meded. Leiden, i, p. 226 (Treub Mts.,
C. New Guinea).

W. & C. New Guinea: Weyland Mt.; Treub
Mts. (7,690 ft.—type loc.); Gebroeders (6,000-
7,000 ft.).

Mayr, p. 171.

- H. 5. "Epimachus ellioti Ward" (1873)
=*Epimachus fastuosus* × *Astrapia nigra*.
(Cf. Stresem., 1930, p. 13; Mayr, 1941, p.
180.)

Purple-backed Bird of Paradise, Elliot's Bird
of Paradise.

Fig.: Elliot, Monogr. Parad., pl. xx (1873).

W. New Guinea. (2 specimens.)

Math., p. 871; Mayr, p. 181 (*Astrapimachus
ellioti* (Ward)).

- H. 6. "Epimachus astrapioides Rothschild" (1898)
 = *Epimachus fastuosus* × *Astrapia nigra*.
 (Cf. Stresem., 1930, p. 13; Mayr, 1941, p. 180.)
 Green-breasted Sickie-billed Bird of Paradise.
 Fig.: Hartert, Nov. Zool., xviii, pl. vii (1911).
 W. New Guinea. (1 specimen.)
 Math., p. 871; Mayr, p. 181 (in synonymy).
- H. 7. "Pseudastrapia lobata Rothschild" (1907)
 = *Paradigalla carunculata* × *Eimachus fastuosus*.
 (Cf. Stresem., 1930, p. 13; Mayr, 1941, p. 180.)
 W. New Guinea. (1 specimen.)
 Math., p. 871 (in synonymy); Mayr, p. 181.

Genus 6. *Astrapia* Vieillot (1816).
 Gorgetted Birds of Paradise.
 Langschwanzparadiesvögel.

- × 19. *Astrapia nigra* (Gmelin) (1788) クビカザリラナガフウテ
 ウ (新稱)
 Gorgetted Bird of Paradise, Gorgeted Bird of
 Paradise, Gorget Bird of Paradise, "Para-
 dise Pie."
 W. New Guinea.
 Math., p. 871; Mayr, p. 171.
- × 20. *Astrapia rothschildi* Foerster (1906)* ヒガシクビカザリラナガ
 フウテウ (新稱)
 Fig.: Hartert, Nov. Zool., xviii, pl. viii (1911).
 N. E. New Guinea: Rawlinson Mts. (type loc.)
 in Huon Penin.; Zakaheme or Zagaheme in
 Huon Penin.; Kaiser Wilhelmsland (type

* Cf. Rothschild, Bull. B. O. Cl., xix, p. 8 (1906- descr. ♂ ♀).

loc. for *A. alboundata* Reichenow, 1918).
Math., p. 872; Mayr, p. 172.

Subgenus 2. *Astrarchia* Meyer (1885).

- × C. 21. *Astrapia stephaniæ stephaniæ* (Finsch & Meyer) (1885)..... シロヂクヲナガフウテウ
(新稱)
Blue-eared Bird of Paradise, Prince Stephanie's
Bird of Paradise, Heliotrope Trail.
Stephanies Paradiesvogel.
S. E. New Guinea: Morobe, etc.
Math., p. 872; Mayr, p. 172.
22. *Astrapia stephaniæ ducalis* Mayr トウホクシロヂクヲナガ
フウテウ (新稱)
1931.—*Astrapia stephaniæ ducalis* Mayr,
Mitt. Zool. Mus. Berlin, xvii, p. 711 (Her-
zog Mts., New Guinea).
N. E. New Guinea: Herzog Mts.
Mayr, p. 172.

Subgenus 3. *Tæniaparadisea* Kinghorn (1939).

23. *Astrapia feminina* Neumann ホソヲヲナガフウテウ
(内田氏及黒田新稱)
1922.—*Astrapia stephaniæ feminina* Neu-
mann, Verh. Orn. Ges. Bay., vx, p. 236
(Schraderberg—♀).
1939.—*Astrapia mayeri* Stonor, Bull. B. O.
Cl., vol. 59, p. 57 (Feb. 6, 1939—vicinity
of Mt. Champion, N. E. New Guinea—type,
feathers of a ♂).
1939.—*Tæniaparadisea macnicolli* Kinghorn,
Austr. Zool. Sydney, ix, p. 295, col. pl., map
(Mt. Hagen, N. E. New Guinea).
1940.—*Tæniaparadisea mayeri* (Stonor),
Kinghorn, Austr. Mus. Mag., vii, pp. 130–

131, col. pl. (March 1, 1940—Mt. Hagen).

Ribbon-tailed Bird of Paradise.

N. E. New Guinea: Mt. Champion, Mt. Hagen;

Schraderberg in Sepik distr.

Math., p. 872; Mayr, p. 172.

- × 24. *Astrapia recondita* Kuroda ヒメホソヲラナガフウテ
ウ (内田氏及黒田新稱)

1943.—*Astrapia recondita* Kuroda, Bull. Bio-
geogr. Soc. Jap., xiii, no. 4, p. 33, pl. i (colour-
ed) (? Morobe distr., S. E. New Guinea).

Lesser Ribbon-tailed Bird of Paradise.

S. E. New Guinea: ? Morobe distr. (2♂♂).

Subgenus 4. *Calastrapia* Sharpe (1898).

- × 25. *Astrapia splendidissima splendidissima* Roth-
schild (1895) フトヲラナガフウテウ
(新稱)

White-tailed Gorgetted Bird of Paradise.

N. W. New Guinea: Arfak, Snow, and Wey-
land Mts.

Math., p. 872; Mayr, p. 171.

26. *Astrapia splendidissima helios* Mayr オホフトヲラナガフウテ
ウ (新稱)

1936.—*Astrapia splendidissima helios* Mayr,
Amer. Mus. Nov., no. 869, p. 3 (Mt. Goliath,
Oranje range, Dutch New Guinea—♂ ad.).

W. New Guinea; Mt. Goliath.

Genus 7. *Paradisaea* Linnæus (1758).*

Birds of Paradise.

Paradiesvögel.

- × C. 27. *Paradisæa apoda apoda* Linnæus (1758) オホフウテウ, 風鳥 (古
名), 無對鳥 (古名), 大
極樂鳥 (通稱), 無脚極
樂鳥 (三吉朋十氏)

* Review of spp. and races—cf. Stressem., Arch. Naturg. Berlin, 89A, Heft 7-8, p. 38 (1923).

Great Bird of Paradise.

Grosser Paradiesvogel, Göttervogel.

Aru Is. [Little Tobago, West Indies (introduced
in 1911).]

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

- × 28. *Paradisæa apoda novæguineæ* D'Albortis &
Salvadori (1879) = ウギニアオホフウテウ
(改稱), = ウギニアフ
ウテウ (松浦氏), 義氣
黄鳥 (和田儀太郎氏)

Fly River Bird of Paradise.

S. New Guinea: Fly River.

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

- × H. 8. “*Paradisea apoda luptoni* Lowe”.*
= *Paradisæa apoda novæguineæ* × *P. a. salvadorii*. (Cf. Mayr, 1941, p. 181).
1923.—*Paradisea apoda luptoni* Lowe, Bull.
B. O. Cl., vol. 43, p. 110 (March 5, 1923—
“Meranke” distr.).
S. W. New Guinea: Merauke distr.
May, p. 183.

29. *Paradisæa apoda salvadorii* Mayr & Rand† ... セグロアカカザリオホフ
ウテウ (新稱)
1935.—*Paradisea apoda salvadorii* Mayr &
Rand, Amer. Mus. Nov., no. 814, p. 11
(Aug. 1, 1935—♂ ad., Vanumai, Centr. Div.,
Territ. of Papua).
New Guinea: Vanumai, Centr. Div., Territ.
of Papua.
Mayr, p. 177.

- × C. 30. *Paradisæa apoda raggiana* Sclater (1873) アカカザリオホフウテウ
(改稱), 赤飾風鳥 (松
浦氏)

* Colour intermediate between *novæguineæ* and *raggiana* (Lowe, *t. c.*).

† *P. raggiana* is intermediate between *salvadorii* and *intermedia* (Mayr & Rand, *t. c.*).

Marquis Raggi's Bird of Paradise.

Karminroter Paradiesvogel.

New Guinea: Orangeisa Bay.

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

- × 31. *Paradisæa apoda intermedia* De Vis (1894) ...キセアカカザリオホフウテウ (改稱), 黄背赤飾風鳥 (松浦氏)

De Vis's Bird of Paradise.

S. E. New Guinea: Kumusi River (type loc.);
island from Huon Gulf (=Holnicote Bay,
Kumusi R.).

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

32. *Paradisæa apoda granti* North (1906)キアカカザリオホフウテウ (新稱)

S. E. New Guinea: between the Mambare River
and Salamao, Huon Gulf.

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

- × 33. *Paradisæa apoda augustævictoriæ* Cabanis
(1888)キセキカザリオホフウテウ (改稱), オウグスト
ビクトリアフウテウ (松浦氏)

Empress of Germany's Bird of Paradise, Em-
press Augusta Paradise Bird.

E. New Guinea: Kaiser Wilhelmsland.

Math., p. 873; Mayr, p. 177.

- H. 9. "Paradisæa maria Reichenow" (1894)
=*Paradisæa apoda augustævictoriæ* × *P. guil-
ielmi*マリアフウテウ (松浦氏)
(Cf. Stresem., 1930, p. 9; Mayr, p. 181.)

Dark-chested Bird of Paradise, Mrs. Reichenow's
Bird of Paradise.

E. New Guinea: Finisterre Mts. (5 specimens.)

Math., p. 874; Mayr, p. 182.

34. *Paradisæa decora* Salvin & Godman (1883) ...ベニカザリフウテウ (改
稱), ダントルカストウ
フウテウ (松浦氏)

Grey-chested Bird of Paradise.

D'Entrecasteaux Archipelago: Fergusson Island.

Math., p. 874; Mayr, p. 178.

- × C. 35. *Paradisæa minor minor* Shaw (1809)*..... コフウテウ, 小碧玉 (三吉朋十氏), キング (河野普氏)

Lesser Bird of Paradise.

Kleiner Paradiesvogel.

N. W. New Guinea: Humboldt Bay, Etna Bay, etc.

Math., p. 874; Mayr, p. 178.

- H. 10. "Neoparadisæa ruysi Van Oort" (1906)

= *Paradisæa minor minor* × *Diphyllodes m. magnificus*.

(Cf. Stressem., 1930, p. 8; Mayr, 1941, p. 180.)

N. W. New Guinea: near Warsembo, west coast of Geelvink Bay.
(1 specimen.)

Math., p. 878, Mayr, p. 182.

36. *Paradisæa minor pulchra* Mayr & de Schau-

ensee シロカザリコフウテウ
(新稱)

1940.—*Paradisæa minor pulchra* Mayr & de

Schauensee, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., vol.

91, "1939" (1940), p. 151 (Tip, Misol).

Misol or Mysol I.: Tip.

Mayr, p. 178.

- × 37. *Paradisæa minor jobiensis* Rothschild (1897)... ジョビタウコフウテウ
(改稱), ジョビタウフ
ウテウ (松浦氏)

Jobi Lesser Bird of Paradise.

Jobi Island (=Japen I.)

Math., p. 874; Mayr, p. 178.

- × 38. *Paradisæa minor finschi* A. B. Meyer (1885)... セイナンコフウテウ (改稱), ファインチ氏風鳥
(松浦氏)

* *Paradisæa minor* var. *albescens* Musschenbroek (1883) is a partial albino (cf. Mathews, p. 874, footnote).

Finsch's Bird of Paradise.

S. W. New Guinea: Karan.

Math., p. 874; Mays, p. 178.

H. 11. "Paradisæa mixta Rothschild" (1921)

= *P. minor finschi* × *P. apoda augustævictoriæ*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 14; Mayr, 1941, p. 181.)

Loc. Unknown. (2 specimens.)

Math., p. 873; Mayr, p. 183.

H. 12. "Paradisæa duivenbodei Menegaux" (1913)

= *P. minor finschi* ? × *P. guilielmi*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 9; Mayr, 1941, p. 181.)

N. W. New Guinea: near Jaur, Geelvink Bay.

Math., p. 874 (in synonymy); Mayr, p. 182.

Subgenus 5. *Trichoparadisæa* Meyer (1893).

39. *Paradisæa guilielmi* Cabanis (1888) シロカザリフウテウ
(改稱), 綠頭風鳥(松浦氏)

White-plumed Bird of Paradise, Emperor of
Germany's Bird of Paradise, Emperor Wil-
liam's Bird of Paradise.

E. New Guinea: Huon Gulf.

Math., 874; Mayr, p. 178.

Subgenus 6. *Uranornis* Salvadori (1876).

- × C. 40. *Paradisæa rubra* Daudin (1800) ベニフウテウ (鷹司公),
赤風鳥 (松浦氏)

Red Bird of Paradise, Blood-Red Bird of Para-
dise.

Roter Paradiesvogel.

Waigeu or Waigou; Batanta: Mt. Behenoe;
Gemein.

Math., p. 875; Mayr, p. 178.

Subgenus 7. *Paradisornis* Finsch (1885).

- C. 41. *Paradisæa rudolphi rudolphi* (Finsch) (1885).....アヲフウテウ, 青風鳥(松浦氏)

Blue Bird of Paradise, Prince Rudolph's Bird of Paradise.

Blauer Paradiesvogel.

Fig.: Johnston, Marvels of the Universe, i, col. pl. (♂ ♀), facing p. 521 (1921); Crandall, Z. Soc. Bull. New York, xxiv, col. pl. (display) (1921).

New Guinea: Horseshoe and Owen Stanley Mts. (type loc.); Iole (near the south coast).

Math., p. 875; Mayr, p. 178.

- × 42. *Paradisæa rudolphi ampla* Greenwayシンアヲフウテウ(新稱)
1934.—*Paradisæa rudolphi ampla* Greenway,
Proc. N. Eng. Zool. Cl., xiv, p. 1 (Mt. Misim, 5,700 ft., Morobe distr., New Guinea).
“Blue Bird.”
S. E. New Guinea: Mt. Misim, Morobe distr.
Mayr, p. 179.

Genus 8. *Cicinnurus* Vieillot (1816).*

King Birds of Paradise.

Schnirkelschweifen.

43. *Cicinnurus regius regius* (Linnæus) (1758)ヒョクトドリ(比翼鳥—古名), 王極樂鳥(飯塚・松浦兩氏), 王風鳥(俗稱), 極樂王鳥(三吉朋十氏), オウサマゴクラクテウ(古川高島兩氏), 帝王極樂鳥(高島氏), キング風鳥(菊池標本社)

Syn.: 1834.—*Cicinnurus spiniturix* Lesson,

* Review—cf. Stresem., Arch. Naturg. Berlin, 89A, Heft 7-8, p. 36 (1923).

Nat. Hist. Ois, Parad., Syn., p. 14 (New Guinea). Cf. Math., 876.

King Bird of Paradise.

Königsvogel, Königsparadiesvogel.

Aru Is.

Math., p. 876, Mayr, p. 176.

- ×C.44. *Cicinnurus regius rex* (Scopoli)*.....セイナンヒョクドリ (新稱)

1788.—*Paradisea Rex* Scopoli, Del Faun. et

Flor. Insbr., pt. ii, p. 88 (New Guinea. Restr.

type loc.: Sorong Distr., Western New

Guinea—Mayr, 1941).

1835.—*Cicinnurus spinturnix* Lesson, Ois.

Parad., p. 182, pls. xvi-xviii (Dorei. Restr.

type loc.: Manokwari, Vogelkop—Mayr,

1941).

1915.—*Cicinnurus regius claudii* Ogilvie-

Grant, Ibis, 1915, Suppl. ii, p. 16 (Parimau,

Mimika River, S. W. New Guinea).

All New Guinea (except the north between the head of Geelvink Bay and the Huon Gulf);

Wajom; Misol; Tip; Salawati; Batanta.

Math., p. 876; Mayr, p. 176.

45. *Cicinnurus regius gymnorhynchus* Stresemann

(1922).....ヒガシヒョクドリ (新稱)

E. New Guinea: Heldbach coast, Schraderberg.

Math., p. 876; Mayr, p. 176.

46. *Cicinnurus regius similis* Stresemann (1922) ...ルキジヒョクドリ (新稱)

N. E. New Guinea: Stephansort (=Torricelli

Mts.) to Astrolabe Bay.

Math., p. 876; Mayr, p. 176.

47. *Cicinnurus regius cryptorhynchus* Stresemann

* Review for *rex* and *claudii* and variation.—Cf. Mayr & de Schauensee, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., vol. 91, p. 156 (1940); Mayr, Amer. Mus. Nov., no., 1133, p. 8 (Aug. 6, 1941).

- (1922)* セイホクヒョクドリ (新稱)
- N. W. New Guinea: Mamberano and Tana.
Math., p. 876; Mayr, p. 176.
48. *Cicinnurus regius coccineifrons* Rothschild
(1891)..... ジョビタウヒョクドリ (新稱)
Jobi Island King Bird of Paradise.
Jobi I. (=Japan).
Math., p. 877; Mayr, p. 177.
- H. 13. “*Diphyllodes gulielmi* III Meyer” (1875)
= *Cicinnurus regius* × *Diphyllodes magnificus*.
(Cf. Meise, 1929, p. 8; Stresem., 1930, p. 7;
Rosseau-Decelle, L'Oiseau, vii, 1937, p. 240;
Mayr, p. 180.
King of Holland's Bird of Paradise, Curly-tailed
Bird of Paradise.
“Waigeu” (error!—Mayr, 1941).
Math., p. 877; Mayr, p. 182.

Genus 9. *Diphyllodes* Lesson (1834).

Magnificent Birds of Paradise.

Leierschwanzparadiesvögel.

- × C. 49. *Diphyllodes magnificus magnificus* (Pennant)
(1781)† キンミノフウテウ (内
田氏新名), キセサウセ
ンフウテウ, 黄背雙線
極樂鳥 (飯塚・松浦兩
氏), 華麗極樂鳥 (津山
尙氏・三吉朋十氏)
- Magnificent Bird of Paradise, Lesson's Bird of
Paradise, Golden-naped Bird of Paradise.
Prachtleierschwanzparadiesvogel.
N. W. New Guinea: Arfak and Onin Penin.

* Review for plumage and range.—Cf. Hartert, Nov. Zool., xxxvi, p. 35 (1930).

† For range of races, cf. Hartert, Nov. Zool., xxxvi, pp. 35–36 (1930);
Rothschild, *op. cit.*, xxxvi, p. 255 (1931).

(type loc. not determined) and Salawati or
Salwatti I.

Math., p. 877; Mayr, p. 175.

50. *Diphyllodes magnificus intermedius* Hartert ... セツザンキンミノフウテ
ウ (新稱)

1930.—*Diphyllodes magnificus intermedius*

Hartert, Nov. Zool., xxxvi, p. 36 (Snow

Mts., 2500 ft., Dutch New Guinea).

W. New Guinea: Snow Mts. (Kapare, Iwaka,
Utakwa Rivers up to 2,500 and 2,900 ft.
[Hartert, 1930]).

51. *Diphyllodes magnificus chrysopterus* Elliot
(1873).....キンバネキンミノフウテ
ウ (新稱)

Gold-winged Bird of Paradise.

Jobi (=Japen) Island and north coast east of
Geelvink Bay at least as far east as the Sepik
River (Hartert, 1930).

Math., 878; Mayr, p. 175.

- × C. 52. *Diphyllodes magnificus hunsteini* A. B. Meyer
(1885).....ニシキンミノフウテウ
(新稱)

Hunstein's Magnificent Bird of Paradise, Hun-
stein's Bird of Paradise.

Hunsteins Paradiesvogel, Eberhauerparadies-
vogel.

N. E. New Guinea; S. E. New Guinea: Morobe;
Owen Stanley Range; Bubui R., north of
Huon Gulf.

Math., p. 878; Mayr, p. 175.

- H. 14. "*Cicinnurus lyrogryus* Currie" (1900)
=*Diphyllodes magnificus* × *Cicinnurus regius*.
(Cf. Stresem., 1930, p. 7; Mayr, 1941, p. 180.)

W. New Guinea.

Math., p. 877; Mayr, p. 182.

- H. 15. "*Cicinnurus goodfellowi* Ogilvie-Grant" (1907)

=*Cirinnurus regius* × *Diphyllodes gulielmi-tertii* (cf. Rothschild, Ibis, 1911, p. 361—descr.).

=*Diphyllodes magnificus* × *Cicinnurus regius* (cf. Stresem., Nov. Zool., 1930, p. 7; Mayr, 1941, p. 180).

Mountain King Bird of Paradise.

W. New Guinea: Cyclops Mts.

Math., p. 877; Mays, p. 182.

Subgenus 8. *Schlegelia* Bernstein (1864).

53. *Diphyllodes respublica** Bonaparte トクトウサウセンフウテ
ウ (新稱)

1850.—*Diphyllodes respublica* Bonaparte, C. R.
Ac. Sci., vol., xxx, p. 291.

1850.—*Paradisea wilsoni* Cassin, Proc. Acad.
Nat. Sci. Philad., 1850, p. 57 (Waigeu and
Batanta).

Bare-headed Bird of Paradise, Wilson's Bird
of Paradise.

Waigeu or Waigou and Batanta: Mindoko
(about 800 ft. above sea level).

Math., p. 878; Mayr, p. 176.

Genus 10. *Pteridophora* Meyer (1894).

Enamelled Birds of Paradise.

Wimpelträger.

54. *Pteridophora alberti alberti* A. B. Meyer
(1894) フキナガシフウテウ (新
稱)

Enamelled Bird of Paradise, King of Saxony's

Bird of Paradise, Albert's Bird of Paradise.

Wimpelträger.

* Note on the type—cf. Mayr & de Schauensee, Proc. Ac. Nat. Sci. Phil., Vol. 91, "1939," p. 162 (1940); on display—cf. Winterbottom (1928).

N. W. New Guinea: Amberno River.

Math., p. 879; Mayr, p. 179.

55. *Pteridophora alberti bürgesi* Rothschild チュウブフキナガシフウ
テウ (新稱)

1931.—*Pteridophora alberti bürgesi* Rothschild,

Nov. Zool., xxxvi, p. 253 (Schrader Berg,

Sepik River distr., Northern New Guinea).

N. E. New Guinea: Schraderberg, Sepik River
distr.

Mayr, p. 179.

Genus 11. Semioptera Gray (1859).

Standard Wings.

- × 56. *Semioptera wallacii wallacii* (Gray) (1859) シラハタフウテウ (内田
氏新名), シカタセンフ
ウテウ, 四肩線極樂鳥
(飯塚・松浦兩氏), 正翼
極樂鳥 (三吉朋十氏),
ヘラバネゴクラクテウ
(古川・高島兩氏)

Wallace's Standard Wing, Standard Wing.

Batchian or Batjan.

Math., p. 879.

- × 57. *Semioptera wallacii halmaherae* Salvadori (1881) ... キタシラハタフウテウ
(新稱)

Standard-Bearer Bird of Paradise.

Halmahera.

Math., p. 879.

Genus 12. Phonygamus Lesson & Garnot (1826).*

Manucodes.

Brauenbuschelparadiesvögel.

58. *Phonygamus keraudrenii keraudrenii* (Lesson

& Garnot) (1826) アラヤブカラスフウテウ

(新稱)

Manucode, Keraudren's Manucode.

* Races listed—cf. Hartert, Nov. Zool., 1930, p. 39.

- N. New Guinea : Dorey (type loc.).
Math., p. 879 ; Mayr, p. 169.
59. *Phonygamus keraudrenii gouldi* (Gray) (1859)... ミドリヤブカラスフウテ
ウ (新稱)
Gould's Manucode.
Australia : Cape York in N. Queensland.
Math., p. 880.
60. *Phonygamus keraudrenii neumanni* Reichenow (1918)..... スミレヤブカラスフウテ
ウ (新稱)
N. E. New Guinea : Lordberg in Sepik River
distr.
Math., p. 880 ; Mayr, p. 169.
- C. 61. *Phonygamus keraudrenii jamesii* Sharpe
(1877)..... ムラサキヤブカラスフウ
テウ (新稱)
James Paradiesvogel, Schalldrossel.
S. New Guinea ; Aru Islands (Mayr).
Math., p. 880 ; Mayr, p. 169.
62. *Phonygamus keraudrenii purpureo-violaceus*
A. B. Meyer (1885) ヤマムラサキヤブカラス
フウテウ (新稱)
Purple-and-Violet Manucode.
Mountains of S. E. Guinea (from 700 m. to
1800 m.) (Mayr).
Math., p. 880 ; Mayr, p. 169.
63. *Phonygamus keraudrenii hunsteini* Sharpe
(1832) クロヤブカラスフウテウ
(新稱)
Hunstein's Manucode.
D'Entrecasteaux Islands : Normaby I. (type loc.).
Math., p. 880 ; Mayr, p. 169.

Genus 13. *Manucodia* Boddaert (1783).

Green Manucodes.

Kräbenschabelparadiesvögel.

- × C. 64. *Manucodia chalybata* (Pennant) (1781)..... アヲカラスフウテウ (新
稱)

- Syn. 1896.—*Manucodia orientalis** Salvadori.
 Green Manucode, Eastern Manucode.
 Grünkopfparadiesvogel.
 New Guinea (all parts); Misol: Tip (Mayr &
 de Schauensee, 1940).
 Math., p. 880; Mayr, p. 168.
- × 65. *Manucodia ater ater*† (Lesson & Garnot)(1830)...テリカラスフウテウ (新
 稱)
 Glossy-mantled Manucode.
 W. New Guinea: Arfak and Snow Mts.; N.
 Papua.
 Math., p. 881; Mayr, p. 167.
66. *Manucodia ater altera* Rothschild & Hartert
 (1903).....オホハシテリカラスフ
 テウ (新稱)
 Louisiade Archipelago: Sudest I.
 Math., p. 881, Mayr, p. 168.
67. *Manucodia ater subalter* Rothschild & Hartert
 (1929)コバシテリカラスフウ
 テウ (新稱)
 Aru Is.: Dobbo (type loc.); S. New Guinea:
 S. W. Papua; Sariba I.; Yule I.
 Math., p. 881; Mayr, p. 168.
68. *Manucodia jobiensis jobiensis* Salvadori (1875)...ルキチガヒカラスフウ
 テウ (新稱)
 Allied Manucode, Jobi Manucode.
 Jobi or Japen Island.
 Math., p. 881; Mays, p. 168.
69. *Manucodia jobiensis rubiensis* Meyer (1885)...コルキチガヒカラスフ
 テウ (新稱)
 Rubi Manucode.
 N. W. New Guinea: Rubi.
 Math., p. 881; Mayr, p. 168.

* United *orientalis* with *chalybata*.—Cf. Mayr & Rand, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 73, p. 193 (1937); Junge, Nova Guinea, iii, p. 93 (1939). Mayr, List New Guinea Bds., p. 168 (1941).

† Cf. Mayr, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17 Bd., p. 652 (1931).

Subgenus 9. *Eucorax* Sharpe (1894).

70. *Manucodia comrii comrii* Sclater (1876) チデレゲカラスフウテウ
(新稱)

Curl-crested Manucode.

D'Entrecasteaux Archipelago: Fergusson I.

Math., p. 882; Mayr, p. 168.

71. *Manucodia comrii trobriandi* Mayr コチデレゲカラスフウテウ
(新稱)

1936.—*Manucodia comrii trobriandi* Mayr,

Amer. Mus. Nov., no. 869, p. 3 (Kaileuna,

Trobriand Is.).

Trobriand Is.: Kaileuna and Kiriwina.

Mayr, p. 168.

Genus 14. *Lycocorax* Bonaparte (1853).

Paradise Crows.

- × 72. *Lycocorax pyrrhopterus pyrrhopterus* (Bonaparte) (1851) チャバネカラスフウテウ
(新稱)

Brown-winged Paradise-Crow.

Halmahera or Gilolo.

Math., 882.

73. *Lycocorax pyrrhopterus morotensis* Schlegel
(1863) ハジロカラスフウテウ
(新稱)

Morty Island Paradise-Crow.

Morotai I.

Math., p. 882.

74. *Lycocorax pyrrhopterus obiensis* Bernstein
(1864) ムデカラスフウテウ (新稱)

Obi Paradise-Crow.

Obi I.

Math., p. 882.

Genus 15. *Paradigalla* Lesson (1835).

Wattled Birds of Paradise.

- × 75. *Paradigalla carunculata carunculata* Lesson
 (1835)..... キヅノフウテウ (内田氏
 及黒田新稱)

Wattled Bird of Paradise.

N. W. New Guinea: Arfak Mts.

Math., p. 882; Mayr, p. 170.

- H. 16. "Loborhamphus nobilis Rothschild" (1901)
 = *Paradigalla carunculata* × *Lophorina superba*.
 (Cf. Stresem., 1930, p. 12; Mayr, 1941, p. 180.)

Big-ruffed Bird of Paradise.

W. New Guinea. (2 specimens.)

Math., p. 875; Mayr, p. 182.

- H. 17. "Loborhamphus ptilorhis Sharpe" (1908)
 = *Paradigalla carunculata* × *Lophorina superba*. (Cf. Stresem., 1930, p. 12.)
 = *P. carunculata* × *Parotia sefilata* (cf. Mayr,
 1941, p. 180).

W. New Guinea. (1 specimen.)

Math., p. 876; Mayr, p. 181.

- × 76. *Paradigalla carunculata brevicauda* Rothschild
 & Hartert (1911)* タンビキヅノフウテウ
 (新稱)

Short-tailed Bird of Paradise.

W. New Guinea: Mt. Goliath (type loc.);

Utakwa River.

Math., p. 882; Mayr, p. 170.

Genus 16. *Macgregoria* De Vis (1897).

Orange-wattled Birds of Paradise.

77. *Macgregoria pulchra pulchra* De Vis (1897) ... ハナガホフウテウ (新稱)
 Orange-wattled Bird of Paradise.

* *Paradigalla brevicauda* has been considered as a subsp. of *carunculata*
 (cf. Junge, Nova Guinea, iii, p. 83, 1939).

S. E. New Guinea: Mt. Scratchley.

Math., p. 883; Mayr, p. 169.

78. *Macgregoria pulchra carolinæ* Junge コハナがホフウテウ (新稱)

1939.—*Macgregoria pulchra carolinæ* Junge,

Nova Guinea, iii, p. 82 (Oranje Mts., 3800 m.,

New Guinea).

W. New Guinea: Oranje Mts.

Mayr, p. 169.

Genus 17. *Parotia* Vieillot (1816).

Plumed Birds of Paradise.

Strahlenparadiesvögel.

- × C. 79. *Parotia sefilata* (Pennant) (1781) カンザシフウテウ, (菊地
標本社), ロクサンフウ
テウ, 黒風鳥(古名), 六
簪極樂鳥(飯塚・松浦兩
氏), ルリフウテウ(河
野普氏), 六箭極樂鳥
(三吉朋十氏)

Six-plumed Bird of Paradise, Six-wired Bird
of Paradise, Gold-breasted Bird of Paradise.

Strahlenparadiesvogel.

N. W. New Guinea: Arfak Mts.

Math., p. 883; Mayr, p. 172.

- × C. 80. *Parotia lawesi lawesi* Ramsay (1885) ミナミカンザシフウテウ
(新稱)

Southern Six-plumed Bird of Paradise.

Lawes Strahlenparadiesvogel.

S. E. New Guinea: Astrolabe Mts. (type loc.);

Owen Stanley Mts.

Math., p. 883; Mayr, p. 173.

81. *Parotia lawesi helenæ* De Vis (1897) チャビタヒカンザシフウ
テウ (新稱)

Mount Scratchley Bird of Paradise.

- S. E. New Guinea: Mt. Scratchley.
Math., p. 883; Mayr, p. 173.
- × 82. *Parotia lawesi fuscior* Greenwayモロベチヤビタヒカンザ
シフウテウ (新稱)
1934.—*Parotia lawesi fuscior* Greenway, Proc.
New Eng. Zool. Cl., xiv, p. 2 (Mt. Misim,
Morobe distr., New Guinea—♀).
S. E. new Guinea: Mt. Misim, Morobe distr.
Mayr, p. 173.
83. *Parotia wahnesi* Rothschild (1906)*シサンフウテウ (新稱)
Four-plumed Bird of Paradise.
E. New Guinea: Rawlinson Mts.
Math., p. 884; Mayr, p. 173.
- × 84. *Parotia carolæ carolæ* A. B. Meyer (1894)† ...ワキジロカンザシフウテ
ウ (内田氏新稱)
White-sided Six-plumed Bird of Paradise.
W. New Guinea: Amberno (=Mamberano or
Mamberamo, type loc.); Weyland Mt.;
Handels Mts.
Math., p. 884; Mayr, p. 172.
85. *Parotia carolæ chrysenia* Stresemannチユウブワキジロカンザ
シフウテウ (新稱)
1934.—*Parotia carolæ chrysenia* Stresemann,
Orn. Monatsb., 42, p. 147 (Sepik region).
E. New Guinea: Sepik region. (Known from
♂ imm.)
Mayr, p. 173.
86. *Parotia carolæ meeki* Rothschild (1910).....セツザンワキジロカンザ
シフウテウ (新稱)
W. New Guinea: Snow Mts.
Math., p. 884; Mayr, p. 172.
87. *Parotia carolæ berlepschi* Kleinschmidt (1897)...ツグロワキジロカンザシ
フウテウ (新稱)

* Rothschild, Bull. B. O. Cl., xix, p. 8 (1906—re-descr.); Stresem., J. f. O,
72, p. 425 (1924—distrib.).

† Notice—cf. Stresem., Nov. Zool., 1923, p. 30.

Count von Berlepsch's Bird of Paradise.

N. W. New Guinea.

Math., p. 884; Mayr, p. 173.

88. *Parotia carolæ chalcothorax* Stresemann.....ナガエワキジロカンザシ
フウテウ (新稱)

1934.—*Parotia carolæ chalcothorax* Stresemann,

Orn. Monatsb., 42, p. 145 (Doormanspad-

Bivak, south of Indenburg R. region).

W. New Guinea: Indenburg River region.

Mayr, p. 173.

Genus 18. *Lophorina* Vieillot (1816).

Superb Birds of Paradise.

Krangenparadiesvögel.

- × C. 89. *Lophorina superba superba* (Pennant) (1781)*...カタカケフウテウ, 肩掛
極樂鳥 (飯塚・松浦兩
氏)

Superb Bird of Paradise.

Prachtkrangenparadiesvogel.

N. W. New Guinea: Arfak Mts. (1100-1700 m.).

Math., p. 884; Mayr, p. 173.

- H. 18. "*Lamprothorax wilhelminæ* Meyer" (1894)

= *Lophorina superba* × *Diphyllodes magnificus*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 11; Mayr, 1941, p. 180.)

Green-tailed Bird of Paradise, Green-trained

Bird of Paradise.

N. W. New Guinea: Arfak Mts. (3 specimens.)

Math., p. 875; Mayr, p. 182.

- H. 19. "*Parotia duivenbodei* Rothschild" (1900)

= *Lophorina superba* × *Parotia sefilata*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 12; Mays, 1941, p. 180.)

Two-plumed Bird of Paradise.

* Groups and races of *L. superba*.—Cf. Mayr, Orn. Monatsb., 38, pp. 178-180 (1930).

- W. New Guinea. (3 ♂ specimens.)
Math., p. 884; Mayr, p. 182.
90. *Lophorina superba niedda* Mayr ミドリカタカケフウテウ
(新稱)
1930.—*Lophorina superba niedda* Mayr, Orn.
Monatsb., 38, p. 179 (Wondiwoi Mts.).
N. W. New Guinea: Wondiwoi Mts. at Wandam-
men Penin. in Geelvink Bay.
Mayr, p. 174.
91. *Lophorina superba feminina* Ogilvie-Grant
(1915)..... セツザンカタカケフウテウ (新稱)
S. W. New Guinea: Utakwa River (type loc.)
and Mt. Goliath near Snow Mts.; Weyland
Mts.; Went Mts.; Peramelesbivak.
Math., p. 885; Mayr, p. 174.
92. *Lophorina superba minor* Ramsay (1885)* コカタカケフウテウ (新稱)
1932.—*Lophorina feminina lehunti* Rothschild,
Ann. & Mag. Nat. Hist., ser. 10, vol. x, p.
126 (Mekeo, S. E. New Guinea).
Lesser Superb Bird of Paradise.
S. E. New Guinea: Astrolabe Mts. (type loc.);
Mekeo.
Math., p. 885; Mayr, p. 174.
93. *Lophorina superba connectens* Mayr ナカツギコカタカケフウ
テウ (新稱)
1930.—*Lophorina superba connectens* Mayr,
Orn. Monatsb., 38, p. 180 (Dawong, Herzog
Mts., New Guinea).
N. E. New Guinea: Herzog Mts.
Mayr, p. 174.
94. *Lophorina superba latipennis* Rothschild (1907)... ヒロタテコカタカケフウ
テウ (新稱)

* Plumage and races.—Cf. Mayr & Rand, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., vol. 73, p. 199 (1937).

E. New Guinea: Rawlinson Mts.

Math., p. 884; Mayr, p. 174.

95. *Lophorina superba sphinx* Neumann = セコカダカケフウテウ
(新稱)

1932.—*Lophorina superba sphinx* Neumann,

Orn. Monatsb., 40, p. 121 (*patr. ignot.*—♀
ad. or ♂ juv.)

Loc.? (1 specimen.). Possibly the Mts. at the
extreme S. E. New Guinea (Mayr, 1941).

Mayr, p. 174.

96. *Lophorina superba pseudoparotia* Stresemann .. ムヂコカダカケフウテウ
(新稱)

1934.—*Lophorina superba pseudoparotia* Strese-
mann, Orn. Monatsb., 42, p. 144 (Hunstein-
spitze, Sepik region—♀).

N. E. New Guinea: Sepik region. (♂ ad. not
known.)

Mayr, p. 174.

Genus 19. *Loboparadisea* Rothschild (1896).

Yellow-chested Birds of Paradise.

97. *Loboparadisea sericea sericea* Rothschild
(1896)..... ツノバシフウテウモドキ
(新稱)

Yellow-chested Bird of Paradise, Shield-billed

Bower-bird.

W. New Guinea.

Math., p. 385; Mayr, p. 179.

98. *Loboparadisea sericea aurora* Mayr ヒガシツノバシフウテウ
モドキ (新稱)

1930.—*Loboparadisea sericea aurora* Mayr,

Orn. Monatsb., xxxviii, p. 147 (Dawong,
Herzog Mts.).

E. New Guinea: Herzog Mts., Morobe distr.

Mayr, p. 180.

Genus 20. *Loria Salvadori* (1894).

Crow Birds of Paradise.

99. *Loria lorix lorix* Salvadori (1894) ルリフウテウモドキ (新稱)

Crow Bird of Paradise, Lady Macgregor's
Bower-bird.

W. New Guinea: Weyland Mt.; S. E. New
Guinea: Moroka, Owen Stanley Range (type
loc.); Mt. Manaeao.

Math., p. 885; Mayr, p. 179.

100. *Loria lorix amethystina* Stresemann スミレルリフウテウモ
ドキ (新稱)

1934.—*Loria lorix amethystina* Stresemann,
Orn. Monatsb., p. 42, 144 (Schraderberg,
Sepik region).

N. E. New Guinea: Schraderberg, Sepik region.
Mayr, p. 179.

101. *Loria lorix inexpectata* Junge セツザンルリフウテウモ
ドキ (新稱)

1939.—*Loria lorix inexpectata* Junge, Nova
Guinea, iii, p. 77 (Bijenkorf, Snow Mts.,
Dutch New Guinea).

W. New Guinea: Bijenkorf, Snow Mts.; Hell-
wig Mts.; Treubbivak.

Mayr, p. 179.

Family PTILONORHYNCHIDÆ.

Bower-Birds. 亭鳥科

Laubenvögel.

Genus 21. *Ptilonorhynchus* Kuhl (1820).*

Satin Bower-Birds.

Laubenvögel.

- × C. 102. *Ptilonorhynchus violaceus violaceus* (Vieillot)
(1816) アヲアヅマヤドリ (黒田)

* Cf. Finn, F.: Birds as Bower-Builders. "Marvels of the Universe,"
i, pp. 105-108, 1 col. pl. (facing p. 113), 4 figs. (1912).

Satin Bower-Bird, Satin Bird.

Blauschwarzer Laubenvogel, Atlasvogel, Seidenlaubenvogel.

Austral.: S. Queensland to Victoria.

Math., p. 886.

- H. 20. "*Ptilonorhynchus rawnsleyi* Diggles" (1867).
= *Ptilonorhynchus violaceus* × *Sericulus chrysocephalus*.

(Cf. Stresem., 1930, p. 13.)

Austral.: Brisbane in Queensland. (1 specimen.)

Math., p. 886 (footnote).

103. *Ptilonorhynchus violaceus minor* A. J. Campbell (1912) コアラアヅマヤドリ (新稱)
Austral.: Herberton (type loc.) in Queensland.
Math., p. 886.

Genus 22. *Amblyornis* Elliot (1871).

Gardener-Birds.

Haubenlaubenvögel.

- C. 104. *Amblyornis inornatus* (Schlegel) (1871)* ニハシドリ [庭師鳥], オ
チンテウ [お亭鳥]

Gardener-Bird, Gardener Bower-Bird, Unornamented Bower-Bird.

Schmuckloser Laubenvogel, Schopflaubenvogel.

N. W. New Guinea: "Northern Peninsula"
(restr. type loc.: Arfak or Berau Penin.—
Hartert, 1930); Siwi, Mts. near Ditschi;
Gunong Mundi near Ditchi (1500 m.);
Lehuma; Wondiwoi in Wandammen Penin.

Math., p. 886; Mayr, p. 183.

105. *Amblyornis macgregoriae macgregoriae* De

* Races discussed.—Cf. Hartert, Nov. Zool., xxxvi, pp. 29-30 (1930). Mayr, however, considers it to be a species without forms.

- Vis (1890)アカチヤガシラニハシドリ (新稱)
- Syn. 1889.—*Amblyornis musgravi* Goodwin.
S. E. New Guinea: Mt. Belford (type loc.);
Musgrave Range.
Math., p. 886; Mayr, p. 184.
106. *Amblyornis macgregoriae aedificans* Mayr.....アラチヤガシラニハシドリ (新稱)
- 1931.—*Amblyornis inornatus aedificans* Mayr,
Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17 Bd., p. 648
(Dawong, Herzoggeb., N. E. New Guinea).
N. E. New Guinea: Dawong on Herzog Mts.
Mayr, p. 184.
107. *Amblyornis macgregoriae germanus* Rothschild
(1910)チャガシラニハシドリ (新稱)
- N. E. New Guinea: Rawlinson Mts.; Sar-
waged Mts.
Msth., p. 887; Mayr, p. 184.
108. *Amblyornis macgregoriae mayri* Hartert.....カンムリニハシドリ (新稱)
- 1930.—*Amblyornis inornatus mayri* Hartert,
Nov. Zool., xxxv, p. 30 ("Karooon," New
Guinea).
1931.—*Amblyornis inornatus longicristatus*
Mayr, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17 Bd., p.
649 (Mt. Goliath).
N. W. New Guinea: "Karooon"=probably
Karon in northern "Vogelkop" (Berau
Penin.); Weyland, Tabi, Nassau and Oranje
Mts. (Mayr, 1941).
Mayr, p. 183.
- C. 109. *Amblyornis subalaris* Sharpe (1884)アカエボシニハシドリ (新稱)
- Orange-crested Bower-bird; Orange-crested
Gardener Bower-Bird.

Kleiner Schopflaubenvogel.

E. New Guinea: Mts. of South-eastern parts.

Math., 887; Mayr, p. 184.

110. *Amblyormis flavifrons* Rothschild (1895) キビタヒニハシドリ (新稱)

Yellow-fronted Gardener Bower-Bird.

W. New Guinea. [Loc. unknown.]

Math., p. 887; Mayr, p. 184.

Genus 23. *Archboldia* Rand (1940).

111. *Archboldia papuensis* Rand パプアニハシドリ (新稱)

1940.—*Archboldia papuensis* Rand, Amer,

Mus. Novit., No. 1072, p. 9 (Bele River

(2200 m.), 18 km., north of Lake Habbema).

W. C. New Guinea: Mt. Wilhelmina, Oranje

Mts. and Idenburg R. (2100-2800 m.).

Mayr, p. 183.

Genus 24. *Cnemophilus* De Vis (1889).

Black-and-Gold Birds of Paradise.

112. *Cnemophilus macgregori* De Vis (1889) カンムリフタイロフウテ
ウ (新稱)

Black-and-Gold Bird of Paradise, Macgregor's

Bird of Paradise.

S. E. New Guinea: Mt. Knutsford (type loc.),

Owen Stanley Mts.; Mt. Musgrave.

Math., p. 887; Mayr, p. 183.

Genus 25. *Prionodura* De Vis (1883).

Golden Bower-Birds.

113. *Prionodura newtoniana* De Vis (1883) ワウゴンニハシドリ (新稱)

Golden Bower-Bird, Newton's Bower-Bird.

N. Queensland: Tully River Scrubs (type

loc.); Bartlefree (3800 ft.); Bellenden Ker.

Math., p. 888.

Genus 26. *Xanthomelus* Bonaparte (1854).

Golden Birds of Paradise.

114. *Xanthomelus aureus aureus* (Linnæus) (1758)... ワウゴンフウテウ (新稱)
Golden Bird of Paradise.
N. W. New Guinea: Vogelkop, Wandammen.
Math., p. 888; Mayr, p. 184.
115. *Xanthomelus aureus bakeri* Chapin (1929) ... クロハラワウゴンフウテウ (新稱)
Madang Golden Bird of Paradise.
E. New Guinea: Madang in Friederich Wilhelmshaven.
Math., p. 888; Mayr, p. 184.
116. *Xanthomelus aureus ardens* D'Albertis & Salvadori (1879) ミナミワウゴンフウテウ (新稱)
Southern Golden Bird of Paradise.
S. New Guinea: Upper Fly River.
Math., p. 888; Mayr, p. 184.

Genus 27. *Sericulus* Swainson (1825).

Regent Birds.

Gärtnerovögel.

- × C. 117. *Sericulus chrysocephalus chrysocephalus*
(Lewin) (1808) ワウテウモドキ (新稱)
Regent Bird, Regent Bower-Bird.
Gärtnerovogel.
N. E. New South Wales.
Math., p. 889.
118. *Sericulus chrysocephalus rothschildi* Mathews
(1912) ヒガシワウテウモドキ (新稱)
S. E. Queensland: Blackall Range.
Math., p. 889.

Genus 28. *Scenopoeetes* Coues (1891).

Tooth-billed Bower-Birds.

- × 119. *Scenopoeetes dentiostri* (Ramsay) (1876) ハバシアヅマヤドリ (新稱)

Tooth-billed Bower-Bird.

N. Queensland: Belleden Ker Range (3000-4000 ft.) and Johnstone River.

Math., p. 839.

Genus 29. *Chlamydera* Gould (1837).

Spotted Bower-Birds.

Kragenlaubenvögel.

- C. 120. *Chlamydera maculata maculata* (Gould) (1837) マダラニハシドリ (新稱)

Spotted Bower-Bird.

Fleckenlaubenvogel, Kragenvogel, Kragenlaubenvogel, Violettnackiger Laubenvogel.

Queensland; New South Wales (type loc.); Victoria; S. Australia.

Math., p. 890.

121. *Chlamydera maculata guttata* Gould (1862) ... = シマダラニハシドリ (新稱)

Western Bower-Bird, Large-spotted Bower-Bird.

Mid-W. and C. Australia.

Math., p. 890.

122. *Chlamydera maculata occipitalis* Gould (1875) オホカザリニハシドリ (新稱)

Large-frilled Bower-Bird.

N. Queensland: Port Albany.

Math., p. 890.

123. *Chlamydera lauterbachii lauterbachii* Reichenow (1897) ズアカキバラニハシドリ (新稱)

Red-crowned Bower-Bird, Lauterbach's Bower-Bird.

E. New Guinea: Jager River.

Math., p. 891; Mayr, p. 185.

124. *Chlamydera lauterbachii uniformis* Rothschild...ムヂキバラニハシドリ
(新稱)

1931.—*Chlamydera lauterbachii uniformis*
Rothschild, Nov. Zool., xxxvi, p. 250 (Siriwo
R., 45 miles above mouth, S. of Geelvink
Bay, Dutch New Guinea).

S. W. New Guinea: Siriwo River near Wey-
land Mts.; Ramura R.; Merauke.

Mayr, p. 185.

125. *Chlamydera cerviniventris* Gould (1850)チャバラニハシドリ (新
稱)

Syn. 1895.—*Chlamydera recondita* A. B. Meyer
(Astrolabe Bay—based on an egg).

Fawn-breasted Bower-Bird; Meyer's Bower-
Bird.

N. Queensland: Cape York; E New Guinea.
Math., p. 891; Mayr, p. 185.

- C. 126. *Chlamydera nuchalis nuchalis* (Jardine &
Selby) (1830)オホニハシドリ (新稱)

Great Bower-Bird, Western Lilac-naped Bower-
Bird, Queensland Lilac-naped Bower-Bird.

Rosennackiger Laubenvogel.

N. Queensland; E. Northern Territory.

Math., p. 891.

127. *Chlamydera nuchalis oweni* Mathews (1912)...ニシオホニハシドリ (新
稱)

N. W. Australis and W. Northern Territory.

Math., p. 892.

Genus 30. *Ailuroedus* Cabanis (1851).

Cat-Birds.

Grünrückenlaubenvögel.

- C. 128. *Ailuroedus crassirostris crassirostris* (Paykull)
 (1815) アヲネコドリ (新稱)
 Cat-Bird, Green Cat-Bird, Australian Cat-Bird.
 Grüner Laubenvogel.
 New South Wales (type loc.); S. Queensland.
 Math., p. 892.
129. *Ailuroedus crassirostris** *melanotis* (Gray)
 (1858) アルネコドリ (新稱)
 Spotted Cat-Bird, Black-checked Cat Bird.
 Aru Islands.
 Math., p. 892; Mayr, p. 185.
130. *Ailuroedus crassirostris maculosus* Ramsay
 (1874) ガウシウネコドリ (新稱)
 N. Queensland: Rockingham Bay (type loc.),
 Bellenden Ker Range.
 Math., p. 892.
- C. 131. *Ailuroedus crassirostris melanocephalus* Ram-
 say (1882) エリグロネコドリ (新稱)
 Black-naped Cat-Bird, Black-headed Cat-Bird.
 Schwarzkopflaubenvogel.
 S. E. New Guinea: Mt. Astrolabe.
 Math., p. 893; Mayr, p. 185.
132. *Ailuroedus crassirostris astigmaticus* Mayr ... ツグロネコドリ (新稱)
 1931.—*Ailuroedus melanotis astigmaticus*
 Mayr, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17 Bd., p.
 647 (Ogerammang, N. E. New Guinea).
 N. E. New Guinea: Ogerammang; Junzaing.
 Mayr, p. 186.
133. *Ailuroedus crassirostris facialis* Mayr ワキジロネコドリ (新稱)

* Mayr and some others have united *melanotis* with *crassirostris* (Mayr, Amer. Mus. Nov., no. 869, p. 4, 1936; Junge, Nova Guinea, iii, p. 76, 1939; Mayr & de Schauensee, Proc. Ac. Nat. Sci. Phil., vol. 91, p. 152, "1939," 1940).

- 1936.—*Ailuroedus crassirostris facialis* Mayr,
Amer. Mus., Nov., no. 869, p. 4 (Utakwa
R., Snow Mts., Dutch New Guinea—♂ ad.).
W. New Guinea: Utakwa R. near Snow Mts.
in Nassau Range.
Mayr, p. 185.
134. *Ailuroedus crassirostris guttaticollis* Strese-
mann (1922)マダラネコドリ (新稱)
N. E. New Guinea: Hunsteinspitze, Sepik distr.
Math., p. 893; Mayr, p. 186.
135. *Ailuroedus crassirostris arfakianus* A. B. Meyer
(1874)キタネコドリ (新稱)
Arfak Mountain Cat-Bird.
N. W. New Guinea: Arfak Mts.
Math., p. 893; Mayr, p. 186.
136. *Ailuroedus crassirostris jobiensis* Rothschild*...アラムネコドリ (新稱)
1895.—*Aeluroedus jobiensis* Rothschild, Bull.
B. O. Cl., iv, p. xxvi (Mar. 30, 1895—"Jobi
I.").
Jobi Island Cat-Bird.
"Jobi Island." N. W. New Guinea: Wey-
land Mts.
Math., p. 893 (in synonymy); Mayr, p. 186.

Note.—Mayr (1941, p. 186) has considered that the type specimen of *jobiensis* is a trade skin, possibly came from the mainland of New Guinea instead of Jobi Island.

137. *Ailuroedus crassirostris misoliensis* Mayr &
de Schauenseeオホネコドリ (新稱)
1940.—*Ailuroedus crassirostris misoliensis*
Mayr & de Schauensee, Proc. Ac. Nat. Sci.
Philad., vol. 91, "1939," 1940, p. 152 (Tip,
Misol).
Misol: Tip.

* A good recognizable race.—Cf. Mayr, Mitt. Z. Mus. Berl., 17 Bd., p. 647 (1931); id., List New Guinea Bds., p. 186 (1941).

Mayr, p. 186.

C. 138. *Ailuroedus buccoides buccoides* (Temminck)

(1835)* ミミジロネコドリ (新稱)

Barbet-like Cat-bird.

Tropfenfleckenlaubenvogel.

W. New Guinea: Snow Mts., Alkmaar, Sahang,

Noord River to Lobo Bay (type loc.); E.

New Guinea: Mt. Scratchley.

Math., p. 893; Mayr, p. 186.

139. *Ailuroedus buccoides oorti* Rothschild &

Hartert (1913) ワイギウミミジロネコ
リ (新稱)

Waigeu (type loc.); Batanta; Salawati; N. W.

New Guinea (may occur in the Berau Penin.).

Math., p. 894; Mayr, p. 186.

140. *Ailuroedus buccoides geislerorum* (A. B.

Meyer) (1891) トウホクミミジロネコ
リ (新稱)

Syn. 1929.—*Ailuroedus buccoides molestus*

Rothschild & Hartert (Haidana, Collingwood
Bay).

New Guinea: North coast from Astrolabe

Bay (type from Lalelee and Bussum) (N. E.

New Guinea) to Takar and Mamberano

River (N. W. New Guinea); Collingwood

Bay (S. E. New Guinea); Jobi or Japen I.

Math., pp. 893, 894; Mayr p. 187.

141. *Ailuroedus buccoides stonii* (Sharpe) (1876) ... コミミジロネコドリ (新
稱)

Stone's Cat-Bird.

S. E. New Guinea: Laloki River.

Math., p. 894; Mayr, p. 186.

* *Ailuroedus buccoides* and its subspecies—cf. Rothschild & Hartert, Nov. Zool., xxxv, p. 59 (1929).

2 families

30 genera

9 subgenera (excluding typical subgenera).

57 species (including 22 species without subspecies)

119 subspecies

141 species and subspecies

20 hybrids