鳥 島 の 鳥

Status of birds on Torishima : particularly
of the Steller's Albatorross

大 野 義 輝

Yoshiteru Ōno

アホウドリの再発見

絶滅したと思われていたアホウドリが、昨年（1954）の春八丈島の南方およそ 300 km にある一孤島鳥島に僅かではあるが生存していることがわかつた。私は本年（1955）1月25日から28日の間機会を見出して鳥島にアホウドリの生態、生存数などの調査、併せて鳥島の冬の鳥類の調査を行つたのでここに報告する次第である。

中央気象台では戦後いち早く気象的な重要地点である鳥島に注目して昭和21年から調査をすすめ、その翌年の昭和22年6月1日に鳥島測候所を設立した。当時の建物はごく粗末なもので掘立小屋同様であつたが、昨年（1954）から本建築に着手し、本年1月には写真で見られるような近代的ブロック建築が島の西側に完成された。

アホウドリの生存が学会へ報告されたのは昨年（1954）の4月のことであつた。私の友人中央気象台無線課員の和久田氏がたまたま現地へ赴任することゝなつたので調査を依頼しておいた処、昨年4月に鳥島から帰還された無線課員の二戸氏がその詳細な記録をもたらしたので、早速畏友猟政調査課の三島冬嗣氏に報告したのがその間のいきさつである。

アホウドリの減少した原因は山階博士によつて明らかにされているが、その後は第二次世界大戦中に海軍将兵約700名と少数の陸軍将兵が駐屯していた事実があり、又戦後は硫黄ブームの波にのつて1,2の会社が多数の人手を派遣して硫黄を採取していたことがあるので、その人達によつて捕獲されたかも知れない。現在は時に漁師の立寄りもあるといわれるが、アホウドリ

の棲息地まで危険をおかして行くとも思われず、又蕃殖時期は季節風が強く、海岸から直接上陸出来る場所でもないので、密猟が目的なら別であるが、今は鳥島測候所員によつて完全に保護されている。

アホウドリの現状

アホウドリは島の南斜面の傾斜 20~30 度の火山岩の砂礫地に棲息しており、ちょうど富士山の砂走りを思わせるところである。下方に向つて砂礫地のつきところは数 10 m に及ぶ断崖絶壁となつて海に面しており、上方も

鳥 島 測 候 所 の 新 庁 舎

やはり 50~60 度の急峻な岩場をなし、且つ両側面からこの棲息地に入るとは全く困難な場所で、容易に外敵の進入をゆるさない環境である。

気象的には北西の強い季節風をさけるような位置にある平和境で、冬季大時化の際は付近の漁船はこの「アホドリ部落」の沖合に風をさけて停泊しているのが見られる。したがって、もしこの様なくれた平和境がなかったら或は絶滅していたかも知れない。

1 月はアホドリにとつてはちょうど蕃殖期にあたり、そのためか私の観察した限りでは強力な飛翔力を持つているにもかかわらず、あまり沖合に出ることはなく終日島の周辺に暮しているようであつた。飛翔範囲は主として沿岸 1~2 km 程度で 4 km も沖合に出ることは極く稀で採餌区域も大体この範囲と思われる。飛翔の際は殆ど羽ばたきをすることなく季節風をたくみ

に利用しながら海面すれすれから島の頂上(400 m)付近迄の間を飛翔しており、数 100 m におよぶ不規則な旋回をしながら主としてハレムの上面を飛翔していた。時折測候所のある北側に出現することもあるが、島の周辺至るところで見られるということはない様である。

蕃殖は斜面の比較的上部の八丈茅の生えている地帯の砂礫地で、写真のような産座を作り淡黄色を帯びた白色の卵を 1 個生む。

調査時は 3 羽の雛を見出したが、雛は白色レグホン程度の大きさに成長していた。手を近づけると嘴をパチパチとならし

て威脅し、時には悪臭ある褐色のイカの未消化物を吐きだすこともあつた。嘴は黒色、羽毛は灰黒色でちじれておりスコッチテリアを思わせる愛らしいものであつた。

アホウドリの個体数は同行の所員の協力を得て最大数 23 羽まで数え得たが、飛翔中のものが入るとしても 25 羽程度と思われる、これが鳥島に現存する総数ということになる。

調査の際育雛中のものを除いて全部飛び去ってしまったが、残つたものはその何れも完全な成鳥ばかりで、背面に灰黒斑のある若い成鳥も少く、まし

鳥島に於けるアホウドリ成鳥
1955 年 1 月 大野義輝氏撮影

て幼鳥の全く見当らなかつたのは意外であつた。又所員の話を総合しても昨年と本年の個体数の増減は大差がないというところから、蕃殖が極めて遅々としていることがうかがえる。

地上から飛翔する際は営巣地から砂礫地の上限までヨチヨチと這い上り、おもむろに向きを下方に変えて大きく翼をひろげ足を交互に運びながら、強く砂をけつて数 10 m 滑走したのち離陸するが、地上に於ける無器用さと離陸後の飛翔ぶりは全く別鳥を思わせる鮮かさである。着陸には海上から斜面に向つてゆるやかにおりたち、巣へもどるのである。この様な性質があるので捕獲の際は上方から行けば容易である。

尙現地をみて意外に感じられたのは抱卵中止の卵が 3 個程発見されたことで、孵化直前のもの、窪地に落ちて既に砂で $2/3$ 程うずまつていたもの、10 数 m 下方の八丈茅の根もとに転ろがつていたもので、何れも腐敗していたことである。それが人の訪問によるものか、鳥の外敵として考えられる野犬野猫によるものか、はたまた上空にハヤブサの散見されたことからハヤブサによるものかわからぬが、何れにしろこのような卵が見られたことは今後の保護対策上考慮すべきことと思ふ。

アホウドリの雛 今里能氏撮影

鳥島に於けるアホウドリの巢と腐敗卵
1955 年 1 月 大野義輝氏撮影

アホウドリのハレムは現在は南斜面 1 ケ所のみで、時間のゆるすかぎり他にも調査してみたがそれらしい場所は見当らず、昭和 4 年 1 月山階博士の御調査時とはその様相が一変していることがわかった。クロアシアホウドリのハレムも同様他には見当らず、コアホウドリの如きはその姿さえ見られぬ有様であつた。

アホウドリの蕃殖地のすぐ下方から絶壁までの砂礫地はクロアシアホウドリの蕃殖地で、相当数のものが見られ、アホウドリとちがつて八丈茅の全くないところである。アホウドリよりも人を恐れることなく写真を撮るにも容易で所々に雛が見られた。産座も雛の大きさもアホウドリと似ており、ただ雛の色彩がアホウドリよりも幾分白つぽく見え識別はさほど困難ではない。

我々が 5 日間も季節風をさけて「アホウドリ部落」の沖合で漂流中目撃されたものはアホウドリのみで、数倍も多いクロアシアホウドリがあまり目撃されなかつたのは何故であろうか、採餌のため海面すれすれにかなりの沖合まで直線的に飛翔しているのを見たが、あるいはこの様な性質を持っているため見逃したとも考えられる。

オーストンウミツバメ其他

アホウドリを別として、この島が主蕃殖地として知られているものにオーストンウミツバメがある。島のいたる所でその巣が見られ特に多いのは北側斜面の中腹以下の草地である。ここは文字通り足のふみ場もない程の穴が掘つてあり斜面の下から上を見上げれば写真の様に穴だらけである、穴の大きさは手が入る程度で奥行は案外深く腕がすつぽり入り、その一番奥に産座がある。産座は幾分広く僅かに枯草が敷いてあり、白色の鳩卵大のもの1個が産まれてある。大部分は抱卵中で孵化しているものは見出すことは出来なかつた。雌が抱卵し雄は夜間だけ巣に帰る様である。午後9時頃島に帰り、明け方午前3時頃にはもう海に出て行き、その出発、帰還時はやかましく鳴き

鳥島に於けるオーストンウミツバメの多数の巢穴

1955 年 1 月 大野義輝氏撮影

さけび、測候所開設当初はその鳴声で夜もねむられぬ程であつたと聞く。最近急激に減少したとのことで、我々の滞在中はそれ程のことはなかつた。以前は外敵により殺された死体が至る所に見られたが、最近あまり見られ

ぬと云ふ。巢の数の極めて多いためか蔓草の密生している中にも営巢しており、入口の蔓をわずかに左右によせて、辛うじて出入しているものもある。早朝この場所を訪ずれた私は片翼をバタバタさせている 2 個体を見たが、近寄つてみると何れも穴から出る際にこの蔓草にからみついて離れることが出来ず結局は死ぬ運命にあつたものなのである。又こうして既に死亡している数個体を見出すことも出来た。中には網の様にはられた蔓草のため出口をふさがれ、出るに出来ず死んでいるものもあつた。そしてその多くは解剖の結果雄であることも判つた。山階博士も御指摘の様に他種の鳥と反対に部屋の中で放鳥すると、暗い場所とか狭い物の影に入る性質がある。持ち帰つた 1 羽は飲まず食はず 1 週間以上も生きており、その生命力の強いのは驚いた。その他夜間測候所の電燈の光をしたつて飛来し窓につきあたるもの、不幸アンテナにぶつかり翼を折られて落ちているものも見られた。昼間巢の中で鳴くことは稀であるが、夜間はよく鳴く様である。又 1 卵を産む鳥であるにもかかわらず、卵が至る所に産みすてられ山頂でさえ卵のころがつているのが見られたが、これは営巢場所がなくて止むを得ず産みおとしたものか、それとも他の理由によるものか、とに角面白いことである。

オーストンウミツバメの鳥島で滞在する期間は長く約 8 ケ月間で、毎年 10 月 15 日から 20 日の間に先ず少数のものが渡来し、順次その数を増す。渡去の最も遅いものは 6 月 10 日頃とのことである。総数の判定は困難であるが主蕃殖地の坪数は凡そ 7,000 坪であるから、坪当り平均 2 番が営巢すると仮定すれば 10 万台の羽数ということが出来よう。

其他の鳥の調査も行つたが、そのうち陸鳥の見られるのは北斜面の僅かな草地に限られ、最も多くみかけるのはイソヒヨであつた。三島冬嗣氏によれば *magna* と何等差異が認められぬという。靱山氏によつて別亜種とされ絶滅したと信じられたトリシマウグイスは、今も極く僅かではあるが生存していることが確認された。その他キジバトが認められ、色彩は幾分赤味を帯びていた。鳥島からはニューレコードと思われる。渡り鳥としてはジョウビタキ 3 羽 (♂ 2 ♀ 1) とシメ 2 羽が目撃され、その他ヤマシギが 3 羽見られたが、このヤマシギはニューレコードと思われる。又ムナグロの幼鳥が数羽越冬していたことは面白く、越冬地として少数のものがこの島にのこる様に思われる。

尙山階博士の報告されたシチトウメジロは既に絶滅したらしく、我々の鳥島滞在中には終に見出すことが出来なかつたことを付記しておく。(筆者は中央気象台天気相談所長)

[此の報告は本会第 147 回例会(1955 年 2 月 26 日)で発表があつた。同会記事参照——[黒・久.]

Résumé

On January 25, 1955, the author visited Torishima, a well known 'albatross island' belonging to the Izu Islands. The Steller's Albatross, *Diomedea albatrus*, once believed to be extinct from this island, was rediscovered by his friend in April, 1954. On his visit, the author, with help of others, estimated 23-25 birds to be the optimum number. They were nesting on a pebbly, grassy sand slope of 20-30°, where was well protected from seasonal NW winds by the surrounding cliffs. Only three chicks of a chicken size were found, and there were three abandoned eggs. Most individuals were adults, none of the black juvenile (and only a few subadult with black nape) having been seen. Some were observed flying to and from the slope, but seemed to make off only 4 km. at the most. The "albatross village", so called by the people of the Weather Station, which is the only establishment on the island, is being given a well managed protection, though occasional landing of fishermen is suspected.

The storm petrels, *Oceanodroma tristrami*, make their nest holes in every inch on the northern slope, covered by grass-tendrils network. Some were found dead or dying tangled by these tendrils at the mouth of the holes. Eggs were being incubated, but curiously, many were laid on the ground. It has, however, markedly decreased recently, because its night cries have become far the less noisy than during the pre-war or war times. Its decrease is apparently due to the damage by cats and dog found in wild state, which are also the menace to the albatross chicks. Few falcons are another predator to not only the petrels but also the small land birds resident or wintering on the island. They are therefore extremely shy, and the White-eye was found to be extinct from the island, while few species were first observed. Fast protective measure from the predators is deemed necessary.

綿羽の雛をだくアホウドリ 鳥島にて、1955 年 1 月 中央気象台員撮影
A Steller's Albatross, *D. albatrus*, brooding its chick. Torishima, January, 1955. Photo by a Tokyo Central Weather Station officer (See page 24).

抱卵するクロアシアホウドリ 鳥島にて 1955 年 1 月 今里能氏撮影
A Black-footed Albatross, *D. nigripes*, on nest. Torishima, January, 1955. Photo by Atou Imazato (See page 24).