岩手県でヤマショウビンを観察

工 藤 勝 四 郎

ヤマショウビン (*Halcyon pileata*) は、北海道、利尻島、本州、九州、対馬、琉球などから迷鳥として記録されているが (日本鳥類目録, 改訂 5 版, 1974), 岩手県ではまだ観察されたことがなかったようである。筆者は、本年 (1981 年) 6 月 12 日, 岩手県滝沢村砂込 390-29 の岩手県鳥獣保護センター内で 1 羽を観察したので報告する。

発見者は鳥獣保護センター職員渡辺尚氏である。この鳥は、朝 8 時頃、センター内の池のまわりの木々の間をとびかっていた。早速県自然保護課の職員 2 名ともに観察し、写真撮影を試みたがなかなかとれなかった。それでさらに観察をつづけながら撮影のチャンスをねらい、結局夕方 4 時半すぎに撮影に成功した。この鳥は翌日はどこかに飛び去って、見あたらなかった。観察日の天候は、晴のち高曇りの状態で風はなかった。

Black-capped Kingfisher Straggles to Iwate Prefecture, Honshu. An individual of the Black-capped Kingfisher *Halcyon pileata* was observed and photographed at Tokizawa, Iwate Pref., on 12 June 1981. The bird was flying around trees surrounding a small pond and found there all day long, but it disappeared next day. The weather condition of the day was fine and no wind.—Katsuhiro KUDO, Shimonoashi 2-9, Morioka, Iwate 020.