心疾患患者の歯科、口腔外科的処置の影響およびその可能性に関する研究

内 山 文 博

Influence of dental and surgical stimulation upon the patients of cardiovascular diseases

Fumihito UCHIYAMA

1. 緒 言

歯科、口腔外科的侵襲の全身への影響については従来から拔牙を中心として、多くの研究者によって実験的、あるいは臨床的研究がなされている。拔牙がより多く取上げられた理由の1つは、歯科、口腔外科の小手術の中で最も頻繁に行なわれるものであり、かつ日常の臨床に、所謂脳貧血様症状（脳貧血という表現には疑問を呈する研究者もいるが）あるいはショック様症候に遭遇することも少なくなく、全身への影響を考える場合、最も身近な問題として考慮されてきたものと思われる。歯科、口腔外科的処置の影響について、2, 3 文献の検索を試みると、拔牙侵襲の血液所見の変化に関し基礎実験的に、Andey および Freguson¹⁾ (1945) は家兎およびラットの拔牙後の白血球の変動を、倉繁²⁾ (1960) は成犬の拔牙後の好酸球数の変動について研究し、人を被験として Faillio³⁾ (1942) は拔牙前後における血液の所見を、奥津、影山⁴⁾ (1951) は拔牙後の好酸球数の変動について、奥津⁵⁾ (1950) は拔牙後における赤沈値の動揺について報告している。また、影山⁶⁾ (1958) は拔牙後における生化学的变化について、坂村⁷⁾ (1969) は拔牙侵襲が血液凝固におよぼす影響について報告している。さらに循環生理学的研究として、豊田⁸⁾ (1944) は三叉神経刺激の家兎血圧の変化を迷走神経との関連について述べ、太田⁹⁾ (1951) は家兎、犬および人を被験として歯質削除および家兎露出歯髄を器械的に刺激することにより、血圧の変動を研究し、玉生¹⁰⁾ (1957) は拔牙手術時の血圧の変動を、大鶴¹¹⁾ (1958) は拔牙時の血圧および脈搏の変動について報告している。また、教室の依田¹²⁾ (1965) は口腔侵襲の末梢脈波の変化について研究している。口腔侵襲の心電図学的研究としては佐藤¹³⁾ (1960) が心電図による拔牙現象の探索を、Williams¹⁴⁾ (1963) は局麻後から拔牙

操作終了までの心電図の所見を、土井¹⁵⁾ (1970) は拔牙時の心電図所見について研究している。精神医学的、神経生理学的面では、内田¹⁶⁾ (1968) は歯科愁訴および口腔外科手術と自律神経機能について、都¹⁷⁾ (1969) は歯科治療時におけるいわゆる脳貧血の心身医学的研究について報告している。口腔侵襲の諸臓器への影響については、福本¹⁸⁾ (1954) が歯牙処置と尿量との関連について、林¹⁹⁾ (1956) は歯牙処置時の脾臓の収縮について述べ、林²⁰⁾ (1957) は歯牙処置時の腎機能への影響について、木村²¹⁾ (1962) は口腔侵襲の諸臓器への影響を自律神経機能との関連について研究している。また、細菌学的研究として、大井ら²²⁾ (1952) は拔牙と菌血症の問題を報告している。しかるに、これらの多くの研究業績は心疾患のごとき系統的疾患を有しているものを被験としての研究はなく、わずかに村瀬²³⁾ (1961)、松田ら²⁴⁾ (1969) が口腔侵襲と心電図所見について報告しているにすぎない。また、多くの臨床家は、心疾患患者の口腔処置においては、多くの場合、心不全の既往のある者に対しては急性心不全を、冠状血管障害患者に対してはその再発を、弁膜疾患患者には細菌性心内膜炎の発生を危惧し、いたずらに避ける傾向にあることも否定出来ない。そこで著者は、口腔外科小手術中、最も頻繁に行なわれる拔牙をとりあげ、心疾患患者の口腔外科的処置時の生理学的動態が全身的疾患を所有していない患者と比較して、はたして変動差があるかどうか、末梢循環の動態と、臨床上注意せねばならぬ脈拍数、血圧を、補足的に精神神経電流現象と心電図について検討を行ない、これらの実験を通じて心疾患患者に加療し得る限界という意味において、また、拔牙術範囲の侵襲に対する主要注意事項について、2, 3 の知見を得たのでここに報告する。

2. 研究対象および研究方法

1. 研究対象

対照として選んだ患者は 1969 年 1 月より 12 月まで、東京女子医科大学口腔外科を受診した患者の内、問診、諸検査の結果、全身疾患を所有せず、かつ安静時、脈波

東京女子医科大学口腔外科学教室（主任：村瀬正雄教授）
Department of Oro-Maxillo Facial Surgery Tokyo Women's Medical College (Chief: Prof. Masao Murase)
受付 昭和 46 年 12 月 13 日

No	氏名	性別	年齢	心疾患名	心臓手術の有無	心機能度	測定対象歯	測定対象歯疾患名	全被歯部位及び数
1	■	♂	23	P. M. D原発性心筋炎	無	III	4	C ₈ 慢化per	4 1
2	■	♂	35	バルサルバ洞動脈瘤	無(予定)	III	4	C ₈ 慢化per	— 4 1
3	■	♀	11	ファロー四徴候	無(予定)	II	C	C ₈	C 2
4	■	♀	9	肺動脈弁閉鎖不全症	有	I	E	C ₈	E E 2
5	■	♀	54	左室肥大症兼高血圧症	無	II	1	C ₈ 慢化per	— 1 1
6	■	♂	67	心筋硬塞症	無	II	5	C ₈	54.2 2.5 9
7	■	♀	28	ファロー四徴候	有	II	8	智歯周囲炎	8 1
8	■	♂	68	心筋硬塞症	無	II	5	急性骨膜炎	8 5 3
9	■	♂	23	亜急性細菌性心内膜炎	有	II	6	C ₈ 慢化per	76 8 5
10	■	♀	29	僧帽弁狭窄症	有	I	8	C ₈	8 8 3
11	■	♀	72	狭心症	無	II	2	P ₈	— 2.6 2
12	■	♂	67	狭心症	無	II	4	P ₈	754 1 4
13	■	♀	80	心筋硬塞症	無	II	5	P ₈	763-3 25 8
14	■	♀	40	心室中隔欠損症	無	I	4	急性骨膜炎	2 4.5 3
15	■	♂	40	A-Vブロック	有	II	5	C ₈ 急性per	2 5 4
16	■	♂	49	頻脈症兼本態性高血圧症	無	I	7	C ₈	7 6.7 3
17	■	♀	27	僧帽弁・三尖弁閉鎖不全症	有	III	1	C ₈ 急性per	— 1 1
18	■	♂	69	心筋硬塞症兼高血圧症	無	II	3	P ₈	43 2
19	■	♂	26	心室中隔欠損症	無	I	8	C ₈	— 8 1
20	■	♂	57	心房中隔欠損症, 狭心症	無	III	6	C ₈ 急性per	— 6 1
21	■	♀	14	僧帽弁閉鎖不全症, 三尖弁狭窄	有	I	7	C ₈ 慢化per	7 1
22	■	♀	28	動脈管開存症	無(予定)	I	6	C ₈ 慢化per	— 6 1
23	■	♀	31	僧帽弁狭窄症	有	I	8	C ₈ 慢化per	8 8 2
24	■	♂	8	心室中隔欠損症	無	I	C	C ₈	DC C 3
25	■	♀	42	僧帽弁狭窄症	有	I	7	C ₈ 慢化per	7 1
26	■	♀	7	心室中隔欠損症	無(予定)	II	D	急性骨膜炎	B B 5
27	■	♀	10	心室中隔欠損症	無(予定)	II	E	C ₈	— E 1
28	■	♂	9	心房中隔欠損症	有	I	D	C ₈	D DE 4
29	■	♀	14	僧帽弁閉鎖不全症	有	I	6	C ₈ 急性per	6 2
30	■	♀	47	僧帽弁閉鎖不全症	有	II	4	急性骨膜炎	7-4 4.7 6
31	■	♂	10	単心室, 僧帽弁閉鎖症, 肺動脈弁狭窄	無	II	D	C ₈	EU DE 7
32	■	♂	28	大動脈弁狭窄	有	III	5	C ₈ 慢化per	5 6 2
33	■	♀	20	心室中隔欠損症	有	I	6	C ₈ 慢化per	— 6 1
34	■	♀	37	僧帽弁閉鎖不全, 三尖弁狭窄	有	II	7	C ₈	— 7 1
35	■	♀	36	僧帽弁閉鎖不全症, 大動脈弁狭窄	有	II	4	C ₈	4 5 3
36	■	♀	31	急性心膜炎	無	II	7	C ₈ 慢化per	87 7 3
37	■	♀	49	狭心症	無	III	1	C ₈ 急性per	— 1 1
38	■	♂	57	心室中隔欠損症	無	I	5	C ₈	21 45 8
39	■	♂	18	心室中隔欠損症	無(予定)	II	8	智歯周囲炎	— 2

表 1 対照の被験者

No	氏名	性別	年齢	測定対象歯	測定対象歯疾患名
1		♀	48	5	C ₃ 慢性per
2		♀	30	8	C ₃ 潰pul
3		♀	23	8	智歯周囲炎
4		♀	21	5	C ₄
5		♀	22	6	C ₃ 慢性per
6		♂	27	8	C ₃ 潰pul
7		♀	57	4	C ₄
8		♂	21	7	C ₄
9		♀	43	6	C ₃ 急性per
10		♂	26	6	C ₄
11		♀	40	6	C ₄
12		♀	59	8	C ₄
13		♂	27	8	智歯周囲炎
14		♀	22	8	C ₃ 潰pul
15		♀	56	5	C ₄
16		♂	24	6	C ₄

表 3 New York Heart Association の機能的分類

I	心疾患あるも、肉体的活動は制限されない。日常肉体的活動で不当な疲労、動悸息切れ、狭心痛は出現しない。
II	肉体的活動が軽度制限される心疾患。安静時に愁訴はない。日常肉体的活動で疲労、動悸、息切れ、狭心痛をきたす。
III	肉体的活動が著明に制限される心疾患。安静時に愁訴はない。日常肉体的活動以下の労作で、疲労、動悸、息切れ、狭心痛をきたす。
IV	不快を伴わずにいかなる肉体的活動も出来ない心疾患。安静時にも心不全ないし狭心症状がある事がある。肉体的活動をすると愁訴が増強する。

表 4 対照および心疾患患者の症例数

症 例	例 数	男 性	女 性
対 照	16 名	5 名	11 名
心疾患群	I 度	14	5
	II 度	19	8
	III 度	6	4
	IV 度	0	0
	合 計	39	17

に病的所見のない男性 5 名、女性 11 名の計 16 名を選び対照被験者とした (表 1)。また、心疾患患者は東京女子医科大学日本心臓血圧研究所附属病院に通院、あるいは入院中の患者で、当口腔外科に紹介された患者の内、無作為に選択した 7 才から 80 才までの男性 17 名、女性 22 名の計 39 名を被験者とした (表 2)。また、これらの心疾患患者の病態像を New York Heart Association の分類 (表 3) にしたが、機能的に分類し検討を加えた。その内訳は I 度 14 名、II 度 19 名、III 度 6 名で IV 度の患者は含まれていない (表 4)。

2. 口腔処置時の手指尖脈波の変動

脈波におけるその波高は誘導部皮下の血管中の血流の変化 (血液の増減) を具体的に表示するものであり、また、皮膚血管と四肢および脳、心筋の血管は刺激に対して等しく同調し、逆に内臓域の血管は逆に反応すると言われている³⁰⁾。すなわち、指尖脈波の変動によって、脳、心筋の血管反射の動態を推定し得る点で、指尖脈波の測定は外科的侵襲による末梢循環の状態を知る上で有意義なものであり、かつ操作上、簡便であるために手指尖部を選んだ。

1) 脈波の誘導 脈波の誘導は左側第 2 手指掌側に (写真 1)、Phethismograph の受光部を固定し、動揺をさけるために注意して固定した。

また、脈波の誘導に際しては、誘導部は心臓の高さと同じ高さにおくことが理想的であるが、多くの外来手術例では、歯科治療椅子を使用し、座位にて処置を行なうものが通例であり、可及的日常診療を予想し、患者の姿勢をほぼ 45 度に傾斜させ、かつ写真 2 に示すごとく安定台を作り、誘導部を安定させた (写真 2)。

2) 脈波変動の観察方法ならびに測定方法 被験者は歯科治療椅子に手術開始前約 10 分間安静させた後に手術を開始した。また、誘導した手指尖脈 (波高と持続時間) の測定時期は

(1) 術前 5 分前。(以後術前と呼ぶ)

写真 1 第 2 手指尖掌側における脈波の誘導 (手掌は GSR の誘導を示す)

写真 2 誘導部位の安定台

図1 測定値の処理方法および変化の比較, 変化率の求め方

表5 手術経過と脈波の誘導時期

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	手術開始 5分前	局所 麻酔時	環状靱帯 切開時	エレベーター 脱臼運動 開始時	手術終了 5分後	終了
開始	↓	↓	↓	↓	↓	
		↑	↑	↑		
		コントロール	コントロール	コントロール		

- (2) 局所麻酔 (浸潤麻酔) 時 (以後局麻時と呼ぶ)
 (3) 環状靱帯切開時 (以後切開時と呼ぶ)
 (4) エレベーターによる脱臼運動時 (以後抜歯時と呼ぶ)
 (5) 術後5分後 (以後術後と呼ぶ) である。

また測定値の処理方法は教室の依田¹²⁾が口腔浸襲の末梢脈波におよぼす影響に関する基礎的, 臨床的研究で明らかにした処理方法を導入した。すなわち, 脈波波高の増減, あるいは持続時間の延長, 短縮についての測定にあたり, 変化の最も著明に現われる時期の2区間 (比I, 比II) を取上げ比較した。比較に当っては図1, 表5に示すごとく刺激前約10秒間の平均値をcontrolとして, 比Iは刺激開始2秒から7秒後までの5秒間の平均値, 比IIでは9秒後から14秒までの平均値の変化を百分比により比較した。しかし比I, 比II間に95%の有意性を論ずることが出来なかったため, 結果的に比Iにて比較することとした。なお, 術後のみ術前術後を比較する意味でcontrolを術前に置き検討した。また, 脈波波高および持続時間の手術的侵襲による変化は依田¹²⁾同様, 5%以上を有意するものとした。この5%を指標と

した理由は測定誤差および生理的動揺などの変動が5%以内にとどまるからである。

3. 口腔処置時の脈拍数の変動

口腔浸襲による脈拍数の動態を把握することは発作性頻脈症などの出現を懸念される心疾患のごとき場合は特に重要である。それがために, 著者は口腔処置時の脈拍数の変動の検索を行なった。口腔浸襲の各刺激前後における脈拍数の比較は脈波持続時間の比I, 比IIの測定で知り得る訳であるが, 全手術経過中の脈拍数の動態を知ることが出来ない。それがために, 別の角度から全手術経過中の脈拍数の変動を検討した。

島津製作所の最高血圧連続記録装置には脈拍数の測定装置を備えているが精確を期するために心電図上から分析した。

1) 脈拍数変動の観察方法 脈拍数を心電図上から分析した時期は術前, 各刺激開始2秒後からほぼ10秒間および術後のほぼ10秒間の平均を分析した。すなわち,

- (1) 術後のほぼ10秒間。
- (2) 局麻時の刺激開始2秒後のほぼ10秒間。
- (3) 切開時の刺激開始2秒後のほぼ10秒間。
- (4) 抜歯時の刺激開始2秒後のほぼ10秒間。
- (5) 術後のほぼ10秒間。

である。

2) 脈拍数変動 測定値の処理方法 変動出現度, 平均値変動度, 頻脈症出現度を求めた。

ここに言う変動出現度とは, 各刺激時あるいは術後の数値から術前の数値を引き, その値を術前値で除し, 100倍し, 5%以上の変動あるものを変動ありとした。平均値変動度とは各刺激時の平均値から術前の平均値を引き, その値を術前の平均値で除し, 100倍したものである。また, 頻脈症出現度は術前から術後までの全経過中, 1時点でも分時100回以上の記録あるものを頻脈症出現ありとしての症例百分比である。変動出現度を求めるにあたり, 5%を指標としたのは測定誤差および生理的動揺などの変動が5%以内にとどまるためである。

4. 口腔処置時の最高血圧の変動

1) 血圧変動の観察方法 血圧の誘導は右側第3, 第4指掌側面に反射受光部を固定し, 第3指に圧受容器を固定した (写真3)。誘導部は脈波誘導と同様, 心臓と同じ高さに置くことが理想的であるが, 外来では歯科治療椅子を使用するために, 安定台に腕を置き, 指尖部が動揺するのを避けた。血圧の測定時期は脈波, 脈拍数と同様の時期の最高値を選んだ。すなわち, 術前, 各刺激時, 術後の最高値である。

2) 血圧測定値の処理方法 変動出現度, 平均値変動度, 高血圧様化出現度を求めた。ここにいう変動出現度とは, 各刺激時あるいは術後の数値から術前の数値を引き, その値を術前値で除し, 100倍し, 10%以上の変動

写真 3 第三, IV手指における血圧の誘導を示す

あるものを変動ありとした。また、平均値変動度とは脈拍数と同様、各刺激時の平均値から術前の平均値を引き、その値を術前の平均値で除し、100 倍したものである。高血圧様化出現度とは最高血圧が 160 mmHg 以上の変化を来したものの症例百分比である。変動出現度を求めるにあたり、10% を指標としたのは測定誤差の変動が 10% 以内におさえられるためである。

5. 実験装置および器材

指尖脈波の誘導には三米測器社製の多目的用途記録監視装置 141-6 型に内蔵されている photo electric phethysmograph の反射型を用いた。得られた脈波型は電気的容積脈波型、圧脈波型などの誘導によって得られた波型と本質的に異なっていない。また、最高血圧の誘導は島津社製の最高血圧連続記録装置 SCS-301 型を用いた。なお、麻酔にあたっては、注射針は 1/4 歯科用注射針を使用した。また、歯科用局所麻酔剤は種々の理由（刺入部位の局所毛細管を収縮させることにより、手術野の出血抑制を期待し、さらに薬物の吸収遅延による麻酔時間の延長、ひいては急性中毒発現の防止など）により、種々の血管収縮剤が使用されるのが通例である。しかし、使用する絶対量がきわめて少ないとは言え、血管収縮剤の全身への影響を完全に否定することは出来ない。たとえば大木²⁵⁾ (1960) はアドレナリン (0.1%) 塩酸エピレナミン 0.013 cc/kg 注) によって指尖脈波の変化を観察し、脈波波高の減少例を報告している。かように、全身への影響をもつ薬剤を含有する局麻剤を使用する事は実験作用因子を複雑化し、具像を正確に把握することにとってはマイナスとなるために単味の Lidocain (2% Xylocain) を用いた。

6. 実験対象とした手術

全例について、抜歯手術に限定した。この理由は口腔外科小手術中、抜歯が最も頻繁に行なわれる手術であり、また、局所麻酔、切開などの処置を含み、局麻下に行なわれる歯髄除去術、歯肉切除術などの歯科保存学上の術式もこの操作の範疇に入り、口腔外科学のみならず、歯科保存学、小児歯科学上にも有意義と判断したためである。

表 6 対照の測定対象歯疾患名

疾 患 名	数
C ₃ : 慢性化膿性根尖性歯周組織炎	2 歯
C ₃ : 急性化膿性根尖性歯周組織炎	1
C ₃ : 慢性潰瘍性歯髓炎	3
C ₄ :	8
智歯周囲炎	2

表 7 心疾患患者の測定対象歯疾患名

疾患名	心機能度		
	I 度	II 度	III 度
C ₃ : 慢性化膿性根尖性歯周組織炎	5 歯	3 歯	3 歯
C ₃ : 急性化膿性根尖性歯周組織炎	1	1	3
C ₄ :	6	6	0
P: 慢性化膿性辺縁性歯周組織炎	0	4	0
智歯周囲炎 (急性化膿性型)	0	2	0
急性化膿性骨膜炎	2	3	0

7. 測定対象とした歯牙の疾患名

抜歯適応と診断し、測定の対象とした歯牙の疾患名は対照が C₃、慢性化膿性根尖性歯周組織炎 2 歯、C₃ 急性化膿性根尖性歯周組織炎 1 歯、C₃、慢性潰瘍性歯髓炎 3 歯、C₄ 8 歯、智歯周囲炎 2 歯の計 16 歯であった (表 6)。また、心疾患患者は C₃、慢性化膿性根尖性歯周組織炎 11 歯、C₃、急性化膿性根尖性歯周組織炎 5 歯、C₄ 12 歯、慢性化膿性辺縁性歯周組織炎 4 歯、智歯周囲炎 2 歯、急性化膿性骨膜炎 5 歯の計 39 歯である (表 7)。なお、これらの疾患歯の植立状態は通法の分類で I 度から IV 度までさまざまであり、抜歯の難易度も歯根分離、骨削去を必要としたものもあった。

8. 心疾患患者に対する術前前後にわたる抗生物質の投与

抜歯手術によって一過性の菌血症が起ることは周知の事実である。大井ら²²⁾ (1952) によれば、抜歯手術 30 例中 19 例、63.3% の高率で緑色連鎖球菌を検出し、菌検出率は抜歯直後より 15 分前後が最高で、術前の対照ならびに抜歯 24 時間以後は全て陰性であったと報告している。つまり抜歯手術に基づく菌血症は一過性ではあるが高率で惹起されるものである。

また、上田³⁴⁾ (1966) によれば亜急性細菌性心内膜炎は 95% が Streptococcus nonhemolyticus によって起り、その内、Streptococcus viridance がその 79.1% を占めているとしている。さらに亜急性細菌性心内膜炎の誘因として、健康な心内膜に生ずることもあるが大部分は既存の弁膜疾患や心異常があり、その上に細菌感染を起すとしている。そして最も重要なのは弁膜の変形をあげ、ついで先天性の心疾患であるとしている。手術による誘因として、抜歯、扁桃摘出後に急性心内膜炎を起すことがあるとも指摘している。

すなわち、亜急性細菌性心内膜の起因菌の大部分が Streptococcus viridance であること、また、同菌は口

腔内に常在し、かつ菌血症時に検出される菌がやはり同菌であることから、著者は心疾患患者の抜歯にあたり、細菌性心内膜炎の発生を予防するために、全例に術前 48 時間より術後 72 時間にわたって抗生物質の投与を行なった。

抗生物質の選択は Penicillin 系薬剤を第一として、禁忌の者には Erythromycin とした。全症例とも上記いずれかの薬剤で副作用の発現をみる事もなく処置を終了することが出来た。Penicillin 系薬剤は成人 1 日 120 万単位とし、年齢に応じて減じた。また、Erythromycin は 30 mg/kg として用いた。

3. 実験成績

1-1 口腔処置時の手指尖脈波の変動、一波型からみた動態一脈波波高および持続時間における変化

1) 局麻時(表 8,9~13)

(1) 対照例

(a) 指尖部脈波波高(以後指波高と略す)の変化は減少するものが 16 例中 11 例, 69.8%, 増加するもの 3 例, 18.8% で、無変化は 2 例, 12.4% である。

(b) 持続時間(以後持時と略す)の変化は短縮するものが 16 例中 5 例, 31%, 延長するもの 4 例, 25% で、無変化は 7 例, 44% である。

(2) 心疾患例

A) 心疾患Ⅰ度

表 9 対照ならびに心疾患の脈波持続時間の波型(比Ⅰ)

		局麻時		切開時		抜歯時		術前術後比	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
対 照	延長	4/16	25	0/14	0	2/16	13	9/16	56
	短縮	5/16	31	1/14	7	5/16	31	3/16	19
	無変化	7/16	44	13/14	93	9/16	56	4/16	25
心疾患Ⅰ度	延長	2/14	14	4/8	50	2/14	14	4/14	29
	短縮	5/14	36	0/8	0	5/14	36	2/14	14
	無変化	7/14	50	4/8	50	7/14	50	8/14	57
心疾患Ⅱ度	延長	2/19	11	3/11	27	7/19	36.8	8/19	42
	短縮	5/19	26	1/11	9	2/19	10.5	1/19	5
	無変化	12/19	63	7/11	64	10/19	52.6	10/19	53
心疾患Ⅲ度	延長	2/6	33	0/4	0	2/6	33	4/6	66.6
	短縮	0/6	0	3/4	75	1/6	17	1/6	16.6
	無変化	4/6	67	1/4	25	3/6	50	1/6	16.6
心疾患群	延長	6/39	15	7/23	31	11/39	28	16/39	41
	短縮	10/39	26	4/23	17	8/39	21	4/39	10
	無変化	23/39	59	12/23	52	20/39	51	19/39	49

(a) 指波高の変化は減少するものが 14 例中 13 例, 93%, 増加するもの 1 例, 7% で、無変化はない。

(b) 指時の変化は短縮するもの 14 例中 5 例, 36%, 延長するもの 2 例, 14% で、無変化は 7 例, 50%

表 8 対照ならびに心疾患の脈波波高の波型(比Ⅰ)

		局麻時		切開時		抜歯時		術前術後比	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
対 照	増高	3/16	18.8	4/14	29	2/16	12.5	8/16	50
	減少	11/16	69.8	9/14	64	10/16	62.5	5/16	31
	無変化	2/16	12.4	1/14	7	4/16	25	3/16	19
心疾患Ⅰ度	増高	1/14	7	0/8	0	1/14	7	9/14	64
	減少	13/14	93	7/8	87	12/14	86	4/14	29
	無変化	0/14	0	1/8	13	1/14	7	1/14	7
心疾患Ⅱ度	増高	5/19	26	1/11	9	5/19	26	9/19	47
	減少	11/19	58	7/11	64	13/19	68	8/19	42
	無変化	3/19	16	3/11	27	1/19	6	2/19	11
心疾患Ⅲ度	増高	0/6	0	0/4	0	0/6	0	6/6	100
	減少	5/6	83	4/4	10	6/6	10	0/6	0
	無変化	1/6	17	0/4	0	0/6	0	0/6	0
心疾患群	増高	6/39	15	1/23	4	6/39	15	24/39	61
	減少	29/39	75	17/23	74	31/39	80	12/39	31
	無変化	4/39	10	4/23	18	2/39	5	3/39	8

表 10 対照の脈波波高変化率

症 例	局麻時		切開時		抜歯時		術前術後比
	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	
1	1.07	1.01	1.27	0.99	2.34	2.35	0.98
2	1.31	0.71			0.54	0.74	2.80
3	0.95	1.10			0.94	1.01	2.50
4	0.25	0.54	1.30	0.72	0.65	0.49	1.23
5	0.94	1.15	1.10	1.24	0.67	0.78	2.02
6	0.68	0.53	0.82	0.73	0.99	0.57	1.13
7	1.04	0.60	0.70	0.65	0.96	0.83	0.79
8	0.60	0.62	0.77	0.61	0.94	0.70	1.02
9	0.86	0.88	0.93	0.90	1.00	1.10	1.45
10	0.89	0.75	0.93	0.90	0.93	0.99	0.94
11	0.48	0.53	0.81	0.92	0.55	0.79	1.04
12	0.62	0.75	0.75	0.98	0.69	0.71	1.54
13	0.79	1.35	0.96	1.01	0.57	0.70	0.90
14	0.82	0.84	0.77	0.96	0.96	0.71	0.84
15	1.20	1.15	1.18	1.20	1.11	1.02	2.29
16	0.74	0.83	0.83	0.89	0.69	0.87	0.93

表11 心疾患Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度脈波波高の変化率

	症例	局 麻 時		切 開 時		抜 歯 時		術前術後比
		比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	
心疾患Ⅰ度	4	0.32	0.49			0.25	0.18	1.38
	10	0.64	0.60			0.46	0.48	1.05
	14	0.90	0.96			0.88	0.77	1.17
	16	0.54	0.46	0.79	0.70	0.71	0.87	0.64
	19	0.62	0.58			0.53	0.30	2.34
	21	0.67	0.57			0.84	0.79	2.06
	22	0.62	0.64	0.88	0.96	0.72	0.75	2.20
	23	0.64	0.98	0.65	0.65	0.68	0.77	0.35
	24	1.46	1.12	0.84	0.80	0.66	0.48	3.80
	25	0.55	0.55	0.82	0.43	0.63	0.52	1.55
	28	0.73	0.75	0.75	0.83	0.63	0.64	1.79
	29	0.85	1.06	1.03	1.04	0.88	1.02	0.87
	33	0.24	0.36			0.95	0.63	0.47
	38	0.71	0.91	0.75	0.82	1.15	1.04	1.49
心疾患Ⅱ度	3	1.54	1.47			1.63	0.94	2.20
	5	0.90	0.97			1.22	1.18	1.30
	6	1.02	1.06			0.88	1.03	1.16
	7	0.59	0.45			0.49	0.59	1.34
	8	1.14	1.14			0.63	0.55	1.64
	9	0.79	0.75			0.74	0.68	1.12
	11	1.63	1.41			0.93	0.96	2.38
	12	0.98	1.01	1.05	1.12	0.87	0.90	1.02
	13	1.11	1.14			0.98	1.03	1.29
	15	0.52	0.56	0.7	0.72	0.68	0.95	0.97
	18	0.91	0.84	0.9	0.96	0.93	0.88	0.65
	26	0.30	0.23	0.3	0.20	0.59	0.67	0.48
	27	0.56	0.58	1.0	0.88	1.64	1.39	0.90
	30	0.50	0.75	0.87	0.75	1.25	0.73	0.90
	31	0.46	0.52	0.73	0.51	0.49	0.37	0.81
	34	1.12	1.07	0.59	0.54	0.52	0.31	0.66
	35	1.00	1.00	0.68	0.66	0.68	0.80	1.10
	36	0.67	0.23	1.09	0.77	1.18	0.81	0.93
39	0.55	0.24	0.30	0.64	0.39	0.52	0.86	
心疾患Ⅲ度	1	0.58	0.77			0.60	0.63	1.84
	2	0.93	0.90			0.65	0.56	1.25
	17	0.80	0.44	0.93	1.07	0.55	0.84	1.07
	20	0.97	1.00	0.90	0.80	0.92	0.97	1.20
	32	0.47	0.56	0.78	0.67	0.61	0.82	1.75
	37	0.63	0.64	0.92	0.84	0.76	0.91	2.50

である。

B) 心疾患Ⅱ度

(a) 指波高の変化は減少するもの19例中11例、58%、増加するもの5例、26%で、無変化は3例、16%

表12 対照の脈波持続時間の変化率

症 例	局 麻 時		切 開 時		抜 歯 時		術前後比
	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	
1	1.07	1.02	0.94	0.98	0.93	0.91	1.07
2	0.91	1.02			0.87	0.98	1.08
3	0.98	1.02			0.89	0.92	1.12
4	0.90	1.02	0.98	0.96	1.01	0.98	1.10
5	0.92	1.08	0.95	0.92	0.87	0.96	1.06
6	0.97	1.14	0.96	0.96	1.04	0.95	1.03
7	1.04	1.13	0.96	0.97	1.09	1.20	1.12
8	0.83	0.83	0.99	1.49	0.98	0.89	1.10
9	1.04	1.04	1.00	1.05	1.00	1.04	0.92
10	0.91	0.85	0.96	0.95	1.02	0.96	1.15
11	0.96	0.96	1.01	1.01	1.06	1.06	0.94
12	1.11	1.03	1.05	1.02	1.02	1.02	0.96
13	1.15	1.12	0.97	0.98	0.94	1.10	0.94
14	1.00	1.00	0.96	0.96	1.11	1.05	1.07
15	1.02	1.04	1.00	0.96	1.00	0.98	0.97
16	1.14	1.14	1.02	1.02	0.98	0.98	0.97

である。

(b) 持時の変化は短縮するもの5例、26%、延長するもの2例、11%で、無変化は12例、63%である。

C) 心疾患Ⅲ度

(a) 指波高の変化は減少するものが6例中5例、83%、増加するものはなく、無変化1例、17%である。

(b) 持時の変化は短縮するものなく、延長するもの2例、33%で、無変化4例、67%である。

D) 心疾患群

(a) 指波高の変化は39例中減少するもの29例、75%、増加するもの6例、15%で、無変化は4例、10%である。

(b) 持時の変化は短縮するもの10例、26%、延長するもの6例、15%で、無変化は23例59%である。

以上のごとく、浸潤麻酔第一刺入時の脈波の変化は指波高で対照および心疾患例とも95%の有意性をもち、減少のパターンが多い(表14、16)。しかし対照と心疾患Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度および心疾患群間に有意性はない(表18)。また、心疾患の機能的分類間では、Ⅰ度が最も強く現われ、ついでⅢ度、Ⅱ度の順で必ずしも心機能度と平行しない。持時の変化では無変化が多く、短縮、延長間では短縮例が多い傾向を認めるが、95%の有意性はなく(表15、17)対照対心疾患例でも有意性を認めることが出来ない(表19)。

2) 切開時(表8、9)

表13 心疾患Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度脈波持続時間の変化率

	症例	局 麻 時		切 開 時		抜 歯 時		術前後比
		比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	比Ⅰ	比Ⅱ	
心疾患Ⅰ度	4	0.95	0.93			0.97	0.98	1.02
	10	0.94	0.98			0.74	0.90	0.96
	14	0.96	1.48			1.02	1.02	1.00
	16	0.74	1.00	1.06	0.92	0.84	0.50	0.97
	19	0.82	0.97			0.87	0.82	1.03
	21	1.00	1.01			1.01	1.01	1.03
	22	0.85	0.85	1.03	1.01	0.97	0.85	1.03
	23	0.99	1.10	1.13	1.06	1.06	1.13	1.10
	24	0.95	0.85	0.97	1.01	0.94	0.87	0.78
	25	1.08	1.05	0.95	1.10	1.09	1.13	1.14
	28	1.14	1.30	1.10	1.16	0.81	0.95	1.09
	29	1.06	1.25	1.07	1.28	1.00	1.07	1.04
	33	0.83	0.95			1.00	0.94	0.91
	38	0.96	0.98	0.97	1.16	0.97	1.14	1.14
心疾患Ⅱ度	3	1.00	1.40			1.24	0.95	1.15
	5	1.00	0.97			0.98	0.97	1.08
	6	0.89	1.00			0.94	1.02	0.96
	7	0.84	1.07			0.96	0.89	0.97
	8	1.00	1.00			0.99	0.94	1.00
	9	1.08	1.10			1.07	1.02	1.07
	11	0.94	0.94			1.00	1.00	1.09
	12	0.99	0.99	1.00	1.00	1.01	1.06	1.00
	13	1.05	1.18			1.00	1.00	0.96
	15	0.98	0.98	1.01	0.98	1.01	1.00	1.00
	18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97
	26	0.79	0.92	1.00	0.92	1.00	1.02	1.00
	27	0.97	1.03	1.04	1.09	1.16	1.11	1.09
	30	1.07	1.03	0.92	1.00	1.24	1.16	1.08
心疾患Ⅲ度	1	1.00	0.98		0	1.00	1.08	1.26
	2	1.13	1.08			1.07	1.10	1.05
	17	1.09	0.89	0.80	0.87	0.75	0.87	1.12
	20	0.98	1.01	0.91	0.88	0.93	0.92	0.91
	32	0.98	1.13	1.00	1.13	1.24	1.03	1.04
	37	1.04	1.04	0.91	1.03	1.00	1.17	1.06

(1) 対照例

(a) 指波高の変化は 14 例中減少するもの 9 例, 64%, 増加するもの 4 例, 29% で, 無変化は 1 例, 7% である。

表 14 対照の脈波高—増加減少の有意性 (比Ⅰ)

	N	P	M	Q	P-Q	RI
局 麻 時	3/16	0.187	11/16	0.687	0.500	0.467*
切 開 時	4/14	0.285	9/14	0.642	0.357	0.515
抜 歯 時	2/16	0.125	10/16	0.625	0.500	0.342*
術前後比	8/16	0.500	5/16	0.332	0.187	0.450

N : 増加例母集団の大きさを示す。

M : 減少例母集団の大きさを示す。

* : NM 内に 95% の信頼限界で有意差が存在した。

表 15 対照の脈波持続時間—延長短縮の有意性 (比Ⅰ)

	N	P	M	Q	P-Q	RI
局 麻 時	4/16	0.250	5/16	0.312	0.062	0.375
切 開 時	0/14	0.000	1/14	0.071	0.071	0.142
抜 歯 時	2/16	0.125	5/16	0.312	0.187	0.330
術前後比	9/16	0.562	3/16	0.187	0.375	0.433

N : 延長例母集団の大きさを示す

M : 短縮例母集団の大きさを示す

表16 心疾患の脈波波高—増加減少の有意性(比Ⅰ)

		N	P	M	Q	P-Q	RI
心疾患Ⅰ度	局 麻 時	1/14	0.071	13/14	0.928	0.857	0.544*
	切 開 時	0/8	0.000	7/8	0.875	0.875	0.661*
	抜 歯 時	1/14	0.071	12/14	0.857	0.785	0.515*
	術前後比	9/14	0.642	4/14	0.285	0.357	0.515
心疾患Ⅱ度	局 麻 時	5/19	0.263	11/19	0.578	0.315	0.421
	切 開 時	1/11	0.090	7/11	0.636	0.545	0.514*
	抜 歯 時	5/19	0.263	13/19	0.421	0.421	0.446
	術前後比	9/19	0.473	8/19	0.052	0.052	0.434
心疾患Ⅲ度	局 麻 時	0/6	0.000	5/6	0.833	0.833	0.745*
	切 開 時	0/4	0.000	4/4	1.000	1.000	1.000*
	抜 歯 時	0/6	0.000	6/6	1.000	1.000	0.816*
	術前後比	6/6	1.000	0/6	0.000	1.000	0.816*
心疾患群	局 麻 時	6/39	0.153	29/39	0.743	0.589	0.303*
	切 開 時	1/23	0.043	17/23	0.739	0.695	0.368*
	抜 歯 時	6/39	0.153	31/39	0.794	0.641	0.311*
	術前後比	24/39	0.615	12/39	0.307	0.307	0.307*

N : 増加例母集団の大きさを示す。

M : 減少例母集団の大きさを示す。

* : NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

(b) 持時の変化は短縮するもの 1 例, 7%, 延長するものなく, 無変化 13 例, 93% である。

(2) 心疾患例

A) 心疾患Ⅰ度

(a) 指波高の変化は 8 例中減少するもの 7 例, 87

表17 心疾患の脈波持続時間—延長短縮の有意性(比I)

		N	P	M	Q	P-Q	RI
心疾患Ⅰ度	局 麻 時	2/14	0.142	5/14	0.357	0.214	0.377
	切 開 時	4/8	0.500	0/8	0.000	0.500	0.500
	抜 歯 時	2/14	0.142	5/14	0.357	0.214	0.377
	術前術後比	4/14	0.285	2/14	0.142	0.143	0.349
心疾患Ⅱ度	局 麻 時	2/19	0.105	5/19	0.263	0.157	0.278
	切 開 時	3/11	0.272	1/11	0.090	0.181	0.363
	抜 歯 時	7/19	0.368	2/19	0.105	0.263	0.315
	術前術後比	8/19	0.421	1/19	0.052	0.368	0.315
心疾患Ⅲ度	局 麻 時	2/6	0.333	0/6	0.000	0.333	0.471
	切 開 時	0/4	0.000	3/4	0.750	0.750	0.866
	抜 歯 時	2/6	0.333	1/6	0.166	0.166	0.577
	術前術後比	4/6	0.666	1/6	0.166	0.500	0.745
心疾患群	局 麻 時	6/39	0.153	10/39	0.256	0.102	0.205
	切 開 時	7/23	0.304	4/23	0.173	0.130	0.288
	抜 歯 時	11/39	0.282	8/39	0.205	0.076	0.223
	術前術後比	16/39	0.410	4/39	0.111	0.300	0.229

N：延長例母集団の大きさを示す。

M：短縮例母集団の大きさを示す。

*：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

表18 対照と心疾患の局麻時における脈波波高の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
増 加	対照：心疾患Ⅰ度	3/16	0.187	1/14	0.071	0.116	0.248
	対照：心疾患Ⅱ度	3/16	0.187	5/19	0.263	0.075	0.284
	対照：心疾患Ⅲ度	3/16	0.187	0/6	0.000	0.187	0.328
	対照：心疾患群	3/16	0.187	6/39	0.153	0.033	0.219
減 少	対照：心疾患Ⅰ度	11/16	0.687	13/14	0.928	0.241	0.292
	対照：心疾患Ⅱ度	11/16	0.687	11/19	0.578	0.108	0.327
	対照：心疾患Ⅲ度	11/16	0.687	5/6	0.833	0.145	0.426
	対照：心疾患群	11/16	0.687	29/39	0.743	0.056	0.264
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	2/16	0.125	0/14	0.000	0.125	0.182
	対照：心疾患Ⅱ度	2/16	0.125	3/19	0.157	0.032	0.237
	対照：心疾患Ⅲ度	2/16	0.125	1/6	0.166	0.041	0.328
	対照：心疾患群	2/16	0.125	4/39	0.102	0.022	0.185

N：対照の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。

M：心疾患の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。

％，増加するものなく無変化は1例，13％である。

(b) 持時の変化は短縮するものなく，延長するもの

表19 対照と心疾患の局麻時における脈波持続時間の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
延 長	対照：心疾患Ⅰ度	4/16	0.250	2/14	0.142	0.107	0.292
	対照：心疾患Ⅱ度	4/16	0.250	2/19	0.105	0.144	0.255
	対照：心疾患Ⅲ度	4/16	0.250	2/6	0.333	0.083	0.426
	対照：心疾患群	4/16	0.250	6/39	0.153	0.096	0.229
短 縮	対照：心疾患Ⅰ度	5/16	0.312	5/14	0.357	0.044	0.345
	対照：心疾患Ⅱ度	5/16	0.312	5/19	0.263	0.049	0.306
	対照：心疾患Ⅲ度	5/16	0.312	0/6	0.000	0.312	0.401
	対照：心疾患群	5/16	0.312	10/39	0.256	0.056	0.264
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	7/16	0.437	7/14	0.500	0.062	0.365
	対照：心疾患Ⅱ度	7/16	0.437	12/19	0.631	0.194	0.338
	対照：心疾患Ⅲ度	7/16	0.437	4/6	0.666	0.229	0.478
	対照：心疾患群	7/16	0.437	23/39	0.589	0.152	0.295

N：対照の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。

M：心疾患の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。

の4例，50％である。

B) 心疾患Ⅱ度

(a) 指波高の変化は11例中減少するもの7例，64％，増加するもの1例，9％で，無変化は7例，64％である。

(b) 持時の変化は短縮するもの1例，9％，延長するもの3例，27％で，無変化は7例，64％である。

C) 心疾患Ⅲ度

(a) 指波高の変化は4例中減少するもの4例，100％である。

(b) 持時の変化は短縮するもの3例，75％，延長するものなく，無変化1例である。

D) 心疾患群

(a) 指波高の変化は23例中減少するもの17例，74％，増加するもの1例，9％で，無変化4例，18％である。

(b) 持時の変化は短縮するもの4例，17％延長するもの7例，31％で，無変化12例，52％である。

以上のごとく，切開時も局麻時と同様，対照，心疾患例とも指波高の変化は減少例が多いといえるが，対照と心疾患例を比較すると，心疾患例に減少例が多い傾向をうかがわせるも，95％でその有意性を断定することが出来ない(表20)。また，持時の変化は対照に無変化例が多い。なお，心疾患例に，局所麻酔下に完全無痛状態で行なわれる本処置に，後述する局麻時と同様変動出現例が多いことは興味深い(表21)。

3) 抜歯時(表8，9)

(1) 対照例

表20 対照と心疾患の切開時における脈波波高の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
増 加	対照：心疾患Ⅰ度	4/14	0.285	0/8	0.000	0.285	0.341
	対照：心疾患Ⅱ度	4/14	0.285	1/11	0.090	0.194	0.322
	対照：心疾患Ⅲ度	4/14	0.285	0/4	0.000	0.285	0.471
	対照：心疾患群	4/14	0.285	1/23	0.043	0.242	0.231
減 少	対照：心疾患Ⅰ度	9/14	0.642	7/8	0.875	0.232	0.394
	対照：心疾患Ⅱ度	9/14	0.642	7/11	0.636	0.006	0.386
	対照：心疾患Ⅲ度	9/14	0.642	4/4	1.000	0.357	0.507
	対照：心疾患群	9/14	0.642	17/23	0.739	0.096	0.309
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	1/14	0.071	1/8	0.125	0.053	0.254
	対照：心疾患Ⅱ度	1/14	0.071	3/11	0.272	0.201	0.295
	対照：心疾患Ⅲ度	1/14	0.071	0/4	0.000	0.071	0.259
	対照：心疾患群	1/14	0.071	17/23	0.179	0.102	0.231

N：対照の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。
＊：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

表21 対照と心疾患の切開時における脈波持続時間の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
延 長	対照：心疾患Ⅰ度	0/14	0.000	4/8	0.500	0.500	0.341*
	対照：心疾患Ⅱ度	0/14	0.000	3/11	0.272	0.272	0.261*
	対照：心疾患Ⅲ度	0/14	0.000	0/4	0.000	0.000	0.000*
	対照：心疾患群	0/14	0.000	7/23	0.304	0.304	0.265*
短 縮	対照：心疾患Ⅰ度	1/14	0.071	0/8	0.000	0.071	0.184
	対照：心疾患Ⅱ度	1/14	0.071	1/11	0.090	0.019	0.218
	対照：心疾患Ⅲ度	1/14	0.071	3/4	0.750	0.678	0.471*
	対照：心疾患群	1/14	0.071	4/23	0.173	0.102	0.231
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	13/14	0.928	4/8	0.500	0.428	0.371*
	対照：心疾患Ⅱ度	13/14	0.928	7/11	0.636	0.292	0.323
	対照：心疾患Ⅲ度	13/14	0.928	1/4	0.250	0.678	0.471*
	対照：心疾患群	13/14	0.928	12/23	0.521	0.406	0.317*

N：対照の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。
＊：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

(a) 指波高の変化は16例中減少するもの10例，62.5%，増加するもの2例，12.5%で，無変化は4例，25%である。

(b) 持時の変化は短縮するもの5例，31%，延長するもの2例，13%で，無変化9例，56%である。

(2) 心疾患例

A) 心疾患Ⅰ度

(a) 指波高の変化は14例中減少するもの12例，86%，増加するもの1例7%である。また，無変化1例，7%である。

(b) 持時の変化は短縮するもの5例，36%，増加するもの2例，14%で，無変化7例，50%である。

B) 心疾患Ⅱ度

(a) 指波高の変化は19例中減少するもの13例，68%，増加するもの5例，26%で，無変化は1例，6%である。

(b) 持時の変化は短縮するもの2例，10.5%，延長するもの7例，36.8%で，無変化10例，52.6%である。

C) 心疾患Ⅲ度

(a) 指脈高の変化は6例中減少するもの6例，100%で，増加，無変化はない。

(b) 持時の変化は短縮するもの1例，17%，延長するもの2例，33%で，無変化3例，50%である。

D) 心疾患群

(a) 指波高の変化は39例中減少するもの31例，80%，増加するもの6例，15%で，無変化は2例，5%である。

(b) 持時の変化は短縮するもの8例，21%，延長するもの11例，28%で，無変化20例，51%である。

エレベーターによる脱臼運動は抜歯手術中の中心手技である。しかし，対照および心疾患例とも指波高の変化に減少例が多いことは，局麻時，切開時と同様であるが，抜歯時も対照対心疾患例間に%では軽度減少例が多い傾向を認めるが，95%の有意性を証明することが出来

表22 対照と心疾患の抜歯時における脈波波高の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
増 加	対照：心疾患Ⅰ度	2/16	0.125	1/14	0.071	0.053	0.219
	対照：心疾患Ⅱ度	2/16	0.125	5/19	0.263	0.138	0.271
	対照：心疾患Ⅲ度	2/16	0.125	0/6	0.000	0.125	0.275
	対照：心疾患群	2/16	0.125	6/39	0.153	0.028	0.209
減 少	対照：心疾患Ⅰ度	10/16	0.625	12/14	0.857	0.232	0.324
	対照：心疾患Ⅱ度	10/16	0.625	13/19	0.684	0.059	0.324
	対照：心疾患Ⅲ度	10/16	0.625	6/6	1.000	0.375	0.426
	対照：心疾患群	10/16	0.625	31/39	0.794	0.169	0.259
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	4/16	0.250	1/14	0.071	0.149	0.274
	対照：心疾患Ⅱ度	4/16	0.250	1/19	0.052	0.198	0.239
	対照：心疾患Ⅲ度	4/16	0.250	0/6	0.000	0.250	0.369
	対照：心疾患群	4/16	0.250	2/39	0.051	0.199	0.185*

N：対照の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。
＊：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

ず（表 22），また，局麻時，切開時，抜歯時の各刺激時間でも有意の差はない．持時の変化は対照および心疾患例とも無変化が多いが，短縮，延長間にも有意差はない（表 23）．

4) 術前術後の比較

(1) 対照例（表 8, 9）

(a) 指波高の変化は 16 例中減少するもの 5 例，31%，増加するもの 8 例，50% で，無変化 3 例，19% である．

(b) 持時の変化は短縮するもの 3 例，19%，延長するもの 9 例，56% で，無変化 4 例，25% である．

(2) 心疾患例

A) 心疾患Ⅰ度

(a) 指波高の変化は 14 例中減少するもの 4 例，28%，増加するもの 9 例，64% で，無変化 1 例，7% である．

(b) 持時の変化は短縮するもの 2 例，14%，延長するもの 4 例，29% で，無変化 8 例，57% である．

B) 心疾患Ⅱ度

(a) 指波高の変化は 19 例中減少するもの 8 例，42%，増加するもの 9 例，47% で，無変化は 2 例，11% である．

(b) 持時の変化は短縮するもの 1 例，5%，延長するもの 8 例，42% で，無変化は 10 例，53% である．

C) 心疾患Ⅲ度

(a) 指波高の変化は 6 例中，減少，無変化なく，増加するもの 6 例，100% である．

表23 対照と心疾患の抜歯時における脈波持続時間の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
延長	対照：心疾患Ⅰ度	2/16	0.125	2/14	0.142	0.017	0.248
	対照：心疾患Ⅱ度	2/16	0.125	7/19	0.368	0.234	0.296
	対照：心疾患Ⅲ度	2/16	0.125	2/6	0.333	0.208	0.369
	対照：心疾患群	2/16	0.125	11/39	0.282	0.157	0.252
短縮	対照：心疾患Ⅰ度	5/16	0.312	5/14	0.357	0.044	0.345
	対照：心疾患Ⅱ度	5/16	0.312	2/19	0.105	0.207	0.271
	対照：心疾患Ⅲ度	5/16	0.312	1/6	0.166	0.145	0.426
	対照：心疾患群	5/16	0.312	8/39	0.205	0.107	0.252
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	9/16	0.562	7/14	0.500	0.062	0.365
	対照：心疾患Ⅱ度	9/16	0.562	10/19	0.526	0.036	0.338
	対照：心疾患Ⅲ度	9/16	0.562	3/6	0.500	0.062	0.476
	対照：心疾患群	9/16	0.562	20/39	0.512	0.049	0.296

N：対照の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。

(b) 持時の変化は短縮するもの 1 例，16.6%，延長するもの 4 例，66.6% で，無変化 1 例である．

D) 心疾患群

(a) 指波高の変化は 39 例中減少するもの 12 例，31%，増加するもの 24 例，61% で，無変化 3 例，8% である．

(b) 持時の変化は短縮するもの 4 例，10%，延長するもの 16 例，41% で，無変化 19 例，49% であ

表24 対照と心疾患の術前術後比における脈波波高の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
増加	対照：心疾患Ⅰ度	8/16	0.500	9/14	0.642	0.142	0.362
	対照：心疾患Ⅱ度	8/16	0.500	9/19	0.473	0.026	0.339
	対照：心疾患Ⅲ度	8/16	0.500	6/6	1.000	0.500	0.460
	対照：心疾患群	8/16	0.500	24/39	0.615	0.115	0.292
減少	対照：心疾患Ⅰ度	5/16	0.312	4/14	0.285	0.026	0.335
	対照：心疾患Ⅱ度	5/16	0.312	8/19	0.421	0.108	0.327
	対照：心疾患Ⅲ度	5/16	0.312	0/6	0.000	0.312	0.401
	対照：心疾患群	5/16	0.312	12/39	0.307	0.004	0.274
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	3/16	0.187	1/14	0.071	0.116	0.248
	対照：心疾患Ⅱ度	3/16	0.187	2/19	0.105	0.082	0.237
	対照：心疾患Ⅲ度	3/16	0.187	0/6	0.000	0.187	0.328
	対照：心疾患群	3/16	0.187	3/39	0.076	0.110	0.185

N：対照の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の増加，減少，無変化例の母集団の大きさを示す。

表25 対照と心疾患の術前術後比における脈波持続時間の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
延長	対照：心疾患Ⅰ度	9/16	0.562	4/14	0.285	0.276	0.362
	対照：心疾患Ⅱ度	9/16	0.562	8/19	0.421	0.141	0.339
	対照：心疾患Ⅲ度	9/16	0.562	4/6	0.666	0.104	0.476
	対照：心疾患群	9/16	0.562	16/39	0.410	0.152	0.294
短縮	対照：心疾患Ⅰ度	3/16	0.187	2/14	0.142	0.044	0.272
	対照：心疾患Ⅱ度	3/16	0.187	1/19	0.052	0.134	0.215
	対照：心疾患Ⅲ度	3/16	0.187	1/6	0.166	0.011	0.401
	対照：心疾患群	3/16	0.187	4/39	0.102	0.085	0.209
無変化	対照：心疾患Ⅰ度	4/16	0.250	8/14	0.571	0.321	0.358
	対照：心疾患Ⅱ度	4/16	0.250	10/19	0.526	0.276	0.332
	対照：心疾患Ⅲ度	4/16	0.250	1/6	0.166	0.083	0.401
	対照：心疾患群	4/16	0.250	19/39	0.487	0.237	0.292

N：対照の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。
M：心疾患の延長，短縮，無変化例の母集団の大きさを示す。

表29 心疾患Ⅰ度、Ⅱ度、Ⅲ度の脈拍数の測定値(分時換算)

	症例	術 前	局麻時	切開時	抜歯時	術 後
心疾患Ⅰ度	4	87	92		98	86
	10	73	72		98	74
	14	55	55		55	55
	16	66	80	74	86	68
	19	68	72		75	66
	21	77	81		79	75
	22	92	103	97	107	90
	23	80	87	78	83	72
	24	61	70	71	78	75
	25	87	83	92	86	75
	28	89	82	82	89	80
	29	62	66	58	64	58
	33	66	69		77	72
	38	79	69	72	71	70
心疾患Ⅱ度	3	100	79		90	85
	5	51	55		50	47
	6	86	90		92	90
	7	73	82		82	75
	8	72	75		76	72
	9	73	68		68	68
	11	71	73		69	65
	12	92	117	98	95	92
	13	63	65		65	66
	15	66	66	66	66	66
	18	91	91	88	90	94
	26	95	109	95	100	95
	27	86	90	86	86	78
	30	70	80	61	68	64
	31	88	92	95	95	90
	34	86	94	82	82	70
	35	97	94	81	83	86
	36	95	90	80	80	94
	39	100	98	92	92	110
心疾患Ⅲ度	1	111	110		98	92
	2	80	73		76	76
	17	60	60	59	66	58
	20	52	55	66	64	57
	32	72	73	72	77	72
	37	127	133	133	133	120

4) 術前術後の比較

術後は脈波持続時間とコントロールが同時点であるために、パターンは一致している。すなわち、持時における延長例が脈拍数の減少例に、短縮例が増加例に一致する訳である(表 9)。

以上のごとく、脈拍数の変動出現度をみると対照なら

表30 対照ならびに心疾患の脈拍数の平均値

		平均 値	不偏分散	標準偏差
対 照	術 前	78.87	70.91	8.42
	局 麻 時	81.18	129.66	11.38
	切 開 時	80.57	80.18	8.95
	抜 歯 時	82.12	91.52	9.56
	術 後	74.37	76.51	8.74
心疾患Ⅰ度	術 前	74.42	179.63	13.40
	局 麻 時	77.21	149.07	12.20
	切 開 時	78.00	98.57	9.92
	抜 歯 時	81.85	166.26	12.89
	術 後	72.57	94.92	9.74
心疾患Ⅱ度	術 前	81.84	198.91	14.10
	局 麻 時	84.63	236.84	15.38
	切 開 時	83.99	140.39	11.84
	抜 歯 時	80.47	174.04	13.19
	術 後	79.31	234.00	15.29
心疾患Ⅲ度	術 前	83.66	867.46	29.45
	局 麻 時	83.99	947.19	30.77
	切 開 時	82.49	1161.66	34.08
	抜 歯 時	85.66	683.46	26.14
	術 後	79.16	566.56	23.80
心 疾 患 群	術 前	78.69	2 0.11	16.73
	局 麻 時	82.02	302.81	17.40
	切 開 時	81.65	278.78	16.69
	抜 歯 時	81.76	241.18	15.53
	術 後	75.38	376.50	19.43

びに心疾患例とも、各刺激時ではほぼ半数が無変化であり、増加対減少をみると、軽度に対照、心疾患例とも局麻時、抜歯時に増加例が多い傾向を認め、また、術後では逆に増加するものよりも減少例が多くなるが有意の差はない。また、局麻時、切開時、抜歯時の各刺激間および対照対心疾患例間に大きい差位は認められない。

2-2 脈拍数の平均値変動度(表 32)

(1) 対照例。変動度は局麻時 2.9%、切開時 2.5%、抜歯時 4.0% の増加を示し、術後は 5.8% と減少している。

(2) 心疾患例。心疾患Ⅰ度における脈拍数の変動度は局麻時 3.8%、切開時 4.8%、抜歯時 10.1% と増加し、術後では 2.4% と減少している。Ⅱ度では局麻時 2.9%、切開時 2.7% と増加し、抜歯時 1.6%、術後 3.0% と減少している。Ⅲ度では局麻時 0.4% と増加し、切開時 1.4% と減少、抜歯時再度 2.9% と増加し、術後では 5.4% と減少している。心疾患群としてみる

表31 脈拍数の変動出現度

		局 麻 時		切 開 時		抜 歯 時		術 後	
		例 数	%	例 数	%	例 数	%	例 数	%
対 照	増 加	5/16	31	3/14	21.4	6/16	37.5	3/16	19
	減 少	2/16	13	3/14	21.4	2/16	12.5	9/16	56
	無変化	9/16	56	8/14	57.2	8/16	50	4/16	25
心疾患Ⅰ度	増 加	7/14	50	4/8	50	7/14	50	2/14	14
	減 少	3/14	21	3/8	37.5	1/14	7	4/14	29
	無変化	4/14	29	1/8	12.5	6/14	43	8/14	57
心疾患Ⅱ度	増 加	6/19	31	2/11	18	4/19	21	1/19	5
	減 少	3/19	16	4/11	36	5/19	26	8/19	42
	無変化	10/19	53	5/11	46	10/19	53	10/19	53
心疾患Ⅲ度	増 加	1/6	16.7	1/4	25	2/6	33.3	1/6	16.6
	減 少	2/6	33.3	1/4	25	2/6	33.3	4/6	66.6
	無変化	3/6	50	2/4	50	2/6	33.3	1/6	16.6
心 疾 患 群	増 加	14/39	35.5	7/23	30	12/39	30.5	4/39	10
	減 少	8/39	20.5	8/23	35	8/39	20.5	16/39	41
	無変化	17/39	44	8/23	35	19/39	49	19/39	49

表 32 脈拍数平均値変動度

	局麻時	切開時	抜歯時	術 後
対 照	2.9	2.5	4.0	5.8*
心疾患Ⅰ度	3.8	4.8	10.1	2.4*
心疾患Ⅱ度	2.9	2.7	1.6*	3.0*
心疾患Ⅲ度	0.4	1.4*	2.9	5.4*
心 疾 患 群	2.4	2.8	3.0	3.3*

*：下降を示す

表33 対照ならびに心疾患の脈拍数変動出現症例における変動度

		局麻時	切開時	抜歯時	術 後
		増 加 減 少	増 加 減 少	増 加 減 少	増 加 減 少
対 照	増 加	16.7%	12.6%	16.0%	7.1%
	減 少	11.0	9.8	5.4	9.9
心疾患Ⅰ度	増 加	10.7	9.9	21.3	16.0
	減 少	8.8	7.7	10.1	11.0
心疾患Ⅱ度	増 加	14.5	7.2	8.1	10.0
	減 少	11.0	13.9	11.0	10.7
心疾患Ⅲ度	増 加	5.8	26.9	15.0	7.6
	減 少	8.9	10.6	12.9	12.8
心 疾 患 群	増 加	12.0	11.5	17.7	11.4
	減 少	9.7	10.9	11.3	11.2

と、局麻時 3.0%，切開時 2.8%，抜歯時 3.0% と増加し、術後と減少している。

以上のごとく、脈拍数の各刺激時および術後の平均値を術前に基準をおいて検討した場合、刺激時は心疾患Ⅱ度の抜歯、Ⅲ度の切開時を除いて脈拍数は増加し、術後は減少の状態にあるがその変動は小さい。この事は既述の変動出現度で無変化例が多く、かつ増加例、減少例が互いに相殺するためである（表 31）。

そこで5% 以上変動した例、つまり変動出現症例における変動度をみると表 33 のごとく、対照例において刺激時、増加例では 12.6% から 16.7% の変動を、減少例では 5.4% から 11% の変動度を認め、また、心疾患群においては増加例 12% から 17.7% の変動を、減少例では 9.7% から 11.3% の変動度を示している。つまり、5% 以上変動した変動出現症例のみを検討すると、対照、心疾患例とも 5～17% 前後の変動がある。しかしながら対照対心疾患間に平均値変動度と同様有意差はない。

2-3 頻脈症出現度（表 34）

表 34 対照ならびに心疾患の頻脈症の出現度

	例 数	%
対 照	0/16	0
心疾患Ⅰ度	1/14	7.1
心疾患Ⅱ度	4/19	21.0
心疾患Ⅲ度	2/ 6	33.3
心 疾 患 群	7/39	17.9

（1）対照例。対照における頻脈症出現は術前、局麻時、切開時、抜歯時、術後の全経過中、脈拍数分時 100 回以上呈した症例はない。

（2）心疾患例。心疾患例における頻脈症出現度は、Ⅰ度 14 例中 1 例、7.1%，Ⅱ度 19 例中 4 例 21.0% で、Ⅲ度 6 例中 2 例 33.3% である。

心疾患群として 39 例中 7 例、17.9% である。

以上のごとく、分時 100 回以上の頻脈数の出現をきたす例は対照に 1 例もなく、逆に心疾患例では機能度が重症化するにつれて出現してくる。

3. 口腔処置時の血圧の変動 心疾患例において血圧を測定した症例は少ないので、機能別にせず、心疾患群として統一して検討した。

3-1 変動出現度（表 37）。

1) 局麻時

（1）対照例。対照における収縮血圧の変動は 12 例中上昇するもの 7 例、58.3%，減少するものなく、無変化 5 例、41.7% である。

（2）心疾患例。14 例中上昇するもの 10 例、71%，下降するものなく、無変化 4 例、29% である。

2) 切開時

（1）対照例。対照例では 12 例中上昇するもの 4 例、33.3%，下降 1 例、8.3%，無変化 7 例、58.3% である。

表35 対照ならびに心疾患の血圧(最高血圧)の測定値

	症例	術 前	局麻時	切開時	抜歯時	術 後
対 照	5	115	135	130	175	110
	6	170	175	130	125	130
	7	125	150	150	135	150
	8	115	135	125	125	110
	9	160	155	150	150	125
	10	110	155	150	155	125
	11	115	155	115	145	115
	12	130	150	135	145	140
	13	125	130	125	145	120
	14	120	130	125	125	130
	15	150	175	175	175	150
	16	115	120	110	125	110
心 疾 患 群	15	160	185	165	175	165
	26	130	155	155	155	140
	28	110	110	110	125	110
	29	110	190	140	145	115
	30	130	230	175	150	130
	31	125	145	140	155	140
	32	160	190	150	160	125
	33	120	160		220	130
	34	150	190	175	210	175
	35	150	150	160	165	130
	36	110	185	120	125	115
	37	125	150	120	130	110
	38	125	130	130	120	120
	39	115	125	125	125	110

表36 対照ならびに心疾患の血圧(最高血圧)の平均値

		平 均 値	不偏分散	標準偏差
対 照	術 前	129.16	394.69	19.86
	局麻時	147.08	306.62	17.51
	切開時	134.99	331.81	18.21
	抜歯時	143.74	327.84	18.10
	術 後	126.24	209.65	14.47
心 疾 患 群	術 前	129.99	323.57	17.97
	局麻時	163.92	1054.53	32.47
	切開時	143.46	472.43	21.73
	抜歯時	154.28	957.14	30.93
	術 後	129.64	401.78	20.04

表 37 血圧の変動出現度

		局麻時		切開時		抜歯時		術 後	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
対 照	上 升	7/12	58.3	4/12	33.3	6/12	50	2/12	16.6
	下 降	0/12	0	1/12	8.3	1/12	8.3	2/12	16.6
	無変化	5/12	41.7	7/12	58.3	5/12	41.7	8/12	66.6
心疾患群	上 升	10/14	71	5/13	38	9/14	64	1/14	7
	下 降	0/14	0	0/13	0	0/14	0	4/14	29
	無変化	4/14	29	8/13	62	5/14	36	9/14	64

表38 対照と心疾患の血圧変動—上昇下降の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
対 照	局 麻 時	7/12	0.583	0/12	0.000	0.583	0.440*
	切 開 時	4/12	0.333	1/12	0.083	0.250	0.372
	抜 歯 時	6/12	0.500	1/12	0.083	0.417	0.404*
	術 後	2/12	0.166	2/12	0.166	0.000	0.333
心疾患群	局 麻 時	10/14	0.714	0/14	0.000	0.714	0.440*
	切 開 時	5/13	0.384	0/13	0.000	0.384	0.344*
	抜 歯 時	9/14	0.642	0/14	0.000	0.642	0.428*
	術 後	1/14	0.071	4/14	0.285	0.214	0.319

N：上昇側の母集団の大きさを示す。

M：下降側の母集団の大きさを示す。

*：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

表39 対照と心疾患の血圧変動出現度の有意性

		N	P	M	Q	P-Q	RI
上 昇	局 麻 時	7/12	0.583	10/14	0.714	0.131	0.374
	切 開 時	4/12	0.333	5/13	0.384	0.051	0.384
	抜 歯 時	6/12	0.500	9/14	0.642	0.142	0.388
	術 後	2/12	0.166	1/14	0.071	0.095	0.251
下 降	局 麻 時	0/12	0.000	0/14	0.000	0.000	0.000*
	切 開 時	1/12	0.083	0/13	0.000	0.083	0.156
	抜 歯 時	1/12	0.083	0/14	0.000	0.083	0.151
	術 後	2/12	0.166	4/14	0.285	0.199	0.331
無 変 化	局 麻 時	5/12	0.416	4/14	0.285	0.131	0.374
	切 開 時	7/12	0.583	8/13	0.615	0.032	0.392
	抜 歯 時	5/12	0.416	5/14	0.357	0.059	0.382
	術 後	8/12	0.666	9/14	0.642	0.024	0.374

N：対照例の母集団の大きさを示す。

M：心疾患例の母集団の大きさを示す。

*：NM間に95%の信頼限界で有意差が存在した。

(2) 心疾患例。心疾患例では上昇するもの 14 例中 9 例, 64%, 下降するものなく, 無変化 5 例, 36% である。

(2) 心疾患例。心疾患例では上昇するもの 5 例, 38%, 下降するものなく, 無変化 8 例, 63% である。

3) 抜歯時

(1) 対照例。対照例では12例中上昇するもの 6 例, 50%, 下降 1 例, 8.3%, 無変化 5 例, 41.7% である。

図4 対照および心疾患(群)の血圧, 平均値変動度
細線: 対照 太線: 心疾患群

4) 術後時

(1) 対照例. 上昇するもの, 下降するもの, おおの2例づつ, 16.6%, 無変化8例, 66.6%である。

(2) 心疾患例. 上昇するもの1例, 7%, 下降するもの4例, 29%, 無変化9例, 64%である。

以上のごとく, 刺激によって血圧の変動が高く出る時期は対照および心疾患例とも, 局麻, 抜歯時である。しかし, 対照が切開, 抜歯と経過が進むにつれて減少例が出現するのに反し, 心疾患例は減少例がなく, 有意差を認めることが出来る(表 38, 39), さらに各刺激時, 対照対心疾患例間では軽度心疾患群に出現度は高いが 95%の有意差を証明することが出来ない。また, 術後では無変化例が対照および心疾患例それぞれ 66.6%, 64%で両者とも 66%前後が術前の状態に回復している。

3-2 平均値変動度

(1) 対照例. 局麻時が 13.9%, 切開時 4.6%, 抜歯時 11.3%の上昇を示し, 術後では 2.3%の下降を示している。

(2) 心疾患例. 局麻時が 26%, 切開時 10.4%, 抜歯時 17.9%と上昇し, 術後は 0.3%と下降している。

以上のごとく, 術前に基準をおき, 1刺激によって引き起される変動の強さをみると心疾患例は対照と比較して変動度が高い傾向をもち, また, 刺激時の変動の強弱をみると局麻時, 抜歯時, 切開時の順である(図 4)。

3-3 高血圧様化出現度

(1) 対照例. 対照例で最高血圧 160 mmHg 以上の高血圧様変化をきたしたものは 12 例中 4 例, 33.3%である。

(2) 心疾患例. 心疾患例においては 14 例中 8 例, 57.1%である。

以上のごとく, 心疾患例では対照と比較して, 高血圧様変化の出現をきたす症例が多い。

4 不快症候発現例

著者は心疾患患者の歯科, 口腔外科的処置時の不快症候を(1)術前不快症候, (2)術中不快症候, (3)術後不快症候の三系に分類し検討を加えている。術前不快症候は歯科治療椅子に座っただけで動悸, 息切れ, 頻脈を起し, 心臓神経症の患者にまれにみられることが経験的に知られている。本症例にも頻脈を起した症例はあるが, 不快症候に入れるものは含まれていない。術中不快症候の発現はⅠ度, Ⅱ度, Ⅲ度に1例づつあり, また, 術後不快症候はⅢ度に1例発現している(表 40)。術中不快症候Ⅰ度の患者は症例 29 の 14 才の女性, リウマチ性の僧帽弁閉鎖不全症の患者で, 心臓手術後 53 日目の患者であり, 主訴は局麻時の頭重感である。術中不快症候Ⅱ度の患者は症例 30 の 47 才の女性, 僧帽弁閉鎖不全

表 40 心疾患患者の不快症候発現例

不快症候 \ 心機能度	Ⅰ 度	Ⅱ 度	Ⅲ 度
術前不快症候発現	0 名	0 名	0 名
術中不快症候発現	1	1	1
術後不快症候発現	0	0	1

写真 4 心電図, 脈波, 精神神経電流, 最高血圧の誘導状態を示す

写真 5 抜歯前日の ECG (胸部誘導) 所見

写真 6 抜歯終了2時間後呼吸困難時の ECG (胸部誘導) 所見

写真 7 抜歯終了 31 時間後、
Ajmaline 50 mg 静注
後の ECG (胸部誘導)
所見

症の患者で、心カテーテル検査後 10 日目の患者であり、局麻時の頭痛、逆上感である。Ⅲ度の不快感発現例は症例 32 の 28 才の男性。大動脈弁狭窄の弁置換手術経験者で、精査のため、カテーテル検査後 21 日目の患者であり、再度手術が予定されている患者である。また、その主訴は局麻時の頭重感である。術後不快感例は症例 1 の 23 才の男性。原発性心筋炎の患者である。抜歯終了後歯科治療椅子で安静中、悪心、顔面蒼白、冷汗を訴え、いわゆる脳貧血様発作を起した。しかし shock 体位により直ちに回復し、安静後帰室させたものである。だが 2 時間後呼吸困難を訴え、心電図上に 2 段脈を認めた例であった。写真 5 は抜歯術前日の心電図所見、写真 6 は術後 2 時間時、呼吸困難を訴えた時の心電図所見。胸部誘導で 2 段脈を認めている。写真 7 は術後 31 時間目、薬物療法で 2 段脈の消失をみた心電図所見である。

4. 総括ならびに考案

侵襲が生体におよぼす影響に関しては 1837 年フランスの Claude Bernard³⁵⁾ が始めて科学的解明の足がかりを築いたといわれている。すなわち、血液、リンパ液などの体液を Milieu intérieur と名づけ、この物理的・化学的恒常こそが生命維持にとって重要であるとする所謂内部環境説である。1935 年、アメリカの Cannon^{36) 37) 38)} は内部環境の恒常性を Homeostasis と名づけ、血液の温度、酸度、CO₂、O₂、糖、水、Na などについて検討し、Claude Bernard の考えたような正確な恒常性ではなく、健康体にもかなりの幅広い変動があり、内部環境の恒常は Mental activity のもとに行なわれるとし、自律神経、特に交感神経系が重要な働きをしていると報告した。1934 年 Reilly^{39) 40) 41)} は非特異的作用に基づく自律神経過剰興奮による非特異的現象を見出ししている。すなわち、各種の侵襲因子（細菌、細菌毒素、化学物質、物理的操作など）が植物神経系、特に交感神経に加えられると、これが異常刺激、超生理的刺激として作用し、主として血管系を介し支配下および遠隔の諸臓器に病変（充血、浮腫、血管破綻、白血球遊走、壊死）を惹起せしめると、そして植物神経系のどの部位に、また、直接的か間接的か、あるいはどれ程の侵襲がおよぶかはその侵襲因子の程度、持続、部位によって病変のあらわれる臓器の種類が決まり、慢性型も急性型もおこし得、かつ惹起された病変は植物神経系と機能的、解剖学的に密接な関連のある細網系、リンパ系、内分泌系が関与しその症候は複雑化するといういわゆる Reilly 現象である。また、Selye⁴²⁾ は非特異的有害因子は副腎随質ホルモンの分泌を亢進させ、生体の抵抗力を増大させることを見出し、有害因子にさらされた場合の内分泌系活動の重要性を指摘している。

以上のごとく、著名な 2, 3 の生理学者の研究をみても、侵襲は生体に種々の反応、変化を惹起せしめることが考

えられ、逆にその侵襲によって、生体に防禦反応の機転が起り得ることも予想される訳である。

また、口腔処置も強い侵襲であり、多様の影響を与えることは緒言で述べた研究者らによって明らかにされている事実である。さらに教室の依田¹²⁾ は口腔侵襲と末梢脈波の研究で、入院手術例の脈波反応様式の検索により、頭部血行と手指尖血行との逆相関、時間経過に伴う相関関係を見出し、Adaptation としての Feed back system をも確認している。ところで、著者は心疾患患者のごとき、健康体と異なる病者が強い口腔侵襲にさらされた場合の変化について、実験成績の項で述べてきたが、ここで総括としての 2, 3 問題に触れたいと思う。

（1）手指尖脈波の変化について

手指尖部における脈波波高波型の変化では対照および心疾患群とも各刺激時はほぼ同率で波高の減少例が多く出現している。すなわち、対照が局麻時 16 例中 11 例、69.8%、切開時 14 例中 9 例、64%、抜歯時 16 例中 10 例、62.5% である。一方心疾患群では局麻時 39 例中 29 例、75% 切開時 23 例中 17 例、74%、抜歯時 39 例中 31 例、80% と減少例を多く認めている。また、これらの刺激間の症例百分比に有意の差はなくほぼ同値の出現率とみることが出来る。つまり本手術の最初の侵襲である局所麻酔から歯牙脱臼運動刺激までの口腔侵襲に対して、ほぼ同率で対照および心疾患群とも手指尖部脈波波高に減少例が多く出現する訳である。また、1 刺激の強度を変化率の平均値からみると、対照は局麻時 0.827、切開時 0.937、抜歯時 0.908 であり、変化率は局麻、抜歯、切開の順に弱くなる。心疾患群では局麻時 0.773、切開時 0.801、抜歯時 0.774 であり、局麻、抜歯時がほぼ同値で、ついで切開の順であり、パターンは対照と同様、ほぼ局麻、抜歯、切開の順と考えてよいと思われる（図 2）。また、持続時間の変化では局麻時、抜歯時に対照および心疾患群とも無変化が多く、半数を占め、他の半数は延長、短縮間に表 15, 17 のごとく有意差はないことから延長例、短縮例がほぼ同率で出現するものとみてよい。しかし、切開時では対照に圧倒的に無変化が多く、対照対心疾患群間に 95% で有意差を認めている。これは心疾患群で局麻、抜歯時とはほぼ同様の出現率であるのかかわらず、対照例で無変化が多く、延長するものが少ないためである。指波高で局麻時、抜歯時と比較して侵襲が弱いと考えられる切開時に対照対心疾患群間に無変化の有意差が生ずることは注目してよい。しかし、変化率は差位はなく、手指尖部の血管反射と心臓反射は同様な強さで現われるものでないことがうかがわれる。以上口腔侵襲に対して手指尖部脈波の変化を総括すると持続時間より波高に変化が現われ、かつ減少例が多く出現する。また、その変化率の強さは局麻、抜歯、切開の順であり、心疾患群は対照より強く現われる傾向をもつということが出来る。末梢循環の機転は生

理学成書⁴³⁾⁴⁴⁾の教えるところによれば、左心室の収縮と弛緩により大動脈に駆出された血液の圧変動に始まるといわれる。そしてこの圧変動によって拡張された大動脈の血管壁の伸展性に基づく張力により血圧は間歇的に調製され、不十分な場合は大動脈による大動脈神経、頸動脈洞にある洞神経などの圧受容器が刺激され、この血管および心臓神経反射によって血圧の恒常的調節を受け、血液は大動脈から分配動脈へと送り出される。かくして、分配動脈平滑筋の持続的収縮により血流の分配調節が、また、血管壁の周期的収縮により血液の促進調節が行なわれ、毛細血管へと移行するとしている。毛細管へ伝播した血液は動脈の分枝部筋細胞集団、連絡枝の収縮拡張、毛細血管網全体の収縮拡張により平等の流れを生じ、血圧の高い方から低い方へと毛細管全体に伝わる訳である。そしてこの脈管中層に位置するといわれる平滑筋の持続的収縮に、毛細管では筋細胞集団などに変化を与えるものが血管収縮神経および拡張神経である訳である。

さらに脈波波高の変化が誘導部位の血流の増減を明示するものであることと合せ、口腔侵襲による手指尖部脈波波高に減少例が多く出現することは交感神経の作用によるものであると考えられる。そして局麻、抜歯、切開とあるいは対照対心疾患群間にその変化率に差位が生ずることは口腔知覚刺激に対する交感神経の緊張度の変化によるものと考えられる。しかし、血管運動神経はそれぞれ(収縮、拡張神経)の中樞の支配下にあり、さらに高位中枢の影響を受けるものでもある。吉村ら²⁹⁾(1971)は精神興奮の脈波への影響について、精神的刺激反応は交感神経刺激と同様な形で現われるとし、強い精神興奮では波高収縮の幅も強く、攣縮の形にもなると述べている。著者は精神神経電流(GSR)の変動出現について補足的な実験を行ない、参考値ではあるが表41のごとく結果を得ている。侵襲に基づくGSRの変化の分析はむずかしく、特に口腔侵襲の各刺激時間の比較分析は困難であるが、著者は局麻時の最大陽性波高を100とし、術前、切開時、抜歯時、術後の陽性波高値との比率で求め、30%以上を変動出現ありとして検討すると、局所麻酔下に完全無痛状態で行なわれる切開時、抜歯時にも高い精神神経電流の出現を認めており、口腔侵襲時に精神刺激反応も充分加担しているものと推定される。また、

心疾患群は対照と比して、各刺激時、心疾患Ⅱ度の切開時の1例を除いて、全刺激時に出現しており、対照対心疾患群に変化率の差位が生ずるのは、この精神刺激反応の差にもよるものと考えねばならないと思われる。大久保⁴⁵⁾(1952)は精神電流現象の歯科への応用を試み、神経質および歯科処置に対する不安者は治療前安静時電流も治療時電流も変化は著しいとしており、疼痛または苦痛の暗示のみで電流変化が現われたと述べている。内田¹⁰⁾(1968)は歯科愁訴および口腔外科手術と自律神経機能に関する研究で、心理検査においての情動不安群は対照群との間に手指尖部脈波波高変化が大であると報告しており、心理学上、情動不安の問題も重視せねばならないと思われる。また、副腎髄質で生成されたNoradrenaline、Adrenalineは交感神経の衝撃で両者の混合物は血中に分泌されるが沖中⁴⁷⁾(1964)によれば、生体の重要な反応は自律神経内分泌機構によって起ると述べており、血中Noradrenaline、Adrenalineの含有量も関与しているものとみなければならない。さらに心疾患患者の場合、変化率が高いことは、心疾患患者の心以外の脈管に存在する病変も一因となるのかも知れない。事実、心疾患患者のあるものには、受動的充血が手指に認められることはよく知られていることであり、吉利⁴⁸⁾(1970)はウツ血状態の手指は脈波振幅減少を呈すると述べている。なお、著者は心疾患の機能的分類間では実験成績の項で述べたとおり成績が個々であり、心機能が悪化するにつれて、脈波の変化に系統的な出現傾向を期待したが、結果的にその結論を得ることが出来なかった。これは今まで述べたような種々の条件がからみあい、また、脱臼運動操作などでは歯牙の植立状態、エレベーター操作時の抜歯圧⁴⁹⁾の問題など、被験者側の局所の問題、実験者側の操作上の問題なども加わり、複雑化し、系統的傾向の出現を妨げたものと思われる。

(2) 脈拍数の変化

脈拍数の変動出現は表31のごとく対照および心疾患群とも各刺激時はほぼ半数が無変化である。また、増加対減少をみると軽度、対照、心疾患群とも局麻時、抜歯時は増加例が多い傾向を認めている。このことは指波高の変化と対比すると興味深い。つまり、一般には血管運動中枢と心臓中枢は密接な関連のもとで活動し、通常血管収縮反射は心臓促進反射と、血管拡張反射は心臓抑制反射とともに現われることが多いとしているが、指波高の変化で減少例が多く現われ、血管収縮反射が多くみられたのにもかかわらず、脈拍数では無変化が多く出現しており、必ずしも口腔侵襲では同様の強さで現われるとは限らないように思われ、成書にいう両者間は時間のズレがあったり、二次的効果が加わると複雑な様相を呈すると述べていることに一致するように思える。

また、脈拍数の平均値からみた変動度では、対照は局麻時2.9%、切開時2.5%、抜歯時4.0%と上昇し、術

表 41 GSR の 変 動 出 現 度

	術 前		局麻時		切 開 時		抜歯時		術 後	
	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
対 照	2/10	20.0	10/10	100	6/8	75	8/10	80	2/10	20
心疾患Ⅰ度	4/14	28.5	14/14	100	8/8	100	14/14	100	3/14	21.4
心疾患Ⅱ度	4/15	26.5	15/15	100	7/8	87.5	15/15	100	3/15	20
心疾患Ⅲ度	4/26	33.3	6/6	100	6/6	100	6/6	100	2/6	33.3
心疾患群	10/35	28.5	35/35	100	21/22	95.4	35/35	100	3/15	22.8

後では 5.8% と減少している。心疾患群では局麻時 2.4%、切開時 2.8%、抜歯時 3.0% と増加し、術後は 3.3% の減少を認めるが、対照および心疾患群に有意差はない。

このことは変動出現例で無変化が多く、かつ増加例、減少例がたがいに相殺するためである。そこで変動出現症例における変動度のみを検索すると、実験成績の項で述べたとおり（表 33）、対照例では各刺激時、増加するものの例では 12.6% から 16.7% と、減少するものの例では 5.4% から 11% と、心疾患群で増加するもの 11.5% から 17.7%、減少するもの 9.7% から 11.3% を示している。つまり、対照および心疾患群とも口腔刺激時、脈拍数は無変化が半数を示め、変動をきたした例では増加するものが軽度減少例を上回る傾向をもつ。そして、平均値変動度では対照および心疾患群とも数% の変動度であり、5% 以上変動をきたした症例のみでは増加する例ではほぼ 17% 前後まで増加し、減少例では 10% 前後減少するといえ、かつ対照および心疾患間に差位を認めないといえる。また、心疾患機能的分類間にも、平均値からすると表 30 のごとく重症化するにつれて、脈拍は増加する傾向をもつが著差はない。そこで著者は多数例を平均化し、数値処理する場合、時として示される細かい具象が無視されがちであることを考慮に入れ、脈拍数の測定上、とりわけ心疾患患者の場合問題となる頻脈症の出現性について検討したところ、興味ある知見を得た。すなわち、対照例において出現しない（16 例中 0）頻脈症が心疾患例において表 34 のごとく、心疾患Ⅰ度 14 例中 1 例、7.1%、Ⅱ度 19 例中 4 例、21%、Ⅲ度 6 例中 2 例、33.3% の数値で出現し、心機能の悪化に伴い頻脈は出現しやすい傾向を認めたことである。心疾患Ⅰ度では症例 22, 28 才の女性。動脈管閉存症の患者で頻脈化の時期は局麻時、抜歯時に、Ⅱ度では症例 3, 11 才の女性。フォロー 4 徴候の患者で術前に、症例 12, 67 才の男性。狭心症の患者で局麻時に、症例 26, 7 才の女性。心室中隔欠損症の患者で局麻時、抜歯時に、症例 39, 18 才の男性。心室中隔欠損症の患者で術前、術後に、Ⅲ度では症例 1, 23 才の男性。原発性心筋炎の患者で術前、局麻時に、症例 37, 49 才の女性。狭心症の患者で、全経過中である。そして上述のごとく形態学的分類は、動脈管閉存症、フォロー 4 徴候、原発性心筋炎各 1 例、心室中隔欠損症、狭心症が各 2 例づつあり、先天性心疾患 4 例、心筋障害 3 例である。また、術前から頻脈症をきたした例の安静時の脈拍数は症例 3 が毎分 84 回、症例 22, 72 回、症例 37, 92 回、症例 39, 86 回でいずれも 100 以下であった。このことは頻脈化の原因が精神的興奮によるものであることを意味し、この点からも心疾患患者の口腔処置にあたっては、特に精神心理学的因子を考慮されねばならないと思われる。逆に心疾患患者の口腔処置時は適切な premedication の必要性がみいだされると思う。

また、刺激時では局麻時に出現するものが多いことは、指波高の平均変化率が局麻時に強く変化することとあわせ、頻脈症の面からも浸襲が局麻時に強く現われる傾向をもつといえるかも知れない。さらにこれらの頻脈症は決して表 29 のごとく高度のものでなく、術中著しい心悸亢進、息切れを示さず、（症例 37 は軽度の心悸亢進を認めている）不快症候に組み入れるものではないが、症例 1 は術後不快症候の発現をきたした例であること、また、頻脈化と心室性期外収縮の頻発をかねそなえた場合、心室細動への危険性が指摘される心筋障害例に 3 例出現していることなどを考え、決して無視することが出来ぬ症候と思われる。以上脈拍数の変動を総体的に検討すると、心疾患群は対照と比して、平均すると変動の有意差はないが、頻脈症の出現をきたし、心臓への負荷を増大せしめる例があること、また、機能が重症化するにつれて出現しやすい傾向をもつ点に留意すべきである。

（3）血圧の変化

血圧の変動出現性をみると、表 37 のごとく対照例には各刺激時、術後とも無変化例が多くそのほぼ半数を占めている。また、上昇対下降間では上昇例が多く出現している。心疾患群は局麻時、抜歯時に無変化が少なくなり、かつ上昇例が多く出現し、切開および術後では対照と同様のパターンを示している。また、平均変動度では対照および心疾患群は局麻時それぞれ 13.9% 対 26%、切開時 4.6% 対 10.4%、抜歯時 11.3 対 17.9% と上昇し、術後では 2.3% 対 0.3% と下降し、心疾患群は対照と比して血圧は上昇化することが認められる。さらに、160 mmHg 以上の高血圧様変化をきたしたものは対照 12 例中 4 例、33.3%、心疾患群 14 例中 8 例、57.1% であり、心疾患群は血圧が高い状態に位置し変動することが判明する。血圧を決定する因子として種々挙げられるが、刺激浸襲に基づく血圧の変化に影響を与える主要なものは心臓の活動性（心拍数、心拍出量）、末梢血管の抵抗性と考えられる。歯牙処置と血圧の関係については太田⁹⁾、Martini¹⁰⁾、豊田⁸⁾の研究があるが、太田は家兎および犬を用いて心臓、腹腔内臓血管を支配する自律神経を各種の組み合わせで切断し、歯質削合の刺激を与えての実験で、歯牙処置時の血圧変動に心臓促進神経、迷走神経、内臓神経および脊椎後根を通り腹腔内臓の血管に対して拡張性に作用する神経線維の 4 者が関与し、心臓促進神経、内臓神経は血圧上昇性に、また、迷走神経および腹腔内臓の血管拡張線維は、血圧下降性に作用し、上昇性要素では心臓促進神経が、下降性要素では迷走神経がいずれも優性に作用するもののように思われる、と述べている。

そして上昇性に作用する要素は、下降性に作用する要素に比し、きわめて強く作用すると述べ、歯牙処置時の血圧の上昇性因子として、心臓促進神経の働きを強調している。

理学成書⁴³⁾の教えるところによれば、左心室の収縮と弛緩により大動脈に駆出された血液の圧変動が始まるといわれる。そしてこの圧変動によって拡張された大動脈の血管壁の伸展性に基づく張力により血圧は間歇的に調製され、不十分な場合は大動脈による大動脈神経、頸動脈洞にある洞神経などの圧受容器が刺激され、ここの血管および心臓神経反射によって血圧の恒常的調節を受け、血液は大動脈から分配動脈へと送り出される。かくして、分配動脈平滑筋の持続的収縮により血流の分配調節が、また、血管壁の周期的収縮により血液の促進調節が行なわれ、毛細血管へと移行するとしている。毛細管へ伝播した血液は動脈の分枝部筋細胞集団、連絡枝の収縮拡張、毛細血管網全体の収縮拡張により平等の流れを生じ、血圧の高い方から低い方へと毛細管全体に伝わる訳である。そしてこの脈管中層に位置するといわれる平滑筋の持続的収縮に、毛細管では筋細胞集団などに变化を与えるものが血管収縮神経および拡張神経である訳である。

さらに脈波波高の変化が誘導部位の血流の増減を明示するものであることと合せ、口腔浸襲による手指尖部脈波波高に減少例が多く出現することは交感神経の作用によるものであると考えられる。そして局麻、抜歯、切開とあるいは対照対心疾患群間にその変化率に差が生ずることは口腔知覚刺激に対する交感神経の緊張度の変化によるものと考えられる。しかし、血管運動神経はそれぞれ（収縮、拡張神経）の中樞の支配下にあり、さらに高位中枢の影響を受けるものでもある。吉村ら²⁹⁾ (1971)は精神興奮の脈波への影響について、精神的刺激反応は交感神経刺激と同様な形で現われるとし、強い精神興奮では波高収縮の幅も強く、攣縮の形にもなると述べている。著者は精神神経電流 (GSR) の変動出現について補足的な実験を行ない、参考値ではあるが表 41 のごとく結果を得ている。浸襲に基づく GSR の変化の分析はむずかしく、特に口腔浸襲の各刺激時間の比較分析は困難であるが、著者は局麻時の最大陽性波高を 100 とし、術前、切開時、抜歯時、術後の陽性波高値との比率で求め、30% 以上を変動出現ありとして検討すると、局所麻酔下に完全無痛状態で行なわれる切開時、抜歯時にも高い精神神経電流の出現を認めており、口腔浸襲時に精神刺激反応も充分加担しているものと推定される。また、

心疾患群は対照と比して、各刺激時、心疾患Ⅱ度の切開時の 1 例を除いて、全刺激時に出現しており、対照対心疾患群に変化率の差が生ずるのは、この精神刺激反応の差にもよるものと考えねばならないと思われる。大久保⁴⁵⁾ (1952) は精神電流現象の歯科への応用を試み、神経質および歯科処置に対する不安者は治療前安静時電流も治療時電流も変化は著しいとしており、疼痛または苦痛の暗示のみで電流変化が現われたと述べている。内田¹⁶⁾ (1968) は歯科愁訴および口腔外科手術と自律神経機能に関する研究で、心理検査においての情動不安群は対照群との間に手指尖部脈波波高変化が大であると報告しており、心理学上、情動不安の問題も重視せねばならないと思われる。また、副腎髄質で生成された Noradrenaline, Adrenaline は交感神経の衝撃で両者の混合物は血中に分泌されるが沖中⁴⁷⁾ (1964) によれば、生体の重要な反応は自律神経内分泌機構によって起ると述べており、血中 Noradrenaline, Adrenaline の含有量も関与しているものとみなければならない。さらに心疾患患者の場合、変化率が高いことは、心疾患患者の心以外の脈管に存在する病変も一因となるのかも知れない。事実、心疾患患者のあるものには、受動的充血が手指に認められることはよく知られていることであり、吉利⁴⁸⁾ (1970) はウツ血状態の手指は脈波振幅減少を呈すると述べている。なお、著者は心疾患の機能的分類間では実験成績の項で述べたとおり成績が個々であり、心機能が悪化するにつれて、脈波の変化に系統的な出現傾向を期待したが、結果的にその結論を得ることが出来なかった。これは今まで述べたような種々の条件がからみあい、また、脱臼運動操作などでは歯牙の植立状態、エレベーター操作時の抜歯圧⁴⁹⁾の問題など、被験者側の局所の問題、実験者側の操作上の問題なども加わり、複雑化し、系統的傾向の出現を妨げたものと思われる。

(2) 脈拍数の変化

脈拍数の変動出現は表 31 のごとく対照および心疾患群とも各刺激時はほぼ半数が無変化である。また、増加対減少をみると軽度、対照、心疾患群とも局麻時、抜歯時は増加例が多い傾向を認めている。このことは指波高の変化と対比すると興味深い。つまり、一般には血管運動中枢と心臓中枢は密接な関連のもとで活動し、通常血管収縮反射は心臓促進反射と、血管拡張反射は心臓抑制反射とともに現われることが多いとしているが、指波高の変化で減少例が多く現われ、血管収縮反射が多くみられたのにもかかわらず、脈拍数では無変化が多く出現しており、必ずしも口腔浸襲では同様の強さで現われるとは限らないように思われ、成書にいう両者間は時間のズレがあったり、二次的効果に加わると複雑な様相を呈すると述べていることに一致するように思える。

また、脈拍数の平均値からみた変動度では、対照は局麻時 2.9%、切開時 2.5%、抜歯時 4.0% と上昇し、術

表 41 GSR の変動出現度

	術 前		局麻時		切 開 時		抜歯時		術 後	
	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
対 照	2/10	20.0	10/10	100	6/8	75	8/10	80	2/10	20
心疾患Ⅰ度	4/14	28.5	14/14	100	8/8	100	14/14	100	3/14	21.4
心疾患Ⅱ度	4/15	26.5	15/15	100	7/8	87.5	15/15	100	3/15	20
心疾患Ⅲ度	4/26	33.3	6/6	100	6/6	100	6/6	100	2/6	33.3
心疾患群	10/35	28.5	35/35	100	21/22	95.4	35/35	100	3/15	22.8

後では 5.8% と減少している。心疾患群では局麻時 2.4%, 切開時 2.8%, 抜歯時 3.0% と増加し、術後は 3.3% の減少を認めるが、対照および心疾患群に有意差はない。

このことは変動出現例で無変化が多く、かつ増加例、減少例がたがいに相殺するためである。そこで変動出現症例における変動度のみを検索すると、実験成績の項で述べたとおり（表 33）、対照例では各刺激時、増加するものの例では 12.6% から 16.7% と、減少するものの例では 5.4% から 11% と、心疾患群で増加するもの 11.5% から 17.7%, 減少するもの 9.7% から 11.3% を示している。つまり、対照および心疾患群とも口腔刺激時、脈拍数は無変化が半数を示め、変動をきたした例では増加するものが軽度減少例を上回る傾向をもつ。そして、平均値変動度では対照および心疾患群とも数% の変動度であり、5% 以上変動をきたした症例のみでは増加する例ではほぼ 17% 前後まで増加し、減少例では 10% 前後減少するといえ、かつ対照および心疾患間に差位を認めないといえる。また、心疾患機能的分類間にも、平均値からすると表 30 のごとく重症化するにつれて、脈拍は増加する傾向をもつが著差はない。そこで著者は多数例を平均化し、数値処理する場合、時として示される細かい具象が無視されがちであることを考慮に入れ、脈拍数の測定上、とりわけ心疾患患者の場合問題となる頻脈症の出現性について検討したところ、興味ある知見を得た。すなわち、対照例において出現しない（16 例中 0）頻脈症が心疾患例において表 34 のごとく、心疾患Ⅰ度 14 例中 1 例、7.1%, Ⅱ度 19 例中 4 例、21%, Ⅲ度 6 例中 2 例、33.3% の数値で出現し、心機能の悪化に伴い頻脈は出現しやすい傾向を認めたことである。心疾患Ⅰ度では症例 22, 28 才の女性。動脈管閉存症の患者で頻脈化の時期は局麻時、抜歯時に、Ⅱ度では症例 3, 11 才の女性。フォロー 4 徴候の患者で術前に、症例 12, 67 才の男性。狭心症の患者で局麻時に、症例 26, 7 才の女性。心室中隔欠損症の患者で局麻時、抜歯時に、症例 39, 18 才の男性。心室中隔欠損症の患者で術前、術後に、Ⅲ度では症例 1, 23 才の男性。原発性心筋炎の患者で術前、局麻時に、症例 37, 49 才の女性。狭心症の患者で、全経過中である。そして上述のごとく形態学的分類は、動脈管閉存症、フォロー 4 徴候、原発性心筋炎各 1 例、心室中隔欠損症、狭心症が各 2 例づつあり、先天性心疾患 4 例、心筋障害 3 例である。また、術前から頻脈症をきたした例の安静時の脈拍数は症例 3 が毎分 84 回、症例 22, 72 回、症例 37, 92 回、症例 39, 86 回でいずれも 100 以下であった。このことは頻脈化の原因が精神的興奮によるものであることを意味し、この点からも心疾患患者の口腔処置にあたっては、特に精神心理学的因子を考慮されねばならないと思われる。逆に心疾患患者の口腔処置時は適切な premedication の必要性がみいだされると思う。

また、刺激時では局麻時に出現するものが多いことは、指波高の平均変化率が局麻時に強く変化することとあわせ、頻脈症の面からも浸襲が局麻時に強く現われる傾向をもつといえるかも知れない。さらにこれらの頻脈症は決して表 29 のごとく高度のものでなく、術中著しい心悸亢進、息切れを示さず、（症例 37 は軽度の心悸亢進を認めている）不快症候に組み入れるものではないが、症例 1 は術後不快症候の発現をきたした例であること、また、頻脈化と心室性期外収縮の頻発をかねそなえた場合、心室細動への危険性が指摘される心筋障害例に 3 例出現していることなどを考え、決して無視することが出来ぬ症候と思われる。以上脈拍数の変動を総体的に検討すると、心疾患群は対照と比して、平均すると変動の有意差はないが、頻脈症の出現をきたし、心臓への負荷を増大せしめる例があること、また、機能が重症化するにつれて出現しやすい傾向をもつ点に留意すべきである。

（3）血圧の変化

血圧の変動出現性をみると、表 37 のごとく対照例には各刺激時、術後とも無変化例が多くそのほぼ半数を占めている。また、上昇対下降間では上昇例が多く出現している。心疾患群は局麻時、抜歯時に無変化が少なくなり、かつ上昇例が多く出現し、切開および術後では対照と同様のパターンを示している。また、平均変動度では対照および心疾患群は局麻時それぞれ 13.9% 対 26%, 切開時 4.6% 対 10.4%, 抜歯時 11.3 対 17.9% と上昇し、術後では 2.3% 対 0.3% と下降し、心疾患群は対照と比して血圧は上昇化することが認められる。さらに、160 mmHg 以上の高血圧様変化をきたしたものは対照 12 例中 4 例、33.3%, 心疾患群 14 例中 8 例、57.1% であり、心疾患群は血圧が高い状態に位置し変動することが判明する。血圧を決定する因子として種々挙げられるが、刺激浸襲に基づく血圧の変化に影響を与える主要なものは心臓の活動性（心拍数、心拍出量）、末梢血管の抵抗性と考えられる。歯牙処置と血圧の関係については太田⁹⁾、Martini¹⁰⁾、豊田⁸⁾の研究があるが、太田は家兎および犬を用いて心臓、腹腔内臓血管を支配する自律神経を各種の組み合わせで切断し、歯質削合の刺激を与えての実験で、歯牙処置時の血圧変動に心臓促進神経、迷走神経、内臓神経および脊椎後根を通り腹腔内臓の血管に対して拡張性に作用する神経線維の 4 者が関与し、心臓促進神経、内臓神経は血圧上昇性に、また、迷走神経および腹腔内臓の血管拡張線維は、血圧下降性に作用し、上昇性要素では心臓促進神経が、下降性要素では迷走神経がいずれも優性に作用するもののように思われる、と述べている。

そして上昇性に作用する要素は、下降性に作用する要素に比し、きわめて強く作用すると述べ、歯牙処置時の血圧の上昇性因子として、心臓促進神経の働きを強調している。

そこで著者の成績をみると、変動出現例においては既述のごとく、対照および心疾患群とも、各刺激、血圧の上昇を認め、太田のいう下降性に作用する要素よりも、上昇性に作用する要素が強いとの成績に一致するが、心臓促進神経の影響を示す1つの徴候たる脈拍数の変化をみると、(2)脈拍数の変化の項で述べたとおり、著しい変動を示していない。また、血管運動神経の働きを示す指波高の変化では各刺激、指波高の減少例を多く認めており、手指末梢血管の抵抗性を呈示している。無論、手指部の脈波波高の変化によって全末梢の循環状態を論ずる事は暴挙に等しいことではある。しかし、軀幹、四肢のごとく比較的広汎な場所の血管収縮が、比較的狭い顔面、頭部、上胸部の血管拡張と共存するという部分的な例外を除いて、今 Brown Sequard³²⁾の共感性血管反応の法則にしたがえば、指尖部の血管収縮で身体の比較的広範囲な部位の血管収縮を想定せられる訳である。また、西島³⁷⁾は血圧が急に上昇する場合、毛細動脈または分枝部は強く収縮状態にあり、時には血行が停止し、持続的に血圧が上昇している場合は毛細管全体は拡張の状態であると述べている。つまり、著者の成績では、口腔浸襲に基づく一過性の血圧の上昇は心臓促進神経より、末梢血管の収縮による末梢抵抗力が大きな要素と考えられる。

なお、精神刺激反応は全身細動脈、特に筋肉系および皮膚細動脈を収縮させるが、比較的広範な細動脈収縮は血圧の上昇の原因となる。Martini ら³⁰⁾は歯牙処置に血圧は著明に上昇し、その上昇度は患者の疼痛および興奮の程度に比例するとし、痛疼を伴わない処置には血圧の変化は認められないが、神経質者では無痛時でも恐怖などの心理学的影響によっても現われると述べており、口腔処置は精神的興奮、情動不安が血圧の変化に与える影響も考えねばならないと思われる。事実、心疾患群では GSR の補足的な実験でも精神神経電流の高い陽性波出現を認めている。

(4) 不快症候について

実験成績の項で述べたとおり、不快症候は術前になく術中にⅠ、Ⅱ、Ⅲ度にそれぞれ1例ずつあり、術後は1例出現した。術中では3例とも局麻時であり、症候は頭痛もしくは頭重であった。通常、口腔外科処置時に起る不快症候は悪心、顔面蒼白、冷汗、血圧下降の症候を呈する、いわゆる脳貧血、もしくは1次性 Shock³⁸⁾といわれるものであり、頭痛、頭重を訴えることは比較的なれ例である。

Woff³¹⁾は頭痛発生の機序として、(1)脳表面の静脈洞へ走る静脈の索引、大動脈洞偏位、(2)中硬膜動脈の索引、(3)脳底動脈とその主分枝の索引、(4)頭蓋内動脈の膨張と拡張、(5)頭部の痛覚受容装置またはその周囲の炎症、(6)痛覚周線維を含む脳神経および頸神経への直接圧迫を挙げている。そして、これらの血管の変化を起す原因として、炎症、腫瘍などが直接に影響を与える場合と、機能的に血管拡張、血流の増大も頭痛を起すと述べている。もし口腔浸襲と頭痛などの関連を考えるならば、この(4)が挙げられると思う。これに一致するものと思われるが、吉利⁴⁰⁾も非反復性の頭部動脈拡張による非片頭痛性血管性頭痛の原因について述べている中で、急激な血圧の上昇を一つの原因として挙げている。教室の依田¹²⁾は耳垂部と指尖部の同時記録による口腔浸襲による末梢循環の研究で、局所麻酔時、指波高減少、頭部波高増高例の出現を多く記録し、ソコフの定位反射様の変化を認めている。上記3例の局麻時の指波高は症例29, 30, 32、それぞれ0.85, 0.50, 0.47と減少しており、依田の業績を踏まえ、耳垂部頭部表層と内部の血流が相関するものであるならば、口腔浸襲によって頭内動脈の拡張が1時的に出現したと考えてよいと思われる。そして血圧もそれぞれ190 mmHg, 230 mmHg, 190 mmHg と高い変化を記録している(写真8)。もし以上のことが否定されるならば(症例33, 34, 抜歯時に220 mmHg, 210 mmHg と上昇しているが、自覚症候を認めていない)、吉利⁴⁰⁾のいう心因性頭痛、もしくは緊張性頭痛によるものかも知れない。しかし、いずれにしても、血圧の変動で述べたように、心疾患患者は高い状態に位置し変動することを考え合せ、血圧上昇に

写真 8 不快症候時の記録例最高血圧 230 mmHg を記録している

よってもたらされる危険性(高血圧性脳症, 脳出血)を充分考慮に入れる必要があると考えられる。血圧の測定で 180 mmHg 以上を記録したならば不快な自覚的症候を認めない場合でも, 処置を中断し, 血圧の安定を待ち, 治療を再開するよう努めるべきである。著者がこの 180 mmHg を指標とした理由は上記の頭痛あるいは頭重を訴えた時点の血圧(収縮期)が既述のごとくいずれも 190 mmHg 以上であることおよび全身疾患を所有しない対照例が全例 175 mmHg 以下で処置を終了していることによるものである。術後不快症候の 1 例は心機能Ⅲ度, 23 才の男性で原発性心筋炎の患者である。抜歯操作完了までなんらの症候を示さず, 抜歯後歯科治療椅子に侵襲の回復を待つ時点で悪心, 冷汗, 顔面蒼白の出現を認め, いわゆる脳貧血様の発作を呈した。しかし, shock 体位により直ちに回復し, (30 秒程度)安静後, 入院中の本学心臓血圧研究所附属病院病室へ帰室させたほぼ 2 時間後に, 呼吸困難を訴え, 心電図上に二段脈の出現を認め, 以後 31 時間にわたって不快症候の継続をみ, 薬物療法が試みられた 1 例である。そしてこの不整脈の出現について本学心臓専門医師は口腔侵襲が誘因となったものであろうと指摘している。口腔侵襲によって心電図上に変化をきたすとする報告は Williams¹⁴⁾, 土井ら¹⁵⁾の報告があるが, Williams¹⁴⁾によると, 抜歯手術で 63 例中 16 例, 26.2% の出現度で心臓性不整脈(Cardiac arrhythmias coincident)を認めたと述べている。そして心疾患所有者は 16 例中 2 例にすぎなかったとし, 健康体でも多くの割合で不整脈が出現することを指摘している。また, 村瀬ら²³⁾は心疾患患者の歯科処置時の心電図所見について研究し, 心臓手術前では軽症者でも全身疾患を所有しない者と比較して影響がでやすいと報告しており, 口腔侵襲が心疾患患者により多くの変化を与えるものであることが判明する。さらに, 本不快症例が各刺激時, 心電図上に著変なく, 術後に二段脈の出現を認めた例であることを考え, 心疾患患者の口腔処置において術中の管理のみならず, 術後にわたっての細心の注意が必要であると考ええる。また, 原発性心筋炎および心筋の変性を主体とする病変をもつ心疾患患者は外科的侵襲を加えない場合でも症候が急変しやすい疾患であるといわれており, かかる症病名をもつ心疾患患者を取扱う場合, 特に注意が必要であると思われる。

著者は以上の経験から厳重なる管理下に敏速かつ適切な処置を行えば, 口腔外科親血小手術に対して大多数の症例は心機能Ⅲ度まで(N. Y. H. A. の分類)手術可能と考えている。しかし, 重篤な不整脈の出現をみた症例もあることを考え, 術中はもとより, 術後にわたっての細心の注意の必要性を指摘したい。

なお, 心疾患 39 例 111 歯の抜歯によって, 抜歯術の菌血症に基づく細菌性心内膜の発生はなく, 投与した抗生物質(Penicillin 剤, 120 万単位/成人 1 日量, Eryth-

romycin 30 mg/kg 1 日量)の効果を認めることが出来た。逆に抜歯に基づく細菌性心内膜炎の防止は上記抗生物質の術前 48 時間から術後 72 時間にわたる継続的投与で可能と考えている。

5. 結 論

私は心疾患患者の外來手術(抜歯手術)39 例を対象とし, 全身的疾患を所有しない患者 16 例(対照)と比較することにより, 手指尖脈波, 脈拍数, 血圧, および精神電流現象, 心電図について検討し, つぎの結論を得た。

(1) 心疾患患者は口腔侵襲によって, 対照と同様手指尖脈波上に局麻時, 切開時, 抜歯時の刺激時に, 脈波持続時間より波高に変化が強く現われ, かつ減少する例が多い。また, 減少出現性は対照と比較し差位を認めない。

(2) 心疾患患者の 1 刺激によって惹起される脈波波高の変化は対照と比してより強い傾向をうかがわせる。

(3) 心疾患患者は脈拍数の変動性では対照と比して有意差を認めないが, 口腔侵襲によって対照にない頻脈化をきたす例がある。

(4) 心疾患患者の口腔侵襲による頻脈化は心機能の重症化にしたがい, 増加する傾向を認める。

(5) 心疾患患者の頻脈化は口腔侵襲を加えない術前の状態で発現する場合があります, 精神心理学的条件の加担を認めることが出来る。

(6) 心疾患患者は血圧の変動で対照と比し上昇性に強く現われる傾向をもつ。しかし, その変動は対照と同様一過性のものである。

(7) 心疾患患者の血圧変動の merkmal は最高 180 mmHg とし, それ以上の上昇を認めた場合, 処置を中断し, 血圧の安定を待ち処置を再開すべきである。

(8) 心疾患患者の抜歯に基づく細菌性心内膜炎の予防は, 術前 48 時間から術後 72 時間にわたる抗生物質(Penicillin 剤 120 万単位/成人 1 日量, Erythromycin 30 mg/kg 1 日量)の継続的投与で可能と思われる。

(9) 心疾患患者の口腔侵襲に基づく不快症候の発現は術中ばかりでなく, 術後にも発現する場合があります, 術中はもちろん, 術後にわたっての細心の注意が必要である。

(10) 心疾患患者の抜歯に対して, New York Heart Association の機能的分類で, 大多数の症例はⅢ度まで手術可能である。しかしながら, 不快症候の出現をみていることから, その処置に当っては, 術前では主として頻脈症を, 術中では期外収縮の多発化による不整脈に注意の主体を置き, 頻脈症, 高血圧様変化に留意すべきである。また, 最高血圧の上昇は術前の状態より平均 26% 程度上昇する可能性があることを予想し, 処置の計画を立てるべきである。さらに, 術後では期外収縮, 二段脈に注意をはらうべきであろうと思われる。特に術中, いわ

ゆる shock 様症候ばかりでなく、頭重、頭痛、逆上感を訴えた場合にも、処置を1時中断すべきものと思われる。また、術前、負荷心電図上で重篤な心不全の症候を招く心疾患者は特殊な場合（抜歯術以外に激痛を抑制出来ない歯牙疾患を有する場合）を除いて、心疾患の状態の安定化まで待つべきであろう。なお、著者が局所麻酔薬として 2% Xylocain を選択した理由は多くの研究者⁵⁸⁾によってその口腔外科領域への効果、安全性が確認されている結果であることを附記する。

稿を終るにあたり、終始御懇篤なる御指導と御校閲の労を賜った、恩師村瀬正雄教授に衷心より感謝するとともに、種々の御援助と御教示をいただいた高井宏助教授に、さらに御協力をいただいた本学心臓血管研究所研究員諸兄（所長 柳原 仟博士）ならびに口腔外科学教室員諸兄に感謝の意を表します。

本論文の要旨は昭和 45 年 10 月 2 日、第 15 回日本口腔外科学会総会、昭和 46 年 10 月 1 日、第 16 回日本口腔外科学会総会および昭和 46 年 4 月 3 日、第 25 回日本口腔科学会総会において発表した。

文 献

- Adnay, G. J. et al. : Changes in the white cell count following to the extraction in albino rat and rabbits. J Dent Res 24 : 17 1945.
- 倉繁準之助：好酸球数の変動から見た口腔内手術（抜歯）の侵襲，歯科学報 60 : 809 1960.
- Faillo, P. S. : Blood finding on twenty patients before and after extraction of teeth. J Dent Res 21 : 19 1942.
- 奥津一重，影山六郎：抜歯直後における好酸球の変動について，お茶の水医誌 3 : 159 1951.
- 奥津一重：抜歯後における赤沈値の変動について（第一報）抜歯直後における赤沈値動揺の現象確認について，お茶の水医誌 2 : 220 1950.
- 影山六郎：侵襲の見地より見たる抜歯の影響について，口病誌 25 : 107 1958.
- 坂村吉保：抜歯侵襲が血液凝固におよぼす影響について，口科誌 18 : 402 1969.
- 豊田晃行：三叉神経刺激の血圧におよぼす影響に関する実験的研究，日本生理学雑誌 9 : 777 1944.
- 太田 稔：歯牙処置時の血圧変動について，Ⅰ報，Ⅱ報，Ⅲ報，東京医科大学生理学教室論文集，1951.
- 玉生みつ：抜歯手術における血圧変動について，口病誌 24 : 374 1957.
- 大鶴 栄：抜歯時の血圧および脈拍の変動について，第Ⅰ報，臨床歯科 41 : 20 1958，第Ⅱ報，42 : 26 1958.
- 依田雄弘：口腔侵襲の末梢脈波におよぼす影響，日口外誌 11 : 113 1965.
- 佐藤寅弥：心電図による抜歯現象の探索，日薬誌 56 : 297 1960.
- Williams, R. M. et al. : Electro cardiographic changes during oral surgical procedures under local Anesthesia. OS OM & OP 16 : 1270 1963.
- 土井 尚，他：抜歯時の心電図所見，口科誌 20 : 1 1971.
- 内田安信：歯科愁訴および口腔外科手術と自律神経機能，口科誌 17 : 285 1968.
- 都 温彦：歯科治療時における所謂脳貧血の心身医学的研究，口科誌 18 : 697 1969.
- 福本博：歯牙処置の尿量におよぼす影響について，歯科学報 54 : 105 1954.
- 林 芳雄：歯牙処置の脾臓容積におよぼす影響について，歯科学報 56 : 338 1956.
- 林 木栄：三叉神経刺激，歯牙処置の腎機能への影響，歯科学報 57 : 1 1957.
- 木村友七：口腔侵襲とそれに伴う諸変化が生体におよぼす影響，口科誌 11 : 72, 139, 393 1962.
- 大井 清，他：口腔疾患と菌血症，第一報抜歯手術に伴う一過性菌血症の臨床的並びに細菌学的研究，歯科学報 52 : 203 1952.
- 村瀬正雄，他：口腔侵襲の心疾患におよぼす影響について，口科誌 10 : 286 1961.
- 松田 登，他：心電図の上からみた心疾患と抜歯，口科誌 18 : 245 1969.
- 大木千枝：電気容量脈波計による脈波の研究，東女医誌 30 : 2464 1960.
- 藤田トク：電気容量脈波計による人体動脈の基礎的研究，東女医誌 29 : 1109 1959.
- 松本将子…電気容量脈波計による脈波の研究，心臓疾患患者における指節脈波について，東女医誌 30 : 2669 : 1960.
- Hertzman, A. B. : The blood supply of various skin areas as estimated by the photoelectric phethysmograph. Am J Physiol 128 : 328 1938.
- 吉村正蔵，他：図説臨床脈波，医学書院，東京，1971.
- Kleine-Natrop, H. F. : Gottron's Dermatologie 1/1 : 551 1961.
- 北村 信：刺激の受容にさいして見られる血管運動反射について，大日歯会誌 2 : 23 1960.
- Rothman, S. : Physiology and Biochemistry of the skin. 3 : 106 1954.
- Ratschow, M. : Angiology. 333 Thieme 1959.
- 上田英雄：心臓病学，改訂第3版，南山堂，東京，1960.
- Bernard, C. (三浦岱米訳)：実験医学序説，第5刷改訂，岩波書店，東京，1931.
- Canon, W. B. : New evidence for sympathetic control of some internal secretion. Am J Psychiat 2 : 15 1922.
- 西島和義：脈管学の基礎的研究，東京慈恵会脈管学研究 所 1967.
- 沢沢喜守雄：ショックの臨床，医学書院，東京，1956.
- 山口与市：病因論からみた植物神経系，Reilly の現象の臨床的意義（総説），廣成医学 33 : 5, 213 1956.
- 山口与市：レーリ氏植物神経過剰興奮と 2, 3 の実験成績，日本医事新報 1665 : 8 1965.
- 山口与市：Reilly 氏の現象植物神経系の過剰反応による非特異症候群の発生について，最新医学 10 : 366 1955.
- Selye, H. : The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation. Canad MAJ 6 : 117 1946.
- 松田幸次郎：生理学大系Ⅲ，循環の生理学，医学書院，東京，1969.
- 柳原 仟，他：臨床病態生理学大系 5，循環系，中山書店，東京，1957.
- 大久保信一：精神電流現象の一応用，日本生理誌 14 : 211 1952.
- 藤森閑一：皮膚電気反射（精神電流現象）に関する最近の知見，生命の科学 2 : 98 1950.
- 沖中重雄，他：自律神経系と臨床，杏林書院，東京，1964.
- 吉利 和：内科診断学，改訂版第4刷，金芳堂，京都，1964.

- 49) 坂下寛信：抜歯圧に関する研究，口科誌 19：39 1970.
50) Martini, et al. : Münch Med Woch 29：1060 1962.
51) Woff：名尾良憲：内科ハンドブック，頭痛の考え方，2：18 1960 より引用.
- 52) 坂本秀夫，他：頭痛，医学書院，東京，1952.
53) 林 一，他：歯科口腔外科領域における塩酸キシロカイ
ンの使用成績，歯界展望 14：262 1955.
-