変形性顎関節症の外科的療法と予後について

高久 暹

Surgical treatment and prognosis of the temporomandibular osteoarthritis

Susumu TAKAKU

緒 言

顎関節の変形性関節症 (osteoarthritis, osteoarthritis) については、成書に記載をみるが、実際の臨床に関する報告はほとんど認めることができない。筆者はいわゆる顎関節症¹⁾と称される疾病のなかから、単純X線所見に基づいて、顎関節における変形性関節症を指摘し、本誌²⁾ (昭和36年) に報告した。以後、それにかなう慢性顎関節障害は変形性顎関節症として臨床で取扱い症例を重ねてきているが、昭和46年1月から同52年12月までの約6年11か月間に、17症例に外科的療法を行った。最近、そのうち術後4年2か月以上 (最長7年10か月) 経過した10症例について、予後を検討する機会を得た。今回、その成績に 適応症、手術術式などを加えて報告する。

I. 症 例

昭和46年1月から同52年12月までの約6年11か月間に埼玉医科大学口腔外科で取扱った変形性顎関節症 (osteoarthritis of the temporomandibular joint) は61症例であった。そのうち44例 (72%) に保存的療法を、17例 (28%) に外科的療法 (手術療法) をそれぞれ行った。今回、予後の検討を行ったのは、外科的療法群17例のうち術後4年2か月以上 (最長7年10か月) 経過した10症例 (45~71歳、平均年齢60歳、男2例、女8例) である。その術前臨床像は、次に述べるとおりであった。

1. 臨床所見

すべてが日常の食生活に著しく支障をきたしていると訴えた。とくに肉類 (挽肉を除く)、漬物 (タクワン、キュウリ、ナスなど)、干物類 (魚、イカなど)、パンの耳、豆類 (落花生、アーモンドなど)、野菜 (レタス、ネギなど) などを咬みしめることができないものであった。

局所症状は炎症症状を欠き、関節痛・下顎頭運動制限・開口制限からなるものが10例中8例で、そのうち1例は開閉口運動時に関節音 (すれ合うような摩擦音) を聴取した。下顎頭運動制限の程度は筆者の試みている下顎頭運動制限の分類によると (図1)、制限度Ⅱが3例、Ⅲが5例で、いずれも強度であった。8例を除く他2例は、いずれも長期間の保存的療法 (症例4 療法の期間1年、症例9 2年5か月、薬物および歯科的療法併用) にもかかわらず症状の改善の得られなかったものである。いずれも強い関節痛を主症状としたが、そのうち1例 (症例9) は開閉口運動で下顎頭の転位を頻発し、その都度、顎偏位に基づく咬合不全をひき起こした。

2. X線所見

全症例の単純X線像に異常が認められた。それはおもに下顎頭と関節裂隙における変化であった。下顎頭の変化は、その前縁または外縁の骨棘像、辺縁の尖鋭化と凹

図1 下顎頭運動制限の分類

最大開口時の下顎頭の位置を触診とX線写真から判断して分類を試みた。下顎頭が下顎窩を逸脱できない場合を運動制限とした。

制限度0：下顎頭は関節結節の前下方位まで動く。運動制限はない。

制限度Ⅰ：下顎頭は関節結節の下方位まで動く。運動制限はない。

制限度Ⅱ：下顎頭は下顎窩を逸脱することができない。下顎窩の anterior slope 付近まで動く。

制限度Ⅲ：下顎頭は下顎窩内でわずかに動く。

制限度Ⅳ：下顎頭は全く動かない。

埼玉医科大学口腔外科学教室 (主任：高久 暹教授)

Department of Oral Surgery, Saitama Medical School (Chief: Prof. Susumu Takaku)

受付日：昭和54年12月18日

表 1 術前の臨床所見

症 例	年齢	性	患側	自 覚 症 状	機能障害	他 覚 的 所 見
1. ■■■■	45	男	右	関節運動痛	咀嚼ができない	下顎頭運動制限 開口制限 25 mm 開口時、下顎右側偏位 咬筋、内側翼突筋・硬ばり、圧痛
2. ■■■■	47	女	左	関節運動痛 開口障害	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 24 mm 開口時、下顎左側偏位
3. ■■■■	56	女	左	関節運動痛 開口障害 顔面痛	同 上	下顎頭運動制限 関節音 開口制限 25 mm 咬筋、側頭筋・硬ばり、圧痛
4. ■■■■	52	男	右	強度の関節運動痛	同 上	下顎頭の運動制限なし 関節音
5. ■■■■	70	女	右	関節運動痛	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 27 mm 開口時、下顎右側偏位
6. ■■■■	53	女	左	関節運動痛	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 24 mm 開口時、下顎左側偏位 側頭筋、内側翼突筋・硬ばり、圧痛
7. ■■■■	65	女	左	関節運動痛 開口障害	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 21 mm 開口時、下顎左側偏位
8. ■■■■	63	女	右	関節運動痛 開口障害	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 27 mm 開口時、下顎右側偏位
9. ■■■■	71	女	左	強度の関節痛 (運動痛ときに自発痛)	同 上	下顎頭の運動制限なし 開口時、頻発する下顎頭転位、それに伴う咬合不全(脱臼症状)
10. ■■■■	64	女	右	関節痛 (運動痛、ときに自発痛)	同 上	下顎頭運動制限 開口制限 26 mm 開口時、下顎右側偏位

凸不整像，周縁の骨硬化像，関節面の平坦化と同面下骨梁部小嚢胞像などであり，関節裂隙についてはその狭小化であった．下顎窩・関節結節には異常を認めなかった．なお3例については，健側関節（临床上，症状を欠く）にも変化が認められたが，下顎頭辺縁の骨硬化像と骨棘像（1例）であった．

顎関節造影は全症例に行ったが，いずれも異常所見が得られた．下部関節腔の部分陰影欠損像（7例），上下両部関節腔の交通像（1例），下部関節腔の部分陰影欠

損像と上下両部関節腔の部分陰影欠損（1例）などをおもな所見とし，陰影輪郭の凹凸不整像，関節腔充盈造影剤陰影の濃淡の異常などは，すべての症例に認められた．以上の関節造影像から関節円板（以下，円板と書く）と下顎頭（または下顎窩）との癒着，円板の穿孔，裂創，変形などが推定された．それらが顕著なものほど，臨床症状，顎機能障害などが著しい傾向がみられ，両所見間の関連性を認めた．

3. 臨床検査所見

図 2 下顎頭関節面に大きな骨棘像を認める。骨硬化が著明。(症例 1 45歳, 男, 術前断層像)

図 4 下顎頭外縁に尖鋭な骨棘と小骨嚢胞(2つみえる)が認められる。周縁の骨硬化像も著明。(症例 8 63歳, 女, 術前側方斜め上方向像)

図 3 下顎頭前縁に大きな骨棘を認める。関節裂隙も狭小である。(症例 4 52歳, 男, 術前断層像)

図 5 下顎頭前縁と関節面(一部)に相当して陰影欠損が認められる。造影剤によって抽出された円板下表面は凹凸不整である。(症例 2 47歳, 女, 術前下部関節腔造影)

血色素, 血沈値, C-蛋白反応, RA (Rheumatoid arthritis 因子) などについては, 全症例において異常は認められなかった。

4. 術前の咬合所見

咬合状態がほぼ正常と思われたもの 7 例, 異常が 3 例であった。正常咬合群 7 例のうち 2 例は上下顎ともに無歯顎であったが, 咬合状態が安定した適合のよい全部

床義歯を装着していた。異常咬合群 3 例の内訳は, 顎堤に不適合で低位咬合の上顎全部床義歯を装着していたもの 1 例, 不適合で低位咬合の上下顎全部床義歯装着 1 例, 16 高位咬合の歯冠補綴と歯の挺出(歯周症による)

図 6 上部関節腔を造影したが、下部関節腔も充盈された症例（上下両部関節腔交通像）。手術によって円板に円形（直径約3mm）の実質欠損を確認（症例3 56歳，女，術前上部関節腔造影）

図 7 上下両部関節腔が造影されているが、上部関節腔の造影による（関節腔交通像）。下顎頭前縁に相当して陰影欠損像，輪郭の凹凸不整像などが認められる。手術によって円板後部に直径約4mmの実質欠損，下顎頭前縁との癒着などを確認。（症例9 71歳，女，術前上部関節腔造影）

に基づく咬合干渉と早期接触1例などであった。いずれも術前に歯科補綴の処置を行って咬合状態を改善しておいた。

II. 適応症

長期間の保存的療法にもかかわらず臨床症状が改善しないような場合³⁻⁹⁾は手術療法の適応症とされている。関節運動制限または顎運動制限などによって咀嚼障害をきたしたり、疼痛、関節音、亜脱臼、顎偏位による機能障害などの症状が1ないし2以上あるような場合¹⁰⁻¹²⁾も適応症としているひともある。筆者は osteoarthritis の手術適応症として、下記に述べる場合（1，2）をあげた。今回、対象の10症例はいずれも1または2に相当するものである。

1. a) から e) までの項目をすべてみたす症型。

a) 関節痛のため、咀嚼運動が障害され、日常の食生活に支障をきたしている。

b) 関節運動痛がある。

c) 下顎頭の運動制限がある。筆者は下顎頭の運動制限の程度について臨床的に0からⅣまでに分けて判定を試みているが、それによると制限度ⅡまたはⅢである。

d) 開口制限がある。関節痛に基づく疼痛性開口制限を含むが、とくに他動的にも十分に開口させることができない場合である。

e) 関節造影によって円板に異常が認められる。

2. 長期間（2～3か月間）の保存的療法（薬物ならびに歯科的療法）にもかかわらず、なお強度の関節痛があるか、または顎運動時に下顎頭の転位を頻発するもので、いずれも関節造影によっては円板に異常があると推定された場合である。

III. 手術法

本誌第21巻2号（昭和50年）¹³⁾に報告した関節円板切除手術術式（以後、円板切除術と書く）に基づいて、まず円板を切除し、そののち下顎頭の形成を行った。それについては直径2.3mmと4.0mmの球形の外科用パ

図 8 手術術式
円板を切除したところ

図 9 手術術式

下顎頭前縁に大きな骨棘が認められる (矢印).
下顎頭外縁と関節面も凹凸不整である.

図 10 手術術式

外科用バーを用いて、骨棘を削除しているところ

ーと骨ヤスリをおもに用い、下顎頭辺縁(または関節面)の骨棘は削除し、尖鋭化した頭辺縁または粗糙な関節面は平滑にする程度にとどめ、極力、下顎頭部の骨損失を少なくすることに留意した。下顎頭の形成ののちは、止血をよく行い、通法に基づいて創を閉鎖した。中間挿入物は用いなかった。創部の圧迫包帯は術後7日目まで施し、また感染予防のため抗生物質を全身的に投与した。

図 11 形成後の下顎頭 (矢印)

IV. 手術所見

1. 円板の所見

円板と下顎頭との癒着は全症例に認められた。10例中9例は癒着範囲が狭く、部分的であったが、1例は下顎頭関節面の全域に及んだ。部位については下顎頭外縁での癒着が最も多い(7例)。下顎窩・関節結節との癒着は2例に認められたが、部分的であった。円板は総じて灰白色または黄白色を呈していたが、後部や関節包との付着附近が淡紅色あるいは暗赤色を帯びているものもあった。厚さはまちまちで、硬度も弾性硬または弾性軟であった。表面の性状は凹凸不整で、なかには多数のヒダ状または結節状の隆起が認められるものもあった(図12)。下顎頭との癒着面はとくに粗糙で、けばだったような性状を呈した。また所々に大小の裂創がみられたが、いわゆる穿孔と称される実質欠損は3例に認められた。円板の穿孔は関節造影によると上下両部関節腔の交通像で示される¹⁴⁾。3例中2例は術前の関節造影で上下両部関節腔交通像が得られた。図13は、大きな穿孔が存在した円板(症例6 53歳、女)を示すが、5×4mmのはぼ楕円形の穿孔である。穿孔部の周縁が下顎頭関節面に癒着していたため、術前の関節造影では上下両部関節腔の交通像は得られず、その存在を推測するに至らなかった。

図14~16は別出された円板の病理組織像である。膠原線維の強い硝子化、表面のけばだち、化生性変化、軟骨様細胞の集簇、円板中央部における血管新生などがおもな所見であった。とりわけ下顎頭と癒着していた付近や穿孔部周縁で化生性変化は顕著であった。

2. 下顎頭の所見

下顎頭外縁、前縁または関節面に刺状あるいは瘤状の骨隆起が認められた。下顎頭辺縁に連続して尖鋭な尖端をもつ棚状骨隆起が認められたものもあった(1例)。円板が癒着していた下顎頭の骨面は粗糙で、なかには小さな骨隆起が集簇したような骨面を呈したものもあった(2例)。

図 12 剔出された円板
下表面を示すが、凹凸不整である。所々に裂創が認められる。(症例 5 70歳, 女)

図 13 剔出された円板
大きな穿孔を示す。(症例 6 53歳, 女)

図 14 円板の病理組織像 (H-E 染色, ×100)
表面は粗糙で、けばだったように見える。膠原線維の走行は不規則で硝子様変性が著しい(症例 7 65歳, 女)

3. 下顎窩

いずれの症例においても異常は認められなかった。

図 15 円板の病理組織像 (H-E 染色, ×100)
円板中央部の膠原線維の硝子様変性と血管新生を示す。(症例 3 56歳, 女)

図 16 円板の病理組織像 (アルシアン青染色, ×200)

下顎頭との癒着部付近を示す。化生性変化が著明で、軟骨様細胞の集簇と周囲の線維軟骨の基質を思わせる構造。矢印は、均一無構造な変性像を示す。(症例 4 52歳, 男)

V. 術後の顎機能療法

術後5日ないし7日目から chewing gum を噛むことからはじめ、1日おいて東医歯大式木製開口器(朴の木製、大きさ 100×15 mm、中央部の厚さ 20 mm、洗濯挟み様の形式をとる)を用いて患者自身に開閉口運動を行わせた。10例のうち6例は、術後の関節拘縮を防ぐとともに外側翼突筋の賦活を意図した FKO 式床副子の装着を試みたが、起床時の関節部拘縮の緩解と下顎運動の改善を容易にした。FKO 式床副子の装着は夜間就眠中にかけ、28日ないし30日間使用した。

顎機能療法の間は、術後3か月間としているが、FKO 式床副子を使用した6例については、開口度および左右側方下顎運動域の改善から、若干期間を短縮した。

VI. 術後成績

術後の経過期間は予後の検討を行った昭和54年5月現

表 2 術後成績

症例	術 後 経過期間	咀嚼 障害	関節痛	下顎頭運動 制限度	開口時 顎偏位	開口度 (mm)	術 後 咬合異常	判 定
1	7 年 10 か月	—	—	*Ⅲ→Ⅰ	—	46	—	良 好
2	6 8	—	—	Ⅱ→Ⅰ	—	50	—	良 好
3	6 5	—	—	Ⅲ→Ⅱ	軽 度	45	—	改 善
4	6 1	—	—	Ⅰ→Ⅰ	—	47	—	良 好
5	5 5	—	—	Ⅲ→Ⅰ	—	48	—	良 好
6	5 3	—	—	Ⅱ→Ⅰ	軽 度	50	—	改 善
7	4 9	—	—	Ⅲ→Ⅱ	軽 度	47	—	改 善
8	4 5	—	—	Ⅲ→Ⅱ	軽 度	46	—	改 善
9	4 3	—	—	Ⅰ→0	—	50	—	良 好
10	4 2	—	—	Ⅱ→Ⅱ	軽 度	37	—	改 善

* 術前制限度

図 17 術後 判定：良好
(症例 2 47歳，女，術後 6 年 8 か月)

図 19 術後 判定：改善
(症例 8 63歳，女，術後 4 年 5 か月)
最大開口時，下顎は右側（手術関節側）へ軽度ながら偏位している。

図 18 術後 判定：良好
(症例 5 70歳，女，術後 5 年 5 か月)

在で最短期約 4 年 2 か月，最長約 7 年 10 か月であった。各症例別では，表 2 に示すとおりで，いずれも当口腔外科外来に来科させて調査を行った。

予後の判定は，良好，改善，不変，悪化の 4 段階に分けて行った。それぞれの判定事項は，次に述べるとおりである。

良好：咀嚼障害がなく，日常の食生活には全く支障を感じていない。顎関節痛は全くなく，下顎頭運動の制限もない。下顎頭の運動制限の程度については，制限度 0 またはⅠに相当する（前述，図 1 を参照）。開口制限はなく，開口時に下顎が手術関節側へ偏位するようなこともない。術後の咬合異常はない。

改善：咀嚼障害がなく，日常の食生活には全く支障がない。関節痛はないが，ときどき関節部にひきつり感がある。下顎頭の運動制限は軽度ながら認められる。それについては制限度Ⅱである。開口制限はないが，開口時に下顎が手術関節側へ軽度ながら偏位する。関節音を聴取するが，下顎頭の運動を障害しているようなことはない。術後の咬合異常はない。

不変：手術によっても自覚的，他覚的に症状は改善されず，術前とは全く変わらない。咀嚼障害も著しい。

悪化：術後，かえって症状は悪化し，関節痛が強い，または開口制限が著しい。下顎頭の運動制限は強度でⅢまたはⅣである。咀嚼障害も著しく，日常の食生活にますます支障をきたしている。

以上の各判定項目に基づいて，10例を検討したところ，良好5例，改善5例，不変なし，悪化なしの成績が得られた。なお顔面神経損傷に基づく後遺症は全症例において認められなかった。

VII. 術後の顎関節X線所見

撮影法は，術前と同様に側方斜め上方向と眼窩－関節方向の2方法を用い，咬合時と最大開口時の撮影を行った。

全症の下顎頭に異常が認められた。それは外形の異常で，扁平な下顎頭を呈した2例を除けば，著しいものではなかった。下顎頭の輪郭は，総じて平滑であったが，2例は軽度ながら凹凸不整であった。骨梁については，いずれも著変は認められなかった。関節結節・下顎窩の異常は2例に認めたが，低い結節と浅い下顎窩であった。なおそのうちの1例は，下顎頭が扁平な形を呈していた症例である。関節裂隙については，とくに異常は認められなかった。

術後経過期間の長短とX線所見を比較したが，まちまちであり，両者間の関連性はとくに認められなかった。

図 20 術後のX線写真（眼窩－関節方向像）
（症例1 45歳，男，術後7年10か月）

軽度の変形が認められるが，輪郭は明瞭で，骨皮質，骨梁に著変を認めない。

図 21 術後のX線写真（側方斜め上方向像，開口時）

（症例5 術後5年5か月，判定：良好）

下顎頭は関節結節下にある（制限度Ⅰ）。輪郭がやや不明瞭であるが，変形は著しくない。

図 22 術後のX線写真（側方斜め上方向像，開口時）

（症例9 術後4年3か月，判定：良好）

下顎頭（矢印）は関節結節の前下方位にある（制限度0）。輪郭は明瞭で著変を認めない。

考 察

変形性関節症について

変形性関節症¹⁵⁻¹⁸⁾ (osteoarthritis, osteoarthritis, hypertrophic arthritis, osteoarthritis deformans, degenerative arthritis, chronic senescent arthritis, deformierende arthropathie) は関節軟骨の退行性変化を基盤とする慢性疼痛性疾患であるといわれる。単関節または数関節性で原因の多くは不明であるが、40歳以上のひとに認められ、加齢に伴って増加することなどで関節軟骨の老化現象との関連性が指摘されている。原因が定かでない、加齢的因子によると思われる場合は primary osteoarthritis と称され、関節の形態異常、外傷、炎症などから発症する原因の明らかな secondary osteoarthritis と区別されている。慢性かつ潜行性に発症し、膝関節、股関節などの力学的負荷のこもりやすい関節に生じやすい。おもな臨床症状は関節痛であるが、とくにそれは長い静止の状態から運動を起こすときや悪天候時に著しい。病変の進行に従って運動制限を生ずるが、関節強直をひき起こすようなことはないといわれる。貧血、血沈値の促進などはなく、全身症状を欠くので関節炎と鑑別される。X線像は特徴的であって、Greenfield¹⁹⁾によると関節頭縁骨棘像、関節軟骨下骨部の骨硬化像、関節面下骨部の嚢胞像、関節裂隙の狭小化、関節周縁における骨萎縮像の欠如などからなるといわれる。

顎関節の osteoarthritis, osteoarthritis は古くから指摘されており、Axhausen²⁰⁾ は決して少なくない顎関節疾患であると述べている。また Blackwood²¹⁾ は400体のヒト屍体顎関節を組織学的に検討し、その40%に osteoarthritic change が認められたという。筆者²⁾ はいわゆる顎関節症と診断された167例をX線学的に検討し、その35例(21%)に osteoarthritic change を認め、顎関節の変形性関節症を指摘したが、その後の臨床での観察から、やや頻度は高いのではないかとの印象をもっている。

本症の成因、病理については基本的に他関節のそれと共通するところが少なくない。顎関節では加齢的因子に加えてさまざまな咬合の異常(歯の欠損に基づく低位咬合、不良補綴物による高位咬合、咬合の偏位、咬合干渉など)または異常顎運動(亜脱臼、歯軌り、過度の顎運動など)に由来する慢性微小外力^{3, 11, 20, 22, 23)} が重視されている場合が多い。Axhausen²⁰⁾ などは咬合の異常は Statik にも Dynamik にも顎関節に力学的負荷をあたえたと述べている。しかしながら一方では、Shafer²⁴⁾ は病理学的変化は同一であるが、顎関節にかぎって weight-bearing joint ではないと述べ、また Boman²⁵⁾ は、必ずしも咬合に異常があるとは限らないとし、咬合異常からの力学的負荷に批判的なひともある。実際、臨床で個々の症例からその成因をみつけ出すのは難かしく、まして

経年的に少しずつ変化していく歯、咬合との関連性を求めるのは極めて難かしいものといわざるを得ない。筆者は諸家の多くが指摘しているほど、咬合の異常が成因のすべてであるとは思っていない。Boman²⁵⁾ が述べているように咬合状態に異常がない場合の方が多い(10例中7例は、現症においておおむね正常であった)。あえて、顎関節の osteoarthritis の発症について推論するならば、顎関節に力学的負荷をあたえる咬合の異常や顎運動の異常はむしろ一因子にすぎないものと考えられ、それが加齢的因子、素因などと複雑に相乗し合う場合があると発症するのではないかと推測している。

臨床症状について Buchman¹¹⁾、Steinhardt²⁶⁾、Dingman²⁷⁾ は関節痛、関節音、顎運動制限からなると述べ、Markowitz & Gerry²⁸⁾ らは関節音単独とし、Foged³⁾ は関節音、関節痛、顎運動制限からなるが、経過によっては、それらの症状の一部を欠き、症状に推移がみられると述べている。Thoma¹²⁾ はその成書に通常、軽度の関節痛と関節音であるが、重症になると慢性の亜脱臼症状をひき起こすと記載している。筆者²⁹⁾ も保存的療法を試みた軽症の18例について臨床症状を検討したところ、関節運動痛が9例で半数を占め、次いで関節音単独4例、関節痛・関節音合併2例などの順であった。このように osteoarthritis の臨床症状がまちまちなのは、Foged³⁾ が指摘しているように症状が経過によって変わりやすいためと思われる。それについて Axhausen²⁰⁾ は詳しく述べている。初期は顎関節部の硬ばりと軽度の疼痛があるが、まもなく本症に特徴的な開口時の関節音(Intermediäres Knacken)を生ずる。それは円板の変化に基づくが、症状は突然、関節音から強い関節痛と顎運動障害に変わるといふ。Intermediäres Knacken を特徴的な症状であるとしていることについては若干、疑問を感じるが、臨床症状が経時的に移り変わることをよく示唆していると思う。いずれにしても病状の進行したものは、強い関節痛または顎運動制限を生じ、顎機能障害をひき起こすに至るといわれる(Buchman¹¹⁾、Mehnert⁵⁾、Gordon⁶⁾、Mayer¹⁰⁾、Thoma¹²⁾)。

筆者は今回、osteoarthritis の手術適応症として関節痛、下顎頭運動制限、開口制限などの症状に、著しい咀嚼障害を伴う場合をあげたが、その臨床像をみるならば諸家の指摘する病変の進んだ重症型に相当するものと思われる。

顎関節 osteoarthritis のX線所見については、下顎頭辺縁の尖鋭化²⁰⁾、下顎頭の erosion⁶⁾、下顎頭の変形²³⁾、下顎頭辺縁の lipping と輪郭の変化²³⁾、関節面の exostosis または粗糙化⁹⁾などが指摘されている。筆者は下顎頭の変化を主とする特徴的な所見を得たが、それは他関節における osteoarthritis のそれ¹⁹⁾とおおむね一致した。本症の関節造影所見については、内外の文献を渉猟しても認めることができない。術前の関節造影像は本症

表 3 適応症

1. a) から e) までの項目をすべてみたす症型
 - a) 関節痛のため咀嚼障害がある.
 - b) 関節痛がある.
 - c) 下顎頭の運動制限がある.
 - d) 開口制限がある.
 - e) 関節造影によって関節円板に異常が認められる.
2. 長期間の保存的療法にもかかわらず、強度の関節痛があるか、または顎運動時に下顎頭転位を頻発し、いずれも関節造影によって円板に異常が認められる症型

に伴う円板の諸変化（癒着、変形、高度の変性と損傷）をよく示した。それらが顕著なものほど、臨床症状も著しく、両所見間に関連性を認めた。

適応症について

一般に顎関節の手術については、批判的なひとが多い。理由の多くは、術後の合併症や副損傷、予後などを憂うことがあるが、適応症をはっきりしないためでもある。osteoarthritis では、長期間の保存的療法にもかかわらず症状が改善されない場合（Foged³⁾, Davidsn⁴⁾, Mehnert⁵⁾, Gordon⁶⁾, Ward⁷⁾, Hartwell⁸⁾, Dingman⁹⁾）、顎機能障害や関節痛などの著しい場合（Mayer¹⁰⁾, Buchman¹¹⁾, Thoma¹²⁾）に手術の対象とされている。いずれも保存的療法の結果や一部症状に基づくが、適応症を決めるにはやや厳密性を欠くのを見逃すことができない。臨床諸所見から基本的病変に触れ、それに基づいた判断が望まれる。筆者は表3に示すような場合を osteoarthritis の手術適応症としたが、いずれも osteoarthritic change の進んだ症型である。とくに円板の病変（癒着、変性、損傷）を重視したが、その強度なものほど顎機能障害を伴い、臨床症状が著しく、臨床症状との関連性を認めたからである。ちなみにヒト屍体顎関節を対象にし、組織学的に検索を行った Bauer³⁰⁾, Steinhart²⁶⁾, Blackwood³¹⁾ らも osteoarthritic change の進んだものほど、円板に強度の癒着や穿孔が認められたと述べている。臨床的に円板の病変は関節造影によっても的確に把握できるが、それについてはすでに報告¹⁴⁾した。

手術法について

osteoarthritis には condylectomy が推奨されている。下顎頭を下顎頭部で切離して剔出するが、手術に基づく骨欠損量のいかんによっては、下顎枝の短小化を生ずることになる。そのため術後、顎偏位や咬合異常を招くことも少なくない。自家軟骨³²⁾または自家骨³³⁾, タンタル^{33,34)}, バイタリウム^{35,36)}, アクリル材³⁶⁾などによる下顎頭の再建が行われるが、一方、骨欠損の少ない arthroplasty を試みているひと¹⁰⁾もある。Dingman の in-

tracapsular arthroplasty⁹⁾ がそれであるが、円板を温存して、ただ下顎頭辺縁の lipping. 関節面の exostosis または erosion を小さな外科用バーによって削除し、平滑にする方法である。円板を温存した理由について Dingman は術後、下顎頭に対して cushion 様の働きをするからであると述べているが、osteoarthritis における円板の変化については考慮していない。筆者は適応症の一部で考察を試みているように、顎機能障害を伴う重症型の osteoarthritis では円板、関節包の強度の病変が重視されたので、円板切除と下顎頭の形成を兼ねた関節形成術を試みた。下顎頭の辺縁または関節面の骨棘、粗大な関節面は小さな外科用バーと骨ヤスリで削除しつつ平滑にし、外科侵襲による骨欠損を極力少なくするようこころがけた。そのため関節形態を保ち得たことが、術後顎偏位をひき起こさず、早期に開始した顎機能療法と相俟って良好な結果を得たと思っている。

術後成績について

osteoarthritis の手術療法については良好な結果が得られている場合が多い。Mehnert⁵⁾, Gordon⁶⁾, Hartwell⁸⁾, Mayer¹⁰⁾ らは condylectomy によって、Foged³⁾, Hankey³⁷⁾, Hansen³⁸⁾ らは meniscectomy によって、それぞれ良好な成績を得ている。筆者は meniscectomy と下顎頭の形成を兼ねた arthroplasty を行い、術後の関節機能療法と相俟って良好な結果を得た。osteoarthritis にあえて meniscectomy を行った理由については、適応症の項で詳しく述べたのでここでは論及を避けるが、単に症候的な観点から meniscectomy を行った Foged³⁾, Mayer¹⁰⁾, Hankey³⁷⁾, Hansen³⁸⁾ らとは異なることを強調しておきたい。術後の評価は、関節痛、関節音、開口制限などの関節症状の有無に基づいてなされることが多い。判定は極めて容易ではあるが、手術療法の適応症とされる顎関節障害は、著しい顎機能障害を伴っている場合が多いので、単に関節痛、関節音の消長で術後を評価するのは適切とはいえない。筆者は、術後評価を下顎頭運動制限、開口制限、開口時の顎偏位、咀嚼障害などの関節病変に起因する機能障害に置いて判定を試みた。とくに咀嚼障害は重症の顎関節疾患に伴う顎機能障害であるだけに、その消長は療法の評価を最も端的に示すものとして重視した。なお関節音については、関節運動に支障をきたさないかぎり、評価の対象としなかった。

術後のX線所見について

術後の顎関節形態の変化は、関節手術の予後を知る上に興味のあるところである。今回の予後調査にあたってX線撮影を行い検討したところ、術後経過期間の長短にかかわらず、全症例の下顎頭に変形が認められた。それは外形の異常を主とし、下顎頭の周縁を形づくる骨皮質、骨梁などの骨部構造、関節裂隙などには著変が認められないものであった。したがって術後のX線写真から

は osteoarthritic change を思わせる所見は得られなかった。関節の形態異常から二次的に osteoarthrosis が生ずる場合のあることは知られているが、今回検討の10症例については、術後の臨床所見と併せて、その憂いはないと思われる。結果的には変形治癒の状態にあるといえよう。下顎頭の変形については、手術侵襲によることも考えねばならないが、おおかたは術後の顎機能に適應した機能的改造に基づく結果と推測している。

結 語

昭和46年1月から同52年12月までの約6年11か月間に変形性顎関節症の17症例に手術療法を行った。今回、術後4年2か月から7年10か月経過した症例について予後を検討したところ、良好5例、改善5例、不変と悪化なしなどの結果を得たので、適応症、手術術式、術後療法などと併せて報告した。

引用文献

- 1) 上野 正, 他: 顎関節症に関する臨床的研究 第1報 臨床的所見(会). 口科誌 5: 284 1956.
- 2) 高久 邇: 正常ならびに病的顎関節のX線学的研究. 日口外誌 7: 1 1961.
- 3) Foged, J.: Temporomandibular arthrosis. Lancet 2: 1209 1949.
- 4) Davidsn, A.S.: Endaural condylectomy. Brit J Plast Surg 8: 64 1955.
- 5) Mehnert, H.: Die Condylektomie am Unterkiefer. DZZ 13: 375 1958.
- 6) Gordon, S.H.: Surgery of the temporomandibular joint. Am J Surg 95: 263 1958.
- 7) Ward, T.G.: Surgery of the mandibular joint. Ann Roy Coll Surg Engl 28: 139 1961.
- 8) Hartwell, S.W. & Hall, M.D.: Mandibular condylectomy with silicone rubber replacement. Plast Reconstr Surg 53: 440 1974.
- 9) Dingman, R.O. & Grabb, W.C.: Intracapsular temporomandibular joint arthroplasty. Plast Reconstr Surg 38: 3 1966.
- 10) Mayer, D.: Zur Erage der Diskusentfernung bei der Deformierenden Arthropathie des Kiefergelenkes. DZZ 19: 6 1964.
- 11) Buchman, J.: Lesion of the temporomandibular joint. Am J Orthod 25: 355 1939.
- 12) Thoma, K.H.: Oral surgery II. ed 5, Mosby Co, St Louis, 1969, p 664.
- 13) 高久 邇: 顎関節円板切除手術々式についての新しい試み. 日口外誌 21: 209 1975.
- 14) 高久 邇: 関節造影所見と手術所見とを対比した病的顎関節10症例について. 日歯放誌 7, 8: 14 1967.
- 15) Anderson, W.A.D.: Pathology. ed 4, Mosby Co, St Louis, 1961, p 1275.
- 16) 児玉俊夫: 整形外科教科書. 第11版, 南江堂, 東京, 1967, 298頁.
- 17) 三木威勇治: 整形外科科学入門. 第11版, 南山堂, 東京, 1974, 289頁.
- 18) Hollander, J.L. & Mc Carty, D.J.: Arthritis and allied conditions. ed 8, Lea & Febiger, Philadelphia, 1972, p 1032.
- 19) Greenfield, G.B.: Radiology of Bone Diseases. ed 2, Lippincott, Philadelphia & Toronto, 1975, p 607.
- 20) Axhausen, G.: Die Allgemeine Chirurgie in der Zahn-Mund-und Kieferheilkunde, Lehmanns Verlag, München, 1946, s 424.
- 21) Blackwood, H.J.J.: Arthritis of the mandibular joint. Brit D J 115: 317 1963.
- 22) Freese, A.S.: Degenerative joint disease of the temporomandibular joint. J Pros Den 7: 663 1957.
- 23) Heuser, H.: Röntgenologische Untersuchungen über die Erkrankungen im Bereich des Kiefergelenkes. Dtsch Zahn Mund & Kieferheilk 14: 96 1951.
- 24) Shafer, W.G., et al.: A textbook of oral pathology. ed 3, Saunders Co, Philadelphia, London & Toronto, 1974, p 658.
- 25) 26) より引用
- 26) Steinhardt, G.: In Häuple, K., et al.: Die Zahn-Mund-und Kieferheilkunde. Bd 3, Urban & Schwarzenberg, München & Berlin, 1957, s 529.
- 27) Dingman, R.O. & Constant, E.: A fifteen year experience with temporomandibular joint disorders. Plast Reconstr Surg 44: 119 1969.
- 28) Markowitz, H. & Gerry, R.: Temporomandibular joint disease. OS OM OP 2: 1309 1949.
- 29) 高久 邇: 各種慢性顎関節障害例に対するパロチン錠の治療成績について. 診療と新薬 12: 115 1975.
- 30) Bauer, W.H.: Osteoarthritis deformans of the temporomandibular joint. Am J Path 17: 129 1940.
- 31) Blackwood, H.J.J.: Pathology of the temporomandibular joint. J Am Dent Assoc 79: 118 1969.
- 32) Hind, E.C., et al.: Cartilage block arthroplasty for the correction of temporomandibular joint disturbances. Am J Surg 98: 787 1959.
- 33) Stuteville, O.H., et al.: Surgical reconstruction of temporomandibular joint. Am J Surg 90: 931 1955.
- 34) Goodsell, J.O.: Tantalum in temporomandibular arthroplasty. J Oral Surg 5: 41 1947.
- 35) Kleitsch, W.P.: Vitallum reconstruction of hemimandible and temporomandibular joint.

- Plast Reconstr Surg 7: 244 1951.
- 36) Gottlieb, O.: Temporomandibular arthroplasty. OS OM OP 9: 362 1956.
- 37) Hankey, G.T.: Temporomandibular arthrosis. Brit Dent J 10: 249 1954.
- 38) Hansen, W.G. & Deshazo, B.W.: Silastic reconstruction of temporomandibular joint meniscus. Plast Reconstr Surg 43: 388 1969.
-