Oxyphilic adenoma の1例

河野信彦

Oxyphilic adenoma: Report of a case

Nobuhiko KOHNO

緒 言

Oxyphilic adenoma は好酸性の細顆粒状細胞質を有する大きな細胞よりなる良性腫瘍で、口腔領域では耳下腺に好発する稀な疾患である。

本症は耳下腺のほかに顎下腺および小唾液腺、咽頭、下垂体、腎、涙丘等の報告も散見される。Oxyphilic adenoma はこれまでにさまざまな名称で報告されており、特に oncocytoma としての呼称が多く、一般的のようであるが著者はその名称を WHO¹⁾ の分類に従った。

今回、59歳男性の口蓋に発生した oxyphilic adenoma を経験したので報告するとともに文献の考察を行った。

症 例

患 者： 59歳 男性。

初 診：昭和55年7月 日。

主 訴：口蓋部腫瘤。

既往歴、家族歴：特記事項なし。

現病歴：昭和55年7月 日、義歯不適合のため某歯科を受診したところ、口蓋部の腫瘤の指摘を受け、本科を紹介され来院した。

現 症

全身所見：特記事項なし。

局所所見：口腔外所見；特記事項なし。

口腔内所見；正中よりやや左側の硬軟口蓋部に約5×8mmのはば円形の境界明瞭な腫瘤を認める。皮膚の変色はなく、圧痛も認めない。硬さは弾性硬で可動性はなかった（写真1, 2）。

臨床検査成績：特記すべき検査事項は認めなかった（表1）。

臨床診断：多形性腺腫。

山口県立中央病院歯科口腔外科（主任：河野信彦）
Division of Dentistry and Oral Surgery, Yamaguchi Prefectural Central Hospital (Chief: Nobuhiko Kohno)

受付日：昭和56年6月25日

写真1 初診時顔貌所見

写真2 口腔内所見

手術所見：全麻下にて歯槽部および軟口蓋側に基底を有する腫瘤前縁への弧状切開を行い、粘膜骨膜弁を剝離し腫瘤を摘出した。腫瘤は周囲との癒着もなく容易に摘出された。

摘出物所見：腫瘤は1.5×1×1cmのヒョウタン型で硬く、断面は灰黄色充実性であった（写真3, 4）。

病理組織所見：多くは胞状の、一部濃縮性の核を有した好酸性細顆粒状細胞質をもつ腫大した上皮性細胞の小集団よりなり、それらの間には少量の間質結合組織が認められた。被膜に被われた腫瘤辺縁の極く一部に、筋上皮

表 1 臨床検査成績

RBC	$\times 10^4$	403/mm ³	CHO (130-230 mg/dl)	183
Hg	g/dl	14.4	TG (30-135mg g/dl)	103
Ht	%	39.8	UN (8-20 mg/dl)	17
MCV	μ^3	99	CRE (0.7-1.5 mg/dl)	1.2
WBC		4,400/mm ³	BS (70-160 mg/dl)	109
BIL (0.2-1.0 mg/dl)		0.7	TTT (1-6U)	0.9
ZTT (2-10U)		5.7	NPN (20-30 mg/dl)	28.3
TP (6.5-8.0 g/dl)		6.6	Na (136-148 mEq/l)	143
ALB (3.8-5.0 g/dl)		4.5	K (3.6-5.0 mEq/dl)	4.1
A/G (1.4-1.8)		1.85	Cl (100-106 mEq/dl)	109
GOT (40K, U<)		15	Ca (4.5-5.5 mEq/dl)	4.3
GPT (35K, U<)		9	CRP (-)	
GTP (50 I, U<)		12	ASLO (-)	
LAP (20-60U)		30	HBs (-)	
ALP (2.7-10 KA)		5.7	Wreaction (-)	
CHE (0.7-1.1 Δ P.H)		0.82	ESR 1hr 8 mm	
LDH (60-140 W.U)		128	2hrs 11 mm

写真 3 摘出物所見

写真 4 ヒョウタン型充実性の断面

写真 5 腫大した好酸性細顆粒状細胞質を有する細胞

写真 6 強拡大像

写真 7 一部にみられた筋上皮細胞集と腫大細胞

細胞が存在し、それらの中に好酸性細胞が散見された。なお、粘液様組織、軟骨様組織、リンパ球の浸潤あるいは好酸性細胞顆粒状の二層性の排列は観察されなかった（写真5～7）。

確定診断：oxyphilic adenoma.

考 察

Oxyphilic adenoma (oncocyoma) は好酸性の細胞顆粒細胞質を有する大きな細胞 (oncocyte) よりなる稀な良性腫瘍である。

Oncocyte は1897年 Schaffer²⁾ により唾液腺、咽頭、気管、食道において好酸性顆粒を有する膨大した細胞として最初に報告された。その後、Zimmermann (1927)³⁾ は濃縮核を有する同細胞に pyknocyte の名称を提唱し、また、Meza-Chávez (1949)⁴⁾ は oxyphilic granular cell と呼んでいる。Hamperl (1931⁵⁾, 1936⁶⁾) は oncocyte に類似した細胞よりなる唾液腺腫を報告し、それはしばしば adenolymphoma においても認められるとした。一方、Jaffé (1932)⁷⁾ は現在 adenolymphoma として知られている腫瘍に oncocytoma という言葉を使用した。しかし、Ackerman (1943)⁸⁾ は oncocytoma は oncocyte より構成される腫瘍に限定して使用されるべきものであるとした。その後、本症は、pyknocytoma⁹⁾, oncocytic cell adenoma¹⁰⁾, azidophiles adenoma¹¹⁾, oxyphilic granular cell adenoma^{4, 12)}, oxyphil adenoma¹³⁻¹⁵⁾, acidophilic granular cell adenoma¹⁶⁾, oxyphilic granular-cell tumor¹⁷⁾, oxyphil cell adenoma¹⁸⁻²¹⁾, eosinophiles adenoma²²⁾ 等さまざまな名称で報告されてきたが、著者は WHO¹⁾ の分類に従って oxyphilic adenoma を使用した。

Oxyphilic adenoma の発生頻度は極めて少なく、Foote ら (1954)¹⁹⁾ の報告では大唾液腺腫瘍 800 例中わずか 1 例のみであった。本邦では北村 (1964)²³⁾ は 120 例中 1 例、また、Eneroth (1965)²⁴⁾ は、1,019 例中 7 例で、

表 2 頭頸部 oxyphilic adenoma の本邦報告例

	報 告 者	年次	年齢	性	発生部位
1	齊 藤ら ⁷⁰⁾	1957	9歳	男	舌下腺
2	松 井ら ⁵⁸⁾	1958	63	女	耳下腺
3	渡 辺 ⁵⁹⁾	1960	12	男	耳下腺
4	安 野ら ⁶⁰⁾	1962	22	女	耳下腺
5	北 村 ²³⁾	1964	?	?	耳下腺
6	永 谷ら ⁶¹⁾	1964	?	?	耳下腺
7	佐 藤ら ⁷²⁾	1964	23	女	口 蓋
8	矢 追ら ⁷¹⁾	1964	45	男	下 顎
9	戸 谷ら ⁶²⁾	1966	64	女	耳下腺
10	帷 子 ⁵⁷⁾	1966	48	女	耳下腺
11	洪 ⁷³⁾	1969	27	男	口 蓋
12	鈴 木ら ⁶⁶⁾	1970	59	男	顎下腺
13	Kobayashi ら ⁶³⁾	1972	61	女	耳下腺
14	Yamane ら ⁶⁴⁾	1973	74	男	耳下腺
15	三 吉ら ⁶⁵⁾	1974	28	男	耳下腺
16			53	女	口 蓋
17			31	男	顎下腺
18			81	女	声 帯
19	松 田ら ⁷⁴⁾	1974	53	女	頬 部
20	隈 元ら ⁶⁷⁾	1976	23	男	顎下腺
21	向 井ら ⁶⁸⁾	1978	61	男	顎下腺
22	山 田ら ⁶⁹⁾	1981	60	女	顎下腺

耳下腺腫瘍の 1% 以下の稀な腫瘍である²⁵⁻³²⁾。これまでに、60～83 例の本症が文献的に集計されているが研究者によりその数値は一致していない³³⁻³⁶⁾。そこで、著者が過去 10 年間における耳下腺での本症の発生を文献的に渉猟してみたところ 37 例^{15, 37-56)} を数えた。

また、本邦における頭頸部での oxyphilic adenoma の症例数は 22 で、そのうちわけは、耳下腺 10 例^{23, 57-65)}, 顎下腺 5 例⁶⁵⁻⁶⁹⁾, その他 7 例^{65, 70-74)} で、口蓋部での発生はわずか 3 例^{65, 72, 73)} のみであった (表 2)。

欧米での耳下腺以外の本症の発生は、頭頸部では咽頭が多く、Thawley ら (1977)⁷⁵⁾ の報告では 50 例程である。また、甲状腺では Hürthle-cell-tumor^{76, 77)} として知られている。次いで多いのが腎臓で 20 例あまりの報告がみられる⁷⁸⁾。その他の部位では、顎下腺^{18, 24, 79, 80)}, 小唾液腺^{12, 17, 34, 81-83)}, 鼻腔^{34, 53, 84-86)}, 上顎骨^{39, 83)}, 舌^{87, 88)}, 舌下部⁸⁹⁾, 喉頭蓋^{14, 90-92)}, 涙丘⁹³⁻⁹⁵⁾, 下垂体⁹⁶⁻¹⁰⁰⁾, 気管¹⁰¹⁾, 肺¹⁰²⁾, 胃粘膜¹⁰³⁾ の報告がみられた。

なお、口蓋部に発生した oxyphilic adenoma は欧米の報告を含めてもわずか 5 例のみであった (表 3)^{17, 65, 72, 73, 81)}。

Oncocyte は加齢とともにその出現率が上昇することが知られている。耳下腺において、0～10 歳代では oncocyte は認められず、30 歳代の 33.3%, 50 歳代の 57.7

表 3 口蓋部 oxyphilic adenoma の報告例

	報告者	年次	年齢	性	大 き さ
1.	Ahlbom ⁸¹⁾	1935	59	男	1.5 × 2 cm
2.	佐 藤 ⁷²⁾	1964	23	女	2.3 × 1.5 × 1.5
3.	Briggs ら ¹⁷⁾	1967	71	女	3 × 3
4.	洪 ⁷³⁾	1969	27	男	2.2 × 1.7 × 1.5
5.	三 吉 ⁶⁵⁾	1974	53	女	?
6.	本 症 例	1981	59	男	1.5 × 1 × 1

%, 70歳代の67.1%と増齢とともに増加傾向が認められる¹⁰⁴⁾。また、口蓋部では30歳代以上で90%以上の高率で oncocyte が認められる¹⁰⁵⁾。Oxyphilic adenoma は oncocyte の出現率に比例して若年者に少なく、50歳以降に好発している。この傾向は他の部位に発生した oxyphilic adenoma についても認められる^{14, 92~95, 106~109)}。しかし、若年者に発生した本症がみられないわけではなく、20歳代^{60, 64, 67, 100, 110)}、30歳代^{32, 64)}の報告があり、特に、7歳⁸⁷⁾、9歳⁷⁰⁾、12歳⁵⁰⁾の報告は非常に稀なもので、特筆に値する。

また、性差については、女性に僅かながら多いとの報告があるが^{24, 39, 84)}、著者の集計ではやや男性に多く発生しており、男女間における有意の差は認められなかった。

Oxyphilic adenoma は組織学的には好酸性細胞顆粒状の細胞質を有する多角形の相対的に大きな細胞よりなる腫瘍で、核は円形で小さく、胞状を呈している。また、核内には明瞭な核小体が1~2個認められる。これらの状態が、oxyphilic adenoma としての真の腫瘍であるのか、あるいは oncocyte の hyperplasia にすぎないのか判然とせずこれまでに多くの議論が行われてきた。

Hamperl (1931⁵⁾, 1933⁶⁾) は、oncocyte は充実性あるいは腺腫様集積として現れる腫瘍状 hyperplasia の形態をとることがあるとし、本症と hyperplasia の鑑別不可能なことを指摘している。Schwartz ら (1969)¹¹¹⁾ は本症を oncocyte による増殖、あるいは oncocyte への転換が広範囲におこったとし、耳下腺がほぼ完全に転換された稀な例を oncocytosis としている。さらに、本症が neoplasm ではなく hyperplasia であると断定する報告もみられる^{26, 43, 79)}。

一方、Kleinsasser ら (1966)¹¹²⁾ は oncocyte の腫瘍状過形成を oncocytoma と区別してその存在を提示している。さらに、Meza-Chávez (1949)⁴⁾ は本症を腫瘍と断定し、その根拠として本症が腺よりおこった新しい異常な構造の形成は腫瘍としての十分な形態をしていると述べている。このことを具体的に示したのが Gallagher ら (1969)¹⁰⁶⁾ および Thawley ら (1977)⁷⁵⁾ である。

Gallagher ら (1969)¹⁰⁶⁾ は咽頭に発生した19例の oncocytic lesion を報告し、その中の1例は充実性で Acker-

man (1943)⁸⁾ の耳下腺 oncocytoma に類似していると述べ、さらに、oncocytoma と oncocytosis の区別は困難であるとしながらも neoplasm としての oncocytoma の定義を次のように示している。即ち、その細胞は正常 oncocyte より大きな核を有す、核細胞質比の増大、明瞭な核小体、しばしば極性 (polarity) の変化、細胞質の染色性の変化、充実性の細胞増殖を挙げている。そして、咽頭に発生する囊胞状 oncocytic lesion は hyperplasia や degeneration と考えるとしている。さらに彼はこれまでに報告された咽頭での23例は、hyperplasia や oncocytic mataplasia であると考察している。また、Thawley ら (1977)⁷⁵⁾ も hyperplastic form か neoplastic form かの鑑別は困難な時があるとしながらも次のように鑑別指標を示している。Hyperplastic の場合は、小さな核で、oncocyte として正常な核や細胞質を有し、他の細胞および基底膜に対して長軸の正常極性 (polarity) の細胞よりなる。一方、腫瘍性の場合は Gallagher ら (1969)¹⁰⁶⁾ と同じように、正常 oncocyte より大きく突起状の核小体を有し、核細胞質比の増加、細胞の極性の変化、さらに乏しい線維性間質により小葉に区分されるとしている。そして、咽頭部の oncocytic lesion は真の neoplasm というよりもむしろ hyperplasia あるいは metaplasia の結果と考えるべきであると述べている。

彼らの定義^{51, 75, 106)} からこれまでに報告された oncocytoma を再吟味してみると hyperplastic form の範疇の域を出ない症例も少なくないようである。

本症例において、一部導管を形成する細胞は正常 oncocyte と思われた。その oncocyte より生じたと思われる、正常 oncocyte より染色性のやや劣る大きな細胞の充実性増殖が認められた。それらの細胞の増殖態度は一部導管を形成する oncocyte や基底膜に対する配列が乱れ、その極性は失われていた。さらに正常 oncocyte より核は大きく胞状を呈し、明瞭な核小体が1~2個認められた。これらの所見は Gallagher ら (1969)¹⁰⁶⁾、Thawley ら (1977)⁷⁵⁾ の、また成書に記載されている真の neoplasm と考えられる。

次に、oxyphilic adenoma と papillary cystadenoma lymphomatosum とは非常に類似性の高い疾患であるが、それらの組織構成の違いはリンパ組織の有無にあり、oxyphilic adenoma ではリンパ組織は認められないことが鑑別の定説となっている。

Jaffé (1932)⁷⁾ は adenolymphoma として知られている腫瘍に oncocytoma という名称を使用したため、Ackerman (1943)⁸⁾ はその名称の使用に異論を唱えた。Hamperl (1962)⁸⁴⁾ は oncocytoma の名称はそのほとんどが oncocyte により構成されている場合にのみ使用されるべきであり、他の腫瘍に oncocytic foci のみられる場合は使用すべきではないと述べている。

また、Eneroth (1965)²⁴⁾ は papillary cystadenoma

lymphomatosum の場合の oncocyte は oncocytoma のそれとは異なり単一では存在しない。即ちリンパ球や形態不明な物質および液状物と混在し、oncocytoma の細胞で観察される coarse granulation が papillary cystadenoma lymphomatosum の oncocytic cell には発見できないとしている。さらに、Oliveira ら (1977)⁹²⁾ は papillary cystadenoma lymphomatosum は嚢胞腔内へ乳頭突起を出す嚢胞性の腫瘍であるとし、その乳頭は 2 層の上皮よりなり、内層は正常な oncocyte であり、oncocytoma とは形態的にもかなりの差異を指摘している。しかし、一方電顕的には papillary cystadenoma lymphomatosum と oncocytoma の oncocytic cell の間には高レベルの酵素活性があり、生化学的にもはっきりした区別はできなかったとする報告もある¹¹³⁾。

Oxyphilic adenoma との鑑別の必要な前述した 2 疾患に対しては比較的確な判断基準が得られているが、oncocyte よりなる本腫瘍内に混合腫瘍の構成成分が認められた場合、その鑑別基準がこれまでに示されておらず、両者の鑑別が困難である。

Christopherson (1949)¹¹⁰⁾ は oncocyte よりなる上皮成分の中に一部粘液および軟骨様組織を認めており oncocytoma と混合腫瘍との区別はできないとしている。また、Greenberg ら (1957)²¹⁾ は oncocytoma において、その間質が粘液様物質からなる混合腫瘍部を認めており、このことは oncocyte が時おり混合腫瘍に変化する能力をもっている¹⁹⁾ ことを示していると述べている。一方、Hamperl (1962)⁸⁴⁾ は混合腫瘍と共存する oncocytic foci はすでに変化している混合腫瘍内で oncocyte が増殖したためであると言っている。また、Trejo ら (1972)¹⁵⁾ は耳下腺に発生した混合腫瘍切除後 4 年して同部に oxyphil adenoma を認めた。その組織像には混合腫瘍様成分はなかったとし、oxyphil adenoma と混合腫瘍との相関関係の可能性はわずかであると述べている。さらに、Sidhu ら (1975)⁴⁶⁾ は mucoepidermoid carcinoma 内での oncocyte 様変化に対して、oncocyte が分泌や模写する機能および oncocyte の特徴を娘細胞に伝達する機能を有しているとしている。これらの報告は oncocyte の細胞変異の能力を示唆している。

Gray ら (1976)⁵¹⁾ は 15 例の oncocytic lesion の中に oncocytic pleomorphic adenoma の 3 例を報告し、oncocytic pleomorphic adenoma の判断指針として oncocyte よりなる上皮結節の周囲は豊富な粗性結合組織の間質があり、oncocyte 以外の上皮よりなる導管あるいは腺房構造が必要であると述べている。また、それら 3 例のすべてに粘液軟骨様基質を認めている。

結局、oxyphilic adenoma の混合腫瘍との鑑別の判断基準は、腫瘍のすべてが、あるいはそのほとんどが oncocyte により構成されており、混合腫瘍に認められる粘液腫様、軟骨様組織等がみられないという比較的漠然と

したものである。本症例においてもそのほとんどが oncocyte により構成されていたが、腫瘍の辺縁の極く一部に筋上皮細胞が認められた。以上の所見より oxyphilic adenoma としたが、混合腫瘍を積極的に否定しうものではないように思え、この両者の鑑別は今後検討されるべき課題である。

Oxyphilic adenoma は良性腫瘍とされてきたが、最近では悪性例、死亡例も報告されており、慎重なる施術と長期的な経過観察が必要である。

Bauer ら (1953)¹¹⁴⁾ は導管の小さな好酸性の立方形細胞が腫大して oxyphilic granular cell (oncocyte) に移行するのは良性あるいは悪性腫瘍にでも変化しうものであると述べ、本症においても悪性変化がありうることを示唆している。

Eneroth (1954)²⁴⁾ は良性耳下腺混合腫瘍の切除 8 年経過後、同部に oncocytoma の“再発”を認めている。さらに腫瘍の一部の oncocyte は被膜組織に浸潤し、非定型的な oncocyte に漸次移行する像がみられ、好酸性の染色性の低下をも呈し、この部分において adenocarcinoma への移行像も認められたとしている。Leventon ら (1976)⁵⁰⁾ の報告では pleomorphic adenoma と診断された耳下腺部に 9 年後 oncocytoma が発生し、かつ頸部への転移も認め、さらにその 2 年後にも転移をきたしている難治例を示している。また、Lee ら (1976)⁵²⁾ は最初の手術から 10 か月および 2 年半後の 2 度にわたる本症の再発例を経験し、初発時と再発時の組織像に類似性を認めていながらも、再発時の方が mitosis, pleomorphism が増加していたと述べている。Blanck ら (1970)²⁶⁾ の報告では 13 例中 4 例に局所再発を、また最近では頸部リンパ節への転移の報告例も示されている^{30, 44, 50, 68, 113)}。

Ross (1976)⁴⁹⁾ によれば、1976 年までに報告された malignant oncocytoma は 20 例のみであり、それ以後の malignant oncocytoma は著者の文献渉猟では 9 例の報告がみられた^{32, 50, 51, 53, 54, 68)}。

一方、Johns ら (1977)⁵³⁾ は oncocytic carcinoma の 3 例のうち、1 例は鼻腔に生じたもので、上顎骨への浸潤、破壊を認めている。彼らは本症の悪性像を臨床的あるいは組織学的に明らかな局所浸潤および転移がなければならぬと定義している。しかし、Becks (1975)⁸⁵⁾ ら^{34, 36)} は組織学的には良性であっても生命に危険を及ぼす程の大出血を誘発させるような局所浸潤もおこりうるとしている。さらに本邦での向井 (1978)⁶⁸⁾ の報告は、大型の円形あるいは多角形の異型性細胞よりなり、核の hyperchromatism, pleomorphism などの異型性および mitosis をみ、リンパ節にも原発巣と同様な腫瘍細胞により転移を認めている。また、Chu ら (1978)⁵⁴⁾ は oncocytoma の被嚢外への浸潤は認められなかったものの細胞形態学的あるいは線維性間質反応は oncocytoma における悪性転化への preinvasive stage を示唆している

と述べている。

Handler ら (1979)³⁶⁾ は小唾液腺由来の左側上顎洞 oncocytoma を報告し、その中で小唾液腺由来の oncocytoma の多くの報告は大唾液腺由来の oncocytoma の状態とは異なり侵略的な態度をとることを強調している。即ち大唾液腺に発生した本症の大部分は良性であり、周囲への成長を抑制する被膜を形成する。一方小唾液腺由来のそれは被膜はなく侵略的で、周囲組織に侵入し骨をも破壊するとしている。さらに、彼らと同様の見解は鼻腔や上顎洞の小唾液腺由来の oncocytoma は局所的には侵略的であるとする Cohen ら (1968)³⁴⁾ や Larson ら (1976)⁸⁶⁾ の報告にもみられる。

しかし、口蓋に発生した oxyphilic adenoma (oncocytoma) では、Briggs ら (1967)¹⁷⁾ が悪性例を報告している以外はすべて良性であり、本症例においても腫瘍実質は線維性被膜により包まれた、異形性も認められぬ良性 oxyphilic adenoma (oncocytoma) であり、臨床的にも再発および転移もきたしていない。

しかし、一方では malignant oxyphilic adenoma (oncocytoma) による腫瘍死の報告もなされており^{32, 49)}、慎重な態度での長期的な観察が必要である。

最近、電子顕微鏡および組織化学による研究も盛んに行われ、oxyphilic adenoma (oncocytoma) の診断における有用性を証明している。Tandler ら (1970)³⁷⁾ は Oxyphilic adenoma (oncocytoma) を診断するための項目を提示している。1) 組織学的成熟器管にみられること。2) その細胞は組織化学染色により高度な酵素活性を示さなければならない。3) 多くのミトコンドリアを有す。4) ミトコンドリアは大きく、多形性で異型性が強い。以上の条件は以後の電顕観察でも同様の報告がなされている。Micheau ら (1975)⁴⁸⁾ は耳下腺 oncocytoma の12例で豊富な酵素は正常な腺細胞の3～4倍もあるとし、その oncocyte の強力な活性能力を証明しており、これらの報告により^{30, 46-48, 53, 57, 98, 100, 101, 113)} oncocytic change は少なくとも退行性変化でないことが理解できる。

最後に、oxyphilic adenoma (oncocytoma) の発生起源および腫瘍形成についてはこれまでに多くの議論、検討がなされてきた。Schaffer (1897)²⁾ は本症は唾液腺上皮の変性であるとし、Pischinger (1924)¹¹⁵⁾ は破壊された未分化な細胞が特異な増殖をして変質したものであるとした。また、Zimmermann (1927)³⁾ は細胞分化の際の異常形態の細胞であると述べている。一方、Hamperl (1962)⁸⁴⁾ は線組織の萎縮に関連した上皮細胞の特殊な不可逆変化として、同時にこの細胞は分裂増殖能力をもち、ときに充実性または腺腫性病巣を形成し、いわゆる腫瘍状過形成を示すことがあるとした。また、Feyrter (1963)¹¹⁶⁾ は結節部に由来を求め、Hübner ら (1967)¹¹⁷⁾、Askew ら (1971)⁸²⁾ らは筋上皮からの発生ではないかと

推測している。岩田ら (1977)¹⁰⁴⁾ も oncocyte が筋上皮が存在しうる線条部、介在部および腺房部に高頻度に見られた結果からして起源細胞の1つとして筋上皮細胞を考えることも否定できないとしている。

一方、Whittam ら (1971)³⁹⁾ は oncocyte あるいは oncocytoma の起源は求めるのは困難であるとしながらもその細胞は分裂、増殖する能力を残しており、この oncocytic change は娘細胞にも伝えられるとしている。

以上のごとく、oncocyte, oxyphilic adenoma (oncocytoma) の起源、発生、腫瘍形成についての統一見解は得られていない。

本症例においては、僅かな導管形成部 oncocyte は正常と思われ、それらに接して腫瘍実質を形成する細胞はこの導管部正常 oncocyte から生じ、腫瘍化したと考える。また、ごく一部に筋上皮細胞をも認めており、筋上皮由来も否定できなかった。

結 語

今回、59歳男性の口蓋に発生した良性 oxyphilic adenoma (oncocytoma) を経験したのでその概要を報告し、文献的考察を行った。

本論文の要旨は第35回口腔科学会総会（昭和56年6月東京）において発表した。

稿を終えるに臨み、ご助言、ご協力を戴いた高知医科大学口腔外科大野彰彦先生に感謝致します。

引 用 文 献

- 1) Thackray, A. C.: Histological typing of salivary gland tumor. WHO, Geneva, 1972, p 26.
- 2) Schaffer, J.: Beiträge zur Histologie der menschlicher Organe. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 100 (Abt. 3) 440 1897.
- 3) Zimmermann, K.W.: Die Speicheldüse der Mundhöhle und die Bauchspeicheldrüse. In Handbuch der Mikroskopischen Anatomie des Menschen. Vol. 5 Ed, W, Mollendorff, Springer, Berlin, 1927, p 1, 128.
- 4) Meza-Chávez, L.: Oxyphilic granular cell adenoma of parotid gland (oncocytoma). Oral Surg 11: 897 1958.
- 5) Hamperl, H.: Onkocyten und Geschwülste der Speicheldrüsen. Virchows Arch Path Anat 282: 724 1931.
- 6) Hamperl, H.: Über das Vorkommen von Onkocyten in verschiedenen Organen und ihren Geschwülsten. Virchows Arch Path

- Anat 298: 327 1936.
- 7) Jaffé, R.H.: Adenolymphoma (oncocytoma) of the parotid gland. *Am J Cancer* 16: 1415 1932.
 - 8) Ackerman, L.V.: Oncocytoma of the parotid gland. *Arch Path* 36: 508 1943.
 - 9) Harris, P.N.: Adenoma of the salivary gland. *Amer J Cancer* 27: 690 1936.
 - 10) Schafer, E.L., et al.: Oncocytic cell adenoma of the parotid gland. *Amer J Surg* 91: 272 1956.
 - 11) Rouch, S.: Eneroth²¹⁾ より引用.
 - 12) Chaudhry, A.P., Gorlin, R.J.: Oxyphilic granular cell adenoma (oncocytoma). *Oral Surg* 11: 897 1958.
 - 13) Evans, R.W., Cruickshank, A.H.: Epithelial tumors of the salivary glands. W B Saunders Co, Tront, 1970, p 27.
 - 14) Barton, R.T.: Oxyphil adenoma of the larynx. *Ann Otol* 81: 256 1972.
 - 15) Trejo, I.H., Harwood, T.R.: Oxyphil adenoma four years after a benign mixed tumor. *Arch Otolaryng* 96: 570 1972.
 - 16) Buxton, R.W., et al.: Surgical treatment of epithelial tumors of the parotid gland. *Surg Gynec & Obst* 97: 401 1953.
 - 17) Briggs, J., et al.: Malignant oxyphilic granular-cell tumor (oncocytoma) of the palate. *Oral Surg* 23: 796 1967.
 - 18) Dibble, P.A., Sanford, D.M.: Submaxillary oncocytoma; oxyphilic-cell adenoma. *Arch Otolaryng* 74: 299 1961.
 - 19) Foote, F.W., Frazell, E.L.: Tumors of the major salivary glands. In *Atlas of tumor pathology*, Sect IV, Fasc. 11. Washington, Armed Forces Inst. Pathology, 1964.
 - 20) Lucas, R.B.: Pathology of tumors of the oral tissues. ed 2, Churchill Livingstone, Edinburgh and London, 1972, p 284.
 - 21) Greenberg, S.D., Haley, M.D.: Oncocytoma (oxyphil cell adenoma) of the parotid gland. *Am J Clin Path* 27: 321 1957.
 - 22) Gräser, A.: Eneroth²⁴⁾ より引用.
 - 23) 北村 武: 耳下腺腫瘍. 癌の臨床 10:141 1964.
 - 24) Eneroth, C.M.: Oncocytoma of major salivary glands. *J Laryng Otol* 79: 1064 1965.
 - 25) Kirklin, J.W., et al.: Parotid tumors. *Surg Gynec & Obst* 92: 721 1951.
 - 26) Blanck, C., Eneroth, C.M.: Oncocytoma of the parotid gland; neoplasm or nodular hyperplasia? *Cancer* 25: 919 1970.
 - 27) Crocker, D.J., et al.: Intraoral minor salivary gland tumors. *Oral Surg* 19: 60 1970.
 - 28) 陳 瑞和: 耳下腺悪性腫瘍の臨床と病理. 日耳病 74: 888 1971.
 - 29) Spiro, R.H., et al.: Tumors of minor salivary origin. *Cancer* 31: 117 1973.
 - 30) Kay, S., et al.: Electron microscopic observations on a parotid oncocytoma. *Arch Path* 96: 186 1973.
 - 31) Sohn, D.: Oxyphil adenoma (oncocytoma) of parotid with hemorrhage presentation as an enlarging neck mass. *Eye Nose and Throat Monthly* 53: 242 1974.
 - 32) Laurian, N., et al.: Malignant oncocytoma. *J Laryngol Otol* 91: 805 1977.
 - 33) Smoler, J.: Oxyphilic granular cell adenoma of the parotid gland. *Arch Otolaryng* 87: 114 1968.
 - 34) Cohen, M.A., Batsakis, J.G.: Oncocytic tumors (Oncocytomas) of minor salivary glands. *Arch Otolaryng* 88: 97 1968.
 - 35) Mair, I.W.S., Johannessen, T.A.: Benign and malignant oncocytoma of the parotid gland. *Laryngoscope* 82: 638 1972.
 - 36) Handler, S.D., Ward, P.H.: Oncocytoma of the maxillary sinus. *Laryngoscope* 89: 372 1979.
 - 37) Tandler, B., et al.: Ultrastructure of oncocytoma of the parotid gland. *Lab Invest* 23: 567 1970.
 - 38) Serre, D.E., et al.: Parotid gland adenoma of oxyphilic granular cells. presentation of a case. *Rev Esp Enferm Apar Dig* 30: 209 1970.
 - 39) Whittam, D.E., Bose, B.: Malignant oncocytoma of the parotid gland. *Br J Surg* 58: 851 1971.
 - 40) Smirnov, E.A.: Oncocytoma of the Parotid salivary gland. *Vopr Onkol* 18: 91 1972.
 - 41) Abioye, A.A.: Malignant oncocytoma (oxyphilic granular cell tumor) of the parotid gland; case report. *East Afr Med J* 49: 235 1972.
 - 42) Hernandez, A., Rafal, H.S.: Oncocytoma of the parotid glands; case presentation and review of the literature. *Del Med J* 45: 219 1973.
 - 43) Schwartz, I.S.: Parotid oncocytoma. *Arch Path* 97: 190 1974.
 - 44) Fayemi, A.O., Toker, C.: Malignant oncocytoma of the parotid gland. *Arch Otolaryngol* 99: 375 1974.
 - 45) Macri, C., et al.: Parotid gland oncocytoma associated with papillary carcinoma of the thyroid gland. *Pathologica (Ita)* 67: 195 1975.
 - 46) Sidhu, G.S., Waldo, E.D.: Oncocytic change in mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland. *Arch Path* 99: 663 1975.
 - 47) Sun, C.N., et al.: Oncocytoma (Mitochondr-

- ioma) of the parotid gland. Arch Path 99: 208 1975.
- 48) Micheau, C., Riou, G.: Oncocytes et oncocytomes. Arch Anat Pathol (Paris) 23: 123 1975.
 - 49) Ross, C.F.: Malignant oncocytoma ('oxyphilic granular cell tumour') of parotid gland. Clin Oncol: 253 1976.
 - 50) Leventon, G., et al.: Malignant oncocytic tumour of the parotid salivary gland. J Laryng Otol 90: 289 1976.
 - 51) Gray, S.R., et al.: Oncocytic neoplasms of salivary glands. Cancer 38: 1306 1976.
 - 52) Lee, S.C., Roth, L.M.: Malignant oncocytoma of the parotid gland. Cancer 37: 1606 1976.
 - 53) Johns, M.E., et al.: Oncocytic neoplasms of salivary gland; an ultrastructural study. Laryngoscope 87: 862 1977.
 - 54) Chu, W., Strawitz, J.G.: Oncocytoma of the parotid gland with malignant change. Arch Surg 113: 318 1978.
 - 55) Lunia, S., et al.: Oxyphilic adenoma of the parotid gland. Radiology 128: 690 1978.
 - 56) Cameron, W.R., Stenram, U.: Adenoma of parotid gland with sebaceous and oncocytic features. Cancer 43: 1429 1979.
 - 57) 帷子康雄: 膨大細胞腫 oxyphil cell adenoma. 日皮誌 76: 181 1966.
 - 58) 松井敬介, 他: 稀有な耳下腺腫瘍2例; Warthin 腫瘍及び Onkocytoma. 米子医誌 9: 935 1958.
 - 59) 渡辺謙太郎: Onkocytoma の1例. 米子医誌 11: 737 1960.
 - 60) 安野友博, 他: 最近の珍しい腫瘍例. 耳鼻臨床 55: 226 1962.
 - 61) 永谷 憲, 菱和田寛子: 稀有なる組織像を呈した耳下腫瘍の1例. 日耳鼻 67: 1798 1964.
 - 62) 戸谷拓三, 他: 本邦初例と思われる耳下腺好酸性腺腫の1例. 外科診療 8: 1227 1966.
 - 63) Kobayashi, H., Hoshino, M.: Ultrastructural study of cytochrome oxidase in oncocytoma. Nagoya J Med Sci 34: 25 1972.
 - 64) Yamane, I., Ikeda, M.: Ein Fall von oxyphil granuliertem Zellcarcinom der Parotis mit Lymphknotenmetastase. Nagoya Acta Medica 17: 55 1973.
 - 65) 三吉康郎, 他: 頭頸部における Oncocytoma について. 耳鼻臨床 67: 1414 1974.
 - 66) 鈴木省吾, 他: 顎下腺膨大細胞腫 (Oncocytoma) の1例. 耳鼻臨床 63: 1101 1970.
 - 67) 隈元伸一, 他: 顎下部に発生した Oncocytoma の1例. 日口外誌 22: 137 1976.
 - 68) 向井 洋, 他: 顎下腺に発生した malignant oncocytoma の1例. 日口外誌 24: 1978.
 - 69) 山田公一, 他: 顎下腺に発生した oxyphilic adenoma の1例. 日口外誌 27: 557 1981.
 - 70) 斉藤純夫, 他: 口腔底に発生した Oncocytoma の1例. 臨外 12: 277 1957.
 - 71) 矢追秀彦, 他: 顎中心性に発現した "oncocytoma" の1例. 口科誌 11: 137 1964.
 - 72) 佐藤 道, 渡辺哲夫: 硬口蓋膨大細胞腫 (Oncocytoma) の1治験例. 耳喉 36: 75 1964.
 - 73) 洪 得意: 硬口蓋膨大細胞腫 (onkocytoma) の電子顕微鏡的観察. 耳喉 41: 867 1969.
 - 74) 松田 登, 他: 頬部に発生した Oncocytoma の症例. 日口外誌 20: 278 1974.
 - 75) Thawley, S.T., et al.: Oncocytic hyperplasia of the larynx. J Laryngol Otol 91: 619 1977.
 - 76) Kaick, G.: Die onkozytären Geschwülste der Schilddrüse. Med Welt 15: 668 1970.
 - 77) Lederer, B., et al.: Das onkocytäre Adenoma der Schilddrüse im Endemiegebiet. Verh Dtsch Ges Pathol 61: 280 1977.
 - 78) Weinle, S.N., Bernstein, R.G.: Renal oncocytoma: angiographic features of two cases. Radiology 125: 3 1977.
 - 79) Batsakis, J.G., Marty, D.G.: Oxyphil cell tumor of submaxillary gland. US Armed Forces Med J 11: 1383 1960.
 - 80) Beltaos, E., Maurer, W.J.: Oncocytoma of the submaxillary salivary gland. Arch Otolaryng 84: 193 1966.
 - 81) Ahlbom, H.E.: Mucous-and salivary-gland tumors. Acta Radiol Suppl 23: 1 1935.
 - 82) Askew, J.B., et al.: Epithelial and myoepithelial oncocytes. Arch Otolaryng 93: 46 1971.
 - 83) Vilasco, J., et al.: Un cas de tumeur intramaxillaire d'origine salivaire probable. Rev Stomatol 71: 71 1970.
 - 84) Hamperl, H.: Onkocyten und Onkocytome. Virch Arch 335: 1962.
 - 85) Becske, M.: Onkozytom mit seltener Lokalisation. HNO 23: 216 1975.
 - 86) Larson, D.L., Fechner, R.E.: Pathologic quiz case, oncocytoma of the nasopharynx. Arch Otolaryng 102: 320 1976.
 - 87) Das, S., et al.: Oncocytoma of tongue in a child. J Pediatr Surg 11: 113 1976.
 - 88) Ziperman, H.H.: Oxyphil-cell adenoma of the tongue. US Armed Forces M J 6: 1039 1955.
 - 89) Portman, G.L.: Oncocytome sublingual. Rev Laryng 83: 1 1962.
 - 90) Weidauer, H.: Ein Beitrag zu dem seltenen onkozyären des Larynx. Z Layng Rhinol 51: 163 1972.
 - 91) Sasaki, C.T., Holmes, R.E.: Oncocytoma of the epiglottis. Ear Nose Throat J 55: 14 1976.

- 92) Oliveira, C.A., et al.: Oncocytic lesions of larynx. *Laryngoscope* 87: 1718 1977.
- 93) Radnót, M., Lapis, K.: Ultrastructure of the caruncular oncocytoma. *Ophthalmologica* 161: 63 1970.
- 94) Németh, B., Fehér, J.: Oncocytoma carunculae. *Ophthalmologica* 175: 1 1977.
- 95) Bujara, K., Domarus, D.: Onkozytome der Karunkel. *Klin Mbl Augenheilk* 172: 848 1978.
- 96) Landolt, A.M., Oswald, U.W.: Histology and ultrastructure of an oncocytic adenoma of the human pituitary. *Cancer* 31: 1099 1973.
- 97) Landolt, A.M.: L'oncocytome un nouveau type histologique des adénomes hypophysaires. *Oto Neuro Opt* 47: 265 1974.
- 98) Rollet, J., et al.: Un cas d'adénome oncocyttaire de l'hypophyse avec galactorrhée et hyperprolactinémie. *Ann Endocrinol* 36: 221 1975.
- 99) Roy, S.: Ultrastructure of oncocytic adenoma of the human pituitary gland. *Acta Neuro-pathol* 41: 169 1978.
- 100) Bauserman, S.C., et al.: Pituitary oncocytoma. *Arch Pathol Lab Med* 102: 456 1978.
- 101) Fechner, R.E., Bentinck, B.R.: Ultrastructure of bronchial oncocytoma. *Cancer* 31: 1451 1973.
- 102) Black, W.G.: Pulmonary oncocytoma. *Cancer* 23: 1347 1969.
- 103) 寺門広輝, 他: 胃粘膜に発生した Oncocytoma の1例. *日本医科大学雑誌* 45: 458 1978.
- 104) 岩田 康, 他: ヒト耳下腺の病理組織学的研究, II oncocyte について. *口科誌* 26: 234 1977.
- 105) 川村啓造: ヒト口蓋腺の oncocyte 出現に関する病理組織学的研究. *九州歯会誌* 31: 103 1977.
- 106) Gallagher, J.C., Puzon, B.Q.: Oncocytic lesions of larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 78: 307 1969.
- 107) Sos, T.A., et al.: The angiographic appearance of benign renal oxyphilic adenoma. *Am J Roentgenol* 127: 717 1976.
- 108) Ambos, M.A., et al.: Angiographic patterns in renal oncocytomas. *Radiology* 129: 615 1978.
- 109) Morales, A., et al.: Renal oncocytomas: clinical, radiological and histological features. *J Urol* 123: 261 1980.
- 110) Christopherson, W.M.: Oncocytoma of the parotid gland. *Arch Path* 48: 96 1949.
- 111) Schwartz, I.S., Feldman, M.: Diffuse multinodular oncocytoma ("oncocytosis") of the parotid gland. *Cancer* 23: 636 1969.
- 112) Kleinsasser, O., et al.: Onkocytäre adenomartige Hyperplasien, Adenolymphome und Onkocytome der Speicheldrüsen. *Archiv klin exper Ohren Nasen und Kehlkopfheilk* 186: 317 1966.
- 113) Balogh, K., Roth, S.I.: Histochemical and electron microscopic studies of eosinophilic granular cell (oncocytes) in tumors of the parotid gland. *Lab Invest* 14: 310 1965.
- 114) Bauer, W.H., Bauer, J.D.: Classification of glandular tumors of salivary gland. *Arch Path* 55: 328 1953.
- 115) Pischinger, A.: Beiträge zur Kenntnis der Speicheldrüsen, besonders der Glandula sublingualis und submaxillaris des Menschen. *Ztschr f mikr ana Forsch* 1: 437 1924.
- 116) Feyrter, F.: Über das Onkozytom der Speicheldrüsen. *Zbl allg Path* 104: 513 1963.
- 117) Hübner, G., et al.: Zur Feinstruktur und Genese der Onkocyten. *Vichows Arch Path Anat* 343: 34 1967.