実験的舌癌における血管構築ならびに腫瘍血管の超微構造

松嶋典彦

The ultrastructure of the tumor vessels and the angioarchitecture in experimentally induced carcinoma of the tongue

Tsunchiko MATSUSHIMA

緒 言

癌の化学療法において制癌剤の腫瘍局所到達性^{1,2)}を高めたり、放射線療法において十分な酸素効果³⁾を期待する上で、癌を栄養する血管の分布、走行、形態、性状などを把握することは重要なことである。また最近再び注目を集めている温熱療法⁴⁻⁶⁾においても、腫瘍内循環の果たす役割は大きいものと思われる。

腫瘍血管は以前より注目され、胃癌・大腸癌など⁷⁻¹¹⁾についてはかなり研究されているが、口腔癌^{12,13)}についての報告は極めて少ないようである。著者は口腔癌の血管構築の解明を試みたが、臨床例において十分にそれを観察することは手法上極めて困難である。そこで、ハムスターの 9, 10-dimethyl-1, 2-benzanthracene (以下 DMBA) による実験的発生舌癌^{14,15)} について血管構築の観察を行った。

特に、正常粘膜の固有層の血管から腫瘍血管への移行や、腫瘍細胞との関係などを検討して、腫瘍血管の特徴を把握するために、正常粘膜から発癌に至るまでの血管構築の変化を段階的に追跡した。また、透過電顕により腫瘍血管の超微形態上の特性の検討と、走査電顕による腫瘍血管内腔の立体的観察も行った。

材料および方法

1. 材 料

実験動物は、生後 5 週の雄ゴールデン・ハムスター 60

九州大学歯学部口腔外科学教室第 1 講座 (主任：田代英雄教授)

First Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry, Kyushu University (Chief: Prof. Hideo Tashiro)

九州大学歯学部口腔解剖学教室第 1 講座 (主任：長谷川一夫教授)

First Department of Oral Anatomy, Faculty of Dentistry, Kyushu University (Chief: Prof. Kazuo Hasegawa)

受付日：昭和 56 年 9 月 18 日

頭を用いた。光顕用に 45 頭、走査電顕用に 3 頭および透過電顕用に 12 頭を用いた。

2. 発癌操作

発癌剤は 0.5% DMBA アセトン溶液とし、週 6 回エーテル麻酔下に舌左側縁中 1/3 部に塗布した。DMBA 塗布後経時的 (1 週ないし 2 週間隔) にハムスターを屠殺し標本を作製した。実験期間は塗布開始より 30 週である。

3. 光顕標本作製法

光顕的に血管構築を把握するために、墨汁注入標本¹⁶⁾を作製した。作製法は、まずハムスターをエーテル麻酔下に開胸し、左心室より 5% セラチン添加墨汁を注入後、セラチンが完全に硬化したのを確認した後、舌根より舌を注意深く切離し 10% 中性フォルマリンで固定した。その後水洗・エタノール脱水系列を経た後舌をセロイジンに包埋した。ブロックは舌尖より舌根にかけて前額断に 200 μ の厚切りの連続切片とし、これを Spalteholz 氏透明標本¹²⁾とした。また随所に 10 μ の薄切切片を入れヘマトキシリン・エオジン染色用の標本とした。200 μ の厚切り透明標本で血管構築を、また 10 μ の薄切染色標本で同部の組織学的検索を行った。

4. レジン鑄型標本作製法¹⁷⁻¹⁹⁾

ハムスターをエーテル麻酔下に開胸し、左心室より大動脈弓までテフロン・チューブを挿入し、これを結紮固定し、生食水で血液を灌流させたのち常温重合レジン (Mercor) を強圧をかけずに注入した。舌がレジンの色を帯びさらにレジンが心臓に還流してきた時点を、注入終了の目安とした。レジンの硬化後、注意深く舌根部より舌を切離し、20% KOH に 1 か月浸漬し周囲軟組織を腐蝕除去した。次に生食水で数回洗浄後鑄型標本を凍結乾燥させ、毛細血管鑄型標本を完成させた。この標本を実体顕微鏡下に切り出し、金蒸着を施した後走査電子顕微鏡 (Hitachi S-430) で観察した。撮影条件は、加速電圧 20 Kv、倍率 30~300 倍、フィルムはネオパン SS を使用した。

5. 透過電顕標本作製法

左側舌縁病巣部を注意深く細切し、Karnovsky 固定液で前固定 1.5 時間、1% オスミック酸で後固定 1 時間を

施しエタノール系列で脱水した後エポン 812 に包埋した。超薄切した切片は、ウラン・鉛二重染色を施した後透過電子顕微鏡 (Hitachi H-500) で観察した。

結 果

1. DMBA 塗布後の肉眼所見

DMBA を反復塗布すると、早いものでは3週目より処置部の粘膜は粗糙になり白色調が目立つようになり、このような粘膜表面の変化は遅くとも5週目までに出現した。またこの時期、おもに白斑の中に散在性に時に集合性に、数個の白色ないし灰黄白色の点状隆起がみられるものが多かった。その後早いものでは10週頃より、一般には14週以降に上皮性ポリープないし乳頭腫様の腫瘍が形成された。粘膜表面に潰瘍・硬結が生じたり、腫瘍の急速な成長や、全身的に高度なうそが認められ、明らかに癌を思わせるのは処置後20週からであり30週までにすべて癌が発生した。

2. 肉眼所見と組織所見との関連

DMBA 塗布後2週目までは、舌粘膜は肉眼的・組織学的に正常粘膜であった。3週目を境に一部の症例に白板症様の粘膜表面病変が出現し、これらのうち処置後3週より12週までの早期群においては組織学的に良性過角化症であった。この場合若干の上皮脚の延長はあっても、過角化がその主たる所見であるものは、すべてこの分類に含めた。11週以後16週目までの群ではほとんどの症例に、上皮の過角化性変化に加え層構造の乱れ、異常角化などの異角化性変化がみられ、異型上皮の所見を示した。また14週目と16週目の症例の一部に構造異型・細胞異型ともに高度であり下方への浸潤傾向を示さないものがあり、これらは高度異型上皮ないし上皮内癌とみなされるものであった。このような所見を呈するものは30週目の症例でもみられ、この場合は外向性発育を示す癌に近接する口底よりの舌粘膜に認められた。

外向発育型の腫瘍では、10週目の症例の舌側歯肉に上皮性ポリープの発生をみたほかは、すべて乳頭腫あるいは扁平上皮癌であった。乳頭腫と診断した14週目の症例は、口底より舌側歯肉にわたる領域よりポリープ状に発育するものであった。典型的な乳頭腫様発育を示すものは、18週目の左側舌縁より口底・舌側歯肉にわたる領域に発生したものであった。

癌と診断したものは一般に20週以後に出現したが、16週目にみられた1症例は早期浸潤癌と思われるものであった。ほとんどのものは外向性発育を呈したが、27週目の1症例のみは潰瘍硬結型であった。

3. 上皮の組織学的変化と血管変化との関連

a. 正常上皮における血管構築 (写真 1, 2)

舌縁上部より舌背にわたる領域は糸状乳頭が存在し角化の比較的高度な部位である。上皮脚の発達は良く、間

質乳頭内にはそれぞれ1本ずつ正常ヘアピン様ないし1回ねん転型ヘアピン様毛細血管ループが侵入している。一方、今回観察の対象とした舌縁下部より口底にわたる領域は、舌乳頭のみられない角化の弱い粘膜上皮で被われ上皮脚の発達も弱い部位である。ゆえに上皮と固有層との界面は、比較的平坦な様相を呈する。粘膜固有層内の血管はおおむねこの界面に対し平行に走り、上皮に近接している血管群と舌筋上方を平行に走る血管群とから構成されている。これら平行に走る血管は所々で互いに吻合枝により連絡している。上皮に近接して走る血管の場合、なだらかに上皮に対し平行に走るが、所々に不完全型のループ形成がみられる。つまり、粘膜表面に対し平行な面上で、二次元的な広がりをもつ血管網を形成しているといえる。血管内径はほぼ均一でばらつきも少ない。また粘膜下の血管密度は舌筋内を縦横に走る毛細血管と比較するとはるかに低い状態にある。

b. 良性過角化症における血管構築 (写真 3, 4)

既存毛細血管網より上皮方向へ血管ループの立ち上がりが見られ始める。しかし、この時期はまだ有棘細胞層の肥厚が著明にみられないために間質乳頭としての形態が明らかではない。よってループを形成したとしても不完全型である。過形成のみみられる上皮下の毛細血管は一般的に拡張傾向にあるが、特に舌筋群上方を横走る血管の拡張の方が著明である。血管密度は上昇傾向にある。

c. 異型上皮における血管構築 (写真 5, 6)

粘膜固有層内の毛細血管網よりヘアピン様毛細血管ループが粘膜表面へ向けて伸長し、過形成のみみられる上皮に対し垂直位をとり櫛状配列を示すようになる。毛細血管ループは間質乳頭の上部までくまなく侵入するために、上皮脚の発達が良く下方へ十分に伸びているものほどそれに対応して毛細血管ループもその基底部より先端までの長さが伸びる。上皮脚がさほど下方へ伸びていない場合でも、ループ状毛細血管の立ち上がりの兆しが見られ始める。このように異型上皮直下の血管走行は、糸状乳頭部の血管構築に類似してくるといえる。毛細血管内径は、健側ならびに病巣周囲の既存毛細血管と比較すると明らかに拡張している。全体的に内径の拡張がみられるが、そのばらつきも大きく内径が不規則であるために全般的にふしくれだてみえる。特に拡張の強い箇所では静脈瘤様にみえることがある。このような拡張部は、ループ先端付近にみられることが多いようである。

d. 高度異型上皮における血管構築 (写真 7, 8)

上皮直下を横走る血管網より種々の形態をなす毛細血管ループが上皮内に侵入する。上皮が複雑に重複しているために、上皮内の毛細血管ループも粘膜表面に対し垂直位を示す成分のみならず水平位をとる成分も多くなり、Y字型ループやねん転の頻繁なループを形作ったり総じて高度な変化を示すようになる。単純なヘアピン様

ループはほとんどみられない。毛細血管は上皮内に豊富に侵入し、上皮のかなり上方まで達するし、縦横に走るために上皮内の血管密度は高いものになっている。上皮内では1本の血管とごくわずかな結合織を芯にして間質を形成し、その周囲を同心円状に viable な上皮細胞が配列するために、正常な上皮の層構造は完全に失われ、しかも上皮細胞はほとんど viable な状態を示す。また上皮内各所には、単一細胞角化や角質真珠の形成などがみられ異角化が著明に認められる。

e. 上皮性ポリープ・乳頭腫における血管構築

上皮性ポリープ・乳頭腫いずれでも、血管構築の面からは同様の所見を呈するものと思われる。1本の比較的内径の大きな主幹血管が腫瘍外表面方向に走り、その経過中各所において放射状に外方へ分枝を送る。それらはそのまま、あるいはさらに分岐をくり返し最終的にはその末梢枝は腫瘍間質乳頭内に深く侵入する。このような樹枝状血管構築が上皮性ポリープ・乳頭腫の際の基本単位であると考えられる(写真9)。

これら分枝血管の末端は静脈瘤様あるいは数珠状に拡張していることが多く、火花が散ったような感を与えるのが特徴である。一部その数珠状拡張部より、鹿の角状あるいは指状の突起が腫瘍表面方向へ伸びている像もみられる。乳頭腫の場合全般的に比較的大きな血管から構築されており、細い血管による蜂巣状血管網の形成はみられない。また血管内径は比較的大きいが、その構築がそれほど密でないために血管密度は中等度となっている。腫瘍径が大きくなるにしたがい血管密度は低下してくる。

f. 癌における血管構築

1) 外向発育部(写真10)

この部分は、いわゆる癌固有間質を形成しているところである。癌固有間質内には通常次の3種の血管群が認められる。

(α) 乳頭腫にみられるような、腫瘍基部より腫瘍外表面方向に放射状に固有間質を貫いて腫瘍上皮下に達する血管群(写真11)。

(β) 癌固有間質内で、塊状・球状あるいは島状をなす比較的大きな癌胞巣の表面をとりまく血管群(写真12)。

(γ) 癌固有間質内を、細網状に分岐走行し、蜂巣状血管網を形成する血管群(写真13)。

癌固有間質の発達の程度により、これら3種の血管群はその構成量比に変化をきたしてくる。間質の発達が良好な腫瘍では各血管群の発達も良いようである。ことに(γ)群の発達が著明となり、腫瘍内血管密度は高くなっている(写真14-a)。一方、間質内に多量の癌胞巣が形成され、相対的に間質が乏しくなってくると(β)群が優勢となり、(γ)群が減少してくるために腫瘍内血管密度は低下してくる。ことに癌固有間質を癌胞巣がほ

とんど満たしているような腫瘍では、各血管群すべてに減少がみられ血管密度が非常に低い腫瘍となる(写真14-b)。

血管内径については、良性腫瘍におけると同様に、癌においても明らかに内径の大きな血管が認められる。また走行中に内径が不規則に変化するために、ふしくれた奇様な像を呈する。(α)群の血管内径は、他の2群のそれに比べはるかに大きなものである。またこの血管群は末端部で異常な拡張がみられることが多く、静脈瘤様あるいは数珠状に観察される。この数珠状膨大部では時に墨汁が血管外に認められ、血管壁の構造上的特異性が示唆される。

2) 内方浸潤部

この部分は腫瘍細胞の浸潤により、既存正常組織が破壊をうけ、偶然間質が形成されるとともに、正常組織におけるとは全く異なる毛細血管網が再構築されている。この部分はほとんど大数多数の癌胞巣により占められていることが多く、間質の発達は不良である。そのためこの部で認められる血管型は癌胞巣表面をとりまく血管群(β群)が主体であり、残りはβ群間の間質を網状に走る血管群(γ群)が少量みられるのみである。また外向発育部に認められたα群は全く認められず、そのため外向発育部の血管構築は樹枝状構築が主体であったのに反し、内方浸潤部ではβ群が主体をなすため、いわばシャボン玉状血管構築として認められる(写真15)。また血管がシャボン玉状構築をとっているために、血管密度は低くなっている。

正常組織との境界部では、癌細胞の浸潤方向に一致して走行する既存毛細血管は比較的保存されている。そしてこの保存された既存毛細血管群の間に、肥大発育型の癌胞巣より続発性に生じたと思われる癌細胞の小集団がしばしば認められる。つまり、このような正常組織との境界部では、癌実質はいわゆる簇出発育型を示すといえる。そのためこのような部位では、正常組織より肥大発育型癌胞巣の方に向かう柵状血管網として認められる(写真16)。一方、球状の癌胞巣をなし、肥大発育性に周囲健全組織と明瞭に境している部位では、β群に相当すると思われる血管が著明に拡張しているのが認められる。

4. 腫瘍血管の超微形態的所見

a. 一般的所見

1) 内皮細胞

最も特徴的な所見は、luminal process の存在である。これには一部 marginal fold の延長したものも認められるが、ほとんどのものは内皮細胞管腔側全域より管腔へ向けて、指状・波状・渦状などの突起を突き出しているのが認められる(写真17)。腫瘍血管によっては、luminal process を多数有するものもあれば、極めて luminal process に乏しいものまで種々の変異がみられる。

正常毛細血管では、内皮細胞は扁平な形態をとり、核のあるところにしても軽度管腔側へ隆起しているにすぎない。このため、正常毛細血管の管腔断面は比較的平滑な類円形を呈している。ところが腫瘍血管では、核領域が立方円柱状に管腔側へ立ち上がっているものが多く、核のない部分でも正常毛細血管に比べ厚くなる傾向にある(写真18)。よって腫瘍血管の管腔断面は、星状形態など不規則な内面を形作ることが多い。

管腔は多数の内皮細胞の連続よりなるものが多く、あるものでは10個以上の内皮細胞からなるものも認められる。各胞体は明調を示すものから暗調を示すものまで、種々の電子密度のものが認められることがある(写真19, 24)。

細胞内小器官に関しては、その量・構造に特別な異常は認められず、特殊な構造物の存在も確認できない。mitochondria は粗面小胞体に近接して存在するものが多い。粗面小胞体は比較的発達しているようである。pinocytotic vesicle はすべての腫瘍血管に認められるが、特に肥大を示す内皮細胞にはより著明に観察される。

2) pericyte

内皮細胞基底膜外側に、扁平な細胞として存在する。pinocytotic vesicle は間質側に局在していることが多い。また、胞体内には細胞内線維が豊富に認められる(写真18~20)。

b. 腫瘍血管の形態分類

毛細血管の形態分類については、従来より内皮細胞の形態的特徴から分類を行っているものが多い²⁰⁻²²⁾。今回の腫瘍血管の形態分類に当たっては、Bennett ら²⁰⁾の分類に準じた。

1) fenestrated type (写真21, 22)

この種の血管は癌巣側に近接する腫瘍血管に特徴的に観察される。癌巣側の血管内皮細胞は全体的に扁平で菲薄であり、癌巣側に限って所々に fenestration がみられる。また、癌巣側では一般に単一の内皮細胞からなっていることが多いために、junction 形成はあまり観察されない。しかし、まれにみられる junction は胞体が扁平であるために直線的な経過をとり、しかも junction 部の間隔は広く open channel のような状態を呈する。基底膜は所々で多層化がみられたり、あるいは不明瞭な場合もあるが、概して連続性であるといえる。pericyte はあるものとないものがあり、pericyte の観察される場合でも、その存在領域はわずかなものである。

2) continuous type

この種の血管は癌巣から離れた腫瘍間質中に認められる。内径の大きさと内皮細胞の肥大の有無により、ほぼ3種の血管に分類される。

a) 内径が比較的大きく、内皮細胞に肥大がみられる

もの(写真23)

正常毛細血管であれば、核領域以外の細胞質は扁平で菲薄な形態を示すのであるが、この種の血管では、肥大した内皮細胞からなり非常に異常な形態をとっている。高度に肥大した内皮細胞からなる血管では、管腔を狭窄してしまうほどのものもある。luminal process の発達には中等度で、疣状・短楕状の突起が主体である。内皮細胞は、所々管腔より内皮細胞基底方向にくびれが生じ、そのような箇所では隣接内皮細胞と junction を形成することが比較的多い。

b) 内径が比較的大きく、内皮細胞に肥大がみられないもの(写真24)

この種の血管は、電子密度がそれぞれ異なる多数の内皮細胞の連続からなる。

c) 内径が比較的小さなもの(写真25)

この種の血管は、数個の内皮細胞の連続からなり、それら内皮細胞の電子密度に変化はみられない。

5. 腫瘍血管の立体的観察所見

腫瘍血管は、分枝・吻合を繰り返し複雑な閉鎖循環経路を形成していた。腫瘍血管末端部では、隣接血管との吻合あるいはループ形成はあまり認められず、多くは単独で指状に腫瘍発育表面へ伸長し終末を形成していた(写真26)。末端部の一部の箇所では、ループ先端より鹿の角状突起が伸長したり、これら突起がまさに接触吻合しループを形成しようとしている像も認められた(写真27)。またある部位では、末端が小球状の集団塊をなしかリフラワー様にみえるところもあった(写真28)。

高倍の観察では、血管内腔面形態は平滑な性状を示さないことが多く、小窩や突起が頻繁に認められた(写真27)。

考 察

1. DMBA 塗布による癌形成過程について

本実験では、小田島らの報告¹⁵⁾による週6回 DMBA 塗布法を採用した。DMBA 塗布に際し、擦過処置は施さなかった。理由は、感染等の因子を除外するためと、既存の間質血管系への直接的な外傷を避けるためである。

藤田ら²³⁾は、舌癌の形成過程を、1)初期、2)びまん性増生期、3)乳頭腫形成期、4)癌形成期に分類している。今回著者による発癌実験での組織学的分類において、正常上皮は藤田らの初期に、良性過角化症・異型上皮・高度異型上皮はびまん性増生期に、上皮性ポリプ・乳頭腫は乳頭腫形成期に、また癌は癌形成期に相当するものと考えられる。各段階の出現時期には、多少ずれを認めるものの、発癌過程の流れにおいて共通性がみられる。本実験においても、先人の所見と同じように、上皮性ポリプあるいは乳頭腫という段階を踏んで癌化するものがほとんどであり、外向発育はほとんど示さず

に内方浸潤だけを示す型は非常にまれであった。一方、舌癌臨床症例で経験するものは潰瘍硬結型が多く、本実験で観察されるような外向発育形態を示すものは比較的少ないようである。

2. 上皮の構造変化と間質ならびに血管構築との関連について

a. 正常上皮より良性過角化症への移行

良性過角化症では単に角化層の増生がみられるのみであり、一部軽度の上皮脚の延長が認められるにすぎない。一応この段階までは、発癌剤の刺激に対する反応性の上皮細胞の増殖機転の亢進として考えられる。Sekibaら¹⁰⁾は、子宮頸部の非特異性炎症において肉眼下の赤点に対応するものとして、ヘアピン様構造の protruding vessel を報告している。良性過角化症における、間質乳頭内へ侵入するヘアピン様毛細血管ループは、この protruding vessel に相当するものと考えられる。

b. 良性過角化症より異型上皮ないし高度異型上皮への移行

この移行時期においては、上皮細胞の増殖はますます旺盛になり、上皮脚の間質方向への伸長が優勢になってくる。そこで間質の方向より、上皮と間質との界面の形態を観察すると、基底細胞層は増殖のために必要な酸素・栄養を十分かつ効率よく獲得するために、その表面積を増しているのが観察される。そのため、この際の上皮の構造変化を、単に上皮細胞の過度の増殖による間質方向へのはみ出しとして把握するのみではなく、酸素・栄養獲得のための上皮細胞の active migration^{24,25)}によるものとも考える必要があると思われる。

この段階での血管構築は既存血管網よりの毛細血管ループの立ち上がりとして表現しうるが、この現象は上皮の下方への増殖の結果による相対的な所産ではないと考えられる。なぜなら、既存血管網が下方へ圧排されている所見は全く認められず、比較的正常な構築を保つ血管網より毛細血管ループが伸長しているからである。このように考えるならば、毛細血管ループが伸長するためには、基底細胞層と既存血管網との間の間質結合組織の増大あるいは、上皮構造変化に対応した間質形態の随伴性変化が必要となろう。

c. 上皮性ポリープ・乳頭腫への移行

この種の外向発育型腫瘍では、既存血管網より腫瘍外表方向へ主幹血管が伸び、それらの末梢枝は各間質乳頭内に入り込んでいる。間質増生量と上皮増生量との量的関係により、上皮性ポリープより乳頭腫までの病態像の移行が観察される。この場合、間質増生と血管誘導が、その腫瘍の外向発育形態に寄与していることは疑いのないところである。乳頭腫にしてもその発育中心が上皮に優位ではあるものの、若干の結合組織ならびに毛細血管を芯にして間質乳頭を形成している点から、外向発育に際しては、間質・毛細血管の新生^{26,27)}が重要な因子であ

ると考えられる。

また、この種の腫瘍においては、腫瘍発育方向に沿って線維芽細胞²⁸⁾やコラーゲン線維が豊富に認められ、間質産生が活発であることがうかがわれる。したがって、この時期の旺盛な間質産生様式から、上皮成分より何らかの growth factor²⁹⁾が間質および血管へ活発に放出されていると考えられる。Folkman^{30,31)}が in vitro および in vivo での実験で示唆している TAF という growth factor は、癌のみならず乳頭腫様病変においても放出されているのであろう。

とにかく、乳頭腫様病変における間質・血管の態度は、新生現象³²⁾として把握しうるように思われる。血管新生現象は、胎生期における未分化間葉細胞の接合による形式ではなく、創傷治癒^{33,34)}・移植片生着時^{35,36)}におけるような出芽現象によるものと考えられる。

d. 癌への移行

小林¹³⁾は、DMBA 誘発ハムスター舌癌において血管構築の観察を行っている。それによると、癌形成期の Microangiogram は、いわゆる tumor-stain 像を呈し、腫瘍内の血管の拡張や蛇行、彎曲といった走行異常と血管分布密度の増加が著明であるとしている。今回の実験結果からも、ほぼ同様の所見を得ることができた。著者は、腫瘍血管をその走行と分布形式により 3 群に分類し、腫瘍細胞や腫瘍間質との関連から若干の考察を加える。

1) 外向発育部

乳頭腫様病変において観察されたような、腫瘍基底より放射状に走る血管 (α 群) は、癌の外向発育時の中心的役割を担っているといってもさしつかえないくらい重要な要素であろうと考えられる。癌胞巣周囲をとりまく血管 (β 群) は、その胞巣を形成する癌細胞の酸素・栄養供給を担っていると思われる。この場合、間質中を移動しているであろうと思われる単一あるいは数個の癌細胞よりなる小集団には血管の誘導がみられない。これら小集団の細胞配列には、球状形態をなす肥大発育型胞巣にみられるような規則的な層構造は認められず、しかもすべての細胞は viable な状態を示している。次第に胞巣を構成する細胞数が増加するにしたがい、球状胞巣を形成してくるとともに、血管 (β 群) による胞巣の囲繞が認められる。この種の胞巣では、血管に近接する細胞層のみ viable な様相を呈し、胞巣の内方領域は次第に nonviable となり、かなり胞巣の径を増すにつれて中心部は壊死の状態に陥ってくる。このような球状胞巣の形成は、効果的なガス交換や、栄養吸収・老廃物の排泄が円滑に進行する上で、好都合な形態をなしているように思われる。

酸素供給の面から考えると、理論上酸素到達域は血管より 180μ の範囲とされている³⁷⁾。この点からも、比較的大きな胞巣を形成する細胞群が viable な様相を呈し

cell cycle³⁸⁾を回るには、胞巣への血管誘導が必要なのであろう。酸素到達領域外の低酸素状態の細胞³⁹⁾は、cell cycleからはずれ漸次定寿命細胞³⁹⁾に組み込まれていき壊死領域へ集積するものと思われる。

2) 内方浸潤部

本実験での症例においては、びまん性に浸潤する型はまれであり、ほとんどのものは肥大発育型の癌胞巣を形成し、周囲結締組織と比較的明瞭に区画されていた。しかし胞巣は比較的那層構造を保ち、大きな胞巣になるとその中心部は角化性変化あるいは壊死性変化をきたしていた。つまり、高分化型癌の所見を示すものであった。この形式は、一旦乳頭腫様病変が形成され、その後上皮の一部に癌性変化をきたし内方浸潤を開始すると考えられるこの種の発癌実験モデルの特徴といえるかもしれない。

簇性浸潤形態を示す箇所では、正常組織側より肥大発育型胞巣へ向けて柵状血管が認められたが、この種の血管は新生血管とは考えにくいように思われる。というのは、一見していわゆる腫瘍血管のように内径が大小不同で走行が不規則であるということがなく、正常血管のように均一な内径の血管が規則正しい配列をしているからである。また実際、周囲に残存している舌筋毛細血管と対比してみると、柵状血管内径は舌筋毛細血管のそれと同じであり、走行に関しても浸潤方向に一致しない既存毛細血管成分のみが消去された配列様式をとっている。このことは、癌細胞浸潤に際して一種の障壁の働きををすると思われる血管成分にのみ侵襲⁴⁰⁾が起こり、比較的浸潤方向に一致をみる血管成分は温存されるために柵状血管配列を示すものと考えられる。しかも、この保存された柵状血管を利用した形で、当初癌細胞の移動が起こるものと想像される。

3. 腫瘍血管の超微形態について

a. luminal process について

内皮細胞自由表面に認められる扁平なヒダ状の突起について、Long⁹⁾はluminal processと表現し、Ang¹⁰⁾はpinocytotic processと命名しているが、ともに腫瘍血管における物質の大量輸送形態に関与しているものであろうと述べている。

今回の所見からも、突起先端部が波状・渦状に屈曲し血漿成分を包み込むような様相を呈したり、先端部が管腔表面と癒合し大きなvacuoleを形成しているのが観察された⁴¹⁾。また、この付近の内皮細胞胞体内には、これらの突起の取り込みによるものと思われるvacuoleを認めた。さらにvacuole中のfuzzy materialは電子密度の上から血漿成分であるように思われることより、これら一連の過程はやはり、luminal processの飲細胞運動による血漿成分の管外輸送形態を示しているものと理解される。

腫瘍血管は内径が大きいことに加え、luminal process

が存在することにより、辺縁血漿流の緩徐化を起こし、物質交換の能率を高めているのであろうと想像される。

b. junction 形態について

腫瘍血管の場合、内皮細胞の形態と同様にjunction形態も多様性をおびている。

junctionは直線的で短いものも認められるが、特にcontinuous typeの血管で内皮細胞に肥大のみられるものでは、junction形態がS状をなしたり屈曲・蛇行が強く複雑な経路を示すものが多く認められた。このために隣接内皮細胞間の接触面積はかなり広がっているものと思われる。また、junction付近の内皮細胞胞体中には、円形・楕円形を示す明らかに隣接内皮細胞の細胞質突起と思われる断面像が観察された。このことは、このような部分では内皮細胞間の結合は隣接内皮細胞の細胞質突起の複雑な絡み合いにより、いわば門のような状態を呈しているものと思われる。

このような複雑で経過の長いjunction形態では、正常毛細血管内皮細胞に比し、junction部を介しての物質輸送能率は低下しているものと思われる。今のところ、なぜこのような形態をとるのか疑問が残るところである。

一方、fenestrated typeの血管では、胞巣側のjunctionは比較的直線的で単純な形態をとっており、しかも接着斑も認められずopen channelの様相を呈していた⁹⁾。これは上皮細胞への栄養・酸素供給にとって、比較的自由な物質輸送通路を提供しているものと解される。

c. 内皮細胞間の電子密度の差について

癌細胞間では細胞質電子密度に差がみられることがあり、明調・暗調細胞として報告されている⁴²⁾。一般的には、細胞質中に多量のribosomeが存在することにより、電子密度が高くなると考えられている。また、ribosomeの密度が高いことのはかに、mitochondriaのmatrixの電子密度が高いことも、細胞を暗調にする要因ではないかとするものもある。さらに矢代ら⁴³⁾は、これら明・暗2種類の細胞はともに変性細胞であろうとの解釈を加えている。いずれにしても、細胞内小器官特にribosomeの量あるいは細胞内小器官の特性が関与しているものとみられている。

今回、腫瘍血管内皮細胞で観察した明調・暗調細胞を比較してみると、ribosome、mitochondriaなどの細胞内小器官の量には大差なく、また変性所見も認めることができなかった。明調細胞においては暗調細胞に比し、細胞質基質中の線維性成分(microfilament, microtubule)あるいは滑面小胞体が少ないようにみうけられた。しかも、暗調細胞よりも多くのpinocytotic vesicleが内皮細胞全域にわたり、比較的密に存在していた。これらのことより、細胞内小器官の量・性質がその電子密度に影響しているのではなく、むしろ細胞質基質中の線維性成分

・pinocytotic vesicle の量あるいは細胞質基質自体の特性のちがいが反映しているものと思われる。つまり、pinocytotic vesicle の増加により、あるいはその増加が二次的に内皮細胞基質と線維性成分の量・性質に影響を及ぼすことにより、細胞質基質は希薄な状態になり明瞭を呈してくるのであろう。このような解釈に立つと、明暗2種の細胞は癌細胞におけるような変性所見ではなく、むしろともに活発に物質交換を営む細胞であろうと考えられる。

4. 腫瘍血管の立体的観察所見について

光顕所見と走査電顕所見とを合わせて考慮すると、腫瘍血管先端部すなわち血管新生が活発であろうと思われる部位では、新生血管は通常盲管をなして成長するものと思われる。

ところが、カリフラワー様¹⁸⁾の小球状集団塊は、その形態があまりにも明瞭な球形を呈していることから、レジン¹⁹⁾の管外漏出所見としての可能性が強く、また光顕標本においても一部末端で墨汁が血管外に認められたことから、このような箇所では血管壁が脆弱であるか、あるいは血管末端が時に開放性になるのかもしれないと考えられる。

レジン鑄型に刻印された陥凹は形態ならびに大きさより内皮細胞の核領域あるいは管腔側へ突出した内皮細胞胞体の疣状隆起を表し、一方小窩は luminal process に対応するものと解釈される。

5. 腫瘍血管の新生について

腫瘍血管の新生現象は、透明窓²²⁾やウサギの角膜^{27,30)}を利用して動態的に観察されている。なかでも山浦²²⁾は、ラット透明窓に移植性腫瘍 AH 109A を移植することにより、腫瘍血管の動態を経時的に観察し詳細な報告を行っている。それによると血管新生過程はまず毛細血管の静脈瘤様拡張が起り、そこで新生血管芽が形成され、指状の盲管となり隣接する他の血管芽と接触吻合してループを形成するという。ループは拡張し再び静脈瘤様になり、これからまた新生血管が成長し、これらの過程がくり返されることにより新生血管網が形成されると述べている。

今回の腫瘍血管の立体的観察において、ループよりの鹿の角状突起の伸長や、これら突起がまさに接触しようとしている像が観察されたことより、腫瘍血管の新生は山浦の報告したと同様な出芽によるものと推測される。しかし今回、超微形態上内皮細胞にほとんど分裂像がみられなかったことや、ごく短時間で腫瘍のすみずみまで行きわたる血管網が構築される点などから、いわゆる間葉反応による間葉細胞の集合²⁾も腫瘍血管新生過程に関与しているかもしれない。

結 論

ハムスターの実験的舌癌形成過程における血管構築の変化と、癌組織内の腫瘍血管の走査電顕ならびに透過電顕的観察により、腫瘍血管の特性について次の結論を得た。

1. 組織学的に正常粘膜より高度異型上皮までの移行段階における血管構築の変化は、既存毛細血管網よりの毛細血管ループの立ち上がり、内径の拡張として観察された。
2. 乳頭腫あるいは癌外向発育部の血管構築は、いわゆる樹枝状血管構築を基本としていた。
3. 癌内方浸潤部では、癌巣周囲を取り囲む血管群が主体であり、いわゆるシャボン玉状血管構築をとっていた。
4. 癌間質の発達と腫瘍血管の密度とは相関を示し、間質の豊富なものは血管密度は高く、間質の乏しいものは低い傾向を示した。
5. 光顕および走査電顕の観察より、腫瘍血管は盲端をなし、既存毛細血管網より出芽により形成されるものと考えられた。
6. 腫瘍血管は超微構造的に幼若形態を示し、活発に物質交換を営む新生血管であると思われた。

稿を終るに臨み、終始ご懇篤なるご指導とご校閲を賜りました田代英雄教授に深甚なる感謝の意を表します。また種々のご懇篤なるご指導とご校閲を賜りました本学第1口腔解剖学教室、長谷川一夫教授に心から謝意を表します。さらに本研究を行うにあたり、ご教示、ご協力を頂いた本学口腔外科学教室員各位、ならびに本学第1口腔解剖学教室員各位に感謝致します。

本論文の要旨(の一部)は第35回日本口腔科学会総会(東京, 1981)において発表した。

引用文献

- 1) 鈴木磨郎, 堀 勝義, 阿部郁夫, 他: 腫瘍血管の機能的特殊性. 癌と化学療法 6: 287 1979.
- 2) 東 健彦, 土屋雅春, 三島好雄編: 微少循環. 第1版, 中山書店, 東京, 1979, 125頁.
- 3) Kallman, R.F.: The phenomenon of reoxygenation and its implications for fractionated radiotherapy. Radiology 105: 135 1972.
- 4) Hornback, N.B., Shupe, R., Shidnia, H., et al.: Radiation and microwave therapy in the treatment of advanced cancer. Radiology 130: 459 1979.
- 5) Fajardo, L.F., Egbert, B., Marmor, J., et al.: Effects of hyperthermia in a malignant tumor.

- Cancer 45: 613 1980.
- 6) 岡田清己: 癌に対する温熱療法. 医学のあゆみ 107: 391 1978.
 - 7) 桑原大祐: 大腸癌の微細血管構築像に関する研究—とくに血管像基本型と癌の発育に伴う血管像の変遷について—. 医学研究 50: 1 1980.
 - 8) 秋里和夫: 胃癌の微細血管構築に関する研究. 慶応医学 50: 21 1972.
 - 9) Long, D.M.: Capillary ultrastructure and the blood-brain barrier in human malignant brain tumors. J Neurosurg 32: 127 1970.
 - 10) Ang, E.S.: 肺癌毛細血管の電子顕微鏡学的研究. 抗研誌 25: 214 1973.
 - 11) 野村秀洋, 松山金良, 桑原大祐, 他: Borrmann 4 型胃癌の切除胃微細血管構築像について. 鹿大医誌 29: 527 1978.
 - 12) Schmideder, R.u. Noma, H.: Die Gefäßarchitektur des Plattenepithelkarzinoms der Mundhöhle. Dtsch Mund-Kiefer-Gesichts-Chir 1: 4 1977.
 - 13) 小林光道: DMBA 誘発ハムスター舌癌に対する放射線効果の研究. 歯学 68: 700 1980.
 - 14) 藤田浄秀, 賀来 亨, 佐々木元賢, 他: 舌癌の実験的形成に関する研究, 第 1 編, 9, 10-dimethyl-1, 2-benzanthracene の塗布による舌癌の実験的形成. 口科誌 21: 999 1972.
 - 15) 小田島哲世, 藤田浄秀, 賀来 亨, 他: 舌癌形成実験における発癌剤の高頻回塗布による発癌効果について. 日口外誌 25: 523 1979.
 - 16) 木村郁郎, 河西浩一, 西崎良知, 他: 実験的動物癌の血管構築の墨汁注入法による観察. 医学と生物学 77: 217 1968.
 - 17) 田中敬一, 永谷 隆編: 図説 走査電子顕微鏡—生物試料作製法—. 第 1 版, 朝倉書店, 東京, 1980, 133頁.
 - 18) Sekiba, K., Okuda, H., Fukui, H., et al.: A scanning electron microscope study of the fine angioarchitecture of the uterine cervix using a newly established cast formation technique. Obstet Gynecol Surv 34: 823 1979.
 - 19) 岸 好彰, 高橋和人, 横地千恒, 他: 口腔粘膜における毛細管ループの立体的観察 1 舌. 歯基礎誌 17: 178 1975.
 - 20) Bennett, H.S., Luft, J.H., Hampton, J.C.: Morphological classification of vertebrate blood capillaries. Am J Physiol 196: 381 1959.
 - 21) 浜 清: 毛細血管の微細構造. 血液と脈管 3: 561 1972.
 - 22) 藤本 淳, 竹重順夫: 血管内皮の構造と機能. 細胞 4: 2 1972.
 - 23) 藤田浄秀, 賀来 亨, 佐々木元賢, 他: 舌癌の実験的形成に関する研究 第 2 編 舌癌形成過程の組織学的研究. 口科誌 22: 64 1973.
 - 24) Armstrong, P.B., Lackie, J.M.: Studies on intercellular invasion in vitro using rabbit peritoneal neutrophil granulocytes (PMNS) I. Role of contact inhibition of locomotion. J Cell Biol 65: 439 1974.
 - 25) Malech, H.L., Lentz, T.L.: Microfilament in epidermal cancer cells. J Cell Biol 60: 473 1974.
 - 26) 藤田哲也: 癌の生長制御因子としての間質. 癌の臨床 18: 596 1972.
 - 27) Folkman, J., Cotran, R.: Relation of vascular proliferation to tumor growth. Int Rev Exp pathol 16: 207 1976.
 - 28) Philias, R.: Cytoplasmic polarization of periodontal ligament fibroblasts. J Periodont Res 14: 95 1979.
 - 29) Wolf, J.E., Harrison, R.G.: Demonstration and characterization of an epidermal angiogenic factor. J Invest Dermatol 61: 130 1973.
 - 30) Folkman, J.: The vascularization of tumors. Sci Am 234: 58 1976.
 - 31) Folkman, J.: Tumor angiogenesis factor. Cancer Res 34: 2109 1974.
 - 32) 山浦玄嗣: 腫瘍血管の形態と機能に関する実験的研究. 抗研誌 23: 100 1971.
 - 33) 蔵田克彦: 創傷治癒に伴う血管の立体的研究 7. カイウサギの耳介に作った切創部の血管について. 歯科医学 31: 354 1968.
 - 34) 和久勝彦: 創傷治癒に伴う血管の立体的研究 12. 冷凍外科が血管系に及ぼす影響. 日口外誌 24: 198 1978.
 - 35) 樋口 満: 口腔粘膜欠損部への皮膚移植における血管新生に関する実験的研究. 口科誌 29: 82 1980.
 - 36) Converse, J.M., Smahel, J., Ballantyne, D.L., et al.: Inosculation of vessels of skin graft and host bed. A fortuitous encounter. Br J Plast Surg 28: 274 1975.
 - 37) Thomlinson, R.H., Gray, L.H.: The histological structure of some human lung cancer and the possible implication for radiotherapy. Br J Cancer 9: 539 1955.
 - 38) 土屋 純, 前川 正: 細胞回転と化学療法. 癌と化学療法 5: 717 1978.
 - 39) 杉村 隆, 山村雄一編: 癌, 岩波講座現代生物学 15 巻 第 1 版, 岩波書店, 東京, 1979, 248頁.
 - 40) 斎賀 一, 長尾孝一, 松崎 理, 他: 早期胃癌の血管侵襲に関する病理組織学的研究. 癌の臨床 25: 1046 1979.
 - 41) 山田英智: 血管内皮の構造と機能. 血液と脈管 3: 511 1972.
 - 42) 岡田憲彦: 初期口腔癌の電子顕微鏡的研究. 口病誌 42: 140 1975.
 - 43) 矢代昭夫: 実験的皮膚癌の電子顕微鏡的研究. 昭医誌 34: 601 1974.

- 写真 1 正常上皮の固有層における血管構築像 (透明標本, $\times 60$). 粘膜表面に対し平行な面上で二次元的な広がりを示す. I : 舌側歯肉
- 写真 2 写真 1 の組織像 (H-E 染色, $\times 60$). 上皮と固有層との界面は, 比較的平坦な様相を呈する. I : 舌側歯肉
- 写真 3 良性過角化症における血管構築像 (透明標本, $\times 60$). 一部毛細血管ループの立ち上がりがみられる.
- 写真 4 写真 3 の組織像 (H-E 染色, $\times 60$). 上皮の過角化傾向はみられるが, 有棘細胞層の肥厚は著明ではない.
- 写真 5 異型上皮における血管構築像 (透明標本, $\times 60$). 内径の拡張した毛細血管ループが, 粘膜表面へ向けて伸長している. I : 舌側歯肉
- 写真 6 写真 5 の組織像 (H-E 染色, $\times 60$). 上皮には過角化・錯角化がみられ, 上皮脚は下方へ略度延長している. I : 舌側歯肉
- 写真 7 高度異型上皮における血管構築像 (透明標本, $\times 60$). 豊富な毛細血管ループが間質乳頭内に侵入しており, 血管密度は高くなっている. I : 舌側歯肉
- 写真 8 写真 7 の組織像 (H-E 染色, $\times 60$). 上皮は過角化・錯角化ならびに有棘細胞層の肥厚が高度に認められ, 上皮の網構造の乱れが観察される. I : 舌側歯肉
- 写真 9 乳頭腫における血管構築像 (透明標本, $\times 7$). 主幹血管が腫瘍外表面方向に走り, それから放射状に分枝血管を出すために, いわゆる樹枝状血管構築として認められる.
- 写真 10 癌外向発育部における血管構築像 (透明標本, $\times 7$). 腫瘍外表面方向に放射状に走る血管群 (α 群), 胞巣表面をとりまく血管群 (β 群), および間質内を蜂巣状に走る血管群 (γ 群) が観察される.
- 写真 11 α 群の拡大像 (透明標本, $\times 50$). 内径の大きな血管であり, 末端部での静脈瘤様拡張が特徴的である.
- 写真 12 β 群の拡大像 (透明標本, $\times 50$). 球状の癌胞巣の形成がみられ, その表面に β 群の誘導が認められる.
- 写真 13 γ 群の拡大像 (透明標本, $\times 50$). 癌胞巣間の間質には, 蜂巣状血管網として γ 群が認められる.
- 写真 14-a 癌固有間質の豊富な腫瘍 (透明標本, $\times 7$) α 群, β 群および γ 群すべての血管は良く発達しており, hypervascularized tumor の観を呈している.
- 写真 14-b 癌固有間質の乏しい腫瘍 (透明標本, $\times 7$). 腫瘍血管の発達が不良で, hypovascularized tumor となっている.
- 写真 15 癌内方浸潤部における血管構築像 (透明標本, $\times 7$). この症例は, 潰瘍硬結型の舌癌であり, 浸潤部は多量の癌胞巣により占められている. 腫瘍血管は β 群が主体であり, いわゆるシャボン玉状血管構築として認められる.
- 写真 16 癌組織と正常組織との境界部 (透明標本, $\times 50$). 簇出性発育を示すところでは, 正常組織より胞巣に向けて柵状の血管構築 (矢印) を形成している.
- 写真 17 腫瘍血管内皮細胞 ($\times 16,000$). 指状あるいは波状形態をした luminal process (LP) が管腔へ突出している.
- 写真 18 腫瘍血管内皮細胞と pericyte ($\times 13,000$). 左側の内皮細胞のように, 核のあるところでは特に管腔側への内皮細胞の立ち上がりが著明である. pericyte は, 扁平な細胞として認められ, pinocytotic vesicle は間質側に多く観察される.
- 写真 19 腫瘍血管内皮細胞と pericyte ($\times 10,000$). 電子密度がそれぞれ異なる種々の形態をなす内皮細胞が, junction を介して連続しているのが認められる.
- 写真 20 腫瘍血管内皮細胞と pericyte ($\times 14,000$). 内皮細胞の細胞質は明調を呈し, 多数の pinocytotic vesicle が散在している. 内皮細胞基底膜外側では, 部分的に数層の pericyte による囲繞が観察される.
- 写真 21 fenestrated type の腫瘍血管 ($\times 6,000$). 癌胞巣に近接する側の内皮細胞は, 全体的に菲薄であり所々 fenestration がみられる. 内皮細胞の核は, 癌胞巣に近接しない部位に認められる.
- 写真 22 fenestrated type の腫瘍血管 ($\times 14,000$). 癌胞巣に近接するにしたがい, 内皮細胞は非常に扁平化し部分的に fenestration が認められる. 挿入写真: fenestration 部の拡大 ($\times 42,000$).
- 写真 23 continuous type の腫瘍血管 ($\times 10,000$). 内皮細胞は高度に肥大し, 管腔を狭窄してしまうほどである.
- 写真 24 continuous type の腫瘍血管 ($\times 24,000$). この腫瘍血管は, 電子密度がそれぞれ異なる内皮細胞からなっている.
- 写真 25 continuous type の腫瘍血管 ($\times 13,000$). 正常毛細血管に比較的近似した構造をとっているが, 内皮細胞が所々こぶ状に管腔側へ隆起しているのが特徴的である.
- 写真 26 腫瘍血管の立体的観察所見 ($\times 30$). 盲管をなして腫瘍外表面方向に走っているのが認められる.
- 写真 27 腫瘍血管の立体的観察所見 ($\times 300$). 隣接の腫瘍血管同士が, 接触・吻合しようとしていると解される像. また鋳型表面には陥凹 (◀) や小窩 (◀) が認められる.
- 写真 28 腫瘍血管の立体的観察所見 ($\times 90$). 腫瘍血管末端部は, 球状に拡張している.

23

24