両側性（多発性）顎下腺唾石症の3症例

木下靖朗・高田良彦・神谷祐二

三原 学・稲本 浩

Bilateral (multiple) submandibular sialolithiasis: Report of three cases

Yasuo KINOSHITA・Yoshihiko TAKADA・Yuji KAMIYA

Manabu MIHARA・Hiroshi INAMOTO

はじめに

唾石症は、しばしば遭遇する疾患で、それに関連した報告は数多い。しかし両側に生じた唾石症の報告は比較的少ない。

最近、わたくしたちは両側の顎下腺管と両側の顎下腺体におおの1個ずつ、計4個の唾石の形成をみた症例、両側の顎下腺管におおの1個ずつ、計2個の唾石の形成をみた症例および左側顎下腺管に1個、右側顎下腺体に1個、約2個の唾石の形成をみた症例を経験したので、文献的考察をあわせて報告する。

症 例

症例1

患 者：65歳 女性。

初 診：昭和57年6月

主 訴：左側舌下部の腫脹。

家族歴：特記事項なし。

既往歴：昭和42年より高血圧症のため治療を継続しており、さらに昭和57年3月より左側上腕筋肉周囲炎のため理学療法を継続している。

現病歴：昭和56年1月頃より左側舌下部の腫脹に気付き某内科を受診、抗生剤の投与を受け、1か月後一時的に腫脹は消退したが、その後再発をきたし、再び抗生剤投与を受けたが腫脹は消退しないため当科に来院した。

現 症：全身所見は体格、栄養ともに中等度で、血圧は150/80 mmHg に control されており、ほかに特記所見はみられなかった。

写真1 症例1：口腔内写真

局所所見は顔貌、顎下部ともに特に異常を認めず、顎下リンパ節は両側ともに小指頭大のものを1つずつ触知し、可動性で圧痛を認めなかった。口腔内は左側舌下部に小指頭大の腫脹と発赤を認め、触診により硬固物を触れるとともに圧痛を訴え、圧迫すると顎下腺開口部より排膿がみられた（写真1）。

X線所見ではオルソパントモグラムにて、左側顎下腺管相当部に小指頭大、および右側顎下腺体部に大豆大の不透過像を認めた。また咬合型X線写真では右側顎下腺管にも米粒大の不透過像を認めた（写真2, 3）。

臨床検査成績は血液一般検査で、血色素量 14.4 g/dl, ヘマトクリット値41%とわずかな低値を示し、血液生化学検査で、血糖値、ナトリウム、クロール、トリグリセライドがわずかに高値を示したほか、特に異常所見を認めなかった。

臨床診断：左側顎下唾液管炎、両側顎下腺管および右側顎下腺体唾石症。

処置および経過：左側顎下腺唾石は、顎下唾液管炎を呈していたため、抗生剤投与の翌日局所麻酔下にて、唾液管に切開を加え、直下の小指頭大唾石を摘出して、開放創とした。術後経過は順調であった。後日、GE 製 CT/T スキャナーによる右側腺体唾石の位置的確認を試みたところ、左側顎下腺体相当部にも小豆大の CT 値

愛知学院大学歯学部第1口腔外科学教室

(主任：深谷昌彦教授)

First Department of Oro-Maxillo-Facial Surgery,

School of Dentistry, Aichi-Gakuin University

(Chief: Prof. Masahiko Fukaya)

受付日：昭和58年1月25日

写真 2 症例 1 : オルソパントモグラム

写真 3 症例 1 : 咬合型X線写真

写真 5 症例 1 : 咬合型X線写真

写真 6 症例 1 : 摘出唾石

写真 4 症例 1 : CT 所見

の高い石灰化像を認め、さらに咬合型X線写真でも左側顎下腺体に小豆大の唾石を確認することができた(写真4, 5)。したがって本症例は両側の顎下腺管および顎下腺体におのおの1個ずつ計4個の唾石の形成をみた多発性唾石症であった。右側腺管唾石および両側腺体唾石による症状は認められないため、現在経過観察中である。

摘出物所見：重さ 751 mg, 大きさ 17.8×7.4 mm, 表面は粗造で、黄白色棍棒状を呈していた(写真6)。

X線回折所見：日本電子製 JEOL JDX-7 型X線回折装置を使用し、X線回折を試みた結果、本唾石の主成分は Calcium Hydroxide Orthophosphate $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ と一致した。

症例 2

患者：19歳 男性。

初診：昭和57年9月

主 訴：左側顎下部の腫脹。

家族歴：特記事項なし。

既往歴：特記事項なし。

現病歴：昭和57年8月初旬より、左側顎下部に腫脹と拍動性自発痛を覚えたため、9月初旬某歯科を受診し、抗生剤の投与を受け、疼痛の軽減をみたが腫脹の消退をみぬため当科を紹介され来院した。

現 症：全身所見は体格、栄養ともに良好であった。

局所所見は左側顎下部に軽度の腫脹を認め、また圧痛もみられた。左側顎下リンパ節は触知できず、右側顎下リンパ節は小指頭大で可動性のものを1つ触知したが、圧痛は認められなかった。口腔内より右側顎下腺開口部に黄白色の硬固物を認め、左側舌下部顎下腺体移行部付近には発赤を認めた（写真7）。

X線所見ではオルソパントモグラムで、左側第3大臼歯は埋伏し、その直下顎下縁相当部に大豆大の不透過像を認めた。また咬合型X線写真では、右側顎下腺開口部相当付近に米粒大の不透過像を認めた（写真8, 9）。左側顎下腺造影X線写真では、左側唾石が腺管より腺体への移行部に近い管腔内に位置していることが確認された。

臨床検査の結果、血液一般検査で白血球の増多を認め、血液生化学検査では、血糖値のわずかな高値および血清鉄のわずかな低値を認めた。

臨床診断：左側顎下唾液腺炎および両側性顎下腺管唾石症。

処置および経過：初診日より抗生剤を投与、1週間後に局所麻酔下で口腔内より左側唾石を摘出、右側唾石はピンセットにて容易に管孔より摘出できた。術後経過は順調である。

摘出物所見：左側唾石は重さ 274mg、大きさ 7.8×6.0mm、表面は粗造、黄白色でほぼ円形であった。右側唾石は重さ 10mg、大きさ 5.0×1.4mm で、両端は黄白色粗造、中央は黄色で滑沢であった（写真10）。

X線回折所見：左側唾石のX線回折の結果、本唾石の

主成分は Calcium Hydroxide Orthophosphate $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ と一致した。右側唾石は量不足のため、回折不能であった。

症例3

患 者：51歳 男性。

写真 8 症例 2：オルソパントモグラム

写真 9 症例 2：咬合型X線写真

写真 7 症例 2：口腔内写真

写真 10 症例 2：摘出唾石

初 診：昭和57年11月

主 訴：左側舌下部の腫脹。

家族歴：特記事項なし。

既往歴：15歳頃黄疽を経験するも1週間程で治癒する。

現症歴：昭和57年10月中旬より、左側舌下部の腫脹、嚥仙痛、顎下腺開口部よりの排膿を自覚したため某歯科を受診、唾石症と診断され当科に紹介されて来院した。

現 症：全身所見に特記事項なし。

局所所見は外貌に異常なく、口腔内所見は左側舌下部に小指頭大の硬固物を触知し、同部に発赤および圧痛を認めた(写真11)。また、右側顎下腺体部を口腔内より触診すると硬固物を触知した。

X線所見ではオルソパントモグラムで、左側下顎小白歯歯根部に小指頭大および右側下顎大白歯部下方、下顎下縁部に不定形小指頭大の不透過像を認めた。また咬合型X線写真でも左側顎下腺管部に小指頭大の不透過像を認めた(写真12, 13)。右側顎下腺造影X線写真では、右側唾石が顎下腺体部に存在していることが確認された。

臨床検査所見に特記事項はなかった。

臨床診断：左側顎下唾液管炎、左側顎下腺管および右側顎下腺体唾石症。

処置および経過：昭和57年11月、局所麻酔にて口

腔内より通法に従い、左側腺管唾石を摘出し開放創とした。術後経過は順調である。右側腺体唾石は症状を呈さないため現在経過観察中である。

摘出物所見：重さ1,074 mg, 大きさ19.4×10.5 mm, 表面粗造, 黄白色で、一端が太く他端が約1/2の幅の棍棒状を呈していた(写真14)。

X線回折所見：X線回折の結果、本唾石の主成分はCalcium Hydroxide Orthophosphate $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH}$ と一致した。

考 察

両側性顎下腺唾石症の報告は比較的少なく、欧米では Perrotta¹⁾, Reczyk & Plewinska²⁾, New & Harper³⁾, Ivy & Curtis⁴⁾, Tholen⁵⁾, Kennett⁶⁾, Forman⁷⁾ の報告がみられる。本邦における両側性顎下腺唾石症の報告

写真 11 症例3：口腔内写真

写真 12 症例3：オルソパントモグラム

写真 13 症例3：咬合型X線写真

写真 14 症例3：摘出唾石

表1 本邦における両側性顎下腺唾液石症の報告例

報告者	症例数	部 位	年齢	性別
中村	1例	左右顎下腺管	23歳	男
大築ら	2例	左右顎下腺管	32歳	女
		左右顎下腺管	27歳	女
滝川ら	1例	左顎下腺体	8歳	男
		右顎下腺管		
朱雀ら	1例	左右顎下腺管	34歳	男
石川ら	1例	左右顎下腺体	68歳	女
		左右顎下腺管		
原ら	1例	左右顎下腺管	不明	不明
遠藤ら	1例	左右顎下腺管	63歳	男
真泉ら	2例	不 明	不明	不明
川嶋ら	1例	左顎下腺体	52歳	女
		右顎下腺管		

は、わたくしたちが渉猟し得た限りでは、1938年中村⁹⁾の報告以来、大築ら⁹⁾、滝川ら¹⁰⁾、朱雀ら¹¹⁾、石川ら¹²⁾、原ら¹³⁾、遠藤ら¹⁴⁾、真泉ら¹⁵⁾、川嶋ら¹⁶⁾の11例の報告をみるにすぎず、うち7例は顎下腺管に発生しており、とくにわたくしたちの第1症例のごとく、両側顎下腺管および両側顎下腺体に生じた多発症例は石川らの1例のみであった(表1)。唾石は顎下腺、耳下腺、舌下腺および小唾液腺のいずれにも生ずると考えられるが、顎下腺に圧倒的に多い。小唾液腺には少ないといわれるが、伊達岡ら¹⁷⁾は小唾液腺唾石60症例について文献的考察を行っている。また、耳下腺については楨・竹村¹⁸⁾、徳植¹⁹⁾が顎下腺と耳下腺に多発した唾石症症例を報告している。

唾石の位置的確認および腺実質の破壊の程度を知る目的で、唾液腺造影X線撮影がしばしば行われ、その診断的意義は大きい。しかし福田²⁰⁾は一般に行われている、一時点だけの唾液腺造影法は、管系適量像、腺系適量像はもとより、唾石の詳細な形態、腺体内の小結石などの観察に適切な像を得ることは困難であるとし、造影剤を定量持続注入しながら、同時にX線写真の連続撮影を行う方法を用い、顎下腺唾石症の造影法について検討を行っている。その結果、唾石の存在部位の確認、鮮明な唾石形態の把握、唾液腺および管の病変の程度を正確に知るためには、造影剤の種々な注入量の造影像が必要であり、このため連続的撮影法は非常に有効であると述べている。また造影剤注入時の抵抗の測定は、注入状態を把握することができ、唾石による通過障害の程度、唾石の存在部位、管・腺の病変の程度、組織内漏出などを知る手がかりとなるとともに、特に自動注入装置により造影剤を注入する場合には、異常に高い圧力による唾液腺・管の損傷および患者の苦痛を防ぐために有効な方法

であると述べている。また吉沢ら²¹⁾はX線テレビ透視による唾液腺造影法を行って、造影剤の過不足や異所流入を防止し、望ましい角度から、しかも段階的に撮影を行うことができ、臨床診断上良好な写真が得られたという。神田ら²²⁾は、唾液腺造影X線撮影を行う理由の1つに、造影剤の注入圧により唾石の嵌頓が解けて、急性症状が消退する可能性があることを述べているが、福田ら²⁰⁾は開口部近くに小さな可動性唾石が存在する場合の、唾液管用消息子およびポリエチレンチューブの使用、造影剤の注入は唾石を腺体の方向に押し込むことが多いと異論を唱えている。

われわれの第1症例では、造影剤注入による感染の惹起や拡散の危険性を考慮し、無症状の唾石症に対しCTスキャンによる位置的確認を行った。CT像は唾石の存在および3次元的位置確認に有効で、唾液腺との位置的相関関係は、ウィンドウレベルを上げることにより、唾液腺体および唾液腺管を確認することができた。しかし移行部の詳細な境界や機能的診断には無効と思われた。CTの唾液腺疾患への応用について、金子ら²³⁾は炎症性疾患、系統疾患などに対するCTの応用は唾液腺造影法に比べて、より優位な情報が得られるとは考えられず、CT像が効果的と思われる疾患は唾液腺の腫瘍であると述べているが、唾石症の診断には、造影による侵襲を考慮した場合、唾石の存在および3次元的位置確認の補助的診断法としては有効であると思われた。

唾石症を含め唾液腺疾患の補助的診断法はほかに超音波診断、^{99m}Tcシンチグラフィなどがある。金子²⁴⁾は超音波診断を顎下腺に応用した場合、超音波ビームの方向いかににより顎下腺周囲の組織、すなわち舌下腺、舌などのエコーを拾うことがあるが、口腔底に最後の反射がくるよう指向方向を定めると判定が容易となり、ビームが正しく唾石にあたると唾石エコーを現すと述べている。また東ら²⁵⁾は^{99m}Tc連続シンチグラフィを唾液腺疾患に応用して、^{99m}Tcシンチ像のみでは、唾石症と炎症を鑑別することはできないが、唾液腺造影法では診断できない腺機能の障害の有無を知ることができると述べている。

唾石の摘出術は通常、腺管および移行部唾石は口腔内より、腺体唾石は口腔外より摘出される。わたくしたちも通法に従って唾石摘出術を行ったが、大西ら²⁶⁾は内視鏡による顎下腺管内・移行部の唾石摘出術を行っており、本法によると口腔外による手術の適応と考えられた深在性の移行部唾石をはじめ腺管内の唾石はほぼすべて保存的に摘出しうるのみならず、従来法に比べ侵襲が少なく、周囲組織の損傷もほとんどないと述べており、特に小さい唾石には有効と考えられる。

唾石の無機成分の研究はX線回折、蛍光X線分析などにより数多く行われているが、岡田²⁷⁾は、歯石、唾石、胆石、腎石、尿管石、外尿石をX線回折し、成分の比較

を行っており、歯石の全例、唾石の全例、腎石の1例および外尿石の多数例の主成分が $\text{Hydroxyapatite } 8\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2\text{Ca}(\text{OH})_2$ であったと報告している。また朱雀¹¹⁾、梶山²⁰⁾、亀山²⁰⁾、森永³⁰⁾も同様の報告をしており、わたくしたちの症例も諸家の報告と同様であった。唾石の成因については、細菌説、炎症説、異物説、貯留説、体質説、内分泌説など数多く論じられているがいまだ定説はないようである。

両側性唾石の報告が少ない理由としては、臨床的に自覚症状を呈さない唾石症や、診断に際しての見落とし、自然排泄、未報告例などが考えられるが、わたくしたちは数か月間に3症例を経験したことから、未報告例が多いことが考えられ、今後の報告を待たれる。

ま と め

1. わたくしたちは、比較的報告の少ない両側性顎下腺唾石症3例を経験したので報告した。

2. 腺体唾石の位置的確認のためCTスキャンを用いた結果、3次元的位置確認がほぼ可能であり、造影による侵襲を考慮した場合、補助的診断法としては有効であると考えた。

本論文の要旨は、第7回日本口腔外科学会中部地方会(昭和57年10月23日、於岐阜)で発表した。

引用文献

- 1) Perrotta, R.J., et al.: Simultaneous bilateral parotid and submandibular gland calculi. Arch Otolaryngol 104: 469 1978.
- 2) Reczyk, J. & Plewinska, H.: Obustronne kamica slinianek podzuchwowych. Czas Stomatol 28: 1193 1975.
- 3) New, G.B. & Harper, F.R.: Chronic inflammation of the salivary glands with or without calculi. Surg Gynec and Obst 53: 456 1931.
- 4) Ivy, R.H. & Curtis, L.: Salivary calculi. Ann Surg 96: 979 1932.
- 5) Tholen, E.F.: Sialolithiasis. J Oral Surg 7: 63 1949.
- 6) Kennett, S.: Bilateral submandibular sialolithiasis. Oral Surg 27: 445 1969.
- 7) Forman, G.: Bilateral submandibular sialolithiasis. Brit D J 120: 84 1966.

- 8) 中村麟兵衛: 両側顎下腺に発生せる稀有なる唾石症に就て. 口病誌 12: 246 1938.
- 9) 大築安春, 植田尚男: 顎下腺唾石症の臨床および治療法の選択について. 千葉医会誌 36: 979 1960.
- 10) 滝川富雄, 他: 顎下腺内唾石症について. 日大歯学 44: 159 1970.
- 11) 朱雀直道, 他: 両側顎下腺管内に見られた稀有なる唾石症の1例. 日口外誌 17: 35 1971.
- 12) 石川雅夫, 他: 両側の顎下腺ならびにその排泄管にあらわれた唾石症の1例. 城歯大紀要 5: 331 1976.
- 13) 原 利通, 他: 唾石症の臨床統計および病理組織学的観察. 日口外誌 25: 1066 1979.
- 14) 遠藤義隆, 他: 両側に見られた顎下腺導管内唾石症の1例(会). 日口外誌 26: 1162 1980.
- 15) 真泉幸子, 他: 幼児に見られた唾石症の2症例. 日口外誌 26: 1598 1980.
- 16) 川嶋龍一, 他: 両側同時に見られた顎下腺唾石の1例(会). 日口外誌 28: 1377 1982.
- 17) 伊達岡陽一, 他: 小唾液腺(頬腺)に発生した唾石症について——その1. 症例と文献の考察——. 日口外誌 27: 1129 1981.
- 18) 榎 正男, 竹村文祥: 唾石の臨床的知見補遺(1). 東京医事新誌 2742: 2015 1931.
- 19) 徳植 進, 岡本美二: 耳下, 顎下両腺に現われた稀な唾石症. 口科誌 4: 253 1955.
- 20) 福田 博, 他: 唾液腺造影法に関する研究(第4報)——顎下腺系唾石症について——. 口科誌 23: 352 1974.
- 21) 吉沢信夫, 他: X線テレビ透視による唾液腺造影法について. 日口外誌 21: 563 1975.
- 22) 神田重信, 他: 唾石症——唾液腺造影法によるX線所見——. 日歯放歯 10: 49 1970.
- 23) 金子敏郎, 他: 唾液腺疾患. 耳喉 54: 848 1982.
- 24) 金子敏郎: 耳鼻咽喉科領域における超音波診断. 医学のあゆみ 66: 478 1968.
- 25) 東 与光, 他: 唾液腺の^{99m}Tc連続シンチグラフィの臨床的意義. 口科誌 31: 46 1982.
- 26) 大西正俊, 他: 顎下腺唾石の内視鏡による摘出術. 口病誌 47: 191 1980.
- 27) 岡田充弘: 生体内結石のX線回折(第2報). 口外誌 8: 1 1962.
- 28) 梶山 稔: 唾石の構造に関する研究. 九州歯科学会雑誌 20: 143 1967.
- 29) 亀山忠光, 他: 幼児と老人の唾石症2例. 日口外誌 22: 498 1976.
- 30) 森永 太: 走査型電子顕微鏡による唾石の微細構造の観察. 口科誌 29: 254 1980.