8歳男児の右頬部に生じた粘表皮腫の1例

佐藤 和子・天竺 光雄・横尾恵美子・長谷川和樹
塩田 重利・那須道世*・山城正宏**

A case of mucoepidermoid tumor in a 8-year-old boy

Kazuko SATO・Teruo AMAGASA・Emiko YOKOO・Kazuki HASEGAWA
Shigetoshi SHIODA・Michiyo NASU*・Masahiro YAMASHIRO**

緒 言

粘表皮腫は、唾液腺腫瘍で一般に成人に発生し、小児の症例は比較的まれとされている。今回、われわれは8歳小児の粘表皮腫の症例に遭遇し、治療を行ったので報告する。

症 例

患 者：8歳 男児。

初 診：昭和56年2月■日。

主 訴：右頬部の腫脹。

既往歴：特記事項なし。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：昭和55年7月頃右頬部の腫脹に気づき近医を受診、■大学口腔外科を紹介され、8月■日同科を受診。右頬部リンパ節炎の疑いにて消炎療法を行い、腫脹は一時軽減した。しかし、その後腫脹は徐々に増大し、開口制限も生じたため、昭和56年2月■日試験切除を行い、粘表皮腫と診断され、2月■日同大学より紹介さ

れ、東京医科歯科大学第1口腔外科を受診した。

現 症：

口腔外所見；身長121 cm、体重28 kg。右頬部に約50×45×25 mmの境界比較的明瞭な弾性硬の腫瘤を触知した。圧痛はなく、試験切除後の瘢痕部では、皮膚との癒着が認められた（写真1、2）。

口腔内所見；口腔粘膜は正常色で、癒着はみられなかったが、開口制限があり、右側上下顎中切歯間距離は、14 mmであった（写真3）。

リンパ節所見；右側顎下部に大豆大、可動性のリンパ節を1個触知したが、圧痛はなかった。左側顎下部、オトガイ下部、および頸部のリンパ節は触知されなかった。

臨床検査所見：

血液検査所見；一般血液検査では異常はみられず、血清生化学的検査で、Al-P、LDHにわずかの上昇がみられたほかは特に異常は認められなかった。

写真1 入院時顔貌

東京医科歯科大学歯学部第1口腔外科学教室
(主任：塩田重利教授)

* 東京医科歯科大学歯学部口腔病理学教室
(主任：石川梧朗教授)

** 琉球大学医学部附属病院歯科口腔外科
(主任：山城正宏教授)

The First Department of Oral Surgery, Tokyo
Medical and Dental University School of
Dentistry (Chief: prof. Shigetoshi Shioda)

* Department of Oral Pathology, Tokyo Medical
and Dental University School of Dentistry
(Chief: prof. Gorō Ishikawa)

** Department of Oral surgery, School of Medi-
cine, University of the Ryukyus (Chief: prof.
Masahiro Yamashiro)

受付日：昭和58年3月15日

写真 2 入院時右側側貌

写真 5 術後顔貌

写真 3 入院時口腔内所見

写真 4 CT 所見 (矢印)

CT 検査所見；右頬部，下顎枝前外側に径約 25 mm の筋肉よりやや low density な solid tumor を認め，その表面は一部凹凸を示し，右側咬筋との境界は不明瞭

写真 6 術後右側側貌

で，右側耳下腺はやや萎縮性であるが腫瘍との関係は明らかではなかった（写真 4）。

耳下腺造影所見；■大口腔外科にて行った耳下腺造影像では，患側耳下腺にやや萎縮像を認め，さらに，管の圧排像を認めたほかは，特に異常な所見は認められなかった。

処置および経過：

昭和56年3月■日，当科に入院。3月■日，気管切開を施行後 NLA 全身麻酔下に，一部頬部皮膚を含め腫瘍

写真 7 術後口腔内所見

写真 8 手術切除物の剖面

および耳下腺浅葉の一部、さらに顎下リンパ節を含め切除した。切除範囲は、上方は頬骨弓、下方は顎下組織を一部含め下顎下縁まで、前方は口角より2cmの位置、後方は下顎枝後縁までの頬部軟組織を一塊として切除した。なお、耳下腺管は切除物に含まれたため、管断端部にテフロンチューブを接続し、口腔内に誘導、留置した。

術後の経過は順調で、12日目にテフロンチューブを除去し、シリコンベンローズドレーンに変えた。その後、一時、右耳介下部より唾液の流出を認めたが、まもなく創は閉鎖し、4月■、軽快退院した。2年後の現在、再発の徴候はみられない(写真5～7)。

手術材料所見：

肉眼的所見：腫瘍の大きさは30×30×18mmで、大部分は薄い線維性の被膜により周囲組織より境されていた。しかし、耳下腺組織との間には明瞭な被膜はなく、一部では耳下腺と腫瘍との移行が認められた。剖面は充実性で一部小嚢胞を形成し、弾性でやや硬さを有し、黄白色を呈していた(写真8)。

病理組織学的所見：耳下腺組織との境界は比較的明瞭であるが、一部では腫瘍組織との移行像を認めた。耳下腺は随伴性の炎症を思わせる像を呈していた(写真9)。

腫瘍は、多角形および紡錘形の類表皮細胞といわゆる

写真 9 一部で腫瘍組織と耳下腺組織の移行像が認められる(H-E染色, ×8)

写真 10 腫瘍細胞は充実性の増殖を示し、ところどころに腺管ないし小嚢胞の形成を認める(H-E染色, ×100)

写真 11 腺管、小嚢胞内に粘液反応が陽性に認められる(ムチカルミン染色, ×50)

中間細胞よりなり充実性の増殖を示し、ところどころに腺管ないし小嚢胞の形成を認めた。粘液産生細胞は少なく、腫瘍細胞は多形性を認めるが異型性は軽度であった

(写真10).

ムチカルミン染色では、腺管あるいは小嚢胞内に粘液反応が陽性に認められ、まれに胞体内にも陽性物質が認められた。以上より、中分化型粘表皮腫と診断された。

考 察

粘表皮腫は、唾液腺導管由来の腫瘍と考えられ^{1,2)}、その発生は大唾液腺腫瘍の約3%¹⁾、小唾液腺腫瘍の約10%程度といわれる^{1,3)}。年齢的には、30～70歳代が全体の80%を占め、とくに30～40歳代に好発するといわれ^{1,2)}、10歳以下の小児の報告は少ない⁴⁻⁸⁾。性別では、他の唾液腺悪性腫瘍と同様、やや女性に多い傾向を認める^{1,2)}。

本症例は、8歳男児の右頬部に発症した粘表皮腫の症例であるが、小児期における本腫瘍の発現頻度は、Castro ら⁹⁾によれば大唾液腺腫瘍2,135例中16歳以下の症例は38例、13%。このうち粘表皮腫は15例、0.7%とされ、10歳未満はさらに少ないものと思われる。また、長尾ら¹⁰⁾によれば、耳下腺腫瘍584例中15歳以下の小児における粘表皮腫の頻度は、1例約0.2%ときわめて少ない。

本腫瘍の発現部位は、大唾液腺においては耳下腺が最も多く約70～90%^{1,2)}、顎下腺では10～20%^{1,2,10)}、舌下腺ではきわめてまれであるといわれている。また、小唾液腺においては口蓋が最も多く約40%、次に臼後部、頬部、上顎洞、口底、舌、または、舌、口底、頬、歯槽部の順に多いといわれている。なお本例は、臨床所見、CT検査所見、耳下腺造影所見などより副耳下腺に原発したと思われ、まれなものと考えられた。

本腫瘍は、文献的には大きさが2cmを越えるものが80～90%を占めるとされている^{11,12)}。さらに、悪性度の高いものほど大きさは大きい傾向を示すとの報告もあり、本腫瘍は比較的緩慢に発育し、局所の症状に気づくまでに時間を要する疾患といえる。そのため、初診より確定診断を下すまでに時間のかかる場合が多く、本症例もリンパ節炎やその他炎症との鑑別が困難であったため、症状自覚より確定診断を得るまでに6か月を要した。このように、炎症性疾患との鑑別に長期間を要したことは反省すべき点であり、本例も小児期の腫瘍について考慮し、さらに早期に試験切除を行うべきであったと考えられる。

唾液腺腫瘍の補助的診断に、CT検査、シンチグラム、および唾液腺造影等是有用であるが、手術に際しての腫瘍の位置、進展度などの判断に、CT検査の占める役割は大きく、本症例においても腫瘍の進展度の推定および切除範囲決定にきわめて有用であった。

治療および予後については、とくに小児の症例についてまとめて報告したものはいまだ見当たらない。小守ら⁹⁾の報告によれば、おもに成人ではあるが、粘表皮腫40例

のうち再発は3例に認められ、また、頸部郭清術を行った6例中2例にリンパ節転移が認められた。また予後については、27例中22例(81%)が腫瘍を認めず生存し、4例(15%)が腫瘍死している。Healay ら¹¹⁾の報告では、粘表皮腫60例中、一次治療として局所の外科処置のみを施行したもの29例(48.3%)、局所の外科処置+頸部郭清術3例(5.0%)、局所の外科処置+放射線照射14例(23.4%)、局所の外科処置+頸部郭清術+放射線照射2例(3.3%)が行われ、このうち14例に再発が認められ、うち13例が死亡している。本症例では、腫瘍および、一部耳下腺組織、顎下リンパ節とその周囲組織、一部頬部皮膚を含め、広範囲に切除を行い、また一部顔面神経をも切断したが、再発防止を目的としたものでやむを得なかったと考える。なお、本腫瘍のリンパ節転移は比較的少なく^{3,5,12,13)}、本症例ではリンパ節転移を疑わせるような所見が認められなかったことから、予防的郭清術は行わなかった。

本症例の観察期間はいまだ2年と短期間ではあるが、再発の徴候もみられず、健在である。なお、術後の顔貌の変形に対しては、患者が小児であったこと、また、経過観察を確実にするため、一次再建は行わなかった。今後、患者の成長を待ち、再発のないことを確認した上で、二次的に再建を行うことを考えている。

一方、病理学的には、本症は悪性度の高い場合、腫瘍の発育は速やかで浸潤性に増殖し、潰瘍形成や骨破壊を伴うことも少なくなく¹⁾、腫瘍の大きさは悪性の程度の高いほど大きい傾向があるとされている^{2,11)}。

腫瘍実質は、粘液産生細胞、中間細胞、扁平上皮細胞よりなり、悪性の程度の低いものほど粘液産生細胞に富み、悪性の程度が高くなるほど扁平上皮細胞が多く、角化傾向も認められるようになり、さらに、周囲組織との境界は不明瞭となり、周囲への浸潤も認められるようになるといわれている^{1,2)}。本症例では、腫瘍は徐々に増大し長径は30mmと比較的大きく、その断面は充実性で完全な被膜は有さず、組織学的には類表皮細胞といわゆる中間細胞がほとんどを占め、粘液細胞は少なく、また、腫瘍細胞は軽度の異型性を示すことから、中等度分化型の粘表皮腫と考えられた。

小守ら¹⁴⁾によれば、粘表皮腫60例中経過観察のできた30例のうち転移と腫瘍死が確認された悪性経過例は12例あり、このうち2例は分化型であったと報告している。本例においては転移、再発の可能性はきわめて少ないと思われるが、今後も厳重な経過観察は必要と考えられる。

結 論

今回、われわれは、8歳男児の右頬部に発症した粘表皮腫症例を経験し、若干の文献の考察を加え報告した。

本例に対しては、腫瘍を含む広範囲切除により 2 年後の現在、再発、転移は認められていない。

引用文献

- 1) 石川梧朗監修：口腔病理学Ⅱ。第 1 版，永末書店，京都，1982，740頁。
- 2) 小守 昭，高城 功，他：唾液腺に原発した粘表皮腫の病理組織学的検討。口病誌 45: 263 1978.
- 3) 小守 昭：小唾液腺腫瘍ならびに顎下腺腫瘍の組織型と病態。日病会誌 70補冊：5 1981.
- 4) 小守 昭，高城 功，石川梧朗：小児の唾液腺腫瘍。口病誌 44: 93 1977.
- 5) Kauffman, S.L. & Stout, A.P.: Tumors of the major salivary glands in children. Cancer 16: 1317 1963.
- 6) Howard, J.M., et al.: Parotid tumor in children. Surg Gyn Obst 90: 307 1950.
- 7) James, W.H.: Mucoepidermoid cancer of the parotid gland in a one year old child. Am J Surg 108: 907 1964.
- 8) Krolls, L.G., Throdall, J.N., and Boyears, C.R.C.: Salivary gland lesions in children. A survey of 430 cases. Cancer 30: 459 1972.
- 9) Castro, E.B., Huvos, A.G., Strong, E.W. & Foote, F.W.: Tumors of the major salivary gland in children. Cancer 29: 312 1972.
- 10) 長尾孝一，松崎 理，他：小児の耳下腺腫瘍に関する病理組織学的研究。癌の臨床 26: 324 1980.
- 11) Healey, W.V., Perzin, K.H. & Smith, L.: Mucoepidermoid carcinoma of salivary gland. Classification, clinical pathologic correlation, and results of treatment. Cancer 26: 368 1970.
- 12) 長尾孝一：耳下腺腫瘍の臨床病理学的研究。癌の臨床 23: 519 1977.
- 13) 馬場謙介，鷺津邦雄，他：唾液腺腫瘍。その組織型と予後。癌の臨床 19: 893 1973.
- 14) 小守 昭，高城 功，石川梧朗：唾液腺粘表皮腫の悪性度についての検討。口病誌 46: 19 1979.