口腔転移腫瘍 2 例について

長野 稔男・大関 悟・大石 正道

飯田 康雄・岡 増一郎*

Metastatic tumors to the mouth

Toshio NAGANO・Satoru OZEKI・Masamichi OHISHI

Yasuo IDA・Masuichiro OKA*

緒 言

口腔領域における転移性の悪性腫瘍は、口腔悪性腫瘍の約1%といわれ¹⁾、比較的まれとされている。Cash²⁾が述べているように、原発性の腫瘍とは異なり、特有の臨床症状を欠くことや、時に原発巣に先立って発見されることなどから、臨床的意義は大きく、また診断に際しては、慎重であるべきである。転移腫瘍の診断には、Clausen³⁾、Zegarelli⁴⁾らが述べている条件を満たす必要があるが、実際にはとくに重複腫瘍か、再発かの判定とも相まって、診断は困難な場合が多い。一方、多発性、多中心性に発現すると考えられている腫瘍、とくに悪性リンパ腫についてその拡大形式は、転移説と系統疾患説の2つがあり、統一した見解を欠き、一般的には転移例から除外されているのが現状であるが、monocentricに発生し、転移性に進展する説が有力であるとするものもある。

今回われわれは、肺を原発巣とした大細胞癌の口腔転移例ならびに、当初辜丸を原発巣とした未分化精上皮腫の口腔転移と考えられていたが、剖検後、後腹部大動脈リンパ節に初発した悪性リンパ腫であることが判明した症例について、その概要とともに若干の文献の考察を加えて報告する。

症 例

症例 1

患 者：73歳 男性。

九州大学歯学部第1口腔外科学教室
(主任：田代英雄教授)

* 九州大学歯学部第2口腔外科学教室
(主任：岡 増一郎教授)

First Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry (Chief: Prof. Hideo Tashiro)

* Second Department of Oral Surgery, Faculty of Dentistry (Chief: Prof. Masuichiro Oka)

受付日：昭和58年5月13日

写真 1 症例 1：口腔転移腫瘍の肉眼的所見

主 訴：右側上顎臼歯部歯肉の腫脹および疼痛。

既往歴：3年前より腰痛のため針灸治療を受けている。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：昭和54年11月初旬頃より $\frac{54}{6}$ の疼痛を生じ

たため、11月下旬某歯科を受診したところ、 $\frac{54}{6}$ を抜歯された。抜歯後数日、 $\frac{54}{6}$ 抜歯窩より出血、疼痛が続いた。12月25日、他歯科にて $\frac{3}{1}$ も抜歯された。その後 $\frac{54}{3}$ 抜歯窩と大臼歯部の腫脹を生じたため、昭和55年1月 $\frac{54}{6}$ 当科を受診した。

現 症：体格中等度、栄養状態不良で、顔面はやや蒼白である。眼瞼結膜は貧血性であるが眼球結膜に黄疸は認めない。右側頬部、顎下部、顎部および鎖骨上窩に鳩卵大から小指頭大のリンパ節を触知し、周囲組織との癒着を認めた。口腔内では、右側上顎犬歯から臼歯部にかけて歯槽部に 30×25 mm の弾性硬で、比較的境界明瞭な腫瘍を認めた。表面は凹凸不整で発赤強く肉芽様で一部黄白色の偽膜におおわれ、易出血性であった(写真1)。

X線所見：右上顎の犬歯抜歯窩と思われる骨欠損像を中心に、歯槽骨の辺縁不整な吸収像が認められる(写真2)。胸部X線写真では右上肺野、第2肋骨と重なり約2.5 cm 径の腫瘍を思わせる結節性陰影像があり、さら

写真 2 症例 1 : 上顎骨X線所見

写真 3 症例 1 : 口腔腫瘍の病理組織像 (H-E 染色)

に右上肺野, 左下肺野にも小円形陰影を認めた。

処置および経過: 口腔内腫瘍の生検による組織所見では, 潰瘍下に異型性の強い腫瘍細胞の浸潤増殖が認められた。腫瘍細胞は, クロマチンに富む大小不同, 形態不整な核を有し, 細胞質は比較的乏しく分裂像が多数認められ, 低分化型扁平上皮癌と診断された。しかし, 歯肉粘膜上皮と腫瘍細胞との連続性は明らかでなく, 転移性の腫瘍の可能性が示唆された(写真3)。ただちにプレオマイシンと放射線の併用療法が開始されたが, 全身衰弱が強く, 1週間で中止した。その後胸部の腫瘍性陰影は急速に増加, 増大し, 断層写真や生検の所見とあわせて, 肺原発が考えられるようになった。入院後約1か月目にタール便がみられ, 2月■日, 消化管出血および癌性肺炎による呼吸不全をきたし死亡した。剖検の結果, 右下葉気管支幹内に腫瘍細胞が浸潤増殖する大きな病巣があり, 右下葉枝原発の大細胞癌と診断された。原発巣の組織所見では, 気管軟骨周囲に腫瘍細胞の浸潤が認められ, 歯肉部の生検標本と同様の細胞形態を示している(写真4)。転移は上顎歯肉, 頸部リンパ節の他, 胸部, 腹部各臓器, リンパ節へ広範囲に認められた(図1)。

症例 2

患 者 : 57歳 男性。

主 訴 : 3) 部歯肉の腫脹。

既往歴 : 32歳時, 胆石摘出術。44歳時, 椎間板ヘルニ

写真 4 症例 1 : 原発巣 (右下葉気管支) の病理組織像 (H-E 染色)

図 1 症例 1 : 全身転移巣

ア。

家族歴: 特記事項なし。

現病歴: 昭和55年8月上旬, 右側睾丸に無痛性腫脹が出現したため, 8月■日, 九大泌尿器科受診。9月■日, 左側高位除睾丸施行。病理組織診断「Anaplastic Seminoma」。腹部傍大動脈リンパ節および後腹膜への転移巣と考えられた病巣に, 放射線, 化学療法施行。同科入院中, 昭和56年3月初旬頃, 右側下顎犬歯部の腫脹に気付いたが, 自発痛はなかった。しかし, 義歯による圧痛を自覚し, 腫脹は徐々に増大してきたため, 同年3月9日当科を受診した。

現 症: 体格中等度, 栄養状態中等度で, 眼瞼結膜に貧血なく, 眼球結膜に黄疸は認めない。顔面に腫脹な

写真5 症例2：初診時口腔内所見

写真6 症例2：下顎骨X線所見

写真7 症例2：歯肉腫瘍の穿刺細胞診所見
(パapanicolaou染色)

く、顎下リンパ節も触知しなかった。口腔内は、右側下顎犬歯相当部に、表面はほぼ正常な歯肉粘膜を呈する膨隆が認められた。周囲との境界は比較的明瞭で、軟かく、偽波動を触れ、一見膿瘍様であるが、軽度の圧痛を認めるのみで発赤等の炎症所見は認めなかった(写真5)。

X線所見：腫瘍直下に抜歯窩を思わせる骨の欠損像を認めるほかは異常所見は認めない(写真6)。

処置および経過：初診時行った穿刺細胞診では、胞体に乏しく、クロマチンに富む大小不同の類円形の核をもつ細胞を多数認め、class V と診断し、口腔領域ではみられない細胞形態であることから、睾丸腫瘍の転移と考

写真8 症例2：原発巣の病理組織像

図2 症例2：全身転移巣

えた(写真7)。未分化精上皮腫と診断された睾丸腫瘍の組織では、細精管周囲に類円形ないし、多角形の胞体に乏しい腫瘍細胞が充実性に認められ、細胞診でみられた細胞形態と比較的類似している(写真8)。当科初診より20日後に、広範な転移のため、全身状態が悪化し死亡した。

剖検所見では、腹部傍大動脈リンパ節、後腹膜、両腎に腫瘍の浸潤があり、腹部傍大動脈リンパ節の腫脹が初診時、すでにあったことより、この部に初発した悪性リンパ腫と診断された(図2)。

写真8は初発巣で、写真9は歯肉腫瘍の組織標本写真で、ほぼ同様の組織所見を示すことから、悪性リンパ腫

写真 9 症例 2 : 歯肉腫瘍の病理組織像

の下顎歯槽部への転移と診断した。

考 察

昭和46年から昭和56年までの11年間に、当科において口腔転移腫瘍であることが確認された症例は5例で、この間当科で治療を行った頭頸部原発の悪性腫瘍患者 292例の約1.7%であった。

本邦報告例では口腔転移癌の原発巣の部位は、子宮卵巣、肺、骨、その他の順で多いとされている^{8,13-14,15)}。組織別では本邦では悪性絨毛上皮腫が多く、次いで腺癌となっているが、外国では腺癌が圧倒的に多い^{1,4,9)}。当科における5例の原発巣は肺が2例で、大腿骨、腎臓、脾臓各1例であり、その組織型も腺癌2例、骨肉腫1例、大細胞癌、小細胞癌各1例とさまざまであった。また口腔への転移巣は、下顎骨2例、上顎骨2例、下口唇の軟組織1例であった。一般に、口腔転移巣は軟組織よりも骨への転移が多く、本邦において吉田ら¹⁴⁾は上下顎に差はなかったと述べている。しかし外国では下顎に多いとの報告が多く、この理由として Bucher¹⁶⁾、Rohrer¹⁷⁾らは、上顎より下顎に造血組織が富んでいることをあげている。歯槽部に転移腫瘍を認める場合、それが歯肉への転移か、顎骨への転移かの診断は困難なことが多く、大庭ら¹²⁾は、肉眼所見により区別することは不可能であり、X線検査に頼らざるを得ないと述べている。顎骨への転移性腫瘍の診断が困難な理由として Cash²⁾ はさまざまな臨床所見を呈し、レントゲンの所見に乏しく変化があっても特徴的な像を示さないことなどをあげているが、Mayer¹⁾ らは顎骨に明らかな病変を認めることが診断には必要であるとしている。本症例1においては、抜歯窩を中心として明らかな骨の吸収破壊像を認めており、腫瘍の占める位置から考えて顎骨への転移と考えられたが、症例2では、骨の欠損像は認められるものの、それは抜歯窩を思わせる像であるため歯肉への転移とするか、歯槽骨への転移とするかは判断しなかった。

臨床症状としては、有痛性もしくは無痛性腫脹、出血、潰瘍形成、抜歯窩治癒不全、開口障害、骨折、嚥下困難、歯牙の動揺または挺出、口唇麻痺や知覚過敏等の神経症状等さまざまである^{6-9,11)}。Dahl¹⁰⁾によれば、歯肉の転移性腫瘍は反応性または過形成性病変にまちがわれやすく、一見良性腫瘍にみえることもあるが、増殖が速く、潰瘍性、易出血性であると述べている。これらの臨床所見より、他疾患と誤診されやすく、鑑別すべき疾患として、歯性感染症、のう胞、局所的外傷、骨髓炎、良性腫瘍、原発性悪性腫瘍（とくに唾液腺由来の腫瘍）等をあげることができる^{8,9)}。

症例1では、当科初診時には易出血性で潰瘍を形成した大きな腫瘍を認め、レントゲン所見とも合わせ悪性腫瘍であることは容易に診断された。しかし、その初発症状は歯牙の疼痛であり、周囲の腫瘍も発赤が強く、肉芽様でやわらかかったため、歯性の感染症を疑わせ、2か所の歯科医院にて「543」を次々に抜去されている。この間当科を受診するまでにすでに2か月が経過している。症例2では表面は、ほぼ正常な歯肉粘膜を呈する膨隆で、軟かく偽波動に触れ、一見膿瘍様であったが、軽度の圧痛を認めるほかに、発赤等の炎症所見は認められなかった。また口腔に原発する腫瘍性病変の所見にも乏しかった。Clausen³⁾、Zegarelli⁴⁾ らは、口腔転移腫瘍の診断基準として、(1)組織学的にも臨床的にも確認された原発腫瘍が存在する。(2)転移病巣と認められる口腔腫瘍が存在する。(3)両者に病理組織学的類似性が認められる。(4)原発巣と転移巣が近在する場合にはその間には、明らかな境界があつて直接の浸潤がない。(5)原発腫瘍が過去に存在しなかったこと。等をあげている。本症例においては、剖検の結果からみると2例とも十分この診断基準に合致する。しかし症例1においては、臨床経過からの診断は必ずしも容易ではなかった。初診時、すでに口腔内に潰瘍を伴う大きな腫瘍を形成しており、患側の頬部、顎下部、頸部、鎖骨上窩にリンパ節の腫大を認めたことから、胸写に認められる多数の陰影像は逆に口腔癌の肺への転移を示すものではないかと考えられた。しかし口腔の生検による組織所見より低分化型扁平上皮癌と診断され、歯肉粘膜上皮と腫瘍細胞との連続性が明らかでなく、肺より転移の可能性が示唆された。また胸部陰影像の急速な増大や胸部断層写真の所見から肺原発が考えられるようになったが、その後の急速な全身状態の悪化のため、原発巣を確定する検査を行い得ず、剖検を行うまでは、予測の域をでなかった。剖検の結果、初めて右下葉気管支原発の大細胞癌で、原発巣の組織所見が口腔腫瘍の生検と同様の細胞形態を示すことが確認された。このように、転移であることが十分予測されるにもかかわらず、原発巣での組織が得られない段階での転移腫瘍の診断は非常に困難であり、それゆえにその診断には慎重であるべきと考える。症例2では、当科

初診時の半年前より睾丸の未分化精上皮腫の診断で治療中であり、すでに得られていた原発巣の組織所見と口腔腫瘤部の穿刺細胞診における細胞形態とに類似性が認められたことから転移腫瘍であることは比較的容易に診断された。しかし、この症例は剖検の結果、腹部傍大動脈リンパ節初発の悪性リンパ腫と診断された。従来、口腔転移腫瘍を集計する際、悪性リンパ腫は、その発生および蔓延形式が不明瞭であるとして除外されることが多い、悪性リンパ腫を系統疾患とし、多中心性に発生するという見地に立てば、これは妥当なことと思われる。しかし臨床上是他の転移腫瘍と同じように monocentric に発生し、転移性に拡大する形式をとったと考えられる場合も少なくない¹⁸⁻²³⁾。今回の症例 2 はこの例と考えられた。

結 語

われわれが最近経験した口腔転移腫瘍 1 例と、当初睾丸(精上皮腫)からの口腔転移腫瘍と思われたが、剖検の結果、悪性リンパ腫であることが判明した 1 例について、その概要を報告した。

本論文の要旨は、第39回日本口腔外科学会九州地方部会(鹿児島)において発表した。

引 用 文 献

- 1) Mayer, I. and Shklar, G.: Malignant tumors metastatic to mouth and jaws. *Oral Surg* 20: 350 1956.
- 2) Cash, C.D., Royer, R.Q. and Dahlin, D.C.: Metastatic tumors of the jaws. *OS OM OP* 14: 897 1961.
- 3) Clausen, F. and Poulsen, H.: Metastatic carcinoma to the jaws. *Acta Path* 57: 361 1963.
- 4) Zegarelli, D.J., Tsukada, Y., Pickren, J.W. and Greene, G.W.: Metastatic tumors to the tongue. *OS OM OP* 35: 202 1973.
- 5) 戸塚靖則, 他: 顎口腔領域に生じた悪性リンパ

- 腫の14症例について. *日口外誌* 25: 631 1979.
- 6) 空閑祥浩, 他: 上顎歯肉部に転移をみた原発性肝癌の1例. *日口外誌* 22: 541 1976.
- 7) 朱雀直道, 他: 下顎骨に転移の見られた精上皮腫の1例. *口科誌* 22: 680 1973.
- 8) 佐藤 匠, 他: 下顎骨転移をきたした胃腺癌の3症例と文献的考察. *日口外誌* 25: 1381 1979.
- 9) Kaugars, G.E., Svisky, J.A.: Lung malignancies metastatic to the oral cavity. *Oral Surg* 51: 176 1981.
- 10) Dahl, E.G., Synhorst, J.B. and Lilly, G.E.: Gingival metastasis from a tracheal adenoid-cystic carcinoma. *J Oral Surg* 39: 446 1981.
- 11) 尾崎登喜雄, 他: 口腔転移癌(腺癌)の2例並びに文献的考察. *口科誌* 27: 173 1979.
- 12) 大庭 健, 他: 歯肉における転移性腫瘍. 癌の臨床 27: 692 1974.
- 13) 小森康雄, 他: 肺からの転移による下顎癌の1症例. *日口外誌* 26: 1352 1980.
- 14) 吉田幸子, 他: 口腔領域にみられた転移性腫瘍2例について. *日口外誌* 22: 534 1976.
- 15) 森 昌彦, 他: 歯肉に転移した腎癌の1例. *日口外誌* 20: 614 1974.
- 16) Bucher, A., Ramon, Y.: Distant metastasis to the jaws. *J Oral Surg* 25: 246 1967.
- 17) Rohrer, M.D., Colyer, J.: Mental nerve paresthesia: symptom for a wide spread skeletal metastatic adenocarcinoma. *J Oral Surg* 39: 442 1981.
- 18) 橋本美智雄: リンパ性細網肉腫の蔓延と発生形式. *最新医学* 19: 1693 1964.
- 19) 伊藤嘉郎, 他: リンパ節腫瘍における腫瘍細胞及び異常細胞の末梢血への出現. *日網内誌* 3: 124 1963.
- 20) 太田邦夫: 細網肉腫の病理学. *最新医学* 19: 1686 1964.
- 21) 赤崎兼義: 網内系概念. *最新医学* 17: 168 1962.
- 22) 芝 茂: リンパ腺の悪性腫瘍. *外科治療* 26: 316 1972.
- 23) 芝 茂: 悪性リンパ腫の病型と進展の形式. *臨放* 18: 850 1973.