上顎洞異物の2症例

神田 剛・小野敬一郎・水城春美・柳沢繁孝
清水正嗣

Two cases of a foreign body in the maxillary sinus

Tsuyoshi KANDA・Keiichiro ONO・Harumi MIZUKI
Shigetaka YANAGISAWA・Masatsugu SHIMIZU

I. 緒 言

上顎洞異物の報告は、上顎洞を診療領域とする口腔外科および耳鼻科から多数みられている。戦傷に起因するものを除くと、外傷による損傷異物、治療操作における治療用具あるいは歯根の迷入などが主なものである。

上顎洞異物は、その原因において気道あるいは消化管内異物と異なり、患者本人によって迷入させることはきわめてまれである。また、外傷に起因するとはいえ、補綴物が洞内に迷入し残留した報告は少ない。

われわれは、歯科用タービンバーを自ら上顎洞に迷入させた1例と、外傷により金属歯冠が上顎洞底粘膜下に迷入した1例の計2症例を経験したので報告する。

II. 症 例

症例1

患 者： 34歳 女性。

初 診：1981年11月 日。

主 訴：上顎洞異物の除去希望。

家族歴：特記事項なし。

既往歴：中学時代に貧血にて加療した。17歳頃より異常言動があり、1981年3月より約半年間、精神分裂病の診断にて某病院にて入院加療した。

現病歴：1979年1月頃、通院先の歯科医院で拾った歯科用バーを持ち帰り、治療中の右側上顎歯牙にバーをあて、弄んでいたところバーが見失われ、上顎組織内に迷入したように思われた。家族に伴われて某病院を受診

し、X線学的に精査したところ、右側上顎洞内にバーと思われる陰影が認められた。よって、同院にて上顎洞異物除去の予定が立てられたが、易疲労感のために手術を中止し、その後放置された。約2年半を経過した1981年秋になって、右側の鼻翼部および眼窩下部に違和感を自覚したため、家族に伴われ異物除去を希望して当科を受診した。

現 症：全身および顔貌所見として、体格は中等度で栄養状態は佳良であった。顔貌は左右対称性だが、顔色は蒼白、表情に乏しく神経質な言動を示した。顎下および頸部リンパ節の腫脹は認められなかった。

精神学的所見では、入院時に本学精神科にて精査したところ分裂病の単純型と診断されたが、安定期ゆえ投薬の必要なく手術は可能とコメントされた。

鼻腔内は、右側上顎洞自然孔は開孔しており、鼻閉、鼻漏などはなかった。

口腔内所見では、口腔粘膜に穿孔、瘻孔などの異常所見は認められず、歯牙は $\frac{8\ 4\ 3}{4\ 3\ 2\ 3}$ のみ残存しており、 $4\ 3$ は残根状態であった。

X線所見：各種方向X線写真にて、右側上顎洞内側壁に歯科用バーと思われる不透過像が認められた。上顎洞は両側とも内腔の発育が良好で、右側の洞底は低位にあった。両側とも慢性炎症性所見を思わせる陰影増強像は認められなかった(写真1a, b)。

臨床検査所見：血液検査で血色素量 9.5 g/dl、ヘマトクリット値27.5%と貧血所見がみられたが、他に異常はなかった。

臨床診断：右側上顎洞異物(タービンバー)。

処置および経過：1981年11月 日、入院全麻下で右側犬歯窩より開洞し、洞内側壁部の粘膜上にあった異物を除去した。異物は歯科用タービンバーで黒っぽく変色していた(写真2)。洞粘膜に炎症性所見はなく、自然孔も開口していたため保存し、洞粘膜および口腔粘膜を縫合し手術を終了した。その際、 $4\ 3$ 残根の抜去もあわせて通法のごとく行った。

術後の創傷治癒は良好で術後7日で退院した。以後、

大分医科大学医学部歯科口腔外科

(主任：清水正嗣教授)

Department of Dentistry and Oral Surgery,
Medical College of Oita (Chief: Prof. Masatsugu Shimizu)

受付日：昭和58年5月23日

写真 1 上顎洞前方内側相当域にバーと思われるX線不透過像を認める。
a : 顔面頭蓋右側面X線所見 b : ウォーターズX線所見

写真 2 除去された歯科用タービンバー

手術野に関して経過は良好に推移し、訴えられていた症状は消失した。しかし、精神的な情緒不安定、異常言動は時にみられ、専門医の治療、管理に委ねられていたところ、術後、1年4か月後に再度自ら縫い針を左側上顎骨骨膜下に迷入させてしまい、局麻下に破折針を除去した。

症例2

患者： 27歳 男性。

初診：1975年12月2日。

主訴：口腔領域外傷の後処置依頼。

家族歴・既往歴：特記事項なし。

現病歴：1975年10月、イラクにおいて単車運転中にイラク軍トラックと衝突し受傷した。受傷時の意識喪失はなく、ただちに HOSPITAL の形成外科に入院し、同日、顔面頭蓋骨折に対する整復、固定手術をうけた。同病院主治医の紹介状によると、上顎骨 Le Fort I 型骨折、下顎骨正中中部骨

折、上下顎歯牙破折、下口唇、頤および頬骨部皮膚裂傷、右側上顎洞異物の診断で、全麻下にて下顎骨の骨縫合、両側頬骨弓よりの suspension wiring が行われた。その際に、右側上顎洞に迷入した歯牙および骨の破折片は除去できたが、X線所見で確認された金属冠は見つけ出せなかったとのことで、顎間固定金属線など術後の処置および右側の上顎洞異物除去の依頼が書き添えてあった。

以上の内容の紹介状をもって、われわれの前任地である東京医科歯科大学歯学部附属病院第1口腔外科に来院した。

現症：全身ならびに口腔外所見では、体格は中等度で栄養状態は佳良であった。顔貌は左右対称性で、所属リンパ節の触診では病的腫脹は認められなかった。頤および頤下部に約 5 cm, 3 cm の2条の創傷による皮膚癒痕が認められた。

鼻腔内は炎症性所見はなく、鼻閉、鼻漏などの異常はなかった。

口腔内所見では、 $\frac{3+5}{1 \sim 47}$ は欠損しており、両側下顎骨体部に施された circumferential wiring と両側上顎部の suspension wiring を利用して、 $\frac{6|6}{6|6}$ 相当部で顎間固定されており、咬合状態は良好であった。口腔粘膜に穿孔、瘻孔などの異常所見は認められなかった。

X線所見：骨折線は、下顎骨体正中中部、上顎では Le Fort I 型あるいは Guerin 骨折すなわち両側上顎洞下底部内外側壁、右側上顎歯槽骨さらに両側頬骨弓にそれぞれ認められた。下顎骨には骨縫合 wire, circumferential wiring, 上顎には両側頬骨弓よりの suspension wiring が認められ、右側上顎洞底部には金属冠様の不透過像が認められた。上顎洞は両側とも内腔が大きく洞底も低位であり、不透過性の増強など炎症性所見はなかった。また、上顎正中中部に埋伏過剰歯が2歯認められた(写真

写真 3 顔面頭蓋 P-A 方向 X線所見

写真 4 咬合法 X線フィルム所見

3, 4).

臨床診断：上下顎骨体骨折および両側頬骨弓骨折，右側上顎洞異物。

処置ならびに経過：初診より1週間後の12月■日，外来にて上下顎の固定用金属線を除去し，翌1976年1月■日，患者の希望により，同じく外来局麻下にて右側上顎洞異物除去手術が実施された。

歯肉頬移行部よりの粘膜切開に続き，右側上顎犬歯窩より開洞したが異物は上顎洞腔内にはみられなかった。洞粘膜は健常色で，若干肥厚性所見がみられたほか異常を認めなかった。術中，異物の位置確認のため，再度各種方向 X線撮影をしたところ異物は 6| 根尖部上方に位置

写真 5 手術時所見
右側上顎洞底粘膜下に金属冠が認められる。

写真 6 654| 3 歯と迷入金属冠の位置的関係の
シェーマ
A：上顎洞壁除去域

しており，洞底粘膜下に存在することが推測された。そこで，同部粘膜を剝離したところ 6| 相当洞底陥凹部の洞粘膜下に異物をみつけ除去した（写真 5, 6），異物はその大きさや形態より上顎切歯の無縫金属冠と思われたが，冠内に歯冠など歯質はみられなかった。洞粘膜は肉眼的に炎症性所見がなかったため保存したが，自然孔周辺粘膜の剝離を行ったため，自然孔閉鎖による上顎洞炎症症状を避ける目的で下鼻道に対孔を形成した後，洞粘膜および口腔粘膜を縫合し手術を終了した。その際，同時に上顎正中埋伏過剰歯の抜歯を行った。

術後の創傷治癒は良好であった。手術創の治癒後，上下顎の部分床義歯を作製，装着し，審美的，機能的にも咬合を回復し，患者は前職に復帰した。

III. 考 察

上顎洞異物の成因として佐藤ら¹⁾は、外傷および戦傷、治療操作の2項目に大別している。症例1の成因は、上顎洞底が低位にあったことと相まって自ら歯科用タービンバーを迷入させた点、既往疾患として精神分裂病を併発していたとはいえ、きわめてまれな成因と考えられた。また、本症例の迷入経路としては、問診および手術所見で骨欠損がなかったこと、さらに手術の1年4か月後に再度、家庭用の縫い針を左側上顎骨骨膜下に迷入させてしまったことなどより、歯根管腔あるいは歯根膜腔より迷入したものと推測された。小児あるいは精神的障害者等の治療に際し、本症例のごとく予想不可能な事態が起こりうることを留意し、施術操作や診療室の整理には注意を喚起するものと考えた。さらに、本症例が術後1年4か月で縫い針を上顎骨骨膜下に迷入させたごとく、同様ないし類似の異物迷入再発の可能性があるので、家族および精神科専門医の協力、診察は大切である。

症例2の成因は外傷であり、迷入経路は右側上顎歯槽骨骨折部より迷入した可能性も考えられた。しかし、関連域の上顎洞底粘膜が肉眼的に健常にみえたことはまれな特異の所見と考えられ、前医が同異物を見出し得なかった理由でもあろう。また、このようにほぼ健常な洞底粘膜下に本異物が位置した状態に対し、歯槽骨骨折部を経路と考えても、外傷時、直接その位置的關係をとったことはやや考え難く、あるいは前医での手術操作に伴って圧入されたことも想定しえるかと考察した。

上顎洞異物の種類として、耳鼻科領域では銃弾、竹片、木片など凶器および過失損傷異物が多い¹⁻⁴⁾。歯科領域では治療操作によるものが多く、上顎臼歯部歯牙抜去時の歯根が最も多く⁵⁻¹⁰⁾、このほかに根管治療用具^{11,12)}、根管充填剤^{13,15)}、油性造影剤¹⁶⁾、歯科用セメント^{17,18)}、印象剤¹⁹⁾、マッチ棒²⁰⁾などの報告がみられる。

症例1の異物はタービンバーであり、バーの舌への迷入例²¹⁾やエンジンバーの破折片の上顎洞迷入例²²⁾はみられるが、上顎洞異物としてはまれなものと考えた。症例2の異物は無縫金属冠であり、このような補綴物の上顎洞異物はまれで、文献上でも西尾らの帯環金属ダミー内部のレジン塊のみ迷入の1症例以外に同様例を見い出せなかった。

上顎洞異物は長年にわたり無症状のこともあるが、一般に滞留期間が長くなれば上顎洞粘膜の炎症を惹起し、また既存の炎症を増悪させ種々の症状を生じるとい¹⁾。症例1は滞留期間が約2年半余で軽度の鼻翼部および眼窩下部の違和感があった。症例2は滞留期間が3か月で自覚的、他覚的にも何ら症状はみられなかった。また、長期にわたる滞留の場合、異物の自然排出^{1,12)}や

自然排出後の誤飲¹³⁾、洞内での移動もあるので、X線検査による経時的観察および術前のX線検査による異物の位置確認^{7,13)}は重要である。

治療法は、多くは上顎洞根治あるいは保存手術に準じて開洞し、異物除去後、下鼻道への対孔形成がなされている。われわれは、健常な洞粘膜は可及的に保存すべきと考えており、症例1は異物除去のみを行い、症例2では異物除去の際に洞粘膜を相当広範囲に剝離したため、自然孔の閉鎖を危惧し下鼻道に対孔形成したが洞粘膜の除去は行わなかった。また、症例2においてイランおよび当科の当初の治療に際して異物を発見できなかったのは洞底粘膜下に位置していたためであり、洞内異物除去に際して注意を喚起する事項と考えた。

治療中の異物迷入例は、ほとんどが上顎洞内腔の發育が特に低位に良好な例であり、歯科治療に際しては、上顎洞と歯牙との位置關係の確認^{24,25)}など特別な注意が必要と思われる。

IV. 結 語

われわれは、自らタービンバーを上顎洞に迷入させた精神障害の既往のある34歳女性と、無縫金属冠が外傷によって上顎洞底粘膜下に迷入した27歳男性の共にまれと考えられる上顎洞異物の2症例を経験したので報告した。

本論文の要旨は、1982(昭和57)年9月11日第41回日本口腔外科学会九州地方部会で報告した。

引 用 文 献

- 1) 佐藤武男, 他: 上顎洞異物症例. 附. 本邦文献の統計的考察. 耳鼻臨床 56: 1 1963.
- 2) 多田悦己, 他: 頬部瘻孔を伴った上顎洞異物(木片)の1症例. 耳喉 39: 35 1967.
- 3) 土田成正, 他: 上顎洞異物(木片の一例). 日耳鼻 75: 573 1972.
- 4) Nicolas, F., et al.: Penetrating foreign body of maxillary antrum. NY State J Med 74: 2027 1974.
- 5) 宇賀春雄, 他: 過去10年間における上顎洞歯根迷入例の臨床集計的観察(昭和38年1月~昭和47年12月). 歯学 62: 363 1974.
- 6) 高田富三男, 他: 抜歯時の上顎洞への歯根迷入例. 歯科医学 36: 581 1973.
- 7) 早津良和, 他: 上顎洞内歯根迷入の8症例. 北海道歯科医師会誌 33: 29 1978.
- 8) 上村良彦: 抜歯によって発生した上顎洞異物の1症例. 日耳鼻 74: 1202 1971.
- 9) Herd, J.R.: The tooth root within the maxillary sinus. Aust Dent J 19: 77 1974.

- 10) Lee, F.M.: Management of the displaced root in the maxillary sinus. *Int J Oral Surg* 7: 347 1978.
- 11) 野垣俊幸: 上顎洞異物 症例 (歯科治療器具). *耳鼻* 13: 295 1967.
- 12) 西尾 仁, 他: めずらしい経過を辿った上顎洞異物. *口科誌* 30: 454 1981.
- 13) 佐川順一, 他: 上顎洞内異物 (根管充填剤) の症例. *日口外誌* 27: 483 1981.
- 14) Kfir, Y., et al.: An endodontic silver point in the maxillary sinus. *J Oral Surg* 49: 417 1957.
- 15) Minkow, B., et al.: Acute maxillary sinusitis caused by a guttapercha point. *Israel J Dent Med* 26: 33 1977.
- 16) 榎本昭二, 他: 上顎洞上壁に異物のみられた 1 症例. *日口外誌* 20: 168 1974.
- 17) Shelton, D.W.: Recovery of zinc oxide and eugenol impression paste from the maxillary sinus. *Oral Surg* 18: 126 1974.
- 18) Schortz, R.H., et al.: Maxillary sinusitis. Foreign body inflammatory reaction. *NY State Dent J* 32: 234 1978.
- 19) Glitterstam, K., et al.: Avtrycksmaterial i sinus maxillaris-kan det inträffa? *Trandlakartidnigen* 73: 1017 1981.
- 20) Rahman, A.: Foreign bodies in the maxillary antrum. *Br Dent J* 153: 308 1982.
- 21) 山本 昭, 他: 歯科治療に関連ある異物の 5 例. *歯放* 14: 24 1974.
- 22) Laur, F., et al.: Trattamento chirurgico di corpi estranei dislocati nel seno mascellare. *Min Stom* 29: 437 1980.
- 23) 西尾 仁, 他: 上顎洞異物 (歯科用レジン) の 1 症例. *日口外誌* 27: 1906 1981.
- 24) 城山剛彦: 歯牙と上顎洞との関係. *歯科医学* 18: 417 1955.
- 25) 上條雍彦: 口腔解剖学 第 1 巻 骨学. 第 2 版, アナトーム社, 東京, 1981, 209頁.