魚骨を核として形成されたとされる顎下腺管唾石症の1例について

金 田 式 世・波多野吉人・半田祐二郎
岡村久美子・阿 部 喜 八・岡 伸 光

**A salivary calculus in the submandibular duct suspected
to be formed with the nucleus of a fish-bone**

Tsuneyo KANEDA : Yoshito HATANO · Yujiro HANDA
Kumiko OKAMURA : Kihachi ABE · Nobumitsu OKA

Abstract: There are many hypotheses on the formation of salivary calculi, such as inflammatory theory, microbiological theory and foreign body theory.

Recently, we experienced an interesting case of a salivary calculus in the submandibular duct which was suspected to be formed with the nucleus of a fish-bone.

The patient, a 37-year-old man, visited our clinic with the chief complaint of swelling in the right submandibular region. Extraoral examination showed a well-defined, smooth swelling and induration in the right submandibular region. Intraorally, a reddened swelling is noted near the orifice of the right Wharton's duct. Saliva could not be secreted from the right orifice and a small amount of pus was discharged. Roentgenogram disclosed a well-defined radio-opaque picture at a root apical region of lower right second premolar tooth. The routine laboratory findings were within normal limits. From these findings, clinical diagnosis was sialolithiasis of the right submandibular duct and sialoadenitis.

After the infection was controlled by administering antibiotics, the calculus in the submandibular duct was removed by incision intraorally. Two months later, total excision of the salivary gland was carried out because inflammation persisted.

Microscopic examination of the removed submandibular gland showed atrophy or disappearance of acinic cells, and inflammatory cell infiltration. Furthermore, inter- and intralobular fibrosis was observed. As a consequence histopathologic diagnosis was chronic sialoadenitis.

The removed calculus was 6 × 2 mm in size, whitish yellow in color with a fish bone in the center. Microscopic and radiographic examination of the calculus revealed calcareous deposit around this fish bone. Therefore, it was suspected that the salivary calculus was formed around fish bone.

This is considered to be an interesting case which may suggest foreign body theory.

Key words: salivary calculus, foreign body theory, fish bone

緒 言

岐阜大学医学部口腔外科学教室

(主任：岡 伸光教授)

Department of Oral Surgery, School of Medicine,
Gifu University. (Chief: Prof. Nobumitsu Oka)

受付日：昭和58年8月29日

唾石症は唾液腺の腺体内または導管内に結石を生ずる疾患で、顎下腺に好発し、従来より数多くの報告がなされている。しかし、唾石の成因については、炎症説、細菌説、異物説、貯留説、外傷説、化学説、体質説、内分

写真 1 初診時口腔外所見

写真 3 摘出唾石の肉眼的所見

写真 2 初診時X線所見

写真 4 摘出唾石のX線所見

泌説など種々の学説が唱えられているが、いまだ定説をみるに至っていない。

今回、わたくしたちは37歳の男性で、魚骨を核として形成されたと思われる興味ある顎下腺唾石症の1例に遭遇したので、若干の文献的考察を加えて報告する。

症 例

患 者：37歳 男性。

初 診：昭和56年6月■日。

主 訴：右側顎下部の腫脹。

既往歴：特記事項なし。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：昭和55年6月頃、右側顎下部に腫脹を認めたが、3日間ほどで自然に消退したため放置していた。その後、同様な症状を1度経験したが、短期間で消退したため放置。昭和56年6月■日に右側顎下部の急激な腫脹と疼痛、開口障害、嚥下痛を生じ、某内科を受診し、紹介により6月■日当科に来院した。

現 症

全身所見：栄養、体格中等度で、その他特記事項なし。

口腔外所見：右側顎下部にウズラ卵大、可動性で境界明瞭な腫脹がみられ、硬結を触知した。表面は平滑で、同部皮膚は健康色を呈し、圧痛が認められた。自発痛、摂食時の疼痛はなく、所属リンパ節にも異常所見は認められなかった(写真1)。

口腔内所見：右側ワルトン氏管開口部付近に、発赤を伴った軽度の腫脹が認められた。開口部からの唾液の流出はなく、排膿がみられた。口腔内より硬固物は触知し得なかった。また、軽度の開口障害が認められた。

X線所見：オルソパントモグラムにおいて51根尖部付近に、円形の境界明瞭なX線不透過像を認めた(写真2)。

臨床検査所見：血液一般検査、血清化学検査、尿検査等に異常所見は認められなかった。

臨床診断：右側顎下腺管内唾石症および顎下唾液腺炎。

処置および経過：抗生剤による消炎療法後、昭和56年6月■日、外来にて2%キシロカイン局所麻酔のもとに、唾石摘出術を施行した。顎下腺開口部よりブジーを挿入し、それを誘導針としてワルトン氏管に沿い約1.5cmの粘膜切開を加え、鈍的に剝離を行った。膿汁の多量流出

写真 5 非脱灰研磨標本
(トルイジンブルー・O染色, $\times 40$)

写真 7 走査電顕所見：唾石表面像

写真 6 非脱灰研磨標本
(トルイジンブルー・O染色, $\times 100$)

写真 8 走査電顕所見：断面像（中心部）

とともに魚骨を核とする唾石を容易に摘出した。術後、右側顎下部の腫脹、圧痛は消退し、開口障害も改善されたが、顎下部に軽度硬結が残存したため、抗生剤大量投与、赤外線照射などを試みた。しかし、著変はみられず、慢性硬化性唾液腺炎と診断し、昭和56年8月■日、GOF全身麻酔下で右側顎下腺摘出術を施行した。右側下顎骨下縁に平行に約5cmの皮膚切開を加え、通法に従い顎下腺を摘出した。顎下腺は内方が一部、周囲軟組織と癒着していたが、一塊として摘出し得た。また、腺後部に小指頭大の顎下リンパ節が癒着していたため、同時に摘出を行った。その後、経過は順調で、術後2年を経た現在、異常所見は認められない。

摘出唾石所見

肉眼的所見：唾石は 6×2 mmの大きさで、黄白色を呈していた。表面は凹凸不整で、中心に魚骨を認めた(写真3)。

X線所見：辺縁は粗粒で、魚骨を核として石灰沈着したと思われるX線不透過像が観察された(写真4)。

光学顕微鏡所見：非脱灰研磨標本のトルイジンブルー

写真 9 走査電顕所見：断面像（外層部）

・O染色により魚骨を中心とした同心円状の層状構造が認められた(写真5, 6)。

走査型電子顕微鏡所見：唾石の表面は凹凸不整の岩石様の膨隆が観察され、一部に空隙が認められた(写真7)。

中心部では魚骨の周辺に均質な石灰沈着像がみられ、

写真 10 顎下腺の病理組織学的所見
(H-E 染色, ×40)

写真 11 顎下腺の病理組織学的所見
(H-E 染色, ×100)

外層部においては大小種々の結晶体が集合して塊状となり、膨隆を形成し、その周辺は均質無構造物によって埋められていた(写真8, 9)。

摘出顎下腺所見

肉眼的所見：顎下腺は胡桃大、表面滑沢で淡紅色を呈し、弾性硬であった。

病理組織学的所見：腺房細胞の萎縮ないし消失が認められ、炎症性細胞浸潤が著明で、リンパ球の形成も散見された。また、小葉間結合組織および小葉内の間質には中等度の線維化がみられ、一部に脂肪変性が存在した。病理組織診断は慢性唾液腺炎であった(写真10, 11)。

考 察

生体に形成される結石のうち、唾石は尿路結石、胆石について多く、全結石疾患の約1%を占めるといわれている¹⁾。

唾石の成因としては、古くから炎症説、細菌説、異物説、貯留説、外傷説、化学説、体質説、内分泌説など種々の説がみられるが、いまだ定説は存在せず、炎症説、細菌説、異物説が重要視されているようである。Kroiss²⁾、Heineke³⁾、Küttner⁴⁾らは炎症説を提唱し、唾液腺あるいは導管の炎症の結果、腺上皮が変性に陥り、機能障害が生じ、うっ滞した唾液の化学的变化により唾石を形成すると述べている。また、槇原⁵⁾は唾液腺の慢性単純性炎症に由来するものとし、高橋⁶⁾も唾液腺の炎症を第一義的病因にあげ、炎症の発生と梅毒とが関連性があるとしている。Söderlund⁷⁾、Naeslund⁸⁾らは細菌説を唱え、唾石において Actinomyces を証明している。また、池尻⁹⁾は唾石の脱灰標本により多数の線状菌を検出し、高崎¹⁰⁾は口腔より分離した Leptotrichia が適当な条件下で菌体内石灰沈着を起こすことを明らかにしている。さらに、内田¹¹⁾は唾石のX線回折、走査電顕像により細菌による石灰化現象が唾石の成因であることを示唆し

ている。異物説は Euler¹²⁾、村島¹³⁾によって提唱され、魚骨、毛髪、羽毛、歯刷子の毛、硝子片、木片、穀粉、果実の種子、稲穂などが迷入し、これらが核となって石灰沈着をきたすとされている。久野¹⁴⁾は顎下腺管内に迷入した線維様の異物を核として形成されたと思われる唾石の1症例を、宮城¹⁵⁾も魚骨を核としたと思われる唾石の1症例を報告している。また、杉原¹⁶⁾、呉¹⁷⁾、福田¹⁸⁾は唾液腺導管内に迷入した異物によって唾液腺炎を起こした症例を、鈴木¹⁹⁾は顎下腺管を経由して腺体内に刺入した異物の1例を紹介している。このような唾液腺管内あるいは腺体内に迷入した異物により炎症をきたした症例においても、自覚症状が軽微で、長期間放置したような場合には、これら異物が核となって石灰沈着を生じ、唾石を形成する可能性は否定できないと思われる。その他、唾石形成の誘因として、綾仁²⁰⁾は打撲によるものをあげており、藤井²¹⁾は顎下腺領域の手術の損傷により誘発されたと思われる1症例を報告している。また、体質説についても見逃すことはできず、亀山²²⁾は唾石症患者32例中2例に腎結石、1例に胆石がみられたとし、熊谷²³⁾も胆石を伴った唾石症の1例を報告し、全身的素因を示唆している。本症例においては、摘出した唾石は魚骨を核とし、その周囲に層状に石灰沈着をきたした様相を呈していた。したがって、魚骨が顎下腺管内に迷入し、それがために腺組織に炎症を招来し、唾液のうっ滞、成分の変化などを生じ、魚骨を中心とした石灰沈着を起こしたものと推察され、異物説を裏づける非常に興味ある症例と思われる。

唾石の発生部位については、Heineke³⁾は顎下腺82.2%、耳下腺12.8%、舌下腺5.0%と報告しており、同様に Rauch²⁴⁾はそれぞれ83%、10%、7%、Levy²⁵⁾は80.0%、18.9%、1.1%といずれも腺下腺、耳下腺、舌下腺の順となっている。本邦においては、池田²⁶⁾は顎下腺86%、耳下腺10%、舌下腺4%と報告し、また、原²⁷⁾は顎下腺91.4%、耳下腺0.6%、左坐²⁸⁾は顎下腺

98.7%, 耳下腺1.3%, としており, ともに舌下腺唾石は認めていない。一方, 舟生²⁹⁾, 鈴木³⁰⁾, 太田³¹⁾, 新国³²⁾は顎下腺, 舌下腺, 耳下腺の順に発生頻度が高かったと記載しており, 総体的に外国例と比べて, 本邦では耳下腺唾石が少ないようである。しかし, いずれにしても内外を問わず, 顎下腺に好発しやすいということでは一致している。その理由としては, 顎下腺唾石は耳下腺唾石よりもムチンの含有量が多く, 粘稠性が高いこと, アルカリ性でカルシウム塩, リン酸塩を多く含んでいること, また, 顎下腺管が耳下腺管より長く, 開口部が口底にあるため唾液が停滞しやすく, 細菌や異物などの影響を受けやすいことなどがあげられている^{27,28,33~35)}。さらに, 顎下腺唾石の存在位置を詳細にみると, Rauch²⁴⁾は顎下腺導管内70%に対し, 顎下腺体内30%, 原ら²⁷⁾は導管内68.6%, 腺体内6.7%, 腺体と腺管の移行部16.3%, 水野ら³⁶⁾は導管内68.1%, 移行部を含めた腺体内31.9%と述べており, 圧倒的に導管内唾石が多く占めている。本症例も顎下腺管内に発生しており, 好発部位に一致するものである。

発症年齢については, 本邦では3歳から³⁷⁾83歳まで³⁸⁾広範囲に分布しており, 20~40歳代に好発するといわれている^{3,6,27,28,32,36,39~43)}。外国例においても, Burdel⁴⁴⁾の生後3か月から Levy²⁵⁾の93歳というもののまで幅広く各年代にわたっているが, 幼児および高齢者には少ないようである。性別では, 一般に男性に多いとされているが^{3,6,26,32,36,40,41,43,45,46)}, 原ら²⁷⁾, 左坐ら²⁸⁾, 嶋本ら⁴⁷⁾は男女はほぼ同数であったと述べている。

主訴としては, 唾液腺部の腫脹が圧倒的に多く^{28,45)}, 次いで, 腫脹に疼痛を伴うもの, その他, 唾仙痛, 嚥下痛, 開口障害などがあげられる。しかし, なかには自覚症状がなく, X線撮影により偶然唾石が発見された症例も少数ながらみられる³⁶⁾。

症状を自覚してから受診するまでの期間は, 比較的長く, その平均期間について, 原ら²⁷⁾, 滝川ら⁴⁵⁾, 高橋⁴⁸⁾はそれぞれ2年5か月, 6年7か月, 7年10か月と述べている。また, 大築ら⁴³⁾は顎下腺内唾石で, 症状初発から来院までに50年もの長期間を要した症例を報告している。さらに, 原ら²⁷⁾, 小野ら⁴⁹⁾は発症部位と自覚期間との関係について言及し, 管内唾石では期間が短いものに対し, 腺内唾石は長い傾向にあるとしている。これは Thoma⁵⁰⁾が述べるごとく管内唾石では腺体内唾石よりも唾仙痛をはじめ急性症状が著しいためであらう。われわれの症例では, 初診までに2回顎下部の腫脹をきたしているが, 疼痛もなく, 短期間で自然消退したため放置しており, 初発症状を自覚してから約1年を経て来院するに至っている。

次に, 唾石の数については, 1症例について1個とするものが大部分であり, 複数個の症例の頻度は, 原ら²⁷⁾は31.5%, 左坐ら²⁸⁾は19.9%, 久保ら⁴⁰⁾は3.8%, 大築

ら⁴³⁾は21.4%, 滝川ら⁴⁵⁾は25.6%, 藤原ら⁵¹⁾は37.5%と記載している。発症部位と唾石数の関係をみると, 顎下腺においては複数個の症例が比較的少ないのに対し, 耳下腺唾石では佐藤ら⁵²⁾の統計的分析によると, 26例中12例(46.2%)と高頻度を占め, なかには1症例に36個の唾石を有したという報告もみられる⁵³⁾。また, 唾石の大きさは, König⁵⁴⁾の182gという巨大なものまで種々の大きさの症例が報告されているが, 一般的には10mm前後のものが多くいようである。本症例は長径約6mm, 幅径約2mmの長楕円形で, 比較的小さな唾石ということができる。

治療法については, 通常, 唾石の外科的摘出が行われており, 口腔内から唾石を摘出する口内法と, 口腔外から唾石のみを摘出するかあるいは顎下腺も含めて摘出する口外法に分類される。唾石の存在部位により摘出法は異なり, 大築ら⁴³⁾は①腺内唾石はすべて口外法により顎下腺, 管とともに唾石を摘出する。②管内および移行部唾石は原則として口内法により唾石を摘出するが, 炎症性変化が高度で, 腺機能低下が推測されるもの, 別に腺内にも唾石が存在すると思われるもの, また, 既往症で再発の傾向が強いものに対しては腺をとともに摘出する, という基準を示している。わたくしたちも大築らとはほぼ同意見であり, 原則的に腺内唾石は顎下腺も含めて唾石を摘出し, 管内唾石は口内法を適応して唾石のみを摘出している。また, 移行部唾石についても極力口内法を選択し, まず唾石のみを摘出した上で経過観察し, 炎症が消退せず, 腺機能の回復がみられないような場合には腺摘出を行っている。今回のわたくしたちの症例では, 初回到口腔内より唾石のみを摘出し, 消炎療法を施したが, 炎症症状は消失せず, 臨床的に慢性硬化性唾液腺炎と診断し, 顎下腺の摘出を行ったものである。その後, 経過は良好であり, 現在, 術後約2年を経過しているが, 再発の徴候は認められない。

結 語

わたくしたちは, 37歳男性で, 顎下腺管内に迷入した魚骨を核として形成されたとと思われる唾石症の1例を経験したので, 異物説を示唆する興味深い症例と考え, 文献的考察を加えて報告した。

本論文の要旨は, 昭和56年11月15日, 第24回日本口腔科学会中部地方会において発表した。

引 用 文 献

- 1) 内堀健二, 中山桂二, 他: 小唾液腺に生じた唾石症の1例. 口科誌 28: 63-74 1979.
- 2) Kroiss, F.: 45) より引用.

- 3) Heineke, H.: Deutsche Chirurgie. Lief 33 Teil 2, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart, 1913, p 376-405.
- 4) Küttner, H.: Handbuch der Praktischen Chirurgie. 1th Ed, Verlag von Ferdinand Enke, Stuttgart, 1926, p 927-935.
- 5) 槇 正男, 竹村文祥: 唾石の臨床的知見補遺. 東京医事新誌 2742: 2015-2018 1931. 2743: 2092-2095 1931. 2744: 2133-2135 1931. 2145: 2170-2176 1931.
- 6) 高橋利貞: 唾石症ノ病理ニ就テ (唾石生成機軸ニ関スル知見). 口病誌 13: 367-383 1939.
- 7) Söderlund, G.: Primäre Aktinomykose der Glandula Sublingualis. Dtsch Med Wschr 34: 1633-1634 1913.
- 8) Naeslund, C.: 6) より引用.
- 9) 池尻 茂, 梶山 稔: 唾石症の1例 (抄). 口科誌 12: 204 1963.
- 10) 高添一郎: 口腔内好気性 Leptotrichia の菌体内石灰化に関する研究. 歯科学報 61: 394-401 1963.
- 11) 内田 實, 石井雅良, 他: 細菌が成因と思われる巨大な顎下腺内唾石の走査電顕的観察. 耳喉 51: 235-245 1979.
- 12) Euler, H.: 45) より引用.
- 13) 村島: 45) より引用.
- 14) 久野吉雄, 木邑知義, 他: 顎下腺管内に迷入した異物を核として形成されたと思われる唾石の1例について. 日口外誌 17: 52-55 1971.
- 15) 宮城亘山: 興味ある唾石症例. 耳喉 12: 390-392 1939.
- 16) 杉原禮彦, 須崎 巖: 耳下腺排泄管異物による急性化膿性耳下腺炎の1例 (抄). 外科 12: 585 1950.
- 17) 呉 修治, 太田俊介: 魚骨片刺入による化膿性耳下腺炎に就て. 臨床歯科 192: 36 1956.
- 18) 福田道男, 岡本次郎, 他: 顎下腺排泄管に迷入せる異物の1例について. 歯界展望 20: 1296-1298 1962.
- 19) 鈴木千賀志: 顎下唾液腺実質内異物. 日外会誌 36: 2735-2737 1936.
- 20) 綾仁信夫, 島野圭司, 他: 多発性耳下腺唾石症. 耳喉 50: 59-62 1978.
- 21) 藤井隆太郎, 福武正純, 他: 唾石症の2例について. 歯科医学 21: 135-136 1958.
- 22) 亀山忠光, 喜多清基, 他: 腎結石を有する唾石症の1例 (偏光顕微鏡による観察. 口科誌 30: 270-275 1981.
- 23) 熊谷京子, 亀山忠光, 他: 胆石を伴った唾石症の1例——胆石と唾石の化学分析による比較——. 口科誌 32: 606-612 1983.
- 24) Rauch, S.: 27) より引用.
- 25) Levy, D.M., ReMine, W.H., et al.: Salivary gland calculi. JAMA 181: 1115-1119 1962.
- 26) 池田朝雄: 顎下腺唾石症の臨床と其病理組織学的研究. 耳鼻咽喉科展望 2 補 2: 236-251 1959.
- 27) 原 利通, 福田健二, 他: 唾石症の臨床統計的および病理組織学的観察. 日口外誌 25: 1066-1072 1979.
- 28) 左坐春喜, 篠原正徳, 他: 唾石症の臨床統計的検索. 日口外誌 29: 1304-1309 1983.
- 29) 舟生秀夫: 本邦並に各国文献に現われたる唾石症の統計学的観察. 日本之歯界 16: 376-391 1936.
- 30) 鈴木忠房: 唾石症のレ線学的研究. 臨床歯科 12: 423-449 1940.
- 31) 太田芳樹: 唾石症知見補遺. 大日本歯科 101: 39-50 1941.
- 32) 新国俊彦, 中村平蔵, 他: 結石症成因に関する臨床的研究——特に唾石症を中心として——. 歯科月報 35: 385-387 1960.
- 33) 池端邦夫, 今田晴隆, 他: ワルトン管唾石症の一治験. 臨床歯科 224: 37-39 1959.
- 34) 中村平蔵監修: 最新口腔外科学. 第1版, 医歯薬出版, 東京, 1971, 824-825頁.
- 35) 平出文久, 野村恭也: 唾石の形態学的観察. 耳喉 50: 241-248 1978.
- 36) 水野吉広, 福田 博, 他: 唾液腺疾患の臨床的研究 第1報 12年間の臨床統計. 日口外誌 28: 903-916 1982.
- 37) 堀田 恒: 3歳の女兒の唾石症の1例について (抄). 口科誌 10: 283 1961.
- 38) 吉尾謙二, 松岡成明, 他: 自然に排出した巨大な唾石の二例に就て. 熊本医会誌 29: 500-504 1955.
- 39) 竹岡榮二, 宇治木ツユ子: 唾石症について. 外科の領域 1: 597-600 1953.
- 40) 久保正雄, 佐倉保利: 唾石症の統計的観察. 耳喉 35: 481-483 1963.
- 41) 佐藤 匠, 吉村茂男, 他: 本教室における唾石症の臨床統計的検討 (抄). 京大口科紀要 6: 192 1966.
- 42) 亀山忠光, 森永 太, 他: 幼児と老人の唾石症2例. 日口外誌 22: 498-505 1976.
- 43) 大築安春, 植田尚男: 顎下腺唾石症の臨床及び治療法の選択について. 千葉医会誌 36: 979-991 1960.
- 44) Burdel, C.: 43) より引用.
- 45) 滝川富雄, 藍原健児, 他: 顎下腺内唾石症について. 日大歯学 44: 159-173 1970.
- 46) 田縁 昭, 児玉昭昭: 過去3年間に於ける唾石症の10例について. 日口外誌 18: 341-346 1972.
- 47) 嶋本加寿子: 顎下腺唾石症の臨床的観察. 耳鼻臨床 68: 1133-1137 1975.
- 48) 高橋利貞: 39) より引用.
- 49) 小野克己, 古川哲夫, 他: 最新経験した唾石症の21例について (抄). 日口外誌 25: 256-257 1979.
- 50) Thoma, K.H.: 45) より引用.

- 51) 藤原弘旦, 草野彰康, 他: 最近5年間に経験した唾石症24例の臨床的観察(抄). 日口外誌 19: 708 1973.
- 52) 佐藤泰則, 高久 暹, 他: 耳下腺唾石症の1例. 日口外誌 27: 1456-1460 1981.
- 53) 牟田 実: 唾液瘻を有する耳下腺唾石治療例(抄). 日耳鼻 62: 1402 1959.
- 54) König, E.: 43) より引用.