静止性骨空洞の6例

和田 明・林 洋紀・木村 享・筒井重行
木村義孝・南雲正男・曾田忠雄*

Lingual mandibular bone concavity: Report of 6 cases

Akira WADA・Yoki HAYASHI・Toru KIMURA・Shigeyuki TSUTSUI
Yoshitaka KIMURA・Masao NAGUMO・Tadao SODA*

Abstract: Six cases of lingual mandibular bone concavity are reported in this paper with review of the literature. This concavity is usually seen between the mandibular canal and the inferior border of the mandible, just anterior to the mandibular angle. This condition is also seen in the anterior portion of the mandible.

A variety of terms have been applied to this bone concavity, including static bone cavity, static bone defect, latent bone cyst, idiopathic bone cavity, aberrant salivary gland tissue in the mandible, developmental bone cyst, and so on. Recently, the term, lingual mandibular bone concavity, is thought to express this condition most precisely. Since Stafne described this condition in 1942, numerous cases have been reported in the English literature. In Japan, however, only 49 cases have been reported in the available literature.

Of our cases, five were present in the posterior portion of the mandible and one in the anterior portion. All our cases occurred in males over the fifth decade. Under the clinical diagnosis of mandibular cyst, the one in the anterior portion was treated surgically and its content was examined microscopically. Microscopic findings revealed normal sublingual salivary gland tissue. From the result, the diagnosis of lingual mandibular bone concavity was made. Another cases were diagnosed by clinical and radiographic findings. These cases are now kept under observation.

Of 55 cases reported in the Japanese literature including our 6 cases, 51 cases occurred in males. Although, no site distribution was reported previously, our study revealed an inclination to the left side. Most of contents were salivary gland tissue, but fibrous connective tissue and fatty tissue were occasionally involved. It is suggested that salivary gland tissue changes to fibrous connective tissue and fatty tissue with aging. Therefore, salivary gland tissue is considered to play an important role in the formation of this condition.

Key words: static bone cavity, idiopathic bone cavity

昭和大学歯学部第2口腔外科学教室
(主任：南雲正男教授)

* 国立病院医療センター歯科口腔外科
(主任：曾田忠雄医長)

The Second Department of Oral Surgery, School of Dentistry, Showa University (Chief: Prof. Masao Nagumo)

* Department of Dentistry and Oral Surgery, National Hospital Medical Center (Chief: Dr. Tadao Soda)

受付日：昭和58年9月26日

緒 言

静止性骨空洞は下顎角部付近の下顎管下方に位置する骨腔で、臨床的には無症状に経過し、X線的には類円形、単胞性の囊胞様陰影を呈する疾患として知られている^{1,2)}。本症は下顎舌側皮質からの骨欠損であることから、最近では lingual mandibular bone concavity の名称³⁻⁵⁾が用いられている。

今回著者らは、昭和56年11月より同58年7月までの間

写真 1 症例 1 : X線所見

に lingual mandibular bone concavity と思われる 6 例を経験したのでその概要を報告する。

症 例

症 例 1

患 者 : 66歳 男性。

初 診 : 昭和56年11月■日。

主 訴 : 457 抜歯依頼。

家族歴・既往歴 : 特記すべき事項はなかった。

現病歴 : 某歯科医院より 457 抜歯依頼にて当科を紹介され来院した。

現 症

全身所見 : 体格は中等度, 栄養状態は良好で, 他に特記すべき事項は認められなかった。

顔貌所見および所属リンパ節所見 : 特記すべき事項はなかった。

口腔内所見 : $\frac{4}{7-3}$ 冠の装着, $\frac{7-5}{2+26}$ 欠損, 14 残根, 157 動揺と同部歯槽骨の高度吸収を認めた。他に口腔内に特に異常はみられなかった。

X線所見 : 左側下顎角部前方で下顎管下方に 7×20 mm の単胞性橢円形の境界明瞭な透過像を認めた (写真 1)。

臨床診断 : 静止性骨空洞。

症 例 2

患 者 : 46歳 男性。

初 診 : 昭和57年11月■日。

主 訴 : 112 根尖部の嚢胞様骨欠損像の精査。

家族歴・既往歴 : 特記すべき事項はなかった。

現病歴 : 昭和57年 9 月頃, 下顎前歯部の自発痛のため某歯科医院を受診し, 抗生剤と鎮痛剤の投与を受け数日後疼痛は消失した。しかし, X線診査により 112 根尖部に類円形の嚢胞様透過像が認められたので, 精査のため当科を紹介され来院した。

現 症

全身所見 : 体格は中等度, 栄養状態は良好で, 他に特記すべき事項は認められなかった。

写真 2 症例 2 : X線所見

顔貌所見および所属リンパ節所見 : 特記すべき事項はなかった。

口腔内所見 : 1+3 に齶蝕, 3+3 の歯肉に軽度の発赤, 腫脹が認められた。11 は失活歯で打診痛は 21 のみに認められた。なお, 112 根尖部には腫脹, 圧痛などは認められなかった。

X線所見 : 下顎前歯部歯槽骨は中等度の水平性骨吸収像を示しており, 11 根尖部に単胞性類円形で小指頭大の境界明瞭な X線透過像を認めた。また 11 の歯根膜腔は拡大し, 嚢胞様陰影部に連続していた (写真 2)。

臨床診断 : 下顎嚢胞。

処置および経過 : 上記診断のもとに昭和57年11月■日に局麻下にて摘出術を施行した。11 部より 13 部の唇側歯肉に切開を加え粘膜骨膜弁を剝離翻転すると, 表面は粗造であったが 11 根尖部の骨はやや膨隆しており, 骨欠損は認められなかった。非薄な骨を削除すると淡黄赤色の充実性の内容物が認められた。周囲骨との癒着はなく容易に剝離でき, 骨欠損は舌側まで達していた。内容物を牽引すると口底部舌下ヒダが牽引されたため舌側部を切断して摘出した。また, 11 は周囲の歯槽骨吸収が著明であり, かつ動揺も高度のため保存不可能と考え抜歯を行った。その後の治癒経過は良好であった。

摘出物肉眼所見 : 大きさは $8 \times 8 \times 10$ mm で, 色は淡黄赤色を呈していた。表面は滑沢であったが, 分葉状の凹凸が認められた。

病理組織診断 : 数個の腺葉よりなる正常舌下腺組織であった。

確定診断 : 静止性骨空洞。

写真 3 症例 3 : X線所見

写真 4 症例 4 : X線所見

症 例 3

患 者 : 50歳 男性.

初 診 : 昭和58年1月■日.

主 訴 : 右側下顎角部の嚢胞様骨欠損像の精査.

家族歴・既往歴 : 特記すべき事項はなかった.

現病歴 : 昭和57年9月頃某病院の人間ドックに入り, その際, 偶然に左下顎角部に卵円形のX線透過像が発見され, 精査のため当科を紹介され来院した.

現 症

全身所見 : 体格は中等度, 栄養状態は良好であり, 他に特記すべき事項は認められなかった.

顔貌所見および所属リンパ節所見 : 特記すべき事項はなかった.

口腔内所見 : 16欠損, $\frac{717}{8178}$ に修復物を認めた. 他に口腔内は特に異常はみられなかった.

X線所見 : 右側下顎角部やや前方の下顎管下方に大きさ13×22 mmの単胞性卵円形の境界明瞭な透過像を認めた(写真3).

臨床診断 : 静止性骨空洞.

症 例 4

患 者 : 49歳 男性.

初 診 : 昭和58年4月■日.

主 訴 : 左側下顎角部の嚢胞様骨欠損像の精査.

家族歴・既往歴 : 特記すべき事項はなかった.

現病歴 : 昭和58年4月■日に歯科治療のため某歯科医院を受診したところ, 左下顎角部に卵円形のX線透過像

写真 5 症例 5 : X線所見

を指摘され, 精査のため当科を紹介され来院した.

現 症

全身所見 : 体格は中等度, 栄養状態は良好であり, 他に特記すべき事項は認められなかった.

顔貌所見および所属リンパ節所見 : 特記すべき事項はなかった.

口腔内所見 : 6欠損, $\frac{754}{8\sim616}$ に修復物を認めた. 他に口腔内は特に異常はみられなかった.

X線所見 : 左側下顎角部前方の下顎管下方に大きさ8×12 mmの骨硬化像は伴わないが, 単胞性卵円形の境界明瞭な透過像を認めた(写真4).

臨床診断 : 静止性骨空洞.

症 例 5

患 者 : 40歳 男性.

初 診 : 昭和58年5月■日.

主 訴 : 右側下顎角部の嚢胞様骨欠損像の精査.

家族歴・既往歴 : 特記すべき事項はなかった.

現病歴 : 昭和58年5月■日に歯科治療のため某歯科医院を受診したところ, 7部下顎下縁付近の透過像を指摘され, 精査のため当科を紹介され来院した.

現 症

全身所見 : 体格は中等度, 栄養状態は良好であり, 他に特記すべき事項は認められなかった.

局所所見 : 口腔外より触診にて7相当部の下顎下縁舌側に軽度の陥凹を認めた. なお, 所属リンパ節には異常は認められなかった.

口腔内所見 : 76に修復物が認められたが, 他の部位に異常はみられなかった.

X線所見 : 右側下顎角部前方の下顎管下方に大きさ10×28 mmの単胞性楕円形の境界明瞭な透過像を認めた(写真5).

臨床診断 : 静止性骨空洞.

症 例 6

患 者 : 44歳 男性.

初 診 : 昭和58年7月■日.

主 訴 : 左側下顎下縁のX線透過像の精査.

写真 6 症例 6 : X線所見

写真 7 症例 6 : 左顎下腺造影像

家族歴・既往歴：特記すべき事項はなかった。

現病歴：昭和58年7月■日に歯科治療のため某歯科医院を受診したところ、左下顎下縁のX線透過像を指摘され、精査のため当科を紹介され来院した。

現 症

全身所見：体格は中等度、栄養状態は良好であり、他に特記すべき事項は認められなかった。

顔貌所見および所属リンパ節所見：特記すべき事項はなかった。

口腔内所見： $\frac{178}{818}$ に修復物、 $\frac{7+8}{8+7}$ に軽度の辺縁性歯周炎が認められたが、ほかに口腔内は特に異常はみられなかった。

X線所見：左側下顎角部前方の下顎管下方に大きさ $11 \times 12 \text{ mm}$ の半楕円形のX線透過像を認めた。近心側は一部骨硬化が認められ、下顎下縁皮質は欠除していた(写真6)。また左顎下腺造影写真(写真7)では、腺葉の一部が骨欠損部へ進入していると思われる像が認められた。

臨床診断：静止性骨空洞。

考 察

本症は、Stafne¹⁾ が1942年に bone cavities situated near the angle of the mandible という標題で報告して以来、諸外国においては数多くの文献がみられている^{6,7)}。しかし、本邦においては、千野ら⁸⁾の報告を初めとして、著者らの渉猟した範囲では49例と比較的報告が少ない(表1)^{3,8-21)}。報告者により種々の名称で報告されており、static bone cavity^{2,15,17,22)}、static bone defect^{16,23,24)}、latent bone cyst^{9,12,13)}、idiopathic bone cavity^{6,8)}、developmental bone defect^{21,25)}、aberrant submandibular gland tissue in the mandible²⁶⁻²⁹⁾、lingual mandibular bone concavity³⁻⁵⁾、lingual mandibular bone cavity^{30,31)} などと呼ばれている。しかし文献的に、真の嚢胞壁を有しておらず、内容物も大多数は唾

液腺であること、下顎骨の顎下腺窩に一致した陥凹としてみられること、さらに Tolman ら²⁵⁾、Hansson ら³¹⁾の報告のように増大する症例があることから考えると、lingual mandibular bone concavity という名称が最もよくその性質を表していると思われる。

本症の発生頻度に関する報告をみると、パノラマX線写真による検索では、江原ら²¹⁾は9,718人中21人に、Oikarinen ら³²⁾は10,000人中10人に、Karmiola ら²³⁾は成人男子4,963人中18人に、そして Lilly ら³³⁾は1,287人の歯科医のうち2人に本症をみだしている。また、乾燥下顎骨における検索では Kay ら³⁴⁾は1,285体中11体に Langlais ら³⁵⁾は469体中18体に、そして Harvey ら³⁶⁾は約950体中7体に本症がみられたことを報告している。解剖学的に検索した Kay ら³⁴⁾、Langlais ら³⁵⁾、および Harvey ら³⁶⁾の報告を除くと、本症は0.1~0.36%の範囲でみられており、それほどまれな疾患ではないようである。著者らの症例のうち前歯部症例を除く5例は、偶然X線検査で発見されたものであり、近年パノラマX線写真が汎用されるようになってきていることから、今後本症に遭遇する機会が増加するものと思われる。

性別では、理由は明らかではないが男性に多いとされており、女性に発症した報告は河野ら³⁾の1例、江原ら²¹⁾の3例の計4例であり、著者らの症例を含め本邦55例中4例とやはり男性に多いようである。

年齢的には11³¹⁾~77²¹⁾歳までの報告がみられるが、40, 50歳代に多いのが特徴的である^{9,20)}。著者らの症例においても(表2)40歳代4例、50, 60歳代各1例とすべて中年以降の者にみられている。

発症部位は一般に第1大臼歯から後方にかけての部位にみられ、そのほとんどは下顎角部やや前方に位置している。また、下顎前方部に生じた症例も、千野ら⁸⁾、河野ら³⁾、および著者らの1例と本邦で3例、諸外国においては1957年 Richard ら²⁸⁾が報告して以来10例と少数であるが報告がみられている^{4-6,26-28,37-40)}。

表 1 本邦における症例

年度	報告者	年齢	性	部 位	内容物・その他
1969	千 野	37	♂	3 相当部	顎下腺
1969	西 嶋	57	♂	左下顎角部	顎下腺
1972	菅 原	48	♂	左下顎角部前方	顎下腺
1974	伊 藤	60	♂	左下顎角部	未検索
		44	♂	左下顎角部	な し
		59	♂	右下顎角部	結合組織
1975	扇 内	44	♂	右下顎角部	顎下腺
		53	♂	右下顎角部	線維組織
1975	太郎丸	56	♂	左下顎角部	顎下腺
1975	椿 本	63	♂	右下顎角部	リンパ組織, 脂肪組織
1977	芳 賀	58	♂	左下顎角部やや前方	リンパ組織
1977	飯 野	64	♂	左下顎角部やや前方	顎下腺
1977	江 原	29	♂21例	24症例すべて下顎大臼歯部	すべて未検索
		77	♀ 3例		
1978	倉 科	55	♂	左下顎角部	顎下腺
1979	竹之下	49	♂	左下顎角部	6例は未検索 1例は脂肪組織
		72	♂	6 相当部	
		32	♂	左下顎角部	
		46	♂	16 相当部	
		45	♂	右下顎角部	
		61	♂	左下顎角部	
		47	♂	左下顎角部	
1979	鈴 木	49	♂	左下顎角部	未検索
1980	大 谷	33	♂	左下顎角部	顎下腺
		45	♂	右下顎角部	脂肪組織
		51	♂	右下顎角部	未検索
1982	河 野	46	♀	1345 相当部	舌下腺
1983	和 田	40	♀	1 症例 12 相当部	1 例舌下腺
		66		5 症例 下顎角部	5 例未検索

表 2 自 験 例

	性・年齢	主 訴	X-P 所 見			内容物・その他
			部 位	大きさ (mm)	形	
症例 1	男 66	1457 抜歯依頼	左下顎角部前方	7×20	橢円形	未検索
症例 2	男 46	2112 部疼痛	12 相当部	15×15	類円形	舌下腺
症例 3	男 50	右側下顎骨の骨欠損像の精査	右下顎角部やや前方	13×22	卵円形	未検索
症例 4	男 49	左側下顎骨の骨欠損像の精査	左下顎角部前方	8×12	卵円形	未検索
症例 5	男 40	右側下顎骨の骨欠損像の精査	右下顎角部前方	10×28	橢円形	未検索
症例 6	男 44	左側下顎骨の骨欠損像の精査	左下顎角部前方	11×12	半橢円形	未検索 顎下腺造影

両側性の症例もまれにみられるが^{1,21)}、ほとんどは片側性であり、左右差はないといわれている^{8,9,11,17,20)}。しかし本邦では、部位の記載のない江原ら²¹⁾の報告例および前方部の3症例を除く28例では左側18例、右側10例とやや左側に多いようである。

X線所見では、類円形、単胞性の嚢胞様陰影を呈し、その辺縁部は緻密なX線不透過像で囲まれ、境界は明瞭であるといわれている^{1,2)}。また、辺縁部が下顎骨下縁の骨皮質と連続した症例もみられ、江原ら²¹⁾はこのようなX線像は、骨中心性に増大した病変が骨膨隆の結果骨皮質を破壊した像ではなく、骨の外側からの圧迫吸収による骨欠損を証明しうるものであると述べている。本疾患は骨欠損部に顎下腺を含んでいることが多いことから、顎下腺造影も試みられており、診断に有用だとする報告がある^{7,16,17)}。しかし、神田は本病変において腺葉が欠損部に進入している例はそれほど多くないこと、さらに、造影法において腺葉が欠損部近くにあっても確実に欠損内に進入していることがわかりにくいことを理由に、唾液腺造影は確かな根拠とはならないと述べている¹⁹⁾。著者らも症例6については、遠心辺縁部が明確でないため顎下腺造影を行ってみたが、診断に有用と思われる造影像は得られなかった。

成因については定説はなく、Stafne¹⁾が軟骨残遺説を唱えて以来、種々の見解が述べられている^{11,16,21,24,34,35,41)}。しかし、現在ではこの部に隣接する唾液腺その他の軟組織の肥大増殖あるいは迷入による舌側骨皮質の限局性欠損であると考えられている²⁾。実際に内容物についての報告をみると、まれに内容物の存在しない症例の報告もみられるが^{4,6,11)}、顎下腺、舌下腺など唾液腺組織がほとんど^{3,10,16,20,24,28-29)}で、他に結合組織^{11,12)}、脂肪組織^{19,20)}、リンパ組織^{14,15)}が認められている。病理学的に顎下腺は、加齢により結合組織や脂肪組織などの実質性細胞に置換してくる現象が認められており⁴²⁾、一方顎下リンパ節や小葉間結合組織中のリンパ小節などのリンパ組織は、腺の導管に沿って出現することから、顎下腺の肥大、位置異常などにより圧排され陥凹部に入りこんだ可能性がもっとも考えやすい。なお、内容物のない症例に対し、Choukas ら²⁴⁾は手術操作時に出してしまったのではないかと推測しており、伊藤ら¹¹⁾の1例については、顎骨で完全に囲まれた骨腔であったことから、動脈瘤性骨嚢胞も疑われている。また、Harvey ら³⁶⁾、および Uemura ら⁷⁾は、これらの陥凹が顎下腺、舌下腺部にみられ耳下腺部にはほとんどみられないことに疑問を投げかけているが、これは耳下腺の大部分が咬筋上に位置することによるものと考えられる。すなわち、陥凹は唾液腺が直接骨面に接する部位にのみ発生することが推測される。下顎角部やや前方および下顎前方部の陥凹は、解剖学的にそれぞれ顎舌骨筋線下部の顎下腺窩および上部の舌下腺窩に一致するといわれ、同部には筋の付

着はみられない。また、下顎角部と報告されている症例についても厳密にはややその前方であり、これはその発生部位が内側翼突筋の付着部と顎下腺の位置によって規定される結果と考えられる。したがって、これらのことを考え合えると、骨欠損の形成にはやはり唾液腺が重要な役割を演じていることが想像される。

処置については、本症はまったく機能障害をきたさないため診断がつけば積極的な治療は必要なく、X線の経過観察が好ましいと考えられている^{8,11,30)}。しかし、内容物が多形性腺腫であったという Simpson ら⁴³⁾の報告や、Tolman ら²⁵⁾、Hansson ら³¹⁾のように骨欠損部が増大したという報告などを考えると、外科的検索の必要性もある程度念頭にいて経過観察をする必要があると思われる。

結 語

下顎前歯部の1例および下顎角部付近の5例のlingual mandibular bone concavityを経験したので、若干の文献的考察を加え報告した。

本症はX線写真および臨床症状から診断がつき、とくに治療の必要はないと考えられるため、前歯部症例を除いて外科的侵襲を加えず現在経過のみ観察中である。

本論文の要旨は、第125回日本口腔外科学会関東地方会において発表した。

引 用 文 献

- 1) Stafne, E.C.: Bone cavities situated near the angle of the mandible. J Am Dent Assoc 29: 1969-1972 1942.
- 2) 石川 悟朗監修: 口腔病理学Ⅱ. 改訂版, 永末書店, 京都, 1982, 399-401頁.
- 3) 河野泰孝, 池村邦男, 他: 進行性全身性硬化症患者の下顎骨前方部にみられた静止性骨空洞. 日口外誌 28: 785-788 1982.
- 4) Conner, M.S.: Anterior lingual mandibular bone concavity: Report of a case. Oral surg 48: 413-414 1979.
- 5) Layne, E.L., Morgan, A.F., et al.: Anterior lingual mandibular bone concavity: report of case. J Oral Surg 39: 559-600 1981.
- 6) Bergenholtz, A. and Persson, G.: Idiopathic bone cavities: A report of four cases. Oral Surg 16: 703-712 1963.
- 7) Uemura, S., Fujishita, M., et al.: Radiographic interpretation of so-called developmental defect of mandible. Oral Surg 41: 120-128 1976.
- 8) 千野武広, 藤井久弥, 他: Stafne's idiopathic

- bone cavity の1例. 日口外誌 15: 124-127 1969.
- 9) 西嶋克巳, 友沢 基, 他: いわゆる Latent bone cyst の1例. 日口外誌 15: 205-208 1969.
 - 10) 菅原利夫, 森下正明, 他: Developmental defect of mandible containing salivary gland tissue stafne の1例について. (抄) 口科誌 21: 406-407 1972.
 - 11) 伊藤輝光, 曾我宏世, 他: 下顎限局性骨欠損および骨腔の臨床的病態とその成因に関する考察. 口科誌 23: 441-451 1974.
 - 12) 扇本秀樹, 阿部広幸, 他: いわゆる Latent bone cyst の2症例. 日口外誌 21: 349-353 1975.
 - 13) 太郎丸浩, 手島貞一, 他: Latent bone cyst の1例. (抄) 日口外誌 21: 905 1975.
 - 14) 椿本雅有, 坂本忠幸, 他: Lingual mandibular concavity の1例. (抄) 日口外誌 21: 905-906 1975.
 - 15) 芳賀信義, 村田晴康, 他: Static bone cavity の1例. 日口外誌 23: 314-317 1977.
 - 16) 飯野ゆき子, 草刈 潤, 他: いわゆる Static bone defect の1症例. 耳喉 49: 645-651 1977.
 - 17) 倉科憲治, 北和田信吾, 他: Static bone cavity の1例. 口科誌 27: 69-73 1978.
 - 18) 鈴木一則, 宇賀恵子, 他: 静止性骨空洞と思われる1症例について. (抄) 日口外誌 28: 588-589 1979.
 - 19) 竹之下康治, 久保敬司, 他: Lingual mandibular bone depression (Stafne's idiopathic bone cavity) の7例. (抄) 口科誌 28: 380 1979.
 - 20) 大谷端夫, 泉 誠一, 他: いわゆる Static bone defect の3症例. 日口外誌 26: 804-809 1980.
 - 21) 江原昌弘, 内海 潔, 他: いわゆる Developmental bone defect の24症例のエックス線写真の検索. 齒放 17: 44-51 1977.
 - 22) Bernstein, H.F., Lam, R.C., et al.: Static bone cavities of the mandible: Review of literature and Report of case. J Oral Surg 16: 46-52 1958.
 - 23) Karmiol, M. and Walsh, R.F.: Incidence of static bone defect of the mandible. Oral Surg 26: 225-228 1968.
 - 24) Choukas, N.C. and Toto, P.D.: Etiology of static bone defects of the mandible. J Oral Surg 18: 16-20 1960.
 - 25) Tolman, D.E. and Stafne, E.C.: Developmental bone defects of the mandible. Oral Surg 24: 488-490 1967.
 - 26) Stene, T. and Pederson, K.N.: Aberrant salivary gland tissue in the anterior mandible. Oral Surg 44: 72-75 1977.
 - 27) Araiche, M. and Brode, H.: Aberrant salivary gland tissue in the mandible. Oral Surg 12: 727-729 1959.
 - 28) Richard, E.L. and Ziskind, J.: Aberrant salivary gland tissue in mandible. Oral Surg 10: 1086-1090 1957.
 - 29) Hayes, H.: Aberrant submaxillary gland tissue presenting as a cyst of the jaw. Oral Surg 14: 313-316 1961.
 - 30) Olech, E. and Arora, B.K.: Lingual mandibular bone cavity. Oral Surg 14: 1360-1366 1961.
 - 31) Hansson, L.: Development of a lingual mandibular bone cavity in an 11-year-old boy. Oral Surg 49: 376-378 1980.
 - 32) Oikarinen, V.J. and Julku, M.: An orthopantomographic study of developmental mandibular bone defects (Stafne's idiopathic bone cavities). Int J Oral Surg 3: 71-76 1974.
 - 33) Lilly, G.E., Steiner, M., et al.: Oral health evaluation: Analysis of radiographic findings. J Am Dent Assoc 71: 635-639 1965.
 - 34) Kay, L.W.: Some anthropologic investigations of interest to oral surgeons. Int J Oral Surg 3: 363-379 1974.
 - 35) Langlais, R.P., Cottone, J., et al.: Anterior and posterior lingual depressions of the mandible. J Oral Surg 34: 502-509 1976.
 - 36) Harvey, W. and Noble, H.W.: Defects on the lingual surface of the mandible near the angle. Br J Oral Surg 6: 75-83 1968.
 - 37) Camilleri, G.: Salivary gland inclusion in the mandible. Br Dent J 114: 515-516 1963.
 - 38) Palladino, V.S., Rose, S.A., et al.: Salivary gland tissue in the mandible and stafne's mandibular 'cyst'. J Am Dent Assoc 70: 388-393 1965.
 - 39) Abramson, A.S.: Ectopic Submaxillary gland in the mandible: report of case. J Am Dent Assoc 43: 1114-1116 1966.
 - 40) Miller, A.S. and Winnick, M.: Salivary gland inclusion in the anterior mandible. Oral Surg 31: 790-797 1971.
 - 41) Rushton, M.A. and Cantab, B. Ch.: Solitary bone cysts in the mandible. Br Dent J 81: 37-49 1946.
 - 42) Waterhouse, J.P., Chisholm, D.M., et al.: Replacement of functional parenchymal cells by fat and connective tissue in human submandibular salivary glands: An age-related change. J oral path 2: 16-27 1973.
 - 43) Simpson, W.: A Stafne's mandibular defect containing a pleomorphic adenoma: report of case. J Oral Surg: 553-556 1965.