軟口蓋にみられた神経鞘腫の1例

山下尚之・亀山忠光・竹中将純・稗田照雄
田中勝己・田中俊一・中村芳明・朱雀直道

Schwannoma of the soft palate: Report of a case

Naoyuki YAMASHITA・Tadamitsu KAMEYAMA・Masazumi TAKENAKA・Teruo HIEDA
Katsumi TANAKA・Shunichi TANAKA・Yoshiaki NAKAMURA・Chokudo SUJAKU

Abstract: A case of Schwannoma of the soft palate has been reported in a 19-year-old female complaining of swelling of the right soft palate.

A soft 15×12 mm mass was noticed in the right soft palate and the clinical diagnosis was pleomorphic adenoma. The tumor was excised under local anesthesia, examined histopathologically, and diagnosed as schwannoma.

Key words: schwannoma, soft palate

緒 言

神経鞘腫は、神経鞘の schwann 細胞に由来する腫瘍であるとされ、顎口腔領域での発生は比較的まれである¹⁾。

今回、われわれは軟口蓋部に発生した神経鞘腫の1例を経験したので、その概要を報告する。

症 例

患 者：19歳 女性。

初 診：昭和59年9月■日。

主 訴：右側軟口蓋部の腫瘤形成。

家族歴：特記すべき事項なし。

既往歴：昭和57年、虫垂炎で手術、その他特記すべき事項なし。

現病歴：昭和59年9月初旬に、右上顎臼歯部の歯科治療のため、某歯科医院を受診した際、右側軟口蓋部の小指頭大の腫瘤を指摘され、当科を紹介され来院した。

現 症：全身所見；体格中等度、栄養状態は良好で皮膚等に異常所見は認められなかった。

写真1 初診時口腔内所見

局所所見：顔貌は左右対称でとくに異常所見はなく、左右の顎下リンパ節はそれぞれ1個ずつ触知し、小豆大で、圧痛はなく可動性であった。また、開口障害は認められなかった。

口腔内所見は、右側軟口蓋部を中心に15×12 mmの半球状の腫瘤を認めた。腫瘤表面は健康粘膜で被われ平滑であった。触診では腫瘤は前方で一部硬口蓋にかかり骨および周囲組織とは可動性であり圧痛はなく弾性硬であった(写真1)。なお、右側上顎臼歯は全部生活歯であった。

X線所見：硬口蓋部の骨の吸収は認められなかった。

臨床検査成績：とくに異常は認められなかった。

臨床診断：多形性腺腫の疑い。

処置および経過：上記診断にて、昭和59年10月■日、全麻下に腫瘍切除術を行った。腫瘍より約5 mm 周辺の

久留米大学医学部口腔外科学講座
(主任：朱雀直道教授)
Department of Oral Surgery, Kurume University
School of Medicine (Chief: Prof. Chokudo Sujaku)
受付日：昭和60年5月27日

写真2 術後4か月目の口腔内所見

写真5 病理組織学的所見 (H-E 染色, ×20)

写真3 摘出物所見

写真6 病理組織学的所見 (H-E 染色, ×100)

写真4 断面所見

写真7 免疫組織化学的所見 (PAP 染色, ×100)

粘膜に切開を加え、鈍的に剝離し腫瘍を一塊として切除した。切除時、小口蓋神経との連続があり骨面は吸収もなく平滑であった。術後経過は良好で、術後4か月の現在、再発は認められず、右側軟口蓋部の知覚異常も認められない(写真2)。

切除物所見：肉眼的所見；切除物の大きさは、20×15×10 mm の類球形で表面は平滑で硬さは弾性硬であった(写真3)。断面は、淡黄白色で腫瘍表層は薄い被膜

で被われ一様に充実性であった(写真4)。

病理組織学的所見：腫瘍は粘膜下組織内に存在し、薄い線維性結合組織で周囲組織と明確に境され、腫瘍細胞は束状あるいはうず巻状に充実性増殖を示した(写真5)。核は紡錘形でその配列は柵状を示しており、Verocay body もみられた。また一部には粘液腫様像もみられた(写真6)。

免疫組織化学的所見：S-100 protein 抗体の PAP 法

写真 8 透過電顕所見 (×3,400)

写真 9 透過電顕所見 (×8,000)

による染色では、同蛋白は腫瘍細胞内に強陽性に認められた(写真7)。

透過電顕所見：腫瘍細胞は互いに規則正しい配列を呈し、核は細胞の長軸に従い核小体もわずかながら認められた。胞体内にはミトコンドリア、粗面小胞体、微細線維が存在するが、腫瘍細胞の多くは極小で不規則に無数に入り組み、軸索をとりまく schwann 細胞の突起はすべて基底板で被われていた(写真8, 9)。

以上の所見より、右側軟口蓋部に発生した神経鞘腫と診断した。

考 察

神経鞘腫は1910年 Verocay²⁾が神経固有の成分である Schwann 細胞の異常増殖を主体とする神経鞘腫であることを明らかにし、神経線維腫と区別して以来、一般には Neurinoma, Neurilemmoma, Schwannoma と呼ばれ現在に至っているが、その組織起源については種々議論されてきたが、最近の電顕的、免疫組織学的検索より Schwann 細胞由来を示唆するものが多い。すなわち、石井ら³⁾によれば、本腫瘍は主として腫瘍細胞、その突起、ときとして混在する血管系の3要素より構成されている。腫瘍細胞は形、大きさともに不規則であり、核の形態は多彩をきわめ、個々の細胞の配列に一定の方向性が認められる。腫瘍細胞の形質膜の外側には、基底膜構造が明確に認められ、しばしば基底膜を伴った形質膜は細胞内陥入を形成し、この形質陥入は、Schwann 氏細胞を示唆したものであるとしているが、われわれの場合も同様の所見がえられた。しかし、神経線維腫と同一の病変かどうかについては、いまだ議論がある。

本腫瘍は神経の存在するところいずれの部位にも発生する。事実、遠城寺ら⁴⁾のわが国における良性軟部組織腫瘍8,086例についての統計的観察によれば、血管腫、

脂肪腫に次いで825例と多い。そして発生部位では、この825例中、242例が頭頸部で最も多く、その中で頸部が161例と多い。しかし、顎口腔領域での発現頻度は低いとされ、Bruce⁵⁾によるとコロンビア大学でみられた神経鞘腫130例中口腔および咽頭に発生したものは、わずか2例の1.5%であったとしている。また、本邦の百井⁶⁾によると手術時摘出されたものおよび剖検による人の皮膚における神経鞘腫115例中口腔領域では舌4例、顎下部1例の4.3%で非常に低い。顎口腔領域疾患のなかで比較しても、塩田ら⁷⁾の422例の被検臨床病理材料中にはなく、小野⁸⁾は九大での腫瘍、嚢胞疾患224例中1例、梶山ら⁹⁾は1966年から1974年までの19年間に入院処置をした諸疾患2,241例中わずか1例とし、菊池ら¹⁰⁾は昭和48年1月から昭和53年9月までの病理診断により確定した口腔領域の非歯源性良性腫瘍は126例でそのうち本腫瘍は4例であったとしている。一方、当教室の白本ら¹¹⁾は、顎骨中心性の本症の1例を報告しているが、その時10年間に当教室で取り扱った良性腫瘍は384例で本腫瘍は2例の0.5%と非常に低かったとしている。このように本腫瘍の口腔領域での発生頻度は非常に低い。

また顎口腔領域での好発部位はGolloら¹²⁾はHatziotisら¹⁾の110例にさらに自験例5例を加えた47例の文献を追加し157例について検索したところ、舌に圧倒的に多く71例で次いで頬粘膜21例、下顎骨18例、口腔底14例、口蓋部12例、歯肉、口唇各7例、口腔前庭5例、上顎骨2例の順である。本邦での亀谷ら¹³⁾の報告でも、109例中、舌が最も多く50例(45.9%)と約半数を占め、次いで口蓋10例(9.2%)であった。いずれにしても口蓋部の発生頻度は比較的低い。

発現年齢はHatziotisら¹⁾によると口腔領域の106例では10~20歳代が最も多く、次いで30歳代、40歳代、50歳代の順で、亀谷ら¹³⁾の109例では10歳代、20歳代で合わせて63例と半数以上を占めていた。このように多くの

報告者が青壮年層に発現すると述べている。

性別について、亀谷ら¹³⁾によると109例中男50例、女59例で男女比は1:1.2で女性に多く発生、梶山ら⁹⁾によるとわが国における顎口腔領域96例では6歳から76歳までであり男性43例、女性46例と性差はないと報告している。

本腫瘍は、一般に無痛性で緩慢な発育を示し、粘膜下に生じ限局性で類円形の比較的硬い腫瘤で多くは被膜を有している。大きさは1～2 cm 位のものが多い。本腫瘍の診断は、組織学的検索に頼る以外に本症例も自覚症状はなく偶然に発見されており臨床的には多形性腺腫と診断され、組織学的検索で始めて神経鞘腫と診断された。組織学的には本症は線維形成様式から Antoni A 型(束状型)と Antoni B 型(網状型)に大別され、本症例では橢円形の核をもつ腫瘍細胞が柵状配列を示すことよりA型に属する。しかし臨床ではその分類を使用しない人も出ている。

治療は、外科的に摘出することが原則とされるが、本症例では多形性腺腫を疑ったため切除した。一般に、予後は良好であるが、きわめてまれに悪性経過を示した報告もある。本症例も術後4か月目の観察では、再発は認められなかった。

結 語

19歳、女性の口蓋にみられた神経鞘腫の1例を経験したので報告した。

本論文の要旨は、昭和60年2月16日、第46回日本口腔外科学会九州地方部会において発表した。

引 用 文 献

- 1) Hatziotis, J. Ch. and Aspirides, H.: Neurilemmoma (Schwannoma) of the oral cavity. OS OM OP 24: 510-526 1967.
- 2) Verocay, J.: Zur Kenntnis der Neurofibrom. Ziegler's Beiträge Zur Path Anat 48: 1-69 1910.
- 3) 石井英男, 川端五十鈴: 神経鞘腫 (Neurilemmoma) の電子顕微鏡像について. 耳鼻臨床 61: 231-237 1968.
- 4) 遠城寺宗知, 岩崎 宏, 他: わが国における良性軟部組織腫瘍—8086例の統計的観察— 癌の臨床 20: 594-609 1955.
- 5) Bruce, K.W.: Solitary neurofibroma (Neurilemmoma, Schwannoma) of the oral cavity. OS OM OP 7: 1150-1159 1954.
- 6) 百井一郎: 神経鞘腫の病理学的研究. 新潟医誌 69: 737-757 1955.
- 7) 塩田研次, 山中弘之, 他: わが国教室過去4年間における被検臨床病理材料 422 例について. 口科誌 6: 437-443, 1957.
- 8) 小野史郎: 口腔領域の腫瘍および嚢胞に関する統計的組織学的観察. 口外誌 5: 38-43 1959.
- 9) 梶山 稔, 鬼塚謙治, 他: 舌神経鞘腫の1例. 日口外誌 21: 328-335 1975.
- 10) 菊池正明, 三浦英子, 他: 舌神経鞘腫の1例. 日口外誌 25: 419-421 1979.
- 11) 白本光鶴, 白本光七, 他: 下顎骨体部に発生した神経鞘腫の1例. 日口外誌 29: 547-552 1983.
- 12) Gallo, M.J., Moss Martin., et al.: Neurilemmoma: review of the literature and report of five cases. J. Oral Surg 35: 235-236 1977.
- 13) 亀谷明秀, 中谷善幸, 他: 歯槽粘膜に発生した神経鞘腫の1例. 日口外誌 27: 263 1981.