上顎に発生した平滑筋肉腫の1例

西嶋 克巳・長畠駿一郎*・高木 慎*
貞森平樹*・永井教之**

A case of leiomyosarcoma of the maxilla

Katsumi NISHIJIMA・Shunichiro NAGAHATA*・Shin TAKAGI*
Hiraki SADAMORI*・Noriyuki NAGAI**

Abstract: Malignant smooth-muscle tumors are common in the uterus and gastrointestinal tracts, but the occurrence of these neoplasms in the oral cavity is rare.

Oral leiomyosarcomas have been reported on only 30 occasions in the world literature. An additional case of leiomyosarcoma of the maxilla in a 42-year-old female is reported. The relevant features of leiomyosarcomas were reviewed and discussed.

Key words: leiomyosarcoma, maxilla, statistics

緒 言

口腔領域に発生する平滑筋肉腫は非常にまれで、われわれの渉猟した範囲では、Zieler¹⁾が報告して以来30例を数えるのみであった¹⁾。今回、われわれは稀有な平滑筋肉腫の1例を経験したので文献的考察を加え報告する。

症 例

患 者：42歳 女性。
初 診：昭和49年11月■日。
主 訴：左眼窩下部の疼痛性腫脹。

岡山大学歯学部口腔外科学第1講座
(主任：西嶋克巳教授)

* 香川医科大学医学部附属病院歯科口腔外科
(主任：長畠駿一郎教授)

** 岡山大学歯学部口腔病理学講座
(主任：永井教之教授)

The First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama University Dental School
(Chief: Prof. Katsumi Nishijima)

* Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kagawa Medical School (Chief: Prof. Shunichiro Nagahata)

** The Department of Oral Pathology, Okayama University Dental School (Chief: Prof. Noriyuki Nagai)

受付日：昭和60年1月25日

家族歴、既往歴：特記事項なし。

現病歴：昭和49年7月、左眼窩下部から左頬部の疼痛性腫脹および左側鼻閉感に気づいたため、某耳鼻科を受診し、約1週間の投薬(抗生物質)を受け、一時症状は軽減した。しかし、約2週間後、再び同部の疼痛性腫脹に気づき、某大学病院耳鼻咽喉科を紹介され試験切除を受けたが、炎症とのことにて放置していた。症状は軽減せず某歯科で¹⁾7を抜歯したが、その後も同症状が続くため同年11月■日岡山大学医学部附属病院歯科口腔外科

写真1 初診時顔貌所見

写真 2 初診時頭部X線所見

写真 3 組織所見 (H-E 染色, 弱拡大)
紡錘形細胞が束状に交錯して増殖している。

を受診した。

現 症

全身所見：体格中等度，栄養状態良好。

口腔外所見：左眼窩下部に有痛性腫脹と圧痛が認められた。顎下リンパ節は左右とも小指頭大で，弾性軟，可動性のものをのおの1個触知し，圧痛は認められなかった（写真1）。

口腔内所見：456部の口蓋粘膜に圧痛，3-6部頬側歯肉に発赤と軽度の腫脹を認めたが，3-6の動揺，打診痛は認められなかった。また17の抜歯窩は左側上顎洞と交通していた。

X線所見：頭部X線写真正面像で，左側上顎洞は境界不明瞭で，右側と比較して不透過性が増していた。また，上顎骨外側壁は骨の過剰添加による骨皮質の膨隆と骨破

写真 4 組織所見 (H-E 染色, 強拡大)
腫瘍細胞は異型性が強く，核は楕円形または類円形である。 写真 5 組織所見 (ワン・ギーソン染色, 強拡大)
腫瘍細胞の胞体は黄染し，間質のコラーゲン線維は少ない。 写真 6 PAP 法によるデスミンの検出
一部の腫瘍細胞が陽性である。

壊が認められた（写真2）。

臨床検査成績：とくに異常値は認められなかった。

処置および経過：初診時，試験切除を行ったが，病理

表 1 平滑筋肉腫の報告例

症例	発 表 者	報告年	性	年齢	部 位	治 療 法	再 発	再手術	リンパ節転移	遠隔転移	観 察 期 間	予 後
1	Zieler ¹⁾ , Hayn ²⁾	1908 1910	女	67	頬 部	不 明						不明
2	Diss ら ³⁾	1924	女	—	頬 部	放射線療法					8 か月	死亡
3	Milian ら ⁴⁾	1926 1927	—	—	頬 部	不 明						不明
4	Carmody ら ⁵⁾	1944	男	18	下 顎	外科療法	有 (1 か月)	有			6 か月	生存
5	Geever ら ⁶⁾	1949	女	61	頬 部	外科療法	有			肺転移	7 年 6 か月	生存
6	Stout ら ⁷⁾	1958	男	82	オイガイ部	試験切除のみ				肺転移	1 年10か月	不明
7	Miles ら ⁸⁾	1962	男	34	下 顎	外科療法	有 (1 年)	有		肺・腰部転移	2 年 2 か月	死亡
8	Yannopoulos ら ⁹⁾	1962	男	1	舌	外科療法					4 年 8 か月	生存
9	O'Day ら ¹⁰⁾	1964	男	3	口 底	外科療法	有	有 (3 回)			最終手術後 1 年10か月	死亡
10	O'Day ら	1964	男	9	軟口蓋	放射線療法					2 年 6 か月	死亡
11	O'Day ら	1964	女	19	口 底	外科療法					11 年	生存
12	Pettini ¹¹⁾	1965	女	73	頬 部	外科療法						不明
13	Giardino ら ¹²⁾	1966	男	11	上 顎	外科療法	有 (15 日)					不明
14	Dor ら ¹³⁾	1967	男	57	下 顎	外科療法					2 年	生存
15	Kawabe ら ¹⁴⁾	1969	男	52	上 顎	外科・化学療法	有 (4 か月)	有	有	肺転移	1 年	死亡
16	Kawabe ¹⁴⁾	1969	男	60	上 顎	外科療法	有 (1 か月)		有		7 か月	死亡
17	Goldberg ら ¹⁵⁾	1970	男	54	舌	外科療法					2 年 6 か月	生存
18	Phillips ら ¹⁶⁾	1971	男	53	上 顎	外科療法					2 年	生存
19	Takagi ら ¹⁷⁾	1972	男	56	上 顎	外科療法	有 (2 年)	有	有		2 年 4 か月	死亡
20	Mindell ら ¹⁸⁾	1975	男	59	舌	外科療法					3 年	生存
21	Farman ら ¹⁹⁾	1977	女	88	頬 部	外科療法					6 か月	生存
22	Brandjord ²⁰⁾	1977	女	63	口 底	外科療法			有	肺転移	2 年 4 か月	不明
23	斎藤 ²¹⁾	1977	男	55	上 顎	化学・放射線療法			有	全身転移	7 か月	死亡
24	Robinson ら ²²⁾	1978	男	74	頬 部	外科療法					19 年	生存
25	Martis ²³⁾	1978	男	67	上 顎	外科療法				肺転移	2 年11か月	死亡
26	Martis ²³⁾	1978	男	24	上 顎	外科療法					1 年10か月	生存
27	中村 ²⁴⁾	1978	女	42	上 顎	外科・化学・放射線療法					4 か月	生存
28	鈴木 ²⁵⁾	1979	女	54	上 顎	放射線療法	有 (1 年)			有	1 年 3 か月	死亡
29	Weitzner ²⁶⁾	1980	女	39	上 顎	外科療法					2 年10か月	生存
30	Kratochvil ら ²⁷⁾	1982	男	51	上 顎	外科療法						不明
31	本症例		女	42	上 顎	外科・化学・放射線療法	有				9 か月	死亡

組織学的に壊死組織と出血がみられたのみで、悪性の所見は認められなかった。しかし、X線所見および臨床経過より、左上顎悪性腫瘍を疑い、昭和49年12月[]に左上顎骨部分切除術と左顎下リンパ節の摘出術を施行した。約3週間後、上顎骨切除部に著明な肉芽様組織の増殖が認められ、昭和50年3月[]左側眼窩下部を中心に著明な腫脹を呈してきたため、腫瘍部に対して、Tele Co⁶⁰ 7,600 rad 照射し、また化学療法としてBLMを総

量 195 mg, および FT 207 総量 7,200 mg 投与した。しかし腫瘍の縮小は認められず, 全身衰弱し, 初診から9か月目に死の転帰をとった。

病理組織学的所見: 腫瘍実質は比較的細胞密度が高く, 不規則に交錯しながら増殖していた。強拡大では, 腫瘍細胞は異型性が強く, 核は両端が鈍で大小の楕円形または類円形を呈し, 核周辺には空胞形成がみられ, 核分裂像も認められた。腫瘍細胞はワン・ギーソン染色にて胞体が黄染し, 間質のコラーゲン線維はごくわずかであった。好銀線維は腫瘍細胞を明瞭にとり囲み, PAS 染色ではわずかな陽性顆粒が認められ, desmin 陽性を示した(写真3~6)。以上の所見から平滑筋肉腫と診断された。

考 察

平滑筋肉腫は口腔領域ではきわめてまれで, 初期には比較的限局した腫瘤を作り, しばしば中心部に壊死や出血をみるが, 後には浸潤性に増大し, 転移を形成するといわれている^{28,29)}。

今回, われわれが渉猟し得た1908年以降1983年までの76年間に報告された口腔領域の平滑筋肉腫30例に自験例1例を加えた31例について統計的観察を行った(表1)。発生頻度は男性19例(61.3%), 女性11例(35.5%), 不明1例(3.2%)とやや男性に多く, 発生年齢は1歳から88歳で, 平均47.0歳であった。

平滑筋肉腫の好発部位はおもに子宮, 胃, 腸, 後腹膜, 四肢の軟組織で, 口腔領域ではきわめてまれである²⁸⁾。口腔領域における発生部位は上顎14例(45.2%), 頬部7例(22.9%)で以下舌, 口底, 下顎などであった。Kratochvil ら²⁷⁾は骨に発生した平滑筋肉腫20例について観察し, 上顎25%, 下顎15%と顎骨に発生したものは全体の40%であったと報告している。本例は比較的多いとされている上顎に発生したものであった。

口腔領域に出現する平滑筋肉腫の発生源として, 一般に血管壁が考えられているが^{16,19,30,31)}有廓乳頭^{16,30)}, 異所性平滑筋¹⁶⁾, 頰の迷走性毛嚢³²⁾などもあげている。本例の場合も詳細は不明であるが, 上顎洞内の血管壁から発生し上顎骨に腫瘍が浸潤したものではないかと考えている。

本症の臨床所見は, 灰色を帯びた円形の膨隆した硬い腫瘍で, 一見良性腫瘍と類似している³³⁾が, 浸潤性に進行し, 軟組織や骨組織を破壊し, 潰瘍を形成する³⁴⁾。また Martis and Greece²³⁾は平滑筋腫と鑑別する場合, 直径2.5 cm 以上の無痛性腫瘍で, 潰瘍形成が認められれば, 平滑筋肉腫であろうと述べている。

組織学的所見で, 正常の平滑筋細胞は長い紡錘形で, 核の形は棒状または紡錘状で, 繊細なクロマチン網と, かなり明瞭な核小体(1~2個)をもち, 細胞質はエオ

ジンに赤く染まり, 繊細な線維構造がみられる³⁵⁾。一方, 平滑筋肉腫は細胞密度が著しく高く, 多形性で核はクロマチンに富み, 核分裂像をみることが多い。診断上, 核分裂像の数が重要で, 細胞密度の高い部位を高倍率で10視野観察し, 合計5個以上の分裂像が認められれば悪性の可能性がきわめて高くなる²⁹⁾。しかし壊死や変性等により組織像が変化すれば, 診断は困難となり, 線維肉腫, 神経原性肉腫などとの鑑別が必要である。最近, 筋肉系腫瘍の診断に免疫組織化学染色が使われているが, デスミンもその1つである³⁶⁾。今回 PAP 法により検討した結果, 腫瘍細胞の一部に陽性細胞をみ出すことができた。

治療法としては, 外科的療法単独が21例(67.7%)と大多数を占め, 放射線療法, 化学療法を併用しているのはごく少数であった。これは平滑筋肉腫が一般に放射線感受性が低く, 化学療法に対しても反応が低いとされているためと考えられる。それゆえ Phillips and Brown⁶⁾は治療法は, 外科的療法による広範囲な腫瘍切除術が用いられる場合が多いと述べている。本例においては外科的療法を施行したにもかかわらず再発し, 再発時の進行がはやく手術不適応と考えたため放射線療法と化学療法を行った。

一般に肉腫は血行性に肺などに転移をきたすことが知られているが, われわれの集計でも肺などへの遠隔転移8例, 所属リンパ節転移5例で, リンパ節のみ転移したものはわずか2例であった。

予後は一般に不良で, 本集計でも生存しているものは13例(41.9%)で, そのうち再発, 遠隔転移もなく生存しているものは11例(35.5%)であった。生存している13例の観察期間は4か月から19年であった。

Brandjord ら²⁰⁾は周囲組織の不完全な摘出が最も本腫瘍の予後を不良にする原因で, 最初の手術で広範囲な切除が行えたら予後は良好であると述べている。今回, われわれが行った集計においても初回治療時に広範囲な切除術が施行されている症例は予後良好であった。

結 語

われわれは, 42歳, 女性の上顎に発生した平滑筋肉腫についてその概要を報告, 過去76年間における口腔領域での報告例を集計し, 統計的観察を行い以下の結果を得た。

- 1) 発生頻度は男性にやや多く, 年齢は1歳から88歳で, 平均47歳であった。
- 2) 発生部位は上顎, 頬部, 舌, 口底, 下顎の順であった。
- 3) 治療法は外科的療法単独が大多数であった。
- 4) 予後は再発, 遠隔転移もなく生存しているものは35.5%であった。

本論文の要旨は第5回日本口腔外科学会中国四国地方会（昭和51年2月22日）において発表した。

引用文献

- 1) Zieler, G.: Üeber ein Malignes Myom der Haut. Virch Dtsch Pathol Ges 12: 142-144 1908. 19) より引用.
- 2) Hayn, F.: Zur Kenntnis der destruierenden Myome der Haut. Arch Derm Syph 105: 211-234 1910.
- 3) Diss, A. and Lévy, G.: Leiomyosarcome développé sur ancien lupus tuberculeux de la face. Bull Soc Derm Syph 31: 108-110 1924.
- 4) Milian, G. and Périn, L.: Bull Soc fr Derm Syph 33: 621 1926. 31) より引用.
- 5) Carmody, T.E., Janney, H.M., et al.: Leiomyosarcoma of the mandible. Report of a case. J Amer Dent Ass 31: 1110-1113 1944.
- 6) Geever, E.F.: Leiomyosarcoma of the buccal region. Cancer Seminar 1: 15 1949. 20) より引用.
- 7) Stout, A.P. and Hill, W.T.: Leiomyosarcoma of the superficial soft tissues. Cancer 11: 844-854 1958.
- 8) Miles, A.E.W. and Waterhouse, J.P.: A Leiomyosarcoma of the oral cavity with metastasis to Lymph-Glands. J Path Bact 83: 551-555 1962.
- 9) Yannopoulos, K. and Stout, A.P.: Smooth Muscle Tumors in Children. Cancer 15: 958-971 1962.
- 10) O'Day, R.A., Soule, E.H., et al.: Soft tissue sarcomas of the oral cavity. Mayo clin Proc 39: 169-181 1964.
- 11) Pettini, D.P.: Su un raro caso di leiomioma della guancia. Ann Stomat 14: 965-979 1965.
- 12) Giardino, C. and Valleta, G.: Gingival Leiomyosarcoma of the Maxilla. Arch Stomatol (Roma) 7: 315-322 1966. 19) より引用.
- 13) Dor, P., Mayer, R., et al.: Le leiomyosarcome de la mandibule. Acta stomat belg 64: 277-287 1967.
- 14) Kawabe, Y., Kondo, T., et al.: Two cases of leiomyosarcoma of the maxillary Sinuses. Arch Otolaryng 90: 492-495 1969.
- 15) Goldberg, M.H., Polivy, C., et al.: Leiomyosarcoma of the tongue: report of case. J Oral Surg 28: 608-611 1970.
- 16) Phillips, H. and Brown, A.: Leiomyosarcoma: report of case. J Oral Surg 29: 194-195 1971.
- 17) Takagi, M. and Ishikawa, G.: An autopsy case of leiomyosarcoma of the maxilla. J Oral Path 1: 125-132 1972.
- 18) Mindell, R.S., Calcaterra, T.C., et al.: Leiomyosarcoma of the head and neck: a review of the literature and report of two cases. Laryngoscope 85: 904-910 1975.
- 19) Farman, A.G. and Kay, S.: Oral leiomyosarcoma: Report of a case and review of the literature pertaining to smooth-muscle tumors of the oral cavity. Oral Surg 43: 402-409 1977.
- 20) Brandjord, R.M., Reaume, C.E., et al.: Leiomyosarcoma of the floor of the mouth: review of the literature and report of case. J Oral Surg 35: 590-594 1977.
- 21) 斎藤利夫, 佐々木正明, 他: 上顎に発生した平滑筋肉腫の1例. 日口外誌 23: 413-417 1977.
- 22) Robinson, E.C. and Whyte, A.M.: Leiomyosarcoma of the cheek: a case report. Brit J Oral Surg 16: 100-104 1978-79.
- 23) Martis, C. and Greece, T.: Leiomyosarcoma of the maxilla: report of two cases. J Oral Surg 36: 62-65 1978.
- 24) 中村昭一, 塩沢誠士郎, 他: 上顎に生じた平滑筋肉腫の1例(抄). 日口外誌 24: 643 1978.
- 25) 鈴木 湛, 酒井俊一, 他: 上顎部平滑筋肉腫の1例. 耳鼻臨床 72: 1493-1498 1979.
- 26) Weitzner, S.: Leiomyosarcoma of the anterior maxillary alveolar ridge. Oral Surg 50: 62-64 1980.
- 27) Kratochvil, F.J., MacGregor, S.D., et al.: Leiomyosarcoma of the maxilla: report of a case and review of the literature. Oral Surg 54: 647-655 1982.
- 28) 石川梧朗監修: 口腔病理学Ⅱ. 改訂版, 永末書店, 京都, 1982, 654-655頁.
- 29) 小野江為則編: 電顕腫瘍病理学. 第1版, 南山堂, 東京, 1982, 50-55頁.
- 30) Stout, A.P.: Leiomyoma of the oral cavity. Amer J Cancer 34: 31-36 1938.
- 31) MacDonald, D.G.: Smooth muscle tumours of the mouth. Brit J Oral Surg 6: 207-214 1969.
- 32) Abulafia, J. and Grinspan, D.: Leiomyomas de la piel. Arch Argent Derm 6: 1-46 1956.
- 33) Pimpinella, R.J. and Marquit, B.: Leiomyosarcoma of nose, nasopharynx and paranasal sinuses. Ann Otolaryng 74: 623-630 1965.
- 34) Stout, A., et al.: Tumors of the soft tissues. 127. Armed Forces Institute of Pathology, 1967. 21) より引用.
- 35) 藤田尚男, 藤田恒夫: 標準組織学総論, 第1版, 医学書院, 東京, 1979, 156-161頁.
- 36) Mucai, M., Iri, H., et al.: Immunoperoxidase demonstration of a new muscle protein (Z-protein) in myogenic tumors as a diagnostic aid. Am J Pathol 114: 164-170 1984.